

### Exercice 1 :


Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir; sinon la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont 1% est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants :

- si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85% des cas ;
- si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas ;

On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilité pour la population entière et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie.

On note  $M$  l'événement « l'animal est porteur de la maladie » et  $T$  l'événement « le test est positif ».

1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation.



2. Un animal est choisi au hasard.

- a) Quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie et que son test soit positif?

$$P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,01 \times 0,85 = 0,0085$$

Ainsi, la probabilité que l'animal soit porteur de la maladie est égale à 0,0085.

- b) Calculer la probabilité que son test soit positif.

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T) = 0,0085 + 0,99 \times 0,05 = 0,058$$

Ainsi, la probabilité que le test de l'animal soit positif est égale à 0,058.

3. Un animal est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie?

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,0085}{0,058} = \frac{17}{116}$$

Ainsi, la probabilité que l'animal soit porteur de la maladie sachant que son test est positif est égale à  $\frac{17}{116}$ , soit environ 0,147.

**Exercice 2 :**

Une entreprise fabrique, en grande quantité, des pièces métalliques rectangulaires dont les cotes sont exprimées en millimètres.

Un contrôle de qualité consiste à vérifier que la longueur et la largeur des pièces sont conformes à la norme en vigueur.

On suppose que la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans le stock de l'entreprise soit conforme est 0,9.

Deux machines automatiques de l'entreprise notées « machine 1 » et « machine 2 » fabriquent ces pièces en grande quantité.

On suppose que la probabilité qu'une pièce :

- prélevée au hasard dans la production d'une journée de la machine 1 soit conforme est 0,914 ;
- prélevée au hasard dans la production d'une journée de la machine 2 soit conforme est 0,879 ;

La machine 1 fournit 60% de la production totale de ces pièces et la machine 2 le reste de cette production.

On prélève au hasard une pièce parmi la production totale de l'entreprise de la journée.

On définit les événements suivants :

- A : « La pièce provient de la machine 1 » ;
- B : « La pièce provient de la machine 2 » ;
- C : « La pièce est conforme » ;

- a. Déterminer les probabilités  $P(A)$ ,  $P(B)$ ,  $P_A(C)$  et  $P_B(C)$ . La machine 1 fournit 60% de la production donc la machine 2 en fournit 40% d'où :

➤  $P(A) = 0,6$

➤  $P(B) = 0,4$

D'autre part d'après l'énoncé on a également :

➤  $P_A(C) = 0,914$

➤  $P_B(C) = 0,879$

- b. En déduire  $P(C \cap A)$  et  $P(C \cap B)$ .

➤  $P(C \cap A) = P_A(C) \times P(A) = 0,914 \times 0,6 = 0,5484$

➤  $P(C \cap B) = P_B(C) \times P(B) = 0,879 \times 0,4 = 0,3516$

- c. Calculer  $P(C)$ . D'après la formule des probabilités totales :

$$P(C) = P(C \cap A) + P(C \cap B) = 0,5484 + 0,3516 = 0,9$$