

UNIwersytet Medyczny \_\_\_\_\_

Wydział Nauk o Zdrowiu — Kierunek: Dietetyka

**Natalia Szymańska**

nr albumu 000000

**Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w wieku 19–30 lat o różnym poziomie aktywności fizycznej**

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr hab. n. o zdr. \_\_\_\_\_

Poznań, 2026

**Jak korzystać z tego wzoru.** To kompletny szkielet **empirycznej pracy magisterskiej z dietetyki** w najczęstszym schemacie kierunku: ocena sposobu żywienia (wywiad żywieniowy, kwestionariusz częstotliwości spożycia) i stanu odżywienia (antropometria) badanej grupy, z porównaniem do norm żywienia i wnioskami dla poradnictwa dietetycznego. Konwencja medyczna: streszczenie strukturalne, rozdział „Materiał i metody”, piśmiennictwo Vancouver. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Dane liczbowe są fikcyjne. Pełne poradniki: [praca-magisterska.pl/poradniki/](http://praca-magisterska.pl/poradniki/)

## Streszczenie

**Wstęp.** Sposób żywienia młodych dorosłych kobiet często odbiega od zaleceń, a regularna aktywność fizyczna bywa uznawana za czynnik sprzyjający korzystniejszemu wyborowi żywieniowemu. Zależność ta nie jest jednak jednoznaczna i wymaga weryfikacji w badaniach własnych.

**Cel pracy.** Ocena i porównanie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia kobiet w wieku 19–30 lat o wysokim i niskim poziomie aktywności fizycznej.

**Materiał i metody.** Badaniem objęto 96 kobiet (48 trenujących regularnie, 48 o niskiej aktywności). Sposób żywienia oceniono metodą trzykrotnego wywiadu 24-godzinowego (analiza w programie komputerowym, porównanie z normami żywienia dla populacji Polski) oraz walidowanym kwestionariuszem częstotliwości spożycia. Stan odżywienia oceniono pomiarami antropometrycznymi (masa ciała, wzrost, obwody; wskaźniki BMI i WHR). Różnice między grupami weryfikowano testem t-Studenta lub U Manna-Whitneya ( $p < 0,05$ ).

**Wyniki.** Średnia wartość energetyczna diety nie różniła się istotnie między grupami, natomiast kobiety aktywne spożywały istotnie więcej białka (1,4 vs 1,0 g/kg mc.;  $p < 0,001$ ) i błonnika (24,1 vs 18,3 g/d;  $p = 0,002$ ). W obu grupach stwierdzono spożycie wapnia i witaminy D poniżej norm (odpowiednio 72% i 38% realizacji normy w całej próbie). Nieprawidłową masę ciała (BMI poza zakresem 18,5–24,9) częściej obserwowano w grupie o niskiej aktywności (31% vs 15%).

**Wnioski.** Wyższa aktywność fizyczna współwystępuje z korzystniejszą strukturą diety, lecz nie eliminuje niedoborów wspólnych dla całej badanej populacji (wapń, witamina D). Poradnictwo dietetyczne dla młodych kobiet powinno akcentować źródła wapnia i suplementację witaminy D niezależnie od poziomu aktywności.

**Słowa kluczowe:** sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczna, wywiad żywieniowy, młode kobiety.

*[Streszczenie strukturalne jak w czasopiśmie medycznym. Zwróć uwagę na precyzję jednostek (g/kg mc., g/d, % realizacji normy) — to warsztatowa wizytówka pracy z dietetyki.]*

## Spis treści

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Wykaz skrótów .....                                                    | 3  |
| Wstęp .....                                                            | 4  |
| Rozdział 1. Żywnienie młodych dorosłych — przegląd piśmiennictwa ..... | 6  |
| 1.1. Normy żywienia i zasady zdrowej diety .....                       | 6  |
| 1.2. Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia .....            | 11 |
| 1.3. Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe — stan badań .....     | 16 |
| Rozdział 2. Materiał i metody .....                                    | 21 |
| 2.1. Cel pracy, pytania badawcze i hipotezy .....                      | 21 |
| 2.2. Charakterystyka badanej grupy i organizacja badania .....         | 23 |
| 2.3. Ocena sposobu żywienia .....                                      | 25 |
| 2.4. Ocena stanu odżywienia .....                                      | 28 |
| 2.5. Analiza statystyczna .....                                        | 30 |
| Rozdział 3. Wyniki .....                                               | 32 |
| 3.1. Wartość energetyczna i odżywcza diet .....                        | 32 |
| 3.2. Realizacja norm na wybrane składniki .....                        | 37 |
| 3.3. Stan odżywienia badanych .....                                    | 42 |
| Rozdział 4. Dyskusja .....                                             | 46 |
| Wnioski .....                                                          | 51 |
| Piśmiennictwo · Spis tabel i rycin · Załączniki .....                  | 53 |

## Rozdział 2. Materiał i metody

### 2.2. Charakterystyka badanej grupy i organizacja badania

Badanie przeprowadzono od lutego do kwietnia 2026 roku wśród 96 kobiet w wieku 19–30 lat. Grupę badaną ( $n = 48$ ) stanowiły kobiety trenujące regularnie (co najmniej 3 treningi tygodniowo od minimum 6 miesięcy), rekrutowane w klubach fitness; grupę porównawczą ( $n = 48$ ) — kobiety o niskiej aktywności fizycznej, rekrutowane wśród studentek kierunków niezwiązanych ze sportem. Kryteria wykluczenia: ciąża i laktacja, zdiagnozowane choroby przewlekłe wymagające diety leczniczej, stosowanie diety redukcyjnej w okresie badania. Udział był dobrowolny i poufny; badanie uzyskało pozytywną opinię uczelnianej komisji bioetycznej (nr \_\_\_\_\_).

*[Prace z dietetyki wymagają precyzyjnych KRYTERIÓW WŁĄCZENIA I WYKLUCZENIA — dieta lecznicza czy ciąża zmieniają zapotrzebowanie i zafałszowałyby porównanie. Zdefiniuj też operacyjnie „aktywność fizyczną” (ile treningów, od kiedy).]*

### 2.3. Ocena sposobu żywienia

Sposób żywienia oceniono metodą trzykrotnego wywiadu 24-godzinnego (dwa dni powszednie i jeden dzień weekendowy), prowadzonego z użyciem albumu fotografii produktów i potraw dla doprecyzowania wielkości porcji. Wartość energetyczną i odżywczą diet obliczono w programie komputerowym opartym na krajowych tabelach składu i wartości odżywczej żywności, a uzyskane wartości odniesiono do aktualnych norm żywienia dla populacji Polski na poziomie EAR lub AI, z uwzględnieniem poprawki na niedoszacowanie spożycia. Zwyczaj żywieniowe scharakteryzowano dodatkowo walidowanym kwestionariuszem częstotliwości spożycia.<sup>1</sup>

*[Warsztat dietetyka w komplecie: metoda wywiadu (ile powtórzeń, jakie dni), album porcji, program obliczeniowy, normy i poziom odniesienia (EAR/AI), narzędzie FFQ. Każdy z tych elementów recenzent może sprawdzić pytaniem na obronie.]*

### 2.4. Ocena stanu odżywienia

Wykonano pomiary antropometryczne: masy ciała (waga ze wzrostomierzem, pomiar w białym, rano na czczo), wzrostu oraz obwodów talii i bioder taśmą antropometryczną według standardowej procedury. Obliczono wskaźniki BMI i WHR, przyjmując klasyfikację WHO (BMI: niedowaga < 18,5; norma 18,5–24,9; nadwaga 25,0–29,9; otyłość  $\geq 30,0$  kg/m<sup>2</sup>).

## Rozdział 3. Wyniki

### 3.2. Realizacja norm na wybrane składniki

Średnia realizacja normy na wapń wyniosła w całej próbie 72%, a na witaminę D — 38%, bez istotnych różnic między grupami. Spożycie białka było istotnie wyższe w grupie aktywnej (1,4 vs 1,0 g/kg mc.;  $p < 0,001$ ), podobnie jak spożycie błonnika (24,1 vs 18,3 g/d;  $p = 0,002$ ).

| Składnik          | Grupa aktywna | Grupa o niskiej aktywności | p       |
|-------------------|---------------|----------------------------|---------|
| Energia (kcal/d)  | 2140          | 2035                       | 0,214   |
| Białko (g/kg mc.) | 1,4           | 1,0                        | < 0,001 |

<sup>1</sup>W polskich pracach standardem jest kwestionariusz KomPAN (Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN) — podaj wersję, źródło i zasady punktacji. Wywiad 24-godzinny i FFQ wzajemnie się uzupełniają: pierwszy daje wartości liczbowe, drugi — obraz zwyczajów.

| Składnik             | Grupa aktywna | Grupa o niskiej aktywności | p     |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Błonnik (g/d)        | 24,1          | 18,3                       | 0,002 |
| Wapń (% normy)       | 74%           | 70%                        | 0,391 |
| Witamina D (% normy) | 41%           | 35%                        | 0,246 |

*[Tabela wynikowa z jednostkami i wartościami p; pod tabelą „Źródło: badania własne”. W tekście komentuj wzorzec (co się różni, co wspólne), nie przepisuj tabeli słowami.]*

## Rozdział 4. Dyskusja

Uzyskane wyniki wpisują się w doniesienia o korzystniejszej strukturze diety osób aktywnych przy zachowanych niedoborach typowych dla całej populacji młodych kobiet — zwłaszcza wapnia i witaminy D. Praktyczne znaczenie ma rozdzielenie tych dwóch warstw: różnice między grupami dotyczą składników związanych ze świadomym komponowaniem diety „pod trening” (białko, błonnik), natomiast niedobory wspólne wskazują na luki wiedzy niezależne od aktywności. Ograniczenia pracy: deklaracyjny charakter wywiadów żywieniowych (ryzyko niedoszacowania spożycia), dobór celowy próby oraz przekrojowy charakter badania, który nie uprawnia do wnioskowania przyczynowego.

## Wnioski

1. Kobiety aktywne fizycznie spożywają istotnie więcej białka i błonnika niż kobiety o niskiej aktywności, przy porównywalnej wartości energetycznej diety.
2. Niedobory wapnia i witaminy D dotyczą obu grup i mają charakter populacyjny, nie związany z poziomem aktywności.
3. Poradnictwo dietetyczne dla młodych kobiet powinno akcentować źródła wapnia i zasadność suplementacji witaminy D niezależnie od stylu życia; w grupie o niskiej aktywności dodatkowym priorytetem jest podaż błonnika.

## Piśmiennictwo

*[Styl Vancouver — numeracja według kolejności cytowania. Obowiązkowe pozycje warsztatu: aktualne normy żywienia dla populacji Polski, tabele składu żywności, źródło kwestionariusza FFQ.]*

1. Jarosz M. i wsp. (red.), *Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie*, NIZP-PZH, Warszawa (aktualne wydanie).
2. Kunachowicz H. i wsp., *Tabele składu i wartości odżywczej żywności*, Warszawa (aktualne wydanie).
3. Gawęcki J. (red.), *Żywnienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu*, Warszawa 2022.
4. Kwestionariusz KomPAN — dokumentacja metodyczna Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN (podaj wersję i rok).