

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ**  
**Кафедра вычислительной математики**

**Отчёт**  
**Лабораторная работа №1**  
**“Интерполирование функций”**  
**Вариант № 12**

Снежко Льва Владимировича  
студента 3 курса, 3 группы  
специальности «Информатика»  
дисциплина «Численные методы»  
Преподаватель: Будник А.М.

Минск, 2025

## Содержание:

Постановка задачи.....	3
Алгоритм решения.....	4
Листинг программы.....	6
Результат и его анализ.....	8

## Постановка задачи

Рассмотрим набор различных точек на отрезке  $[a, b]$ :

$$x_0 < x_1 < \dots < x_n, x_i \in [a, b], i = \overline{0, n}.$$

$$y_i = f(x_i), i = \overline{0, n}$$

Требуется восстановить значение функции  $f(x) = \alpha_j e^x + (1 - \alpha_j) \sin x$  в других точках  $x^*, x^{**}, x^{***} \in [a, b]$ :

$$[a, b] = [\alpha_j, 1 + \alpha_j], \text{ где}$$

$$\alpha_j = 0.1 + 0.05 \cdot j = [j = 12 - \text{номер варианта}] = 0.1 + 0.05 \cdot 12 = 0.7.$$

Таким образом имеем:

$$[a, b] = [0.7, 1.7]$$

$$f(x) = 0.7e^x + 0.7 \sin x$$

Необходимо интерполировать эту функцию:

1. Многочленом Ньютона  $P_{10}(x)$  на равномерной сетке;

Задача:

- Вычислить значения интерполяционного многочлена в точках  $x^*, x^{**}, x^{***}$ ;
- Вычислить остаток интерполирования в точках  $x^*, x^{**}, x^{***}$ ;
- Вычислить истинную погрешность  $r_{n, \text{ист.}}$ ;
- Сравнить и проанализировать полученные результаты.

## Алгоритм решения

### 1. Интерполирование многочленом Ньютона на равномерной сетке

Пусть  $x_i$  заданы равномерно на отрезке  $[0.5, 1.5]$ :

$$x_i = \alpha_i + ih, \text{ где}$$

$$h = \frac{1}{n}, \quad i = \overline{0, n}, \quad n = 10, \text{ т.е.}$$

$$h = 0.1$$

$$x_i = 0.7 + 0.1 \cdot i, \quad i = \overline{0, 10}$$

3 точки восстановления:

$$x^* = x_0 + \frac{2}{3}h = 0.5 + \frac{2}{3} \cdot 0.1 = 0.766667,$$

$$x^{**} = x_{\frac{n}{2}} + \frac{1}{2}h = x_5 + \frac{1}{2}h = 1 + 0.5 \cdot 0.1 = 1.05,$$

$$x^{***} = x_n - \frac{1}{3}h = 1.5 - \frac{1}{3} \cdot 0.1 = 1.466667$$

Интерполяционный многочлен в форме Ньютона будем искать в следующем виде:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \omega_i(x) = \alpha_0 + \alpha_1 (x - x_0) + \alpha_2 (x - x_0)(x - x_1) \dots \alpha_n (x - x_0) \dots (x - x_{n-1}),$$

$$\text{где } \omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j), \quad i = \overline{0, 10}$$

Коэффициенты ИМ удобно вычислять по определению разделённых разностей:

$$\alpha_i = f[x_0, \dots, x_i], \quad i = \overline{0, 10}$$

$$f[x_0, \dots, x_i] = \frac{f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}]}{x_i - x_0}, \quad i = \overline{1, 10};$$

$$f[x_j] = f(x_j), \quad j = \overline{0, 10}$$

путём построения треугольной таблицы следующего вида:

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_0, f[x_0] & & & & & & \\
 & f[x_0, x_1] & & & & & \\
 x_1, f[x_1] & & f[x_0, x_1, x_2] & & & & \\
 & f[x_1, x_2] & & \ddots & & & \\
 x_2, f[x_2] & & f[x_0, x_1, x_2] & & f[x_0, \dots, x_{n-1}] & & \\
 \vdots & f[x_2, x_3] & \vdots & & & f[x_0, \dots, x_n] & \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & & f[x_1, \dots, x_n] & \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & & \\
 x_{n-1}, f[x_{n-1}] & \vdots & f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] & & & & \\
 & f[x_{n-1}, x_n] & & & & & \\
 x_n, f[x_n] & & & & & & 
 \end{array}$$

Остаток интерполирования в точках  $x^*$ ,  $x^{**}$ ,  $x^{***}$  вычислим по следующей формуле:

$$r_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x), \quad x \in \{x^*, x^{**}, x^{***}\}$$

Истинную погрешность вычислим так:

$$r_{n,\text{ист}}(x^*) = f(x^*) - P_n(x^*)$$

## Листинг кода

```
%pip install tabulate
%pip install sympy
import numpy as np
import math
from tabulate import tabulate
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import sympy as sp

j = 12
n = 10
alpha_j = 0.1 + 0.05*j
h = 1/n
def f(x):
    return alpha_j * math.exp(x) + (1 - alpha_j) * math.sin(x)

# Шаг 1. Построим исходную таблицу
x_vals = np.array([alpha_j + i * h for i in range(n+1)])
f_vals = np.array([f(x_) for x_ in x_vals])
x_star = np.array([x_vals[0] + 2/3*h, x_vals[n // 2] / 2 + 0.5 * h, x_vals[-1] - 1/3*h])
f_star = np.array([f(x_) for x_ in x_star])
print(tabulate(zip(x_vals, f_vals), headers=['x', 'f(x)']))
print('\nСпециальные точки')
print(tabulate(zip(x_star, f_star), headers=['x*', 'f(x*)']))

# Таблица значений функции
table = pd.DataFrame({"x_i": x_vals, "f(x_i)": f_vals})
table_transposed = table.T

# Точки для проверки интерполяции
x_star1 = x_star[0]
x_star2 = x_star[1]
x_star3 = x_star[2]

f_x_star = f_star[0]
f_x_star2 = f_star[1]
f_x_star3 = f_star[2]

def compute_newton_coefficients(x_vals, y_vals):
    """
    Возвращает список коэффициентов интерполяционного многочлена Ньютона
    с использованием рекурсивного определения разделённых разностей.
    """
    n = len(x_vals)
    # Создаём таблицу размером n x n
    dd_table = [y_vals.copy()] # f[x_i]

    for level in range(1, n):
        prev_column = dd_table[-1]
        curr_column = []
```

```

        for i in range(n - level):
            numerator = prev_column[i + 1] - prev_column[i]
            denominator = x_vals[i + level] - x_vals[i]
            curr_column.append(numerator / denominator)
        dd_table.append(curr_column)

    # Коэффициенты Ньютона – это верхние элементы каждого столбца
    return [dd_table[i][0] for i in range(n)]

newton_coeffs = compute_newton_coefficients(x_vals, f_vals)
def newton_interpolation(x_vals, y_vals, x, coef):
    """
    Вычисляет значение интерполяционного многочлена Ньютона в точке x
    с использованием рекурсивной формулы:
     $P_{n+1}(x) = P_n(x) + \alpha_{n+1} * \omega_{n+1}(x)$ 
    """
    result = coef[0]
    omega = 1.0
    for i in range(1, len(coef)):
        omega *= (x - x_vals[i - 1])
        result += coef[i] * omega
    return result

P_x_star = newton_interpolation(x_vals, f_vals, x_star1, newton_coeffs)
P_x_star2 = newton_interpolation(x_vals, f_vals, x_star2, newton_coeffs)
P_x_star3 = newton_interpolation(x_vals, f_vals, x_star3, newton_coeffs)

# Результаты интерполяции
data = {
    "Точка": ["x*", "x**", "x***"],
    "Значение x": [x_star1, x_star2, x_star3],
    "f(x)": [f_x_star, f_x_star2, f_x_star3],
    "P(x) (полином)": [P_x_star, P_x_star2, P_x_star3]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Производная (n+1)-го порядка
x = sp.Symbol('x')
f_sym = alpha_j * sp.exp(x) + (1 - alpha_j) * sp.sin(x)
f_derivative = sp.diff(f_sym, x, n + 1)

# Максимум абсолютного значения производной на отрезке [0.7, 1.7]
f_derivative_abs = sp.lambdify(x, sp.Abs(f_derivative), 'numpy')
x_test = np.linspace(0.7, 1.7, 1000)
M_max = np.max(f_derivative_abs(x_test))

# Истинная погрешность
r_x_star = f_x_star - P_x_star
r_x_star2 = f_x_star2 - P_x_star2
r_x_star3 = f_x_star3 - P_x_star3

# Оценка погрешности по неравенству
factorial = math.factorial(n + 1)
x_stars = [x_star1, x_star2, x_star3]
r_x_stars = [r_x_star, r_x_star2, r_x_star3]
error_bound_stars = []

```

```

for x_val in x_stars:
    prod_term = np.prod([abs(x_val - xi) for xi in x_vals])
    error_bound = M_max / factorial * prod_term
    error_bound_stars.append(error_bound)

# Проверка выполнения неравенства
is_error_bound_stars_valid = [
    abs(r_x_stars[i]) <= error_bound_stars[i] for i in range(3)
]

# Таблица ошибок
error_table = pd.DataFrame({
    "Точка": ["x*", "x**", "x***"],
    "Значение x": [x_star1, x_star2, x_star3],
    "r истинная": [abs(r) for r in r_x_stars],
    "оценка погрешности": error_bound_stars,
    "M = max|f^(n+1)(x)|": [M_max] * 3,
    "Неравенство выполняется?": is_error_bound_stars_valid
})

# Вывод таблиц
display(table_transposed)
display(df)
display(error_table)

```

## Результаты

Таблица значений:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x <sub>i</sub>	0.700000	0.800000	0.90000	1.000000	1.100000	1.200000	1.300000	1.400000	1.500000	1.600000	1.700000
f(x <sub>i</sub> )	1.602892	1.773085	1.95672	2.155239	2.370278	2.603694	2.857575	3.134275	3.436431	3.766995	4.129263

	Точка	Значение x	f(x)	P(x) (полином)
0	x*	0.766667	1.714927	1.714927
1	x**	0.650000	1.522435	1.522435
2	x***	1.666667	4.004765	4.004765

	Точка	Значение x	r истинная	оценка погрешности	M = max f^(n+1)(x)	Неравенство выполняется?
0	x*	0.766667	1.021405e-13	1.343614e-13	2.78765	True
1	x**	0.650000	3.516742e-12	4.688495e-12	2.78765	True
2	x***	1.666667	2.433609e-13	2.863766e-13	2.78765	True



Коэффициенты интерполяционного многочлена (разделенные разности):

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_10
0	1.602892	1.701933	0.672075	0.240342	0.081633	0.016566	0.0023	0.000369	0.000059	0.000006	5.661216e-07

Таблица разделённых разностей

	x_i	f[x0..x0]	f[x0..x1]	f[x0..x2]	f[x0..x3]	f[x0..x4]	f[x0..x5]	f[x0..x6]	f[x0..x7]	f[x0..x8]	f[x0..x9]	f[x0..x10]
0	0.7	1.602892e+00	1.773085	1.956720	2.155239	2.370278	2.603694	2.857575	3.134275	3.436431	3.766995	4.129263
1	0.8	1.701933e+00	1.836348	1.985183	2.150398	2.334151	2.538816	2.766998	3.021559	3.305639	3.622678	NaN
2	0.9	6.720749e-01	0.744178	0.826076	0.918765	1.023320	1.140911	1.272809	1.420399	1.585195	NaN	NaN
3	1.0	2.403423e-01	0.272996	0.308962	0.348518	0.391970	0.439659	0.491968	0.549321	NaN	NaN	NaN
4	1.1	8.163336e-02	0.089916	0.098889	0.108629	0.119224	0.130772	0.143382	NaN	NaN	NaN	NaN
5	1.2	1.656594e-02	0.017946	0.019480	0.021189	0.023095	0.025221	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
6	1.3	2.299651e-03	0.002558	0.002849	0.003176	0.003543	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
7	1.4	3.685241e-04	0.000416	0.000467	0.000524	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
8	1.5	5.893869e-05	0.000065	0.000071	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9	1.6	6.451632e-06	0.000007	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10	1.7	5.661216e-07	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

## Анализ

Порядок  $r_{\text{ист}}$  не превышает погрешности интерполяции в контрольных точках. Видно, что погрешность возрастает в точках, близких к краям отрезка и имеет наиболее точное значение в точке находящейся близко к середине отрезка. Разница погрешностей в зависимости от точки восстановления связана с возрастанием многочлена  $\omega(x)$  и расположением контрольной точки относительно ближайшего узла.

$$\omega_{n+1}(x^*) = -0.000002;$$

$$\omega_{n+1}(x^{**}) = 0.000064;$$

$$\omega_{n+1}(x^{***}) = 0.000123.$$