

# Quatitative Methoden der Informatik

## Zusammenfassung und Lernzettel

---

Kompakte Zusammenfassung der Vorlesungsinhalte für die Prüfungsvorbereitung.

Autor Levin Rüßmann  
Matrikelnummer 838791  
Studiengang Informatik B.Sc.  
Semester Sommersemester 2026  
Datum 12.07.2026

# Inhaltsverzeichnis

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Grundbegriffe</b>                         | <b>3</b>  |
| 1.1 Hypothese .....                            | 3         |
| 1.2 Modell .....                               | 3         |
| 1.3 Schlusstechniken .....                     | 3         |
| 1.3.1 Induktion .....                          | 3         |
| 1.3.2 Deduktion .....                          | 3         |
| 1.3.3 Abduktion .....                          | 3         |
| 1.4 Gütekriterien .....                        | 3         |
| 1.4.1 Ethische Aspekte .....                   | 3         |
| 1.4.2 Transparenz .....                        | 3         |
| 1.4.3 Objektivität .....                       | 3         |
| 1.4.4 Interne Validität .....                  | 4         |
| 1.4.5 Externe Validität .....                  | 4         |
| 1.5 Forschungsmethoden .....                   | 4         |
| 1.5.1 Quantitative Methoden .....              | 4         |
| 1.5.2 Qualitative Methoden .....               | 4         |
| 1.6 Stichprobe .....                           | 4         |
| 1.6.1 Zufallsstichprobe (Random Sample) .....  | 4         |
| 1.6.2 Klumpenstichprobe (Cluster Sample) ..... | 4         |
| <b>2 Deskriptive Statistik</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1 Lagemaße .....                             | 5         |
| 2.1.1 Median .....                             | 5         |
| 2.1.2 Modus .....                              | 5         |
| 2.1.3 Mittelwert .....                         | 5         |
| 2.1.4 MAD .....                                | 5         |
| 2.1.5 Quartile .....                           | 5         |
| 2.1.6 Quartile berechnen .....                 | 5         |
| 2.2 Streuungsmaße .....                        | 6         |
| 2.2.1 Spannweite .....                         | 6         |
| 2.2.2 Interquartilsabstand – IQR .....         | 6         |
| 2.2.3 Standardabweichung .....                 | 6         |
| 2.2.4 Varianz .....                            | 6         |
| 2.3 Zusammenhangsmaße .....                    | 7         |
| 2.3.1 Korrelation .....                        | 7         |
| 2.3.2 Kovarianz .....                          | 7         |
| 2.3.3 r-Wert – Korrelationskoeffizient .....   | 7         |
| 2.4 Diagramme .....                            | 8         |
| 2.4.1 Box-Plot .....                           | 8         |
| 2.4.2 Säulendiagramm / Balkendiagramm .....    | 8         |
| 2.4.3 Streudiagramm / Scatterplot .....        | 9         |
| <b>3 Normalverteilung</b>                      | <b>10</b> |
| 3.1 Rechnen mit der Normalverteilung .....     | 10        |
| 3.2 Normalverteilungstabelle .....             | 13        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Inferenzstatistik</b>                                       | <b>14</b> |
| 4.1 Chi-Quadrat-Test .....                                       | 14        |
| 4.1.1 Hypothesen .....                                           | 14        |
| 4.1.2 Die Formel .....                                           | 14        |
| 4.1.3 Freiheitsgrade .....                                       | 14        |
| 4.1.4 Kritischer Wert und Entscheidung .....                     | 15        |
| 4.1.5 Ablauf in der Klausur .....                                | 15        |
| <b>5 Taschenrechner: Casio fx-991DE X ClassWiz</b>               | <b>17</b> |
| 5.1 Stichprobe und Kennwerte (Menü 6: Statistik) .....           | 18        |
| 5.1.1 Stichprobe eingeben .....                                  | 18        |
| 5.1.2 Kennwerte ablesen .....                                    | 18        |
| 5.2 Tabellenkalkulation (Menü 8) .....                           | 19        |
| 5.2.1 Werte eingeben und auswerten .....                         | 19        |
| 5.2.2 Eigene Formeln und „Formel füllen“ .....                   | 20        |
| 5.3 Lineare Regression und Korrelation (Menü 6: $y=a+bx$ ) ..... | 20        |
| 5.4 Normalverteilung (Menü 7: Verteilungsfkt.) .....             | 21        |
| 5.5 Chi-Quadrat mit der Tabellenkalkulation .....                | 23        |

# 1 Grundbegriffe

## Informationen vorab

Dies ist eine Sammlung von Begriffen, die uns im Studium immer wieder begegnen werden, also nicht nur für die Klausur in Quantitative Methoden der Informatik. Für die Personen, welche die Probeklausuren nicht kennen: In der Klausur werden insbesondere die **Gütekriterien** und **Stichprobe** eine Rolle spielen.

## 1.1 Hypothese

Eine Hypothese ist eine Aussage, abgeleitet aus einer Theorie oder einer Beobachtung. Hypothesen sind nicht so umfangreich wie eine Theorie und stellen eine Vermutung zu einem Sachverhalt auf. Sie sind überprüfbar und können bestätigt bzw. bewiesen werden. Wissenschaftliche Hypothesen prüfen Zusammenhänge.

## 1.2 Modell

Modelle sind vereinfachte Darstellungen relevanter Teile der Realität. Die Repräsentation der Realität durch Modelle ermöglicht eine einfachere Analyse.

## 1.3 Schlusstechniken

### 1.3.1 Induktion

Generalisierung von in der Realität beobachteten Regelmäßigkeiten zu einer allgemeineren Vermutung.

### 1.3.2 Deduktion

Ableitung von Aussagen aus anderen (allgemeineren) Aussagen mit Hilfe logischer Regeln.

### 1.3.3 Abduktion

Verknüpfung von Einzelbeobachtungen und Erkennen (Vermuten) von Regeln.

## 1.4 Gütekriterien

Die Gütekriterien beschäftigen sich damit, was eine gute Forschung ausmacht. Wenn diese nicht eingehalten sind, wird eine Arbeit nicht als besonders gut angesehen.

### 1.4.1 Ethische Aspekte

Bei den ethischen Aspekten ist es wichtig, eine bestimmte Ethik einzuhalten. Also, ob durch eine Forschung eventuell Schaden für die Umwelt, Befragte oder untersuchte Personen entsteht. Dazu gehört auch der Datenschutz der Teilnehmer\*innen einer Forschung.

### 1.4.2 Transparenz

Bei Forschung, insbesondere bei Befragungen und Experimenten, sollte die Vorgehensweise gut dokumentiert sein. Die Dokumentation sollte so gut sein, dass andere Forscher\*innen ein Experiment oder eine Umfrage replizieren könnten, um die Forschung zu überprüfen.

### 1.4.3 Objektivität

Es soll geprüft werden, ob das Forschungsergebnis unabhängig von anderen Personen ist, indem geschaut wird, ob andere Personen zum selben Ergebnis kommen. Themen, die in

einer Arbeit behandelt werden, sollten auch objektiv behandelt werden, ohne eine starre Sicht einzunehmen.

#### 1.4.4 Interne Validität

Wenn man eine Umfrage oder eine Forschung durchgeführt hat, sollte man immer schauen, ob das Ergebnis durch die Forschungsmethode zustande kommt oder ob das Ergebnis vielleicht von anderen Faktoren beeinflusst wurde.

#### 1.4.5 Externe Validität

Es wird geprüft, ob behauptete Zusammenhänge auch auf andere Situationen übertragbar sind.

### 1.5 Forschungsmethoden

#### 1.5.1 Quantitative Methoden

Bei quantitativen Forschungen geht es darum, eine These durch Datenerhebung zu prüfen. Hierbei wird versucht, die Wirklichkeit durch numerische Messungen darzustellen. Auf den Skalen wird ein Ausschnitt aus den Befragungen abgebildet. Es wird mit Häufigkeiten, Mittelwerten, Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von Ausprägungen gearbeitet. **Beispiele:**

- Online-Umfragen
- A/B-Test auf Webseiten
- Auswertung von Log-Daten
- Zählung, wie viele von 300 Befragten ein bestimmtes Betriebssystem nutzen.

#### 1.5.2 Qualitative Methoden

Bei qualitativen Methoden wird versucht, eine Wirklichkeit darzustellen bzw. zu verbalisieren. Wirklichkeitsinterpretationen sind durch spezifische soziale Handlungsweisen geprägt und strukturieren gleichzeitig das soziale Handeln der Einzelperson vor. Der Untersuchungsgegenstand soll möglichst in seinem natürlichen Umfeld detailliert, ganzheitlich und umfassend erfasst werden. **Beispiele:**

- Ein leitfadengestütztes Interview mit 8 Entwicklern, in dem du fragst „Warum benutzt ihr Tool X lieber als Y?“, und die Antworten anschließend codierst.
- Eine Gruppendiskussion (Fokusgruppe), in der du beobachtest, wie ein Team über ein neues Software-Feature spricht.
- Teilnehmende Beobachtung: Du sitzt eine Woche in einem Support-Team und dokumentierst, wie sie mit Kundenanfragen umgehen.

### 1.6 Stichprobe

Es wird nur ein kleiner Teil der Grundgesamtheit untersucht. Aus diesem Teil zieht man Rückschlüsse auf die gesamte Grundgesamtheit.

#### 1.6.1 Zufallsstichprobe (Random Sample)

Die Personen werden vollständig zufällig ausgewählt, ohne Kriterien. Jedes Element hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden.

#### 1.6.2 Klumpenstichprobe (Cluster Sample)

Die Grundgesamtheit wird in Klumpen (Cluster) zerlegt, z. B. nach Filialen oder Stadtteilen. Einige Klumpen werden zufällig gezogen und darin werden alle Personen befragt.

## 2 Deskriptive Statistik

Deskriptive Statistik bedeutet, dass man versucht, Daten durch Tabellen, Kennzahlen und Grafiken übersichtlich darzustellen und zu ordnen.

### 2.1 Lagemaße

#### 2.1.1 Median

Der Median ist der mittlere Wert der sortierten Werte. Bei einer geraden Anzahl von Werten nimmt man die zwei mittelsten Werte, addiert diese und teilt sie durch 2. Bei einer ungeraden Anzahl nimmt man den mittleren Wert.

#### 2.1.2 Modus

Der Modus ist der Wert, der am häufigsten vorkommt. Es kann mehrere Modi geben, dann ist die Verteilung multimodal.

#### 2.1.3 Mittelwert

Der Mittelwert gibt den durchschnittlichen Wert an.

**Formel:**

$$\text{Mittelwert} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

#### 2.1.4 MAD

MAD steht für Mittlere Absolute Abweichung.

**Formel:**

$$\text{MAD} = \frac{\sum_{i=1}^n |\text{Mittelwert} - x_i|}{n}$$

#### 2.1.5 Quartile

Die Quartile basieren darauf, dass du deine Daten der Größe nach sortierst. Danach schneidest du die Reihe in vier gleich große Teile, also vier Viertel. Die Schnittstellen sind die Quartile.

- $Q_1$  (unteres Quartil): Unterhalb dieses Wertes liegen 25 % aller Daten.
- $Q_2$  (mittleres Quartil): Das ist genau der Median, 50 % liegen darunter.
- $Q_3$  (oberes Quartil): Unterhalb liegen 75 % aller Daten, also nur noch 25 % darüber.

#### Wichtig

Ein Quartil ist ein Ort auf der Zahlenachse, kein Anteil.

#### 2.1.6 Quartile berechnen

Zuerst werden alle Werte **aufsteigend sortiert**. Dabei ist  $n$  die Anzahl der Elemente und  $x_{(i)}$  der Wert an Position  $i$  der sortierten Liste.

$$x_p = \begin{cases} x_{(\lceil n \cdot p \rceil)} & \text{falls } n \cdot p \notin \mathbb{Z} \\ \frac{1}{2} \cdot (x_{(n \cdot p)} + x_{(n \cdot p + 1)}) & \text{falls } n \cdot p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

**Quartil 1** (unteres Quartil,  $p = 0.25$ ):

$$Q_1 = \begin{cases} x_{(\lceil 0.25 \cdot n \rceil)} & \text{falls } 0.25 \cdot n \notin \mathbb{Z} \\ \frac{1}{2} \cdot (x_{(0.25 \cdot n)} + x_{(0.25 \cdot n + 1)}) & \text{falls } 0.25 \cdot n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

**Quartil 3** (oberes Quartil,  $p = 0.75$ ):

$$Q_3 = \begin{cases} x_{(\lceil 0.75 \cdot n \rceil)} & \text{falls } 0.75 \cdot n \notin \mathbb{Z} \\ \frac{1}{2} \cdot (x_{(0.75 \cdot n)} + x_{(0.75 \cdot n + 1)}) & \text{falls } 0.75 \cdot n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

## 2.2 Streuungsmaße

### 2.2.1 Spannweite

Der Abstand zwischen dem kleinsten und dem größten Wert.

### 2.2.2 Interquartilsabstand – IQR

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

Der IQR ist ein Streuungsmaß, genau wie Varianz oder Standardabweichung. Er beantwortet die Frage: „Wie breit ist der Bereich, in dem die mittlere Hälfte meiner Daten liegt?“

### 2.2.3 Standardabweichung

Die Standardabweichung ist einfach die Wurzel aus der Varianz. Sie gibt an, wie stark die Werte im Schnitt vom Mittelwert abweichen, aber wieder in der ursprünglichen Einheit (nicht quadriert wie bei der Varianz). **Formel:**

$$S = \sqrt{S^2}$$

Kann auch mit  $\sigma$  dargestellt werden.

### 2.2.4 Varianz

Varianz ist ein Maß dafür, wie stark die Werte einer Datenreihe im Durchschnitt von ihrem Mittelwert abweichen. Sie beschreibt also die Streuung der Daten. Die Varianz wird bei Einheiten (z. B. cm) quadriert angegeben, also in  $\text{cm}^2$ . **Formel:**

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \text{Mittelwert})^2}{n}$$

Kann auch mit  $\sigma^2$  dargestellt werden.

## 2.3 Zusammenhangsmaße

### 2.3.1 Korrelation

Eine Korrelation beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Zuständen oder Funktionen.




Abbildung 1. Korrelation

### 2.3.2 Kovarianz

Misst, wie zwei Variablen gemeinsam um ihren Mittelwert streuen (positiv = gleichläufig, negativ = gegenläufig).

### 2.3.3 r-Wert – Korrelationskoeffizient

Der Korrelationskoeffizient  $r$  misst Stärke und Richtung eines linearen Zusammenhangs zweier metrischer Variablen,  $-1 \leq r \leq +1$ . Der Betrag  $|r|$  gibt die Stärke an (nahe 1 stark, nahe 0 schwach), das Vorzeichen die Richtung.



## 2.4 Diagramme

### 2.4.1 Box-Plot

Ein Box-Plot ist ein Diagramm zur grafischen Darstellung von Minimum, Maximum, Median und den Quartilen.

Durch den Box-Plot erhält man einen schnellen Überblick über die Werte.




Abbildung 2. Box-Plot

### 2.4.2 Säulendiagramm / Balkendiagramm

Häufigkeit von Merkmalsausprägungen (nominal, ordinal, metrisch diskret).





Abbildung 3. Säulendiagramm

### 2.4.3 Streudiagramm / Scatterplot

Darstellung der Merkmalsausprägungen von zwei i.d.R. metrischen Merkmalen. Bei kategorialen oder metrisch diskreten Merkmalen ggfs. verwackeln.



**Abbildung 4. Streudiagramm**

### 3 Normalverteilung

#### Zentraler Grenzwertsatz

Fast jeder Mittelwert einer x-beliebigen Verteilung – stetig oder diskret – folgt der Normalverteilung.

Die Normalverteilung wird auch Gauß-Verteilung bzw. Glockenkurve genannt. Der Grund, warum sie so genannt wird, ist am Plot gut zu erkennen.




Abbildung 5. Normalverteilung

Die Normalverteilung hängt vom Erwartungswert  $\mu$  – bzw. dem Mittelwert – und von der Varianz  $\sigma^2$  ab. Der Erwartungswert verschiebt die Kurve nach links oder rechts, die Varianz beeinflusst die Form der Kurve: Sie ist entweder gestreckt oder gestaucht.

#### 3.1 Rechnen mit der Normalverteilung

##### Warnung

Für die Normalverteilung gibt es eigentlich zwei wichtige Funktionen, um eine Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Die müssen wir nicht können! Ich liste sie nur der Vollständigkeit halber auf – ist ja nice to know.

##### Dichtefunktion

Die Dichtefunktion beschreibt, wie dicht die Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten Stelle  $x$  verteilt ist. Bildlich gesprochen: die Höhe der Glockenkurve an dieser Stelle.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

### Verteilungsfunktion

Die Verteilungsfunktion gibt dir direkt die kumulierte Wahrscheinlichkeit  $P(X \leq x)$  an, also die gesamte Fläche unter der Dichtekurve von minus unendlich bis zu diesem Punkt  $x$ .


$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du$$

### z-Transformation

Damit wir diese Formeln nicht lernen müssen, gibt es die Transformationsfunktion. Hier wird eine beliebige Verteilung in eine Verteilung mit  $\sigma = 1$  und  $\mu = 0$  transformiert. Die Formel ist für uns wichtig, da wir dadurch die Normalverteilungstabelle nutzen können.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Das Ergebnis der z-Transformation können wir dann durch einen Plot wie folgt darstellen.



**Abbildung 6.** Wahrscheinlichkeit bei Normalverteilung

### 3.2 Normalverteilungstabelle

Die Normalverteilungstabelle wird uns in der Klausur bereitgestellt. Ich führe sie nur noch mal auf.

#### Negativen Wert berechnen

$$\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$$

**Tabelle**

| u   | 0,00   | 0,01   | 0,02   | 0,03   | 0,04   | 0,05   | 0,06   | 0,07   | 0,08   | 0,09   | u   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 | 0,0 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 | 0,1 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 | 0,2 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 | 0,3 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 | 0,4 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 | 0,5 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 | 0,7 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8079 | 0,8106 | 0,8133 | 0,8 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 | 0,9 |
| 1,0 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 | 1,0 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 | 1,1 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 | 1,2 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 | 1,3 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 | 1,4 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 | 1,5 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 | 1,6 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 | 1,7 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 | 1,8 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 | 1,9 |
| 2,0 | 0,9773 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 | 2,0 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 | 2,1 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 | 2,2 |
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 | 2,3 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 | 2,4 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 | 2,5 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 | 2,6 |
| 2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 | 2,7 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 | 2,8 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 | 2,9 |

**Quantiltabelle**

| p     | 0,8     | 0,9     | 0,95   | 0,975  | 0,98   | 0,99   | 0,995  |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $u_p$ | 0,84162 | 1,28155 | 1,6449 | 1,9600 | 2,0538 | 2,3264 | 2,5758 |

## 4 Inferenzstatistik

Die deskriptive Statistik beschreibt die Daten, die man hat. Die Inferenzstatistik geht einen Schritt weiter: Sie schließt von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit und prüft Hypothesen – also Fragen wie „Ist dieser Würfel fair?“ oder „Ist diese Abweichung noch Zufall?“.

### 4.1 Chi-Quadrat-Test

Der Chi-Quadrat-Test vergleicht **beobachtete** Häufigkeiten mit den Häufigkeiten, die man unter einer angenommenen Verteilung **erwarten** würde. Er beantwortet die Frage: Sind die Abweichungen zwischen Beobachtung und Erwartung noch zufällige Schwankung – oder so groß, dass die Annahme nicht stimmen kann?

#### 4.1.1 Hypothesen

Wie jeder Hypothesentest beginnt der Chi-Quadrat-Test mit zwei Hypothesen:

- $H_0$  (Nullhypothese): Die Daten folgen der erwarteten Verteilung, Abweichungen sind reiner Zufall. Beispiel: „Der Würfel ist fair.“
- $H_1$  (Gegenhypothese): Die Daten folgen der erwarteten Verteilung nicht. Beispiel: „Der Würfel ist manipuliert.“

Der Test kann  $H_0$  nur **verwerfen** oder **nicht verwerfen** – beweisen kann er sie nicht.

#### 4.1.2 Die Formel

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

| Zeichen | Bedeutung                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $O_i$   | beobachtete Häufigkeit ( <i>observed</i> ) in Kategorie $i$                     |
| $E_i$   | erwartete Häufigkeit ( <i>expected</i> ) in Kategorie $i$ : $E_i = n \cdot p_i$ |
| $k$     | Anzahl der Kategorien (z. B. 6 Augenzahlen)                                     |
| $n$     | Gesamtzahl der Beobachtungen                                                    |

So liest du die Formel: Für jede Kategorie wird die Abweichung  $O_i - E_i$  gebildet und **quadriert** – dadurch zählen positive und negative Abweichungen gleich viel und heben sich nicht gegenseitig auf. Die Division durch  $E_i$  setzt die Abweichung ins Verhältnis zur Erwartung: Eine Abweichung von 5 ist bei  $E_i = 5$  dramatisch, bei  $E_i = 500$  fast nichts. Zum Schluss wird über alle Kategorien summiert. Je größer  $\chi^2$ , desto schlechter passen Beobachtung und Erwartung zusammen – bei perfekter Übereinstimmung ist  $\chi^2 = 0$ .

#### 4.1.3 Freiheitsgrade

$$df = k - 1$$

Die Zahl der Freiheitsgrade (*degrees of freedom*, df) ist die Anzahl der Kategorien minus 1.

**Warum minus 1?**

Freiheitsgrade sind die Anzahl der **frei wählbaren** Werte. Die Gesamtzahl  $n$  steht fest – und damit auch die Summe aller Häufigkeiten. Bei 6 Kategorien kannst du also nur 5 Felder frei befüllen; das letzte ergibt sich zwangsläufig als Rest. Deshalb  $df = 6 - 1 = 5$ .

**4.1.4 Kritischer Wert und Entscheidung**

Der kritische Wert  $\chi^2_{\text{krit}}$  ist die Schwelle, ab der eine Abweichung nicht mehr als Zufall durchgeht. Du liest ihn aus der Chi-Quadrat-Tabelle ab (sie wird in der Klausur gestellt), und zwar an der Kreuzung von zwei Angaben:

- dem **Signifikanzniveau**  $\alpha$  – meist  $\alpha = 0,05$ , also 5 % Irrtumswahrscheinlichkeit. Das ist das Risiko,  $H_0$  zu verwerfen, obwohl sie eigentlich stimmt.
- den **Freiheitsgraden**  $df$  aus dem letzten Abschnitt.

**Entscheidungsregel**

$\chi^2 > \chi^2_{\text{krit}} \rightarrow H_0$  verwerfen: Die Abweichung ist signifikant.

$\chi^2 \leq \chi^2_{\text{krit}} \rightarrow H_0$  nicht verwerfen: kein Nachweis einer Abweichung.

**4.1.5 Ablauf in der Klausur**

- 1 Hypothesen aufstellen:  $H_0$  (erwartete Verteilung gilt) und  $H_1$ .
- 2 Erwartete Häufigkeiten berechnen:  $E_i = n \cdot p_i$ .
- 3 Teststatistik  $\chi^2$  mit der Formel berechnen – von Hand oder per Tabellenkalkulation (siehe Kapitel *Taschenrechner*).
- 4 Freiheitsgrade bestimmen:  $df = k - 1$ .
- 5 Kritischen Wert für  $\alpha$  und  $df$  aus der gegebenen Tabelle ablesen.
- 6 Vergleichen und entscheiden: Ist  $\chi^2 > \chi^2_{\text{krit}}$ , wird  $H_0$  verworfen.



**Beispiel: Ist der Würfel manipuliert? (Probeklausur)**

Ein Würfel wird 30-mal geworfen, getestet wird mit  $\alpha = 0,05$ .  $H_0$ : „Der Würfel ist fair.“

| Augenzahl            | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 |
|----------------------|---|----|----|----|---|---|
| Beobachtet ( $O_i$ ) | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Erwartet ( $E_i$ )   | 5 | 5  | 5  | 5  | 5 | 5 |

**Erwartete Häufigkeiten:** Bei einem fairen Würfel ist  $p_i = 1/6$  für jede Augenzahl, also

$$E_i = 30 \cdot \frac{1}{6} = 5$$

**Teststatistik:** Drei Kategorien weichen um  $0 - 5 = -5$  ab, drei um  $10 - 5 = 5$ :

$$\chi^2 = 3 \cdot \frac{(0 - 5)^2}{5} + 3 \cdot \frac{(10 - 5)^2}{5} = 15 + 15 = 30$$

**Freiheitsgrade:**  $df = k - 1 = 6 - 1 = 5$

**Kritischer Wert:** Tabelle bei  $\alpha = 0,05$  und  $df = 5$ :  $\chi^2_{\text{krit}} = 11,07$

**Entscheidung:**  $\chi^2 = 30 > 11,07 \rightarrow H_0$  wird verworfen, der Würfel ist nicht fair.

## 5 Taschenrechner: Casio fx-991DE X ClassWiz

Der *Casio fx-991DE X ClassWiz* ist in der Klausur zugelassen – und er kann deutlich mehr als Plus und Mal: alle Kennwerte einer Stichprobe, lineare Regression samt Korrelationskoeffizient, kumulierte Normalverteilung und mit einem kleinen Trick sogar Chi-Quadrat. Dieses Kapitel zeigt die Handgriffe Schritt für Schritt; alle Anzeigen sind dem Original-Display nachgebaut.




Abbildung 7. Casio fx-991DE X ClassWiz

### Die wichtigsten Tasten

| Taste                                 | Funktion                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MENU</b>                           | öffnet das Hauptmenü – von hier erreichst du alle Modi       |
| <b>OPTN</b>                           | Optionen des aktuellen Modus, z. B. die Kennwerte-Berechnung |
| <b>SHIFT</b>                          | Zweitbelegung einer Taste (gelbe Beschriftung)               |
| <b>ALPHA</b>                          | Drittbelegung (rot), u. a. Buchstaben und = für Formeln      |
| <b>=</b>                              | Eingabe bestätigen bzw. Ergebnis berechnen                   |
| <b>AC</b>                             | Eingabe verwerfen, zurück zum Eingabebildschirm              |
| <b>S<math>\leftrightarrow</math>D</b> | schaltet ein Ergebnis zwischen Bruch und Dezimalzahl um      |

Für die Klausur brauchst du nur drei Menüs. Diese Tabelle ist der Wegweiser durchs Kapitel:

| Aufgabe in der Klausur                            | Menü               | Abschnitt     |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Mittelwert, Median, Quartile, Standardabweichung  | 6: Statistik       | Abschnitt 5.1 |
| Regressionsgerade und Korrelationskoeffizient $r$ | 6: Statistik       | Abschnitt 5.3 |
| Summen, Zwischenrechnungen, eigene Formeln        | 8: Tabellenkalk.   | Abschnitt 5.2 |
| Wahrscheinlichkeiten der Normalverteilung         | 7: Verteilungsfkt. | Abschnitt 5.4 |
| Chi-Quadrat-Wert aufsummieren                     | 8: Tabellenkalk.   | Abschnitt 5.5 |

#### Kein QR-Code in der Klausur

Die Original-Doku bewirbt an mehreren Stellen die Online-Visualisierung per QR-Code, etwa um Box-Plots anzuzeigen. Dafür braucht es ein Smartphone – in der Klausur fällt das also aus. Den Box-Plot zeichnest du stattdessen von Hand: Alle fünf Werte dafür (Minimum,  $Q_1$ , Median,  $Q_3$ , Maximum) liefert die Kennwerte-Berechnung aus Abschnitt 5.1.

## 5.1 Stichprobe und Kennwerte (Menü 6: Statistik)

### Ein Durchlauf, alle Kennwerte

Stichprobe einmal in Menü 6: Statistik eintippen, dann **OPTN** → **3** drücken: Der Rechner liefert Mittelwert, Median, beide Quartile, Minimum, Maximum und Standardabweichung in einer einzigen Liste.

### 5.1.1 Stichprobe eingeben

Als Beispiel dient die Stichprobe aus der Taschenrechner-Doku: 39, 72, 23, 22, 24, 23, 16, 21, 16, 19.

- 1 **MENU** → **6** öffnet das Statistik-Menü.
- 2 **1** wählt 1: 1-Variable – eine Messreihe ohne zweite Variable.
- 3 Jeden Wert eintippen und mit **=** bestätigen; der Cursor springt automatisch in die nächste Zeile.

1:1-Variable  
2:y=a+bx  
3:y=a+bx+cx<sup>2</sup>  
4:y=a+b·ln(x)

Typ-Auswahl nach **MENU** → **6**

|   | x  |
|---|----|
| 1 | 39 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 22 |

Werteliste im Statistik-Editor (Ausschnitt)

### 5.1.2 Kennwerte ablesen

- 1 **OPTN** öffnet die Optionen des Statistik-Menüs.
- 2 **3** wählt 3: 1-Variab-Berech – alle Kennwerte erscheinen als Liste.

1:Typ auswählen  
2:Editor  
3:1-Variab-Berech  
4:Statistik-Rechn

Optionen nach **OPTN**

|              |             |
|--------------|-------------|
| $\bar{x}$    | 27,5        |
| $\Sigma x$   | 275         |
| $\Sigma x^2$ | 10137       |
| $\sigma x$   | 16,04524852 |
| sx           | 16,91317698 |
| n            | 10          |
| min(x)       | 16          |
| Q1           | 19          |
| Med          | 22,5        |
| Q3           | 24          |
| max(x)       | 72          |

Ergebnisliste (auf dem Gerät mit **▼** scrollen)

So übersetzt du die Anzeige in die Begriffe aus dem Kapitel *Deskriptive Statistik*:

| Anzeige   | Bedeutung  | Bezug zum Lernzettel |
|-----------|------------|----------------------|
| $\bar{x}$ | Mittelwert | Lagemaße             |

| Anzeige                | Bedeutung                                  | Bezug zum Lernzettel                     |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\Sigma x, \Sigma x^2$ | Summe der Werte bzw. ihrer Quadrate        | Zwischenwerte für die Varianz „von Hand“ |
| $\sigma x$             | Standardabweichung (geteilt durch $n$ )    | entspricht unserem $S$                   |
| $sx$                   | korrigierte Standardabweichung ( $n - 1$ ) | brauchen wir nicht                       |
| $n$                    | Anzahl der Werte                           | –                                        |
| $\min(x), \max(x)$     | kleinster bzw. größter Wert                | Spannweite = $\max - \min$               |
| Med                    | Median                                     | Lagemaße                                 |
| $Q1, Q3$               | unteres bzw. oberes Quartil                | $IQR = Q_3 - Q_1$ , Box-Plot             |

 **$\sigma x$  oder  $sx$ ?**

Der Rechner zeigt zwei Standardabweichungen an. Unsere Varianz-Formel teilt durch  $n$  – in der Klausur liest du also  $\sigma x$  ab. Das daneben stehende  $sx$  teilt durch  $n - 1$  und gehört zur Inferenzstatistik; es wäre hier falsch.

**Häufigkeitstabellen**

Liegt die Stichprobe als Häufigkeitstabelle vor (Wert und Anzahl), schalte die Häufigkeitsspalte ein: **SHIFT** → **MENU** → Statistik → Häufigkeit Ein. Der Editor bekommt dann eine zweite Spalte Häufig für die Anzahl je Wert – die Kennwerte-Berechnung funktioniert genauso.

## 5.2 Tabellenkalkulation (Menü 8)

Menü 8: Tabellenkalk. ist ein Mini-Excel mit fünf Spalten (A–E) und 45 Zeilen – praktisch für Zwischenrechnungen, Summen und alles, wofür es kein fertiges Menü gibt.

### 5.2.1 Werte eingeben und auswerten

- 1** **MENU** → **8** öffnet die Tabellenkalkulation.
- 2** Werte in Spalte A eintippen, jeden mit **=** bestätigen.
- 3** Cursor auf eine leere Zelle setzen, **OPTN** drücken und z. B. 1: Minimum wählen.
- 4** Den Bereich angeben, etwa A1:A6 (Buchstaben über **ALPHA**), und mit **=** bestätigen.

|   | A  | B | C |
|---|----|---|---|
| 1 | 19 |   |   |
| 2 | 12 |   |   |
| 3 | 23 |   |   |
| 4 | 22 |   |   |
| 5 | 16 |   |   |
| 6 | 21 |   |   |

Stichprobe in Spalte A

1:Minimum  
2:Maximum  
3:Mittelwert  
4:Summe

Auswahl nach **OPTN** (Aus-  
schnitt)

|   | A  | B | C |
|---|----|---|---|
| 1 | 19 |   |   |
| 2 | 12 |   |   |
| 3 | 23 |   |   |
| 4 | 22 |   |   |
| 5 | 16 |   |   |
| 6 | 21 |   |   |
| 7 | 12 |   |   |

Min(A1:A6)

Ergebnis in Zelle A7

Genauso liefern 3: Mittelwert  $\rightarrow$  Mean(A1:A6) den Wert 18,8333 und 4: Summe  $\rightarrow$  Sum(A1:A6) den Wert 113.

### 5.2.2 Eigene Formeln und „Formel füllen“

Formeln funktionieren wie in Excel: Sie beginnen mit  $=$ , das du über ALPHA  $\rightarrow$  CALC eingibst, und rechnen mit Zellbezügen.  $=A1+5$  in Zelle B1 addiert also 5 auf den Wert aus A1.

Damit du eine Formel nicht sechsmal eintippen musst, gibt es OPTN  $\rightarrow$  Formel füllen: Die Formel wird in einen ganzen Bereich kopiert, die Zellbezüge wandern automatisch mit – aus  $=A2+5$  wird in Zeile 3 ein  $=A3+5$  und so weiter.

|                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|
| Formel füllen<br>Formel= $A2+5$<br>Zellen:B2:B6 |  |  |
| Dialog „Formel füllen“                          |  |  |

|   | A  | B  | C |
|---|----|----|---|
| 1 | 19 | 24 |   |
| 2 | 12 | 17 |   |
| 3 | 23 | 28 |   |
| 4 | 22 | 27 |   |
| 5 | 16 | 21 |   |
| 6 | 21 | 26 |   |

$=A2+5$

Spalte B nach dem Füllen

#### Erst ablesen, dann Menü wechseln

Die Tabellenkalkulation hat keinen Speicher: Beim Wechsel in ein anderes Menü oder beim Ausschalten sind alle Zellen leer. Ergebnisse also notieren, bevor du weberspringst.

## 5.3 Lineare Regression und Korrelation (Menü 6: $y=a+bx$ )

Zusammenhangsmaße laufen über dasselbe Statistik-Menü wie die Kennwerte – nur wählst du als Typ 2:  $y=a+bx$ . Der Editor bekommt dann zwei Spalten für die Wertepaare  $(x, y)$ .

- 1 MENU  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  2 – Statistik-Menü mit Typ 2:  $y=a+bx$ .
- 2 Erst alle  $x$ -Werte eingeben, dann mit den Pfeiltasten in die  $y$ -Spalte wechseln und die  $y$ -Werte eintippen.
- 3 OPTN  $\rightarrow$  4 wählt 4: Regressions-Berech – der Rechner zeigt  $a$ ,  $b$  und  $r$ .

Untersucht wird, wie der Angebotspreis  $y$  (in €) mit der Absatzmenge  $x$  zusammenhängt:

| Zahlenpaar        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Absatzmenge $x$   | 109 | 98  | 109 | 94  |
| Angebotspreis $y$ | 7,3 | 7,7 | 9   | 6,6 |

**Beispiel: Angebotspreis und Absatzmenge (aus der Doku)**

|   | x   | y   |
|---|-----|-----|
| 1 | 109 | 7,3 |
| 2 | 98  | 7,7 |
| 3 | 109 | 9   |
| 4 | 94  | 6,6 |

Wertepaare im Editor

|          |              |
|----------|--------------|
| $y=a+bx$ |              |
| a        | -1,152259887 |
| b        | 0,0858757062 |
| r        | 0,6541947207 |

Ergebnis von Regressions-Berech

Die Regressionsgerade lautet also  $y = -1,1523 + 0,0859 \cdot x$ . Der Korrelationskoeffizient  $r = 0,654$  zeigt eine mittelstarke positive Korrelation – wie du  $r$  einordnest, steht im Abschnitt *r-Wert* des Kapitels *Deskriptive Statistik*.

**5.4 Normalverteilung (Menü 7: Verteilungsfkt.)**

Die kumulierte Normalverteilung – also die Wahrscheinlichkeit, dass  $X$  zwischen zwei Grenzen liegt – rechnet Menü 7: Verteilungsfkt. direkt aus, ganz ohne z-Transformation und Tabelle.

- 1 **MENU** → **7** öffnet die Verteilungsfunktionen.
- 2 **2** wählt 2: Kumul. Normal-V.
- 3 Vier Werte eintragen, jeweils mit **=**: untere Grenze, obere Grenze,  $\sigma$  und  $\mu$ .
- 4 Noch einmal **=** drücken – der Rechner zeigt  $P$ .

**Reihenfolge der Eingabe**

Nach den beiden Grenzen fragt der Rechner erst  $\sigma$  und dann  $\mu$  ab – nicht andersherum. Wer die beiden vertauscht, bekommt ohne Fehlermeldung ein falsches Ergebnis.

Einseitige Wahrscheinlichkeiten baust du über die Grenzen nach:

| Gesucht                                      | untere Grenze     | obere Grenze     |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| $P(a \leq X \leq b)$ – zwischen zwei Grenzen | $a$               | $b$              |
| $P(X \leq b)$ – höchstens $b$                | sehr klein wählen | $b$              |
| $P(X \geq a)$ – mindestens $a$               | $a$               | sehr groß wählen |

„Sehr klein“ bzw. „sehr groß“ heißt: deutlich außerhalb aller plausiblen Werte – die Doku nennt das eine Notlösung. Unten reicht oft 0 (wenn keine negativen Werte vorkommen), oben z. B. 10 000.

**Beispiel: Abfüllanlage mit  $\mu = 354$  und  $\sigma = 10,28$** 

Eine Anlage füllt Flaschen im Mittel mit  $\mu = 354$  ml bei einer Standardabweichung von  $\sigma = 10,28$  ml (Beispiel aus der Doku).

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kumul. Normal-V |       |
| Untere:         | 360   |
| Obere:          | 400   |
| $\sigma$ :      | 10,28 |
| $\mu$ :         | 354   |

*Eingabemaske für Fall a)*

|    |              |
|----|--------------|
| P= | 0,2797215279 |
|----|--------------|

*Ergebnis für Fall a)*

| Gesucht                     | untere | obere  | Ergebnis |
|-----------------------------|--------|--------|----------|
| a) $P(360 \leq X \leq 400)$ | 360    | 400    | 0,2797   |
| b) $P(X \leq 360)$          | 0      | 360    | 0,7203   |
| c) $P(X \geq 360)$          | 360    | 10 000 | 0,2797   |

**Rechenweg trotzdem hinschreiben**

In der Klausur zählt der Weg über die z-Transformation und die Normalverteilungstabelle (Kapitel *Normalverteilung*) – der Rechner dient zur Kontrolle. Für Fall b) von oben:  $z = (360 - 354) / 10,28 \approx 0,58$ , Tabelle:  $\Phi(0,58) = 0,7190$ . Die kleine Abweichung zum Rechnerwert 0,7203 kommt nur vom Runden auf  $z = 0,58$ .

## 5.5 Chi-Quadrat mit der Tabellenkalkulation

Für den Chi-Quadrat-Test hat der fx-991DE X kein eigenes Menü. Die Teststatistik

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(B_i - E_i)^2}{E_i}$$

mit den beobachteten Häufigkeiten  $B_i$  und den erwarteten Häufigkeiten  $E_i$  baust du aber in drei Schritten in der Tabellenkalkulation aus Abschnitt 5.2 auf. Die Theorie dazu – Hypothesen, Freiheitsgrade, kritischer Wert – steht im Kapitel *Inferenzstatistik*; hier geht es nur um den Rechenweg.

- 1 Beobachtete Häufigkeiten in Spalte A eintippen, erwartete in Spalte B.
- 2 **OPTN** → Formel füllen mit Formel  $= (A1-B1)^2 \div B1$  und Zellen C1:C6 – Spalte C enthält danach alle Einzelbeiträge.
- 3 Die Summe in eine freie Zelle holen:  $=\text{Sum}(C1:C6)$  ergibt den Chi-Quadrat-Wert.

### Beispiel: Ist der Würfel fair?

Ein Würfel wird 120-mal geworfen. Bei einem fairen Würfel erwartet man  $120 / 6 = 20$  Würfe pro Augenzahl; beobachtet werden 25, 17, 15, 23, 24 und 16.

|   | A                    | B  | C    |
|---|----------------------|----|------|
| 1 | 25                   | 20 | 1,25 |
| 2 | 17                   | 20 | 0,45 |
| 3 | 15                   | 20 | 1,25 |
| 4 | 23                   | 20 | 0,45 |
| 5 | 24                   | 20 | 0,8  |
| 6 | 16                   | 20 | 0,8  |
| 7 |                      |    | 5    |
|   | $=\text{Sum}(C1:C6)$ |    |      |

Spalte C per „Formel füllen“, Summe in C7

Der Rechner liefert  $\chi^2 = 5$ . Ob das „viel“ ist, entscheidet der Vergleich mit dem kritischen Wert aus der Chi-Quadrat-Tabelle (bei  $k - 1 = 5$  Freiheitsgraden und  $\alpha = 0,05$  liegt er bei 11,07) – hier gibt es also keinen Hinweis, dass der Würfel unfair ist.