

Aqui um breve resumo sobre cálculo de limites. Estas notas não substituíam as aulas. Notará algumas coisas faltando aqui, isso porque algumas definições foram apresentadas em sala de aula e não serão repetidas aqui. Os exemplos também estão sem resolver e serão, seguramente, resolvidos em sala.

## Sumário

<b>1</b>	<b>limites de funções elementares</b>	<b>2</b>
1.1	Funções Polinómicas . . . . .	2
1.2	Raízes . . . . .	2
1.3	Funções exponenciais . . . . .	3
1.4	Funções logarítmicas . . . . .	3
1.5	Funções trigonométricas . . . . .	4
1.6	Funções trigonométricas inversas . . . . .	5
1.7	Restrições de funções elementares . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Álgebra de limites</b>	<b>5</b>
2.1	Composição com funções elementares . . . . .	6
2.2	Uma pequena melhora da propriedade de substituição . . . . .	7
2.3	Limite e ordem . . . . .	9
2.4	Limites de funções definidas por partes . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Contínuidade</b>	<b>11</b>
3.1	O gráfico de uma função contínua . . . . .	15
3.1.1	Descontinuidades . . . . .	15
<b>4</b>	<b>Propriedades das funções contínuas</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Limites indeterminados</b>	<b>16</b>
5.1	Escala de infinitos . . . . .	19
5.1.1	Escala de infinitos para limites em $-\infty$ . . . . .	20
5.2	Indeterminações tipo $+\infty - \infty$ . . . . .	20
5.3	Indeterminações tipo $\frac{0}{0}$ . . . . .	21
5.4	Indeterminações tipo $\frac{\infty}{\infty}$ . . . . .	22
5.5	Indeterminações tipo $0 \cdot \infty$ . . . . .	23
5.6	Indeterminações tipo $\infty^0$ . . . . .	24
5.7	Indeterminações tipo $1^\infty$ . . . . .	24

# 1 limites de funções elementares

Em esta primeira seção vemos como calcular limites das *funções elementares*. Seria bom que, além de estudar o que aqui se descreve, você represente os gráficos de cada uma destas funções em geogebra (ou wolfram). Se assume um certo domínio das funções elementares e seus gráficos. Se você não lembrar, dedique um tempinho a relembrar estas questões.

## 1.1 Funções Polinómicas

Se  $f$  é uma função polinómica e  $a \in \mathbb{R}$  então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ . Ainda mais, se  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  então

- Se  $f$  tem grau par então  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \text{signal}(a_n) \cdot \infty$ .
- Se  $f$  tem grau ímpar então  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \text{signal}(a_n) \cdot (+\infty)$  e  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \text{signal}(a_n) \cdot (-\infty)$ .

Lembre as propriedades das potências:

- $x^0 = 1$ ,
- $x^1 = x$ ,
- $x^n x^m = x^{n+m}$ ,
- $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ ,
- $\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$ ,
- $x^n y^n = (xy)^n$ ,
- $\frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n$ .

onde  $n$  e  $m$  podem ser números racionais (e não apenas inteiros) lembrando que  $x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$ .

## 1.2 Raízes

Para  $n \in \mathbb{N}$  consideramos a função  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ . Se  $a$  está no domínio de  $f$  então  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ . Aqui é preciso ter cuidado pois as raízes pares têm domínio  $[0, +\infty[$  e as ímpares  $\mathbb{R}$ . Para os limites no infinito tem-se:

- Se  $n$  é par:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ .
- Se  $n$  é ímpar  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ .

### 1.3 Funções exponenciais

Seja  $b > 0$ . Consideramos a função exponencial com base  $b$ , isto é,  $f(x) = b^x$ .<sup>1</sup> Lembre que o domínio desta função é  $\mathbb{R}$ . Se  $a \in \mathbb{R}$  então  $\lim_{x \rightarrow a} b^x = b^a$ . Para os limites em  $\pm\infty$  precisamos distinguir dois casos:

- Se  $b > 1$  (exponencial crescente) então  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .
- Se  $0 < b < 1$  (exponencial decrescente) então  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

Lembramos as propriedades das exponencias:

- $b^0 = 1$ ,  $b^1 = b$ ,
- $b^x b^y = b^{x+y}$ ,
- $\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}$ ,
- $b^x c^x = (bc)^x$ ,
- $\frac{b^x}{c^x} = \left(\frac{b}{c}\right)^x$ .
- $b^{\log_b(x)} = x$ ,
- $b^x = e^{x \ln(b)}$  (esta propriedade vai ser útil para lidar com algumas indeterminações que envolvem expoentes).

### 1.4 Funções logarítmicas

Seja  $b > 0$ . Consideramos a função exponencial com base  $b$ , isto é,  $f(x) = \log_b(x)$ . Lembre que o domínio desta função é  $\mathbb{R}^+$ . Também seria bom, se não você não lembrar, que procure as propriedades dos logaritmos. Em primeiro lugar, se  $a \in \mathbb{R}^+$  (isto é, se  $a$  está no domínio) então  $\lim_{x \rightarrow a} \log_b(x) = \log_b(a)$ . Para os limites em  $0^{+2}$  e  $+\infty$  distinguimos dois casos:

- Se  $b > 1$  (logaritmo crescente) então  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_b(x) = -\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

---

<sup>1</sup>Estou usando a letra  $b$  para a base para que não haja confusão com o ponto onde se calcula o limite, para o qual estamos usando desde o início do curso a letra  $a$ .

<sup>2</sup>é claro que aqui o limite em  $a = 0$  pela esquerda não pode ser estudado, né?

- Se  $0 < b < 1$  (exponencial decrescente) então  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .

Lembramos as propriedades dos logaritmos:

- $\log_b(1) = 0$ ,  $\log_b(b) = 1$ ,
- $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$ ,
- $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$ ,
- $\log_b(x^y) = y \log_b(y)$ ,
- $\log_b(b^x) = x$ .

Lembre também que  $\ln$  é o logaritmo em base  $e$ .

## 1.5 Funções trigonométricas

O domínio da função  $f(x) = \text{sen}(x)$  é  $\mathbb{R}$ . Para qualquer  $a \in \mathbb{R}$  temos que  $\lim_{x \rightarrow a} \text{sen}(x) = \text{sen}(a)$ . A função seno **não tem** limite em  $-\infty$  e também não em  $+\infty$ .

O domínio da função  $f(x) = \text{cos}(x)$  é  $\mathbb{R}$ . Para qualquer  $a \in \mathbb{R}$  temos que  $\lim_{x \rightarrow a} \text{cos}(x) = \text{cos}(a)$ . A função cosseno **não tem** limite em  $-\infty$  e também não em  $+\infty$ .

O domínio da função tangente é um pouco mais complicado. Ele é a união de todos os intervalos da forma  $]k\frac{\pi}{2}, (k+2)\frac{\pi}{2}[$ , onde  $k \in \mathbb{Z}$  e ímpar. Isto porque esta função tem "problemas" nos números da forma  $k\frac{\pi}{2}$  com  $k$  inteiro e ímpar<sup>3</sup> (por exemplo,  $-5\frac{\pi}{2}, -3\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}$ , etc). Isto pode se ver mais claramente no gráfico da função<sup>4</sup>. Nos pontos problemáticos a função tem assíntotas verticais. Assim, por exemplo em  $a = \frac{\pi}{2}$  tem-se

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = -\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = +\infty,$$

e análogamente com os outros pontos "problemáticos" (lembre que esta função é periódica com período  $\pi$ ).

Por outro lado e  $a$  está no domínio de  $\tan(x)$  então  $\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \tan(a)$ .

---

<sup>3</sup>esses são os pontos onde o cosseno vale 0

<sup>4</sup>Veja com geogebra ou wolfram alpha

## 1.6 Funções trigonométricas inversas

Vamos aqui descrever apenas a função *arcotangente*. Você deverá porucurar informações sobre outras funções trigonométricas inversas (arcoseno e arco-cosseno). A função  $f(x) = \arctan(x)$  tem domínio  $\mathbb{R}$ . Para qualquer  $a \in \mathbb{R}$  tem-se

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2} \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}.$$

Observe que, para as funções elementares, o que esta seção mostra é que para calcular  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , isto se faz simplesmente por substituição, isto é, que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

## 1.7 Restrições de funções elementares

Nem sempre vamos ter nossas funções definidas no maior domínio possível. Mas o domínio de nossa função, claro, deve ser sempre um subconjunto do "maior domínio possível desta". Ter uma função definida em um conjunto menor é o que chamamos de **restringir**. Por exemplo a função  $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \ln(x)$  é a restrição de  $\ln$  para o conjunto  $[1, 2]$ .

Isto não é muito grave, se  $a$  é um ponto do novo domínio então calculamos o limite da função também como sendo  $f(a)$ .

**Propriedade 1** *Seja  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  uma função elementar e  $a \in I$ . Então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .*

Esta propriedade não diz como calcular o limite em pontos de acumulação de  $I$  que não pertencem a  $I$ . Assim, por exemplo para  $f : [1, 2[, f(x) = \ln(x)$ , esta propriedade diz como podemos calcular o limite da função se  $a$  for um ponto qualquer do intervalo  $[1, 2[$  mas não diz como calculá-lo em  $a = 2$ . Depois veremos como lidar com isso.

Claro que se não especificamos o domínio da função, podemos supor que este é o maior possível.

## 2 Álgebra de limites

A partir das funções elementares podemos criar outras funções mais gerais mediante as operações algébricas (ou também mediante composição). Vamos ver como o limite (**quando existir**) é bem comportado em relação às operações algébricas (também em relação à composição). Muito **cuidado** aqui, estas propriedades são válidas quando os limites existem (e, inclusive, alguma delas têm outras restrições adicionais).

**Propriedade 2** *Sejam  $f$  e  $g$  duas funções tais que existem **ambos**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ . Então:*

1. Se  $\lambda \in \mathbb{R}$ .  $\lim_{x \rightarrow a} \lambda f(x) = \lambda \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ,
2.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ ,
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = (\lim_{x \rightarrow a} f(x)) \cdot (\lim_{x \rightarrow a} g(x))$ ,
4. Se  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$  então  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ .<sup>5</sup>

**Observação 3** *As propriedades acima são também válidas para limites à esquerda, ou para limites à direita (e só trocar  $x \rightarrow a$  por  $x \rightarrow a^+$  ou por  $x \rightarrow a^-$  lá acima).*

**Exemplo 4** •  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} + \frac{x}{1+x}$ ,

- $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + 2x + 1 + \arctan(x)$ ,
- $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x)e^x + \sin(\frac{\pi}{2}x)$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x}+x^2}{(x-2)^2+1}$ .

**Exercício 1** *Da lista 2.3 do Stewart: 1,2,3,4,5 e 7.*

## 2.1 Composição com funções elementares

Vamos ainda ampliar um pouco a lista de funções com as quais podemos calcular limites facilmente (mediante "substituição").

**Propriedade 5** *Seja  $f$  uma função tal que existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , então:*

1.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^n = (\lim_{x \rightarrow a} f(x))^n$ ,
2.  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ , (se  $n$  é par então o limite tem que ser  $\geq 0$ . por quê?)
3.  $\lim_{x \rightarrow a} b^{f(x)} = b^{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ ,
4.  $\lim_{x \rightarrow a} \log_b(f(x)) = \log_b(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$  (é preciso que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  seja positivo)
5.  $\lim_{x \rightarrow a} \sin(f(x)) = \sin(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$ ,

---

<sup>5</sup>A restrição é porque não podemos dividir entre zero

$$6. \lim_{x \rightarrow a} \cos(f(x)) = \cos(\lim_{x \rightarrow a} f(x)),$$

**Observação 6** As propriedades acima são também válidas para limites à esquerda, ou para limites à direita (e só trocar  $x \rightarrow a$  por  $x \rightarrow a^+$  ou por  $x \rightarrow a^-$  lá acima).

**Exercício 2** Escreva a propriedade acima para as funções trigonométricas e trigonométricas inversas que faltam (em alguns casos serão necessárias restrições sobre o valor do limite).

Esta propriedades são consequência de uma propriedade mais geral sobre a relação entre o limite e a composição com uma função "contínua" que veremos depois.

**Exercício 3** Calcule os limites seguintes:

1.  $\lim_{x \rightarrow a} \ln(x^2 - 1)$ .
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x^2 + 2x - 5}}{4x - \cos(\pi x)}$
3.  $\lim_{t \rightarrow 0} e^{t^2} + 5\sin(3t)$
4.  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{(x+3)^4 - 6x + 5}$
5.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^3 - 4x + \ln(2x^2 - 1)}{x^3 - \sin(\pi x)}$ .
6.  $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin(x+2\pi)}$ .

## 2.2 Uma pequena melhora da propriedade de substituição

Considere a função  $f : [0, 1], f(x) = x^2$ . Se queremos calcular  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  isto não pode, em princípio, se fazer por substituição pois " $f(1)$ " nem faz sentido. Agora consideramos a função  $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ . De novo, o limite em  $a = 1$  não pode ser obtido mediante substituição pois estaríamos dividindo entre zero.

Pois bem, ambas funções poderão ter seu limite calculado por "substituição" só que para que esta substituição possa acontecer o que fazemos é trocar a função por outra que não apresenta os problemas que a função original tinha (na primeira o problema é o domínio, na segunda a regra de formação).

**Definição 7** Sejam  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  duas funções. Diremos que  $f$  é a restrição de  $g$  para o conjunto  $I$  se  $I \subset J$  e  $f(x) = g(x)$  para todo ponto  $x$  em  $I$ . Denotamos isto mediante  $g|_I = f$ .

Ou seja,  $f$  é a restrição de  $g$  se o domínio de  $g$  é maior que o domínio de  $f$  e  $f$  e  $g$  são iguais nos pontos do domínio de  $f$ . Também dizemos em este caso que  $g$  estende a  $f$ .

**Propriedade 8** *Sejam  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  duas funções tais  $g$  é estende a  $f$ . Suponha que  $a$  é um ponto de acumulação do domínio de  $f$  e que existe  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  então*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Vamos ver como esta propriedade pode ser aplicada às funções com as quais temos começado a seção. Seja  $f : [0, 1[, f(x) = x^2$ . Definimos  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$ . Então  $g(x) = f(x)$  nos pontos do domínio de  $f$ . Agora, dado que  $g$  é uma função elementar (um polinômio) e  $a = 1$  está no domínio de  $g$  então  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$ . Agora, pela propriedade 8 temos que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 1$ .

O que aconteceu aqui foi a seguinte: não podíamos calcular o limite mediante substituição mas era apenas porque o intervalo de definição da função era aberto em 1. Porém, a regra de formação que define nossa função ( $x^2$ ) não tem problema para se definir em todo o  $\mathbb{R}$ .

Quando algo assim aconteça, calculamos o limite simplesmente substituindo o ponto  $a$  na fórmula que define a função (mas não escrevemos " $f(a)$ ").

Os passos a serem seguidos para fazer isso certinho são:

- Verificar que  $a$  é um ponto de acumulação do domínio de  $f$ ,
- Verificar que  $a$ , apesar de não estar no domínio de  $f$ , está no domínio "natural" da função cuja regra de formação é a mesma que a de  $f$ . Chamamos esta função de  $g$ .
- Calculamos o limite para  $g$ . Esse será também o limite de  $f$ .

Nem cada vez você calcule um limite como esse você precisa fazer todos os passos descritos acima. Mas deveria fazê-lo passo a passo até ficar claro para você como é que funciona o negócio. Uma hora ficará tão simples como a taboia do zero.

**Exemplo 9** *Calcule o limite da função no ponto indicado (se possível) usando a propriedade 8:*

1.  $f : ] - \pi, \pi[ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin(x)$  em  $a = -1, a = 0, a = 1$ .
2.  $f : ] - \pi, \pi[ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin(x)$  em  $a = 2$ .



3.  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$  em  $a = 0$ .

4.  $f : ]2, 3[ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4 + e^{x^2-9}, a = 3$ .

Para a segunda função procedemos de forma diferente. Em este caso mudamos a regra de formação. Observe que  $\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \frac{1}{x+1}$  para  $x \neq 1$ . Definimos a função  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{1}{x+1}$ . Obviamente  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \frac{1}{2}$ . Mas é claro também que  $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  exceto apenas em  $x = 1$ . Então  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1) = \frac{1}{2}$ .

Em este caso temos "arrumado" a regra de formação para que não tenha "problemas" em  $x = 1$ , de forma que a nova função está definida em este ponto. O tipo de problema que encontramos em este limite é chamado de indeterminação. Veremos mais sobre como resolver este tipo de situações mais em adiante.

**Exercício 4** Exercícios 11 ao 16 da lista 2.3 do Stewart.

A seguinte propriedade diz que para calcular o limite de uma função em um ponto  $a$ , o valor da função em esse ponto não é importante, o realmente relevante é o valor da função nas imediações do ponto.

**Propriedade 10** Sejam  $f$  e  $g$  duas funções que são iguais em qualquer ponto exceto em  $a$  (onde pode acontecer que  $f(a) \neq g(a)$  ou também que alguma das duas nem esteja definida em  $a$ ). Suponha que existe  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Por exemplo, as funções  $f(x) = \begin{cases} e^x & x \neq 0 \\ 50 & x = 0 \end{cases}$  e  $g(x) = e^x$  coincidem em todo ponto exceto em  $x = 0$ , porém a propriedade acima garante que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ .

Esta propriedade pode ser também usada no exemplo anterior ao exercício 4.

## 2.3 Limite e ordem

As seguintes propriedades nos dizem como o limite é bem comportado em relação à ordem, pois ele mantém desigualdades entre funções. Dado um ponto  $a$  em  $\mathbb{R}$ , chamamos de vizinhança de  $a$  a todo intervalo que contém o ponto  $a$ . Por exemplo,  $] - 1, 1[$  é uma vizinhança de 0 mas  $]1, 2[$  não é.

**Propriedade 11** *Sejam  $f$  e  $g$  duas funções tais que  $f(x) \leq g(x)$  em alguma vizinhança de  $a$  (mas talvez não em  $a$ ). Se existem ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  então*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

**Exemplo 12** •  $f(x) = \sin(x)$ ,

•  $f(x) = x^2 \sin(x)$

**Propriedade 13 (Teorema do confronto)** *Sejam  $f, g, h$  e suponha que  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  (em uma vizinhança de  $a$ ) e  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ . Então  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ .*

Uma função  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  é limitada se existem  $m, M > 0$  tais que  $m \leq f(x) \leq M$  para todo  $x \in I$ . Uma importante consequência do Teorema do Confronto é a seguinte: Se  $f$  é limitada em uma vizinhança de  $a$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  então  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)f(x) = 0$ .

A graça é que o limite de  $f$  em  $a$  nem precisa existir, se ela for limitada e multiplicamos por uma função que tende a zero em  $a$ , então o resultado será uma função que tende a zero em  $a$ . Exemplo:  $f(x) = x \sin(\frac{1}{x}) = 0$ .

**Exercício 5** 36 ao 40 da lista 2.3 do Stewart.

## 2.4 Limites de funções definidas por partes

Seja  $f(x) = \begin{cases} g(x) & x < b \\ h(x) & x \geq b \end{cases}$  onde supomos que  $g$  e  $h$  são duas funções cujos limites laterais sabemos calcular.

Este é um exemplo típico de função definida por partes. O mais habitual, à hora de calcular limites para uma função deste tipo é o seguinte:

Queremos estudar a existência de limite de  $f$  em um ponto  $a$  então:

- Se  $a < b$  então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ ,
- Se  $a > b$  então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$ ,
- Se  $a = b$  então  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$ .

**Exercício 6** 41 ao 50 da lista 2.3 do Stewart

O estudo de funções definidas por partes que tenham mais de duas partes é totalmente análogo.

**Exemplo 14**  $f(x) = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ x + 2 & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 + 2 & x > 1 \end{cases}$

**Observação 15** Sempre que uma função venha definido mediante o módulo de outra função, teremos uma função definida por partes escondida. Isto porque, de fato,  $|x|$  é uma função definida por partes. Lembre que

$$|x| = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

Assim, tem-se

$$|g(x)| = \begin{cases} -g(x) & g(x) < 0 \\ g(x) & g(x) \geq 0 \end{cases}$$

Por exemplo,

$$|x - 2| = \begin{cases} -(x - 2) & x - 2 < 0 \\ x - 2 & x - 2 \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} -x + 2 & x < 2 \\ x - 2 & x \geq 2 \end{cases}$$

**Exemplo 16** Estude os limites laterais em  $a = 0$  da função  $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x) = x + \frac{|x|}{x}$ .

### 3 Continuidade

No melhor dos casos, o limite de uma função se pode obter simplesmente se calculando o valor da função no ponto. Quando isto acontece, se diz que a função é contínua em esse ponto. Outras vezes calcular  $f(a)$  nem faz sentido, pois o ponto pode não estar no domínio da função, mas em alguns casos dá para salvar a situação para continuar calculando o limite "substituindo" em algum sentido (extendendo), como já temos visto. Começamos definindo um pouco mais formalmente o que é uma função contínua.

Seja  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  e  $a \in I$  (**atenção**, aqui o ponto tem que estar no domínio da função!). Diremos que  $f$  é contínua em  $a$  se valem as seguintes afirmações:

- Existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ,
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Segue das propriedades do limite que somas, produtos e quocientes de funções contínuas em  $a$  são também funções contínuas em  $a$ .

**Propriedade 17** *Sejam  $f$  e  $g$  são contínuas em  $a$  então:*

1.  $\lambda f$  é contínua em  $a$  ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ),
2.  $f + g$  é contínua em  $a$ ,
3.  $f \cdot g$  é contínua em  $a$ ,
4. Se  $g(a) \neq 0$  então  $\frac{f}{g}$  é contínua em  $a$ .

Observe que ao dizermos que as funções são contínuas em  $a$  já está implícito que o ponto  $a$  está no domínio de ambas funções, se não nem faria sentido falar de continuidade em esse ponto.

**Exercício 7** *12, 13 e 14 da Lista 2.5 do Stewart*

Se  $J$  é um subconjunto do domínio de  $f$ , diremos que  $f$  é contínua no conjunto  $J$ , se ela é contínua em todo ponto do conjunto.

Pelo que temos já temos visto até agora temos:

- As funções elementares são contínuas em todo ponto do seu domínio (cada uma no domínio dela, claro).
- A soma de funções contínuas é uma função contínua. Em particular, a soma de duas (ou mais) funções elementares é contínua.
- O produto de duas (ou mais) funções contínuas é uma função contínua.
- A divisão de duas funções contínuas é contínua.

As afirmações acima estão escritas de forma que possam ser lembradas facilmente, mas há um detalhe importante a ser tido em conta. Quando dizemos contínuas...contínuas onde? A resposta é: contínuas no seu domínio. Lembre que se  $f$  está definida em  $I$  e  $g$  está definida em  $J$ , então  $f + g$  e  $f \cdot g$  estão definidas em  $I \cap J$ . Assim, se  $f$  é contínua em  $I$  e  $g$  é contínua em  $J$ , então  $f + g$  e  $f \cdot g$  são contínuas sim, mas em todo ponto onde elas estejam definidas, claro, portanto em  $I \cap J$ .

Já o caso de  $\frac{f}{g}$  é um pouco mais delicado, pois ela é contínua no conjunto  $\{x \in I \cap J : g(x) \neq 0\}$  (pois sempre temos que evitar os zeros no denominador).

**Exemplo 18**  $f(x) = \frac{x^3-1}{3x^2+2x}$ .

- Exercício 8**
1. A função  $f(x) = x^2 + \sqrt{x}$  é contínua em todo ponto de  $[0, +\infty[$  por quê?
  2. A função  $f(x) = \ln(x) + \sqrt{x}$  é contínua em  $]0, +\infty[$ , por quê?
  3. A função  $f(x) = x^2 + e^x$  é contínua em  $\mathbb{R}$  por quê?
  4. A função  $f(x) = \frac{1}{x}$  é contínua em ...?
  5. Exercícios 15 ao 16 e 25 ao 32 da Lista 2.5 do Stewart

A seguinte propriedade diz sobre o limite e a composição de funções contínuas.

**Propriedade 19** Se  $f$  é contínua em  $b$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$  então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b).$$

A propriedade acima não é mais que uma versão mais geral de uma propriedade similar que já foi enunciada, mas daquela vez só envolvendo funções elementares.

**Exemplo 20** Calcule os limites:

1.  $\sin(x^2 - 1)$  em  $a = 1$ ,
2.  $\ln(e^x + 1)$  em  $a = 0$ ,
3.  $\sqrt{\sin(x)}$  em  $a = \frac{\pi}{4}$ ,
4.  $e^{x^2+2x+1}$  em  $a = 0$ .

A composição de funções contínuas também é bem comportada em relação à continuidade.

**Propriedade 21** Sejam  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  duas funções tais que  $f(I) \subseteq J$  e  $a \in I$ . Se  $f$  é contínua em  $a$  e  $g$  é contínua em  $f(a)$  então  $f \circ g$  é contínua em  $a$ .

Em particular, se  $f$  for uma função elementar temos o seguinte:

1. Se  $g$  é contínua então  $g(x)^n$  é contínua,
2. Se  $g$  é contínua então  $\sqrt[n]{g(x)}$  é contínua (se  $n$  é par, então a imagem de  $g$  deverá ser um subconjunto de  $[0, +\infty[$ ).

3. Se  $g$  é contínua então  $b^{g(x)}$  é contínua,
4. Se  $g$  é contínua e tem imagem contida em  $\mathbb{R}^+$  então  $\log_b(g(x))$  é contínua,
5. Se  $g$  é contínua então  $\text{sen}(f(x))$  é contínua,
6. Se  $g$  é contínua então  $\cos(f(x))$  é contínua.

**Exercício 9** *Escreva a propriedade acima para as funções trigonométricas e trigonométricas inversas que faltam.*

**Exercício 10** *Diga onde são contínuas as funções:*

1.  $\sqrt{9-x}$ ,
2.  $\sqrt{9-x^2}$ ,
3.  $\ln(1-x)$ ,
4.  $\text{sen}(9-x)$ ,
5.  $e^{\sqrt{x}}$ ,
6.  $\sqrt[3]{\text{sen}(x)}$ ,
7.  $\ln(x^2+2x+1)$ ,
8.  $\arctan(\frac{1}{x})$ ,
9.  $\sqrt{e^x+1}$ .

**Propriedade 22** *Se  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  (onde  $L$  pode ser um número ou  $\pm\infty$ ) então*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

**Propriedade 23** *Se  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$  (onde  $L$  pode ser um número ou  $\pm\infty$ ) então*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

De fato, as propriedades acima são válidas também para limites laterais e até para limites no infinito (isto é, trocando  $a$  por  $+\infty$  ou por  $-\infty$ ).

**Exemplo 24** 1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 + 1)$ ,

2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x + 1)$ ,

3.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \arctan(\frac{1}{x-1})$ ,

4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(\ln(x^2 + 1))$ .

5.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan(\ln(x))$ ,

### 3.1 O gráfico de uma função contínua

Como saber se uma função é contínua só pelo gráfico? O habitual é dizer que uma função é contínua se pode se desenhar o gráfico dela sem levantar a caneta do papel.

A função  $f : ]0, 1[ \cup ]2, 3[$ ,  $f(x) = x^2$  é contínua mas o gráfico dela não pode se desenhar sem levantar a caneta do papel. Claro que o problema aqui é que o domínio dela não é um intervalo.

Para evitar o tipo de problema acima, podemos então dizer que *se o domínio da função é um intervalo* então ela será contínua se o gráfico dela pode se desenhar sem levantar a caneta do papel.

Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x \sin(\frac{1}{x})$  é contínua em todo  $\mathbb{R}$ . Desenhe o gráfico desta função em geogebra e faça zoom na origem de coordenadas. Você acha que conseguiria desenhar esse gráfico com sua caneta?

O que sempre me contaram estava errado? Bom, é verdade exceto em casos como a função anterior, a qual é contínua em  $a = a$  mas oscila muito nas imediações desse ponto. Então podemos dizer o seguinte:

*Se o domínio da função é um intervalo e não há um ponto onde a função oscile muito, então a função será contínua se dá para desenhar o gráfico dela sem levantar a caneta do papel.*

Assim, se (via o gráfico) queremos encontrar pontos onde a função não seja contínua, deveremos procurar saltos ou buracos no gráfico. Por certo, um ponto onde a função não seja contínua é o que chamamos de *descontinuidade*.

#### 3.1.1 Descontinuidades

Seja  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  e  $a \in I$ . Se  $f$  não é contínua em  $a$  então diremos que  $f$  é descontínua em  $a$ . Também diremos que  $a$  é uma descontinuidade da função  $f$ . As descontinuidades podemos ser classificados nos seguintes tipos:

- **Evitável.** Se  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  mas  $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  (isto equivale, claro, a que  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  seja diferente de  $f(a)$ ).

- **Não evitável de primeira especie.** Existem ambos os limites laterais mas são diferentes.
- **Não evitável de segunda especie.** Se algum dos limites laterais não existir. Isto pode ser devido a que algum dos limites laterais seja infinito ou a oscilações (como em  $\sin(\frac{1}{x})$ .)

**Exercício 11** Exercícios 3 ao 8 e 41 ao 43 da lista 2.5 do Stewart.

## 4 Propriedades das funções contínuas

Em esta seção vamos ver duas propriedades muito importantes das funções contínuas: O Teorema do valor intermediário e o Teorema dos zeros de Bolzano. O primeiro é muito útil para calcular imagens de funções, já o segundo tem como principal aplicação encontrar raízes de uma função.

**Teorema 25** *Seja  $f$  uma função contínua no intervalo  $[a, b]$ . Então  $f$  assume todos os valores entre  $f(a)$  e  $f(b)$ .*

**Exemplo 26**  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 1$ .

**Corollary 27** *Seja  $f$  uma função contínua no intervalo  $[a, b]$ . Se  $f(a)$  e  $f(b)$  têm diferente sinal, então existe  $c \in ]a, b[$  tal que  $f(c) = 0$ .*

**Exemplo 28**

$f(x) = 4x^4 - 3x^3 + 5x - 5$  em  $[0, 1]$ ,

$f(x) = x - \cos^2(x)$  em  $]\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}[$ .

**Exercício 12** Exercícios 51 ao 54 da lista 2.5 do Stewart.

## 5 Limites indeterminados

Realmente, o mais complicado do cálculo de limites é aprender a lidar com indeterminações. Antes de ver os principais métodos de resolução de indeterminações será bom deixar claro as situações que envolvem operações com funções que tendem a infinito ou zero, mas que de fato não são indeterminações.

Na Tabela 1 abaixo, vale a regra dos sinais para determinar em cada caso se o resultado é  $+\infty$  ou  $-\infty$ .



$\infty \pm c = \infty$	$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$	$+\infty - (+\infty) = \text{Indet}$
$c \cdot \infty = \infty \ (c \neq 0)$	$\infty \cdot \infty = \infty$	$0 \cdot \infty = \text{Indet}$
$\frac{0}{c} = 0 \ (c \neq 0)$	$\frac{0}{\infty} = 0$	$\frac{0}{0} = \text{Indet}$
$\frac{c}{0} = \infty \ (c \neq 0)$	$\frac{k}{\infty} = 0$	
$\frac{\infty}{c} = \infty$	$\frac{\infty}{0} = \infty$	$\frac{\infty}{\infty} = \text{Indet}$
$0^c = \begin{cases} 0 & c > 0 \\ \infty & c < 0 \end{cases}$	$0^{+\infty} = 0$	$0^0 = \text{Indet}$
$c^0 = 1$	$c^{+\infty} = \begin{cases} \infty & c > 1 \\ 0 & 0 < c < 1 \end{cases}$	$1^\infty = \text{Indet}$
$\infty^{-\infty} = 0$	$(+\infty)^{+\infty} = +\infty$	$\infty^0 = \text{Indet}$

Tabela 1: Operações com infinitos e divisões por sequências que tendem a zero. Na tabela  $c$  é uma constante.

As propriedades listadas na Tabela 1 não devem levar a engano, não estamos dividindo entre zero nem dizendo que  $\infty$  seja um número. Aqui  $\infty$  é uma forma abreviada de dizer "temos uma função que tende a  $\infty$ " ou onde aparece 0 o que queremos dizer é que "temos uma função que tende a 0".

Você já deve ter percebido que para calcular um limite em um ponto  $a$  ou em  $\pm\infty$  você sempre vai tentar substituir, e se der certo, você terá seu limite calculado (claro que quando a substituição envolve  $\infty$  ou divisões entre zero, não é substituir mesmo, senão usar as regras da Tabela 1). Quando após de substituir apareçam limites indeterminados, então isto quer dizer que teremos que usar alguma das técnicas que mostraremos mais em adiante para saber qual é o valor do limite mesmo.

Os seguintes limites podem ser calculados usando a tabela acima.

- Exercício 13** 1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 50$ , 9)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2e^x$ ,  
2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 50$ , 10)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 50 \ln(x)$ ,  
3)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) + 3$ , 11)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} -50 \ln(x)$ ,  
4)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) - x$ , 12)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^x$ ,  
5)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln(x)$ , 13)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cdot \ln(x)$ ,  
6)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} + e^x + x^3$ , 14)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{4}{x - \frac{\pi}{2}} \tan(x)$ ,  
7)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - \frac{1}{x}$ , 15)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \frac{1}{x})(\ln(x))^2$ ,  
8)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) - \frac{1}{x}$ , 16)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2}$ ,

- 17)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{30},$
- 18)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}}{2},$
- 19)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{x-1},$
- 20)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+1}{x-1},$
- 21)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1}{\tan(x)},$
- 22)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{\ln(x)},$
- 23)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\ln(\frac{1}{x})},$
- 24)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2+1}{x+2},$
- 25)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2+1}{x+2},$
- 26)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{\ln(x)},$
- 27)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+1}{\ln(x)},$
- 28)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(x)},$
- 29)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2-1}{\ln(x)},$
- 30)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(4-x)}{e^{\frac{1}{x}}},$
- 31)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(4-x)}{\frac{1}{x}},$
- 32)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(4-x)}{\frac{1}{x}},$
- 33)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\frac{1}{x}}{e^x},$
- 34)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x},$
- 35)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\sin(x)},$
- 36)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x)}{\sin(x)},$
- 37)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x},$
- 38)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{1-x},$
- 39)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{1}{x})^2,$
- 40)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin(\frac{1}{x}))^x,$
- 41)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x)^{\frac{1}{x-1}},$
- 42)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{1}{x})^{x^2},$
- 43)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{\frac{1}{x}},$
- 44)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}},$
- 45)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{e^x-1},$
- 46)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\ln(x)},$
- 47)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{1}{2})^{\ln(x)},$
- 48)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{x^2+3x},$
- 49)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0.333^{x^2+3x},$
- 50)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x)^{\ln(x)},$
- 51)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2)^{x^3-3x},$
- 52)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2)^{x^3+3x},$
- 53)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)^{\ln(x)},$
- 54)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^x.$

## 5.1 Escala de infinitos

Antes de estudar as indeterminações vamos ver aqui uma hierarquia de infinitos (ou escala de infinitos) que será de grande utilidade durante a unidade toda.

Sejam  $f$  e  $g$  funções tais que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \pm\infty$ . Diremos que  $f$  *tende para infinito mais rapidamente do que*  $g$  se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty.$$

Isto será denotado mediante  $f(x) \gg g(x)$  para  $x$  grande.<sup>6</sup>

Obviamente isto é equivalente a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

Uma propriedade muito importante desta relação é que ela é *transitiva*, isto é, tem a seguinte propriedade:

Se  $f(x) \gg g(x)$  e  $g(x) \gg h(x)$  então  $f(x) \gg h(x)$ .

**Propriedade 29 (Escala de infinitos)** *Sejam  $p > 0$  e  $r > 1$  então os limites (em  $+\infty$ ) das funções seguintes são  $+\infty$ :*

$$\frac{x^x}{r^x}, \quad \frac{r^x}{x^p}, \quad \frac{x^p}{\ln(x)}.$$

Claro que se as frações acima são invertidas então os limites serão nulos, isto é, os limites das funções seguintes (em  $+\infty$ )

$$\frac{r^x}{x^x}, \quad \frac{x^p}{r^x}, \quad \frac{\ln(x)}{x^p}$$

são zero.

Ou seja, o que estamos dizendo é o seguinte:

$$x^x \gg r^x \gg x^p \gg \ln(x)$$

para  $x$  grande.

A escala de infinitos contém mais informação do que parece, isto devido a que a relação  $\gg$  é transitiva. Por exemplo, o limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{x^p}$  não aparece explícito na escala de infinitos mas dado que  $x^x \gg e^x$  e  $e^x \gg x^p$  então  $x^x \gg x^p$ , isto é,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{x^p} = +\infty$  (ou equivalentemente  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{x^x} = 0$ ).

---

<sup>6</sup>Na verdade, poderíamos definir coisas parecidas como 'tende a infinito mais rapidamente em  $a$ ' ou 'tende para infinito mais rapidamente em  $-\infty$ ', a ideia seria a mesma e a utilidade também

**Observação 30** É importante na escala de infinitos que  $p$  seja positivo e  $r$  seja maior que 1. Também, onde aparece  $x^p$  você pode botar qualquer polinômio ou qualquer raiz e a escala seguirá funcionando. Isto é,

$$x^x \gg r^x \gg \text{polinômio ou raiz} \gg \ln(x).$$

**Observação 31** Se temos duas potências (isto inclui as raízes, se consideramos uma raiz como uma potência fracionária), sempre tende a infinito mais rapidamente aquela de maior grau. Isto é, se  $p > q$  então  $x^p \gg x^q$ . por quê?

### 5.1.1 Escala de infinitos para limites em $-\infty$

Sempre é possível transformar um limite com  $x \rightarrow -\infty$  em outro em  $+\infty$ . Em efeito, tem-se o seguinte:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x).$$

Se queremos usar a escala de infinitos sem trocar o limite como acima, podemos usar a seguinte escala de infinitos válida para limites com  $x \rightarrow -\infty$ :

$$\text{polinômios} \gg \text{raízes} \gg \ln(\text{polinômio ou raiz}).$$

Quando  $x \rightarrow -\infty$  também vale a regra:  $x^n \gg x^m$  sempre que  $n$  seja maior que  $m$  (aqui  $n$  e  $m$  podem ser frações, de forma que esta regra continua sendo válida para raízes).

## 5.2 Indeterminações tipo $+\infty - \infty$

Uma primeira técnica para resolver este tipo de indeterminações é a seguinte: coloque em evidência a função que tende para infinito *mais rapidamente* de acordo com a escala de infinitos.

**Exemplo 32** Calcule os limites com  $x \rightarrow +\infty$ .

1.  $x^3 - x^2 + 1$ ,
2.  $\ln(x+1) - x^2 + x$ ,
3.  $x^{40} + e^x + \ln(x)$ ,
4.  $x^x + e^x + 3$ .

**Exemplo 33** Calcule os limites com  $x \rightarrow -\infty$ .

1.  $x^3 - x^2 + 1$ ,
2.  $\ln(x^2 + 1) - x^2 + x$ ,
3.  $x^{40} + e^x + \ln(-x)$ ,
4.  $x^3 + e^x + 3 + \sqrt[3]{x}$ .

Se o limite envolve uma diferenca de duas funções, sendo uma delas (ou ambas) uma raiz quadrada, pode funcionar *multiplicar e dividir pelo conjugado* e simplificar. Isto é, faça o seguinte

$$\sqrt{a} - b = \frac{(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b)}{\sqrt{a} + b} = \frac{a - b^2}{\sqrt{a} + b}.$$

Com um pouco de sorte, após simplificar, a indeterminação terá sido removida.

**Exemplo 34** Calcule os limites com  $x \rightarrow +\infty$ .

1.  $\sqrt{x^2 - 1} - x$ .
2.  $\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}$ .

Se o limite envolve uma diferenca de logaritmos pode funcionar aplicar as propriedades do logaritmo para deixar tudo dentro de um unico logaritmo

**Exemplo 35** Calcule o limite com  $x \rightarrow +\infty$  de  $\ln(x^2 + 1) - \ln(x + 3)$ .

Se o limite envolve uma soma ou diferenca de duas frações, pode funcionar reduzir a comum denominador.

**Exemplo 36** Calcule o limite com  $x \rightarrow +\infty$  de  $\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^2}{x+1}$ .

### 5.3 Indeterminações tipo $\frac{0}{0}$

Se estamos calculando um limite em  $a$ , sendo a função um quociente de duas funções polinomicas, então a indeterminação  $\frac{0}{0}$  está dizendo que  $a$  é uma raiz de ambos polinomios. Em este caso o que devemos fazer é fatorar os polinomios e cortar os fatores  $x - a$  que apereçam.

#### Exercicio 14

---

<sup>7</sup>Os sinais podem estar trocados, você deveria poder adaptar esta nova situação

- 1)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-4},$
- 2)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2+x-2},$
- 3)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2-1},$
- 4)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{x^3-4x^2+5x-2}.$

Se a indeterminação envolve (no numerador o no denominador) uma soma diferença de funções sendo pelo menos uma delas uma raiz quadrada, então multiplicamos e dividimos pelo conjugado.

**Exercício 15** *Exercícios 25, 27, 22 e 30 da lista 2.3 do Stewart.*

Em geral, a ferramenta mais útil que temos para lidar com este tipo de indeterminações é a Regra de L'Hôpital. Infelizmente, isso tem que esperar. Segue o resultado para ser usado no futuro:

**Propriedade 37 (Regra de L'Hôpital)** *Sejam  $f$  e  $g$  duas funções deriváveis e suponha que*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

*Agora suponha que  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ . Então*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## 5.4 Indeterminações tipo $\frac{\infty}{\infty}$

De novo podemos começar tentando usar a escala de infinitos da forma seguinte: Seleccionamos a função que tende para infinito mais rapidamente no numerador e colocamos esta em evidência. A continuação seleccionamos a função que tende para infinito mais rapidamente no denominador e colocamos esta em evidência. Com sorte isto resolverá a indeterminação.

**Exemplo 38** *Calcule os limites em  $+\infty$  e  $-\infty$  (quando seja possível):*

1.  $\frac{4x^4+2x^2-2x+3}{x^3+x-2},$
2.  $\frac{x^2+\ln(x)+3}{2x^3-x-1},$
3.  $\frac{3e^x+x^2}{\sqrt{x}-e^{2x}},$
4.  $\frac{x+2}{x\sqrt{x}},$

5.  $\frac{x+4^x}{x+6^x},$
6.  $\frac{9^x}{3+10^x},$
7.  $\frac{9^x}{3+x^x},$
8.  $\frac{\sqrt{x^4+1}}{x^3+x^2},$
9.  $\frac{\sqrt{x^4+1}+x^2}{\sqrt[3]{x+1}+3x}.$

**Observação 39** *É muito importante você lembrar as propriedades das potências e das exponenciais.*

A regra L'Hôpital é também válida para indeterminações da forma  $\frac{\infty}{\infty}$ .

**Propriedade 40 (Regra de L'Hôpital)** *Sejam  $f$  e  $g$  duas funções deriváveis e suponha que  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ . Agora suponha que  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ . Então*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

As vezes são necessárias várias aplicações da regra de L'Hôpital para acabar com uma indeterminação.

## 5.5 Indeterminações tipo $0 \cdot \infty$

Sempre é possível converter uma indeterminação tipo  $0 \cdot \infty$  em uma tipo  $\frac{\infty}{\infty}$  ou em uma tipo  $\frac{0}{0}$ . A ideia é muito simples. Suponha que  $f$  e  $g$  tendem a 0 (pode ser em um ponto ou em  $\pm\infty$ ) então fazendo

$$fg = \frac{f}{\frac{1}{g}}$$

temos uma indeterminação tipo  $\frac{0}{0}$  e fazendo

$$fg = \frac{g}{\frac{1}{f}}$$

temos uma tipo  $\frac{\infty}{\infty}$ .

### Exemplo 41

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right).$$

## 5.6 Indeterminações tipo $\infty^0$

Para indeterminações que envolvem expoentes uma ideia que funciona bem bastantes vezes é fazer o seguinte:

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln(f(x))}.$$

Agora a indeterminação fica no expoente da segunda função e, com sorte, talvez agora saibamos como calcular o limite que aparece no expoente.

**Exemplo 42** 1.  $x^{\frac{1}{x}}$ ,

2.  $(x^2 + 1)^{\frac{1}{x}}$ ,

3.  $\ln(2x^2 + 3x + 1)^{\frac{1}{x}}$ ,

## 5.7 Indeterminações tipo $1^\infty$

Aqui podemos tentar usar a mesma ideia que no caso anterior. Se não dá certo, então usaremos o seguinte resultado:

**Propriedade 43** *Sejam  $f$  e  $g$  duas funções tais que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ . Tem-se*

$$\text{Se } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)(f(x) - 1) = L \text{ então } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)^{g(x)} = e^L.$$

**Exemplo 44** 1.  $(1 + \frac{1}{x})^x$ ,

2.  $(1 + \frac{2}{x})^x$ ,

3.  $(1 - \frac{2}{x})^x$ ,

4.  $(1 + \frac{\ln(x)}{x})^{\ln(x)}$ ,

5.  $(1 + \frac{1}{x^2+1})^{x^2+6x+2}$ ,

6.  $(\frac{x^2+1}{2x^2+1})^x$ .

Para dúvidas, erros, correções, sugestões, etc: [jorge.garces@ufsc.br](mailto:jorge.garces@ufsc.br)