



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento Matematica

Corso di Laurea in  
Matematica

ELABORATO FINALE

TITOLO

*Sottotitolo (alcune volte lungo - opzionale)*

Supervisore  
Sonia Mazzucchi

Laureando  
Claudio Meggio

Anno accademico 2017/2018

# Ringraziamenti

*...thanks to...*

# Indice

<b>Sommario</b>	<b>2</b>
<b>1 Informazione ed Entropia per variabili casuali discrete</b>	<b>2</b>
1.1 Informazione . . . . .	2
1.2 Entropia . . . . .	3
1.3 Unicità dell'Entropia . . . . .	4
1.4 Proprietà dell'entropia . . . . .	5
1.5 Principio dell'Entropia Massima . . . . .	8
1.6 Entropia nelle catene di Markov . . . . .	8
1.7 La Regola della Catena . . . . .	9
1.8 Velocità dell'Entropia . . . . .	10
<b>2 Entropia per Variabili Casuali Assolutamente Continue</b>	<b>12</b>
2.1 Entropia nel caso Continuo . . . . .	12
<b>3 Comunicazione</b>	<b>14</b>
3.1 Trasmissione di informazione . . . . .	14
3.2 Codici . . . . .	16
<b>4 Conclusioni</b>	<b>18</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>18</b>
<b>A Titolo primo allegato</b>	<b>20</b>
A.1 Titolo . . . . .	20
A.1.1 Sottotitolo . . . . .	20
<b>B Titolo secondo allegato</b>	<b>21</b>
B.1 Titolo . . . . .	21
B.1.1 Sottotitolo . . . . .	21

# Sommario

« La mia più grande preoccupazione era come chiamarla. Pensavo di chiamarla informazione, ma la parola era fin troppo usata, così decisi di chiamarla incertezza. Quando discussi della cosa con John Von Neumann, lui ebbe un'idea migliore. Mi disse che avrei dovuto chiamarla entropia, per due motivi: "Innanzitutto, la tua funzione d'incertezza è già nota nella meccanica statistica con quel nome. In secondo luogo, e più significativamente, nessuno sa cosa sia con certezza l'entropia, così in una discussione sarai sempre in vantaggio » (Claude Shannon)

## 1 Informazione ed Entropia per variabili casuali discrete

### 1.1 Informazione

Fondamentali in questa tesi saranno i concetti di Informazione ed entropia.

Bisogna anzitutto specificare che in Probabilità il significato di Informazione ha un connotato diverso da quello della lingua parlata. Consideriamo ad esempio le seguenti frasi:

- i. Quando vado in palestra mi alleno
- ii. Il vincitore delle prossime elezioni sarà Claudio Baglioni
- iii. QUER W LKS E W

istintivamente diremo che la frase contenente maggior informazione è (ii) in quanto contiene un'informazione totalmente inaspettata e nuova, seguita poi da (i) ed in fine (iii) la quale non avendo significato non conterrà nessuna informazione.

Questa scala però tiene conto sia del significato della frase sia della quantità di *sorpresa* che porta. In questo senso (iii) non ha significato, ma porta *sorpresa*, mentre (ii) contiene sia significato che sorpresa.

Nel mondo della matematica si è visto che il concetto di *significato* è difficile da esprimere e si è dunque preferito puntare sul concetto di *sorpresa* per esprimere il significato d'*informazione*.

Per definire in maniera rigorosa il concetto di **informazione** poniamoci in uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ .

Dati due eventi  $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$  vogliamo che la nostra funzione d'informazione  $I$  soddisfi alcuni criteri:

1.  $I(E) \geq 0$  per ogni  $E \in \mathcal{F}$
2. se  $\mathbb{P}(E_1) \leq \mathbb{P}(E_2)$  allora  $I(E_1) \geq I(E_2)$
3. se  $E_1, E_2$  sono indipendenti allora  $I(E_1 \cup E_2) = I(E_1) + I(E_2)$

Per soddisfare queste richieste viene naturalmente in mente la funzione log, infatti:

**Definizione 1.1.1.** In uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  definiamo la funzione **informazione**  $I : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^+$  come:

$$I(E) = -\log_a(\mathbb{P}(E)). \quad (1.1.1)$$

dove  $a$  è una costante positiva (in alcuni testi la funzione viene moltiplicata per  $K$ , ma tale costante è inutile dato che già scegliere la base coincide col moltiplicare per una costante, infatti:  $\log_a(x) = \frac{\log_b(y)}{\log_b(a)}$ ).

Si verifica facilmente che la funzione  $I$  così definita rispetta le proprietà preposte, l'unico intoppo nasce per un evento  $E$  tale che  $\mathbb{P}(E) = 0$  in questo caso  $I(E) = \infty$ , questa occorrenza può essere interpretata come l'incapacità di ottenere informazioni da un evento impossibile. La funzione *Informazione* possiede inoltre la proprietà di essere nulla qualora la probabilità di un evento sia 1 cioè se un evento è certo, la sua realizzazione non ci fornirà alcuna informazione aggiuntiva. Essendo questa funzione spesso associata a codici è comodo scegliere 2 come base del logaritmo, in questo modo supponendo di avere una variabile casuale  $X$  con distribuzione di Bernoulli a parametro  $p = \frac{1}{2}$  (il nostro messaggio sarà definito da un codice binario  $\{0, 1\}$ ) abbiamo che

$$I(X = 0) = I(X = 1) = -\log_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad (1.1.2)$$

Per questo d'ora in avanti, salvo diversa indicazione, con  $\log$  si intenderà  $\log_2$ .

## 1.2 Entropia

Il secondo concetto fondamentale trattato in questa tesi è quello di *entropia*.

Data una variabile casuale discreta  $X$  a valori  $\{x_1 \dots x_n\}$  e con legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$  ( $p_i := \mathbb{P}(X = x_i)$ ) non possiamo conoscere a priori il valore che assumerà  $X$  e di conseguenza non possiamo sapere quanta informazione verrà inviata. Definiamo per questo l'*entropia*.

**Definizione 1.2.1.** Si dice **entropia** di una variabile casuale discreta  $X$  il valore

$$H(X) := \mathbb{E}(I(X)) = -\sum_{j=1}^n p_j \Phi(p_j) \quad (1.2.1)$$

dove

$$\Phi(p) := \begin{cases} \log_2(p) & \text{se } p \neq 0 \\ 0 & \text{se } p = 0 \end{cases}$$

Per capire il senso di questa definizione si immagini di voler scommettere con una moneta modificata come segue:

1. esce testa con probabilità  $p_1 = 0.95$
2. esce testa con probabilità  $p_2 = 0.6$
3. esce testa con probabilità  $p_3 = 0.5$

usando la definizione di entropia otteniamo:

1.  $H_1(p_1) = 0.286$
2.  $H_2(p_2) = 0.971$
3.  $H_3(p_3) = 1$

Ovviamente nel primo caso la probabilità di predire il risultato corretto è molto alta dato che la moneta è pesantemente modificata e infatti il sistema avrà una bassa entropia, nel secondo caso l'entropia aumenta, infine nel terzo l'indecisione sarà massima e l'entropia di conseguenza.

Per convincersi di quanto detto in maniera più matematica, si ha il seguente teorema:

**Teorema 1.2.1.** Sia  $X$  una variabile casuale discreta, allora vale:

1.  $H(X) \geq 0$  e  $H(X) = 0$  se e solo se esiste un valore  $X$ ,  $x_1$  t.c.  $\mathbb{P}(x_1) = 1$
2.  $H(X) \leq \log(n)$  e l'uguaglianza varrà solo quando  $X$  ha distribuzione uniforme

*Dimostrazione.*

1. ovviamente  $H(X) \geq 0$  perché somma di quantità positive (consideriamo gli addendi come  $-\log(x)$  e ricordando che  $x \in (0, 1]$ ). Per quanto riguarda la seconda parte, dato che tutti gli addendi della sommatoria sono positivi, abbiamo che  $H(X) = 0$  se e solo se  $p_j \log(p_j) = 0 \forall j$ , quindi abbiamo che  $p_j$  sarà uguale ad 1 o 0, ma non può essere che tutti i  $p_j$  siano uguali a 0 e dunque deve esistere almeno un  $p_j = 1$ .
2. per prima cosa supponiamo che  $p_j \geq 0$  (nel caso non lo fossero basterebbe togliere i  $p_k = 0$  e dimostrare che  $H(X) \leq \log(n - c) \leq \log(n)$  dove  $c$  è il numero di  $p_k = 0$ ).  
Dalla definizione abbiamo:

$$\begin{aligned}
H(x) - \log(n) &= -\frac{1}{\ln(2)} \left( \sum_{j=1}^n p_j \ln(p_j) + \ln(n) \right) \\
&= -\frac{1}{\ln(2)} \left( \sum_{j=1}^n p_j (\ln(p_j) + \ln(n)) \right) \\
&= -\frac{1}{\ln(2)} \left( \sum_{j=1}^n p_j \ln(p_j n) \right) \\
&= \frac{1}{\ln(2)} \left( \sum_{j=1}^n p_j \ln\left(\frac{1}{p_j n}\right) \right) \\
&\leq \frac{1}{\ln(2)} \left( \sum_{j=1}^n p_j \left( \frac{1}{p_j n} - 1 \right) \right) \\
&= \frac{1}{\ln(2)} \left( \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{n} - p_j \right) \right) \leq 0
\end{aligned}$$

dove nel per passare dalla quarta alla quinta riga abbiamo usato il fatto che  $\ln(x) \leq x - 1$  con l'uguaglianza solo se  $x = 1$ . Quindi abbiamo che le disuguaglianze si trasformano in uguaglianze solo se  $\frac{1}{p_j n} = 1$  cioè se  $p_j = \frac{1}{n}$  cioè se si ha distribuzione uniforme.

□

### 1.3 Unicità dell'Entropia

Si può dimostrare che la scelta della funzione di entropia come *misura di incertezza* è unica a meno di una costante moltiplicativa.

Anzitutto definiamo la *misura di incertezza*:

**Definizione 1.3.1.** sia  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un spazio di probabilità e  $X$  variabile casuale di legge  $\{p_1 \dots p_n\}$ , una funzione  $U$  viene detta **misura di incertezza** se soddisfa le seguenti condizioni:

1.  $U(X)$  è un massimo quando ha distribuzione uniforme
2. presa  $Y$  variabile casuale allora  $U(X, Y) = U_x(Y) + U(X)$
3.  $U(p_1 \dots p_n, 0) = U(p_1 \dots p_n)$
4.  $U(p_1 \dots p_n)$  è continua per tutti i suoi argomenti.

**Teorema 1.3.1.** *In uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  consideriamo una variabile casuale  $X$  con legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$  allora  $U(X)$  è una misura di incertezza se e solo se*

$$U(X) = KH(X)$$

dove  $K$  è una costante  $K \geq 0$

## 1.4 Proprietà dell'entropia

In questa sezione indagheremo le prime proprietà dell'entropia e dimostreremo i primi risultati che getteranno le basi per le costruzioni successive. Può essere interessante capire come si comporta l'entropia nel caso in cui le variabili in considerazione siano dipendenti, per fare ciò definiremo l'*entropia condizionata*. Alla definizione premettiamo una nota sulla notazione:

indicheremo la probabilità condizionata che  $Y = k$  sapendo che  $X = j$  ( $\mathbb{P}(Y = k|X = j)$ ) con la notazione  $p_j(k)$  oppure, in modo totalmente equivalente,  $p(k|j)$ .

**Definizione 1.4.1.** Si dirà **entropia condizionata di  $Y$  data  $X = j$**  la funzione:

$$H_j(Y) := - \sum_{k=1}^m p_j(k) \log(p_j(k)) \quad (1.4.1)$$

Prendiamo una variabile casuale  $X$ , possiamo considerare la variabile casuale  $H.(Y)$  che avrà immagine  $\{H_1(Y) \dots H_n(Y)\}$  e legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$ . Avremo quindi che  $H.(Y)$  sarà funzione di  $X$ .

**Definizione 1.4.2.** definiamo l'**entropia condizionata di  $Y$  data  $X$** ,  $H_X(Y)$  come:

$$H_X(Y) := \mathbb{E}[H.(Y)] = \sum_{j=1}^n p_j H_j(Y) \quad (1.4.2)$$

**Osservazione 1.** Più avanti, analogamente a quanto detto per la probabilità condizionata, ci sarà più comodo scrivere  $H_X(Y)$  come  $H(Y|X)$ .

**Lemma 1.4.1.**

$$H_X(Y) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(p_j(k)) \quad (1.4.3)$$

*Dimostrazione.* Sostituendo 1.4.1 in 1.4.2 otteniamo

$$H_X(Y) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_j p_j(k) \log(p_j(k)) \quad (1.4.4)$$

Ricordando che

$$p_j(k) = \mathbb{P}(Y = k|X = j) \text{ e } p_j = \mathbb{P}(X = j)$$

otteniamo che

$$p_j p_j(k) = \mathbb{P}(X = j) \mathbb{P}(Y = k|X = j) = \mathbb{P}(X = j, Y = k) = p_{jk}$$

e possiamo concludere. □

**Lemma 1.4.2.** se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti allora vale:

$$H_X(Y) = H(Y) \quad (1.4.5)$$

*Dimostrazione.* Sia  $\{q_1 \dots q_m\}$  la legge di probabilità di  $Y$  allora ci basterà notare che nel caso in cui  $X$  e  $Y$  siano indipendenti  $p_j(k) = \mathbb{P}(Y = k | X = j) = \mathbb{P}(Y = k) = q_k$  e dunque 1.4.4 diventerà

$$H_X(Y) = - \sum_{k=1}^m q_k \log(q_k) \sum_{j=1}^n p_j = - \sum_{k=1}^m q_k \log(q_k) 1 = H(Y)$$

□

**Definizione 1.4.3.** Siano  $X$  e  $Y$  due variabili casuali definite sullo stesso spazio di probabilità, definiamo la loro **entropia congiunta**  $H(X, Y)$  come:

$$H(X, Y) := - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(p_{jk}) \quad (1.4.6)$$

dove con  $p_{jk}$  intendiamo  $\mathbb{P}(X = j, Y = k)$

**Osservazione 2.** Dalla definizione si ha immediatamente che  $H(X, Y) = H(Y, X)$ .

**Teorema 1.4.1.** *Date due variabili casuali  $X, Y$  vale:*

$$H(X, Y) = H(X) + H_X(Y). \quad (1.4.7)$$

*Dimostrazione.* sapendo che  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$  e quindi che  $p_{jk} = p_j p_j(k)$  possiamo sostituire direttamente nella definizione di entropia congiunta 1.4.3 ottenendo:

$$H(X, Y) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(p_j p_j(k)) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(p_j(k)) - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(p_j)$$

possiamo concludere ricordando che  $\sum_{k=1}^m p_{jk} = p_j$

□

**Corollario 1.4.1.** *se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti allora vale:*

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y) \quad (1.4.8)$$

*Dimostrazione.* basta applicare 1.4.5 al teorema precedente

□

**Teorema 1.4.2.** *(Disuguaglianza fondamentale di Shannon)*

$$H_X(Y) \leq H(Y) \quad (1.4.9)$$

*Dimostrazione.* Per la dimostrazione utilizziamo la disuguaglianza di Jensen:  
data  $f$  funzione convessa vale

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j) \geq f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) \quad (1.4.10)$$

con  $\lambda_j > 0$  e  $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$  per la dimostrazione si veda [6].

Ora applicando la disuguaglianza con:

$$\lambda_j = p_j, \quad f(x) = x \log x, \quad x_j = p_j(k)$$

per  $k$  fissato, otteniamo quindi:

$$\sum_{j=1}^n p_j p_j(k) \log(p_j(k)) \geq \sum_{j=1}^n \left(p_j p_j(k)\right) \log\left(\sum_{j=1}^n p_j p_j(k)\right) = q_k \log(q_k)$$



dove l'uguaglianza la ricaviamo da:  $\sum_{j=1}^n p_j p_j(k) = \sum_{j=1}^n \left( \mathbb{P}(X = j) \mathbb{P}(Y = k | X = j) \right) = \mathbb{P}(Y = k) = q_k$ . Sommando su  $k$  abbiamo che la parte sinistra della disuguaglianza diventa:

$$\sum_{j=1}^n p_j \sum_{k=1}^m p_j(k) \log(p_j(k)) = - \sum_{j=1}^n p_j H_k(Y) = -H_X(Y)$$

mentre a destra otteniamo

$$\sum_{k=1}^m q_k \log(q_k) = -H(Y)$$

e quindi:

$$-H_X(Y) \geq -H(Y) \quad (1.4.11)$$

Da cui possiamo concludere direttamente.  $\square$

Questo risultato può essere pensato come: aggiungendo informazione (il valore di  $X$ ) l'entropia del sistema diminuisce.

**Osservazione 3.** Nel caso di *processi stocastici* (si veda 1.6 per la definizione) è comodo osservare che considerando  $Y = (X_{n+1})$  e  $X = X_0$  nel teorema precedente si ottiene:

$$H(X_{n+1} | X_0, X_1 \dots X_n) \leq H(X_{n+1} | X_1 \dots X_n)$$

**Definizione 1.4.4.** date due variabili casuali  $X, Y$  definiamo **mutua informazione di  $X$  e  $Y$**

$$I(X, Y) := H(Y) - H_X(Y) \quad (1.4.12)$$

Notiamo che  $H_X(Y)$  è l'informazione contenuta in  $Y$  che non è contenuta in  $X$  e quindi l'informazione di  $Y$  contenuta in  $X$  sarà  $H(Y) - H_X(Y) = I(X, Y)$

**Teorema 1.4.3.** Per siano  $X$  e  $Y$  due variabili casuali con legge di probabilità rispettivamente legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\} \{q_1 \dots q_m\}$

1.  $I(X, Y) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log \left( \frac{p_{jk}}{p_j p_k} \right)$
2.  $I(X, Y) = I(Y, X)$
3. se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti allora  $I(X, Y) = 0$

*Dimostrazione.* si proceda come segue:

1. sempre ricordando che  $\sum_{k=1}^m p_{jk} = p_j$  possiamo scrivere

$$H(Y) = - \sum_{k=1}^m q_k \log(q_k) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(q_k)$$

e dunque per 1.4.3 otteniamo

$$I(X, Y) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log(q_k) - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} \log p_j(k)$$

2. immediato da 1.
3. semplicemente ricordando che se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti  $H_X(Y) = H(Y)$

$\square$

## 1.5 Principio dell'Entropia Massima

Spesso ci si trova in condizioni in cui è data una variabile casuale  $X$  a valori  $\{x_1 \dots x_n\}$  di cui non si conosce la legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$  in questi casi si può applicare il principio di entropia massima:

**Definizione 1.5.1.** Data una variabile casuale  $X$  con legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$  incognita il **principio dell'entropia massima** ci impone di scegliere i  $p_j$  in modo tale che  $H(X)$  sia massima

**Esempio.** Sia  $X$  una variabile casuale a valori  $\{x_1 \dots x_n\}$  di cui non si conosce la legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$ . Sappiamo già che, se non ci sono altre condizioni, l'entropia sarà massima se  $X$  sarà uniformemente distribuita. Prendiamo ora il caso in cui ci venga fornita la media di  $\mathbb{E}[X] = E$ . Per trovare il massimo dell'entropia  $H(X)$  utilizziamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange: come costrizioni abbiamo:

1.  $\sum_{j=1}^n p_j = 1$
2.  $\sum_{j=1}^n x_j p_j = E$

Dunque dobbiamo trovare il massimo valore di:

$$L(p_1 \dots p_n; \lambda, \mu) := - \sum_{j=1}^n p_j \log(p_j) + \lambda \left( \sum_{j=1}^n p_j - 1 \right) + \mu \left( \sum_{j=1}^n x_j p_j - E \right) \quad (1.5.1)$$

dove  $\lambda, \mu$  sono i moltiplicatori di Lagrange.

Imponendo le derivate parziali uguali a 0 otteniamo:

$$\frac{\partial L}{\partial p_j} = -\frac{1}{\ln(2)} (\ln(p_j) + 1) + \lambda + \mu x_j = 0 \quad (1 \leq j \leq n)$$

quindi

$$p_j = e^{\lambda' + \mu' x_j} \quad (1 \leq j \leq n)$$

dove  $\lambda' = \ln(2)\lambda - 1$  e  $\mu' = \ln(2)\mu$

da 1. possiamo ricavare

$$\lambda' = -\ln(Z(\mu')) \quad \text{dove} \quad Z(\mu') := \sum_{j=1}^n e^{\mu' x_j}$$

riassumendo quindi abbiamo:

$$p_j = \frac{e^{\mu' x_j}}{Z(\mu')} \quad (1 \leq j \leq n) \quad (1.5.2)$$

## 1.6 Entropia nelle catene di Markov

**Definizione 1.6.1.** Si consideri una famiglia di variabili casuali tutte definite sullo stesso spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ,  $(X(t), t \geq 0)$ , tale famiglia è detta **processo stocastico**.

Nella nostra trattazione ci limiteremo a considerare una piccola classe di processi stocastici chiamati catene di Markov.

**Definizione 1.6.2.** Un processo stocastico è detto **catena di Markov** se

1. l'insieme  $S$  che comprende i valori ammissibili delle variabili  $X_n$  è discreto (se  $S$  è denso si dirà processo di Markov)
2. possiede la 'proprietà di Markov' cioè

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = k_{n+1} | X_n = x_k \dots X_0 = k_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = k_{n+1} | X_n = k_n)$$

Per i nostri scopi inoltre considereremo l'insieme del tempo come un insieme discreto contenuto in  $\mathbb{N}$ .

Infine, definita  $p_{ij}^n := \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$  vogliamo che la nostra matrice di transizione  $P$ , formata dai vari  $p_{ij}$ , sia stazionaria cioè:

$$p_{ij}^n = p_{ij}^0 =: p_{ij} \quad \forall n$$

Ci domandiamo ora se è sempre possibile definire una catena di Markov  $X = (X_n, n \in \mathbb{Z})$  per la quale ogni  $X_n$  ammette entropia massima cioè per il teorema 1.2.1  $X_n$  ha distribuzione uniforme (se non vi sono altre restrizioni).

**Definizione 1.6.3.** Una matrice  $A$  ad elementi positivi è detta **bistocastica** se per ogni riga e per ogni colonna la somma dei suoi elementi è pari ad 1.

**Teorema 1.6.1.** Una catena di Markov con matrice di transizione  $P$  ammette la distribuzione uniforme come distribuzione invariante se e solo se  $P$  è bistocastica

*Dimostrazione.* Se  $P$  è bistocastica allora  $\sum_{i=1}^N P_{ij} = 1 \forall 1 \leq j \leq N$  e quindi:

$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{N} P_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{ij} = \frac{1}{N}$$

e quindi  $\frac{1}{N}$  è una distribuzione invariante.

Supponiamo ora che la distribuzione uniforme sia invariante e dimostriamo che  $P$  è bistocastica. Procedendo al contrario di prima abbiamo:

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{ij} \Rightarrow \sum_{i=1}^N P_{ij} = 1$$

Abbiamo che per ogni colonna la somma dei suoi elementi è 1, quindi possiamo concludere □

**Definizione 1.6.4.** Siano  $X$  e  $Y$  due variabili casuali della stessa dimensione. Definiamo **entropia relativa** il valore:

$$D(X, Y) := \sum_{j=1}^n p_j \log\left(\frac{p_j}{q_j}\right) \quad (1.6.1)$$

**Teorema 1.6.2.** Per l'entropia relativa vale:

1.  $D(X, Y) \geq 0$ , = se e solo se  $X$  e  $Y$  sono identicamente distribuite
2. se  $Y$  è uniformemente distribuita allora vale

$$D(X, Y) = \log(N) - H(X) \quad (1.6.2)$$

**Definizione 1.6.5.** Un processo stocastico è detto **stazionario** se presi  $m, k \in \mathbb{N}$  vale:

$$\mathbb{P}(X_{n_1} = i_1 \dots X_{n_k} = i_k) = \mathbb{P}(X_{n_1+m} = i_1 \dots X_{n_k+m} = i_k) \quad \forall i_s \in S$$

Consideriamo una catena di Markov stazionaria  $(X_n, n \in \mathbb{Z}_+)$  con una matrice di transizione bistocastica  $P$  e sia  $X_\infty$  uniformemente distribuita, abbiamo quindi che  $D(X_n, X_\infty) = \log(N) - H(X_n)$ . Si dimostra che  $D(X_n, X_\infty)$  è una funzione decrescente e che se la distribuzione uniforme è l'unica distribuzione stazionaria, allora  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(X_n, X_\infty) = 0$ . Segue quindi che  $H(X_n)$  è crescente. [5]

## 1.7 La Regola della Catena

Vediamo ora come cambia l'informazione in un processo stocastico. L'approccio più naturale può sembrare quello di considerare l'entropia come funzione del tempo, in questo modo però ci si dimentica

della relazione tra due passaggi successivi dal tempo  $t_n$  al tempo  $t_{n+1}$ . Procederemo quindi in modo differente generalizzando i risultati visti nel caso di due sole variabili. Estendiamo la definizione di entropia congiunta 1.4.3 in questo modo:

$$H(X_0 \dots X_n) := - \sum_{i_0 \dots i_n=1}^N p(i_0 \dots i_n) \log(p(i_0 \dots i_n)). \quad (1.7.1)$$

Mentre la definizione di entropia condizionata 1.4.1 multivariata diventa:

$$H(Y|X_1 \dots X_n) = - \sum_{j, i_1 \dots i_n=1}^N \mathbb{P}(Y = j, X_1 = i_1 \dots X_n = i_n) \log(\mathbb{P}(Y = j|X_1 = i_1 \dots X_n = i_n)) \quad (1.7.2)$$

Non ci rimane che generalizzare il teorema 1.4.1.

**Teorema 1.7.1. Regola della catena**

$$H(X_0 \dots X_n) = H(X_0) + \sum_{i=1}^n H(X_i|X_0, \dots, X_{i-1}) = H(X_0) + H(X_1|X_0) + \dots + H(X_n|X_0 \dots X_{n-1}) \quad (1.7.3)$$

*Inoltre l'entropia cresce al crescere di  $n$ .*

*Dimostrazione.* Procediamo per induzione:

Il caso base con  $n = 1$  è esattamente il teorema 1.4.1, procediamo con il passo induttivo. Quindi assumiamo che valga per  $n$ , dimostriamo che vale per  $n + 1$ .

$$\begin{aligned} H(X_0 \dots X_n, X_{n+1}) &= - \sum_{i_0 \dots i_n, i_{n+1}=1}^N p(i_0 \dots i_n, i_{n+1}) \log(p(i_0 \dots i_n, i_{n+1})) \\ &= - \sum_{i_0 \dots i_n, i_{n+1}=1}^N p(i_0 \dots i_n, i_{n+1}) \log(p(i_{n+1} = i_{n+1}|X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n)) - \sum_{i_0 \dots i_n, i_{n+1}=1}^N p(i_0 \dots i_n, i_{n+1}) \log(p(i_0 \dots i_n)) \end{aligned}$$

dato che

$$\sum_{i_0 \dots i_n, i_{n+1}=1}^N p(i_0 \dots i_{n+1}) \log(p(i_0 \dots i_n)) = \sum_{i_0 \dots i_n=1}^N p(i_0 \dots i_n) \log(p(i_0 \dots i_n))$$

abbiamo che

$$H(X_0 \dots X_n + 1) = H(X_0 \dots X_n) + H(X_{n+1}|X_0 \dots X_n) \quad (1.7.4)$$

Applicando l'ipotesi induttiva otteniamo il risultato. Inoltre da 1.7.4 e dal fatto che l'entropia è sempre maggiore di zero otteniamo che l'entropia congiunta cresce nel tempo.  $\square$

## 1.8 Velocità dell'Entropia

**Definizione 1.8.1.** Quando il limite esiste,  $h(X)$  si dice **velocità dell'entropia** dove

$$h(X) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_0 \dots X_{n-1})$$

**Teorema 1.8.1.** se  $X = (X_i, i \in \mathbb{N})$  è un processo stocastico stazionario, allora  $h(X)$  esiste e:

$$h(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n-1}|X_0 \dots X_{n-2}) \quad (1.8.1)$$

*Dimostrazione.* Applicando la regola della catena 1.7.1 otteniamo subito che

$$h(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_0 \dots X_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} H(X_i|X_0 \dots X_{i-1}) \quad (1.8.2)$$

Passiamo ora a dimostrare l'esistenza del secondo membro di 1.8.1:  
dall'osservazione 3 otteniamo:

$$H(X_{n+1}|X_0, X_1 \dots X_n) \leq H(X_{n+1}|X_1 \dots X_n) \quad (1.8.3)$$

Grazie al Teorema 1.4.1 possiamo scrivere:

$$H(X_{n+1}|X_1 \dots X_n) = H(X_{n+1}, X_1 \dots X_n) - H(X_1 \dots X_n)$$

e ricordandoci che il processo è stazionario abbiamo:

$$H(X_{n+1}, X_1 \dots X_n) - H(X_1 \dots X_n) = H(X_n, X_0 \dots X_{n-1}) - H(X_0 \dots X_{n-1})$$

infine applicando il Teorema 1.4.1 in modo inverso rispetto a prima

$$H(X_n, X_0 \dots X_{n-1}) - H(X_0 \dots X_{n-1}) = H(X_n|X_0 \dots X_{n-1})$$

riassumendo quindi

$$H(X_{n+1}|X_1 \dots X_n) = H(X_n|X_0 \dots X_{n-1}) \quad (1.8.4)$$

Sostituendo 1.8.4 in 1.8.3 otteniamo:

$$H(X_{n+1}|X_0, X_1 \dots X_n) \leq H(X_n|X_0 \dots X_{n-1}) \quad (1.8.5)$$

Quindi definendo  $a_n := H(X_n|X_0 \dots X_{n-1})$  otteniamo una successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  monotona non crescente limitata dal basso visto che  $a_k = H(X_k|X_0 \dots X_{k-1}) \geq 0$  e dunque  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  esiste ed è finito dato che  $H(Y) < \infty$ . Proviamo adesso che la serie  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = a$  dove  $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i - a \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |a_i - a| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N_0} |a_i - a| + \sum_{i=N_0+1}^n |a_i - a| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=N_0+1}^n |a_i - a|$$

E da qui possiamo concludere scegliendo  $N_0$  tale che  $\frac{1}{n} |a_i - a|$  sia piccolo a piacere cosa sempre possibile dato che  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

Ricordando come abbiamo definito  $a_n$  otteniamo quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n-1}|X_0 \dots X_{n-2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} H(X_i|X_0 \dots X_{i-1}) \quad (1.8.6)$$

ricordando infine 1.8.2 possiamo concludere:

$$h(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_0 \dots X_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n-1}|X_0 \dots X_{n-2}).$$

□

**Teorema 1.8.2.** *Se  $(X_i \in \mathbb{N})$  è una catena di Markov stazionaria con distribuzione iniziale  $\pi^{(0)}$  e matrice di transizione  $P$  allora vale*

$$h(X) = - \sum_{i,j=1}^n \pi^{(0)} P_{ij} \log(P_{ij}) \quad (1.8.7)$$

*Dimostrazione.* dal teorema precedente 1.8.1 abbiamo:

$$\begin{aligned}
h(X) &= \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n-1} | X_0 \dots X_{n-2}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n-1} | X_{n-2}) \\
&= H(X_1 | X_2) \\
&= - \sum_{i,j=1}^n \mathbb{P}(X_0 = i, X_1 = j) \log(P_{ij}) \\
&= - \sum_{i,j=1}^n \mathbb{P}(X_0 = i) P_{ij} \log(P_{ij}) \\
&= - \sum_{i,j=1}^n \pi^{(0)} P_{ij} \log(P_{ij})
\end{aligned}$$

Dove per passare dalla prima alla seconda riga abbiamo usato la 'proprietà di Markov' 1.6.2, per passare dalla seconda alla terza abbiamo usato il fatto che il processo è stazionario, dalla terza alla quarta il lemma 1.4.1  $\square$

## 2 Entropia per Variabili Casuali Assolutamente Continue

In questo capitolo estenderemo la definizione di entropia data per il caso di una variabile aleatoria discreta al caso in cui la nostra variabile casuale  $X$  sia assolutamente continua.

**Definizione 2.0.1.** Data una variabile casuale  $X$ , chiamiamo **funzione di distribuzione di  $X$**  l'applicazione  $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  data da:

$$F_X(t) := \mathbb{P}(X \in (-\infty, t])$$

**Definizione 2.0.2.** Una funzione di distribuzione  $F$  è detta **assolutamente continua** se esiste una funzione  $f \in L^1(\mathbb{R})$ ,  $f \geq 0$  e  $\int_{\mathbb{R}} f(u) du = 1$  tale che:

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(u) du, \quad t \in \mathbb{R} \quad (2.0.1)$$

dove l'integrale è definito nel senso di Lebesgue. Tale  $f$  verrà detta **funzione di densità**

Una variabile casuale che ha funzione di distribuzione della forma 2.0.1 è detta **variabile casuale assolutamente continua**

Per le proprietà degli elementi appena definiti si veda [3]

### 2.1 Entropia nel caso Continuo

**Definizione 2.1.1.** Sia  $X$  una variabile casuale con immagine  $(a, b)$  e funzione di densità  $f$ .  $H(X)$  detta **entropia di  $X$**  dove:

$$H(X) = - \int_a^b \log(f(x)) f(x) dx = \mathbb{E} \left[ \log \left( \frac{1}{f(X)} \right) \right]$$

Anche qui per convenzione  $\log$  sarà il logaritmo in base 2.

Purtroppo la proprietà di essere misura di incertezza, valida nel caso discreto 1.3.1, non è più valida

con questa definizione.

Questo deriva dal fatto che, mentre nel caso discreto l'argomento del logaritmo è sempre compreso tra 0 e 1, nel caso continuo la funzione di densità, argomento del logaritmo, può assumere valori su tutto  $\mathbb{R}$ .

Per un esempio si calcoli l'entropia associata alla variabile casuale uniforme, ricordando che la sua funzione di densità è  $f(x) = \frac{1}{b-a}$  si ottiene:

$$\begin{aligned} H(X) &= \int_a^b \log\left(\frac{1}{b-a}\right) \frac{1}{b-a} dx \\ &= \log(b-a) \end{aligned}$$

che sarà negativa se  $0 < b-a < 1$ .

L'entropia per le variabili casuali non potrà quindi giocare un ruolo così importante come quello giocato per variabili casuali discrete. Esistono tuttavia alcuni teoremi degni di nota.

Prima di introdurli però calcoliamo l'entropia di  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

$$\begin{aligned} H(X) &= -\frac{1}{\sigma(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \log\left(\frac{1}{\sigma(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)\right) dx \\ &= \log(\sigma(2\pi)^{\frac{1}{2}}) + \frac{\log(e)}{\pi^{\frac{1}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} - y^2 dy \end{aligned}$$

dove abbiamo usato la sostituzione  $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$ .

Il calcolo diretto dell'integrale al secondo membro risulta:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} - y^2 dy = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{2}$$

e quindi sostituendo nell'equazione sopra:

$$H(X) = \log(\sigma(2\pi e)^{\frac{1}{2}}) + \frac{\log(e)}{\pi^{\frac{1}{2}}} \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{2} = \log(\sigma(2\pi e)^{\frac{1}{2}}) \quad (2.1.1)$$

D'ora in avanti indicheremo  $\log(\sigma(2\pi e)^{\frac{1}{2}})$  con  $H_N(\sigma)$ . Questo evidenzia il fatto che varianza ed entropia sono due concetti molto legati.

**Teorema 2.1.1.** (*Disuguaglianza di Gibbs nel caso continuo*) Siano  $f, g$  due funzioni di densità allora vale

$$-\int_{-\infty}^{\infty} \log(f(x))f(x)dx \leq -\int_{-\infty}^{\infty} \log(g(x))f(x)dx \quad (2.1.2)$$

dove l'uguaglianza è valida solo se  $g(x) = f(x)$ .

*Dimostrazione.* Dato che  $\log_b(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$  possiamo limitarci al caso in cui abbiamo  $\ln(x)$ , il quale ha la proprietà di essere sempre maggiore di  $x-1$  e uguale solo nel caso  $x=1$ . Quindi

$$\begin{aligned} -\int_{-\infty}^{\infty} \log(g(x))f(x) + \int_{-\infty}^{\infty} \log(f(x))f(x)dx &= -\int_{-\infty}^{\infty} \left[ \log(g(x)) - \log(f(x)) \right] f(x)dx \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} \log\left(\frac{g(x)}{f(x)}\right) f(x)dx \\ &\geq -\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{g(x)}{f(x)} - 1\right) f(x)dx \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 0 \end{aligned}$$

Dove l'ultima uguaglianza si ottiene ricordando che  $f, g$  sono funzioni di densità e quindi  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

$$1, \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx = 1.$$

La disuguaglianza nel caso precedente diventa un'uguaglianza solo se  $\frac{g(x)}{f(x)} = 1$  cioè solo se  $g(x) = f(x)$ .  $\square$

**Teorema 2.1.2.** Sia  $X$  una variabile casuale assolutamente continua con immagine  $\mathbb{R}$  di media  $\mu$ , varianza  $\sigma^2$  e funzione di densità  $f$  allora

$$H(X) \leq H_N(\sigma)$$

con l'uguaglianza se e solo se  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

*Dimostrazione.* Dalla disuguaglianza di Gibbs 2.1.1 appena dimostrata otteniamo che, per ogni funzione di densità  $g$ :

$$H(X) \leq - \int_{-\infty}^{\infty} \log(g(x))f(x)dx$$

con l'uguaglianza solo se  $f(x) = g(x)$ . Come  $g$  prendiamo  $\frac{1}{\sigma(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$  cioè la funzione di densità di una Normale  $N \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\begin{aligned} - \int_{-\infty}^{\infty} \log(g(x))f(x)dx &= - \int_{-\infty}^{\infty} \log\left(\frac{1}{\sigma(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)\right)f(x)dx \\ &= \log(\sigma(2\pi)^{1/2}) - \frac{\log(e)}{2\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2 f(x)dx \\ &= \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) + \frac{\log(e)}{2\sigma^2} \text{Var}(X) \\ &= \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) + \frac{\log(e)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2) = H_N(\sigma) \end{aligned}$$

Dove c'è la disuguaglianza avere l'uguaglianza dobbiamo avere  $f = g$  e quindi  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$   $\square$

## 3 Comunicazione

In questo capitolo sarà proposto una modellizzazione della trasmissione di informazione attraverso canali comunicanti.

### 3.1 Trasmissione di informazione

Il modello più semplice sarà costituito da una sorgente, un canale di comunicazione, ed un ricevente. La sorgente sarà modellata da una variabile aleatoria  $S$  con valori  $\{a_1 \dots a_n\}$  detti alfabeto sorgente e legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$ . Il fatto che la sorgente  $S$  sia una variabile casuale va interpretata come l'incertezza su quale sarà il messaggio inviato. In questo contesto un messaggio sarà una serie di simboli da  $\{a_1 \dots a_n\}$  uno di seguito all'altro. Il ricevente sarà un'altra variabile casuale  $R$  con valori  $\{b_1 \dots b_m\}$  detti alfabeto ricevente e legge di probabilità  $\{q_1 \dots q_m\}$ . Solitamente avremo che  $m \geq n$ . Infine l'effetto di distorsione del canale sarà modellato dalla famiglia di probabilità condizionate  $\{p(j|i); 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$  dove  $p(j|i) := \mathbb{P}(R = b_j | S = a_i)$  (corrisponde a  $p_i(j)$  definito in 1.4). Un sistema di trasmissione ottimale avrà i due alfabeti di trasmissione e ricezione identici e nella distorsione avremo  $p(i|i)$  il più vicino possibile ad 1.



**Definizione 3.1.1.** viene detta **mutua informazione** tra due eventi  $E(S = a_j)$  ed  $F(R = b_k)$  il valore:

$$I(a_j, b_k) = -\log(q_k) + \log(p(k|j)) \quad (3.1.1)$$

se  $p_j = 0$  allora diremo  $I(a_j, b_k) = 0$ .

È importante notare che questa definizione di mutua informazione è diversa da 1.4.12 data che si riferisce a due variabili casuali.

Dato che  $-\log(q_k)$  è l'informazione dell'evento  $R = b_k$ , mentre  $-\log(p(k|j))$  è l'informazione aggiuntiva che ci darebbe la ricezione di  $b_k$  sapendo già per certo che è stato spedito  $a_j$ , possiamo interpretare  $I(a_j, b_k)$  come la quantità di informazione su  $R = b_k$  che ci è data dall'evento  $S = a_j$ . In altre parole è la quantità di informazione che è spedita attraverso il canale. Notiamo che se non ci fosse rumore ( $p(i|i) = 1$ ) avremmo che:

$$I(a_j, b_k) = -\log(q_k) = I(q_k)$$

**Teorema 3.1.1.** Per ogni  $1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq m$  si ha:

1.  $I(a_j, b_k) = -\log(\frac{p_{jk}}{p_j q_k})$
2.  $I(a_j, b_k) = -\log(p_j) + \log(q(j|k))$
3.  $I(a_j, b_k) = I(b_k, a_j)$
4. se gli eventi  $S = a_j$  e  $R = b_k$  sono indipendenti allora  $I(a_j, b_k) = 0$
5.  $I(S, R) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p_{jk} I(a_j, b_k)$ .

*Dimostrazione.* 1. deriva banalmente da  $p(k|j) = \frac{p_{jk}}{q_k}$

2. si ricava sostituendo in 1.  $q(j|k) = \frac{p_{jk}}{q_k}$

3. deriva da 2.

4. ricordando che nel caso siano indipendenti  $p_{jk} = p_j q_k$  si ricava immediatamente da da 1.

5. si ricava da 1. e dal primo punto del teorema 1.4.3

□

Il punto 3. del sistema ci mostra la curiosa caratteristica per cui se in un sistema si invertono sorgente e ricevente abbiamo che l'informazione su  $a_j$  contenuta in  $b_k$  è la stessa di quella contenuta in  $a_j$  su  $b_k$  quando il canale funziona normalmente. Il punto 5. invece esprime la mutua informazione tra due variabili casuali definita in 1.4.12 come la media di tutte le possibili trasmissioni dei singoli simboli. Si può dimostrare che  $I(S, R) \geq 0$  sempre.

Supponiamo ora preso un canale, di fissare  $\{p(j|i); 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ . Vogliamo ora fare in modo che il canale trasmetta più informazione possibile, per fare ciò le uniche variabili del sistema rimaste ancora libere sono  $\{p_1 \dots p_n\}$ .

**Definizione 3.1.2.** viene definita **capacità del canale C** la quantità:

$$C := \max I(S, R) \quad (3.1.2)$$

dove il massimo è scelto tra tutte le possibili leggi di probabilità della variabile  $S$

Operativamente spesso è preferibile vedere la capacità del canale C come:

$$C = \max(H(R) - H_s(R)) \quad (3.1.3)$$

ottenuta utilizzando la definizione 1.4.12.

## 3.2 Codici

In questo paragrafo daremo un'idea di ciò che si intende con *codice* in matematica per poi applicarci la nostra conoscenza sulla trasmissione di informazione.

**Definizione 3.2.1.** L'**alfabeto di un codice**,  $C$  è un insieme  $\{c_1 \dots c_r\}$  i cui elementi  $c_i$  sono chiamati **simboli**.

Una **parola-codice** è una serie di simboli  $c_{i_1} \dots c_{i_n}$ . Il numero  $n$  sarà la **lunghezza** della parola-codice. Un **messaggio** sarà una successione di parole-codice.

Il processo di codifica di un messaggio è quello di mappare ogni singolo simbolo dell'alfabeto di un linguaggio con una parola-codice.

Un esempio pratico di codice che poi utilizzeremo lungo tutto il capitolo è dato dal codice binario. Si ha:

$$C = \{0, 1\}.$$

Se ad esempio domandassimo che le nostre parole siano tutte di lunghezza 6 o meno allora è facile verificare che ci sono 126 possibili parole-codice.

Il nostro obiettivo sarà ora capire cosa succede all'informazione trasmessa ora che il percorso sarà:

$$SORGENTE \rightarrow \text{codificatore} \rightarrow CANALE \rightarrow \text{decodificatore} \rightarrow RICEVENTE$$

Un'importantissima classe di codici è quella dei *codici istantanei o codici prefisso*.

**Definizione 3.2.2.** Sia  $c_{i_1} \dots c_{i_n}$  una parola del codice. Preso  $k < n$  se  $c_{i_1} \dots c_{i_k}$  è anch'essa una parola tale parola si dirà **prefisso**.

Un codice in cui non esistono parole che sono prefisso di altre è detto **codice istantaneo** o **codice prefisso**.

**Lemma 3.2.1.** *Ogni codice istantaneo è decodificabile in modo univoco, inoltre per avere una codifica univoca non è necessario aspettare di ricevere tutto il messaggio.*

Viste le sorprendenti proprietà dei codici istantanei è naturale chiederci quando è possibile creare codici con queste caratteristiche.

**Teorema 3.2.1.** *(Disuguaglianza di Kraft-McMillan)*

*Dato un alfabeto sorgente composto da  $n$  simboli che deve essere codificato allora esiste un codice istantaneo con alfabeto di  $r$  simboli e parole di lunghezza  $l_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) se e solo se*

$$\sum_{i=1}^n r^{-l_i} \leq 1. \quad (3.2.1)$$

Ora che, dato un alfabeto sorgente, abbiamo la possibilità di trovare dei codici che soddisfano le nostre richieste ci viene naturale domandarci come si può scegliere il migliore tra tutti i codici istantanei.

**Definizione 3.2.3.** Dato un alfabeto sorgente  $S = \{a_1 \dots a_n\}$  con legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$  a cui viene associato un codice istantaneo che traduce  $\{a_1 \dots a_n\}$  in  $\{l_1 \dots l_n\}$  possiamo considerare una variabile casuale  $L$  con immagine  $\{l_1 \dots l_n\}$  e legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$ , la stessa di  $S$ . Preso  $\mathbb{E}(L) = \sum_{i=1}^n p_i l_i$  il valore di aspettazione di  $L$  diremo che il **codice è ottimale** se minimizza  $\mathbb{E}(L)$ .

È chiaro che in generale un codice ottimale non è unico infatti dato un qualsiasi codice ottimale che utilizzi un alfabeto di almeno due lettere ci basterà considerare un codice in cui le lettere vengono permutate per ottenere un nuovo codice ottimale. Enunciamo ora un sorprendente teorema che ci permette di mettere in relazione il codice ottimale con l'entropia dell'alfabeto sorgente.

**Teorema 3.2.2.** (Teorema della codifica di sorgente per simboli di codice)  
Dato un alfabeto sorgente  $S$  con legge di probabilità  $\{p_1 \dots p_n\}$  vale:

1. Per ogni codice istantaneo abbiamo che

$$\mathbb{E}(L) \geq \frac{H(S)}{\log(r)} \quad (3.2.2)$$

con l'uguaglianza se e solo se  $p_j = r^{-l_j}$  ( $1 \leq j \leq n$ )

2. esiste un codice istantaneo per cui

$$\frac{H(S)}{\log(r)} \leq \mathbb{E}(L) < \frac{H(S)}{\log(r)} + 1 \quad (3.2.3)$$

*Dimostrazione.*

Definiamo  $\{q_1 \dots q_n\}$  con

$$q_j = \frac{r^{-l_j}}{\sum_{i=1}^n r^{-l_i}} \quad (3.2.4)$$

abbiamo scelto i  $q_i$  in modo tale che

$$\sum_{j=1}^n q_j = 1$$

e ovviamente  $q_j \geq 0$ . Dunque  $\{q_1 \dots q_n\}$  è una distribuzione di probabilità e possiamo quindi utilizzare la Disuguaglianza di Gibbs nel caso discreto:  $-\sum_{i=1}^n p_i \log(p_i) \leq -\sum_{i=1}^n p_i \log(q_i)$  con  $\{p_1 \dots p_n\}$  e  $\{q_1 \dots q_n\}$  distribuzioni di probabilità (deriva quasi immediatamente da 2.1.1).

$$\begin{aligned} H(S) &= -\sum_{j=1}^n p_j \log(p_j) \\ &\leq -\sum_{j=1}^n p_j \log(q_j) \\ &= -\sum_{j=1}^n p_j \log\left(\frac{r^{-l_j}}{\sum_{i=1}^n r^{-l_i}}\right) \\ &= -\sum_{j=1}^n p_j \log(r^{-l_j}) + \sum_{j=1}^n p_j \log\left(\sum_{i=1}^n r^{-l_i}\right) \\ &\leq -\sum_{j=1}^n p_j \log(r^{-l_j}) + \sum_{j=1}^n p_j \log(1) \\ &= \sum_{j=1}^n p_j l_j \log(r) \\ &= \mathbb{E}(L) \log(r) \end{aligned}$$

dove per ottenere la quinta riga abbiamo utilizzato la disuguaglianza di Kraft-McMillan 3.2.1.

Dalle condizioni delle disuguaglianze di Gibbs e Kraft abbiamo che si ha l'uguaglianza se e solo se  $p_j = r^{-l_j}$

Il primo punto dimostra anche il primo membro della disuguaglianza, mostriamo ora la validità della seconda parte.

Imponiamo  $l_j = -\lceil \log_r(p_j) \rceil$  cioè  $-\log_r(p_j) \leq l_j < -\log_r(p_j) + 1$  e quindi

$$r^{-l_j} \leq p_j \implies$$

$$\sum_{j=1}^n r^{-l_j} \leq \sum_{j=1}^n p_j = 1.$$

Quindi per la disuguaglianza di Kraft esiste un codice di tale lunghezza con variabile casuale associata  $L$ . Abbiamo:

$$\begin{aligned} H(L) &= \sum_{j=1}^n p_j l_j \\ &< - \sum_{j=1}^n p_j \log_r(p_j) + 1 \\ &= - \sum_{j=1}^n p_j \frac{\log(p_j)}{\log(r)} + 1 \\ &= \frac{H(S)}{\log(r)} + 1 \end{aligned}$$

□

Il teorema appena dimostrato è detto primo teorema di Shannon e fu dimostrato proprio dal matematico Americano nel 1948.

### 3.3 Regole di decisione

Mettiamoci nella situazione

$$SORGENTE \rightarrow \text{codificatore} \rightarrow CANALE \rightarrow \text{decodificatore} \rightarrow RICEVENTE$$

e concentriamoci sul segmento *codificatore*  $\rightarrow$  *CANALE*  $\rightarrow$  *decodificatore*.

Supponiamo che  $C := \{x_1..x_n\}$  sia l'insieme di tutte le possibili parole del codice che possono essere trasmesse dal e che  $y$  sia la parola ricevuta. Per decidere quale parola  $x_i$  è stata trasmessa possiamo utilizzare il *principio di massima verosimiglianza*:

Date le probabilità condizionate  $p(y|x_i) := (R = y|X = x_i)$  decideremo che la parola inviata è  $x_k$  se

$$p(y|x_k) \geq p(y|x_i) \quad \forall i \quad (3.3.1)$$

Nel caso in cui più  $x_s$  soddisfino ??  $x_k$  verrà scelta in modo casuale tra le varie  $x_s$ .

Ovviamente la nostra scelta di  $x_k$  non ci garantisce che sia stata effettivamente inviata  $x_k$ .

Esistono altri principi sui quali basarsi per la scelta di  $x_k$  nel caso di codici binari ad esempio si può definire *distanza di Hamming* per aiutarsi nella decisione:

**Definizione 3.3.1.** date due parole di un codice binario  $a, b$  si definisce **distanza di Hamming** il numero di simboli per cui  $a$  è differente da  $b$

Utilizzando questa distanza è naturale scegliere come parola  $x_k$  inviata quella che dista meno dalla parola ricevuta  $y$ .

## 4 Conclusioni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora

torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.

# Bibliografia

- [1] David Applebaum. *Probability and: An Integrated Approach*. Cambridge, University Press, second edition edition, 2008.
- [2] A. I. Khinchin. *Mathematical Foundations of Information Theory*. Dover, second edition edition, 1957.
- [3] S. Mazzucchi. Diario del corso di calcolo delle probabilità 2, 2017.
- [4] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 1948.
- [5] Joy A. Thomas Thomas M. Cover. *Elements of Information Theory*. Wiley, second edition edition, 2006.
- [6] Wikipedia. Jensen's inequality.

# Allegato A    Titolo primo allegato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.

## A.1    Titolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.

### A.1.1    Sottotitolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.

# Allegato B    Titolo secondo allegato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.

## B.1    Titolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.

### B.1.1    Sottotitolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed nunc orci. Aliquam nec nisl vitae sapien pulvinar dictum quis non urna. Suspendisse at dui a erat aliquam vestibulum. Quisque ultrices pellentesque pellentesque. Pellentesque egestas quam sed blandit tempus. Sed congue nec risus posuere euismod. Maecenas ut lacus id mauris sagittis egestas a eu dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque at ultrices tellus. Ut eu purus eget sem iaculis ultricies sed non lorem. Curabitur gravida dui eget ex vestibulum venenatis. Phasellus gravida tellus velit, non eleifend justo lobortis eget.