

$$Q = V_1 S_1 = V_2 S_2 = \sqrt{\frac{S_1^2 S_2^2}{S_2^2 - S_1^2}} 2gh$$

$$Q = V_1 S_1 = V_2 S_2 = \sqrt{\frac{S_1^2 S_2^2}{S_2^2 - S_1^2}} 2gh$$

2. Дано:  $V_0, r_0, h$

Найдем  $r$ :

$$\frac{\rho V_1^2}{2} - \frac{\rho V_0^2}{2} = \rho gh$$

$$V_1^2 = 2gh + \frac{V_0^2}{2} \Rightarrow V_1 = \sqrt{2gh + \frac{V_0^2}{2}}$$

$$S_0 V_0 = S_1 V_1$$

$$S_1 = \frac{V_0}{V_1} S_0$$

$$\Rightarrow r_1 = r_0 \sqrt{\frac{V_0}{V_1}}$$

$$r_1 = r_0 \sqrt{\frac{V_0}{\sqrt{2gh + \frac{V_0^2}{2}}}}$$

Ответ:

$$r = r_0 \sqrt{\frac{V_0}{\sqrt{2gh + \frac{V_0^2}{2}}}}$$

$$r = r_0 \sqrt{\frac{V_0}{\sqrt{2gh + \frac{V_0^2}{2}}}}$$