

齐次线性方程组

一、齐次线性方程组

[illegible]

称为齐次线性方程组。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{数矩阵} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{向量}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

方程组的
代数形式

$$AX = O$$

方程组的矩阵形式

引进
向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = O.$$

方程组的向
量方程形式

齐次线性方程组解的性质

$O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = (0, 0, \dots, 0)^T$ 显然是方程组的解；称为零解。

若非零向量 $\xi = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$

是方程组的解，则称为非零解，也称为非零解向量。

问题

你会关心哪一种解？

非零解

齐次线性方程组解的性质

性质1: 齐次方程组的两个解的**和**仍是方程组的解。即:

ξ_1, ξ_2 是解向量, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是解向量。

$$A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2.$$

性质2: ξ 是解向量, 则 $k\xi$ 也是解向量。

$$A(k\xi) = kA\xi.$$

令 $V = \{\xi \mid A\xi = O\}$, 则 V 构成一个向量空间。

称为方程组的解空间。

如何确定一个
向量空间?

若齐次线性方程组的解空间存在一组基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$, 则方程组的全部解就是 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s$, 这称为方程组的**通解**。

由此可见, 要求方程组的全部解, 只需求出其基。

定义: 若齐次方程组的有限个解 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$, 满足:

(i) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关;

(ii) 方程组的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性表示;

则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是齐次方程组的一个基础解系。

也就是说, 我们将解空间的基称为基础解系, 此时, 通解就是基础解系的线性组合, 即为:

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s.$$

基础解系 怎么求？

定义：若齐次方程组的有限个解 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ ，满足：

(i) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关；

(ii) 方程组的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性表示；

则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是齐次方程组的一个基础解系。

行最简形矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

设 $r(A) = r < n$, 且不妨设 A 中最左上角的 r 阶子式不为零。则经有限次行初等变换, 矩阵 A 化为:

$$I_{m \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1(n-r)} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2(n-r)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r(n-r)} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

显然: $A \cong I$

$AX = O$ 与
 $IX = O$ 同解。

行最简形

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例1: 求解方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad IX = O \text{ 为 } \begin{cases} x_1 + 5x_3 = 0, \\ x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -5x_3, \\ x_2 = 3x_3. \end{cases}$$

自由未知量

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5x_3 \\ 3x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} x_3, \quad x_3 \in R.$$

真未知量

同解方程组

令 $\xi = (-5, 3, 1)^T$, 则通解为 $k\xi = k(-5, 3, 1)^T$.

例2: 求方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{同解方程组为}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4, \\ x_3 = 2x_4. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 + x_4 \\ x_2 \\ 2x_4 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_4 \\ 0 \\ 2x_4 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} x_4. \quad x_2, x_4 \in R.$$

$$\xi_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \quad \xi_2 = (1, 0, 2, 1)^T. \quad \text{通解为 } k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2.$$

练习

求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + 15x_4 = 0, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = 0. \end{cases}$$

思考

基础解系的求法？