

哈爾濱工業大學

二维离散型随机变量







二维离散型随机变量

- 定义1 若二维随机变量(*X*, *Y*)所有可能取值是有限对或可列无限多对,则称(*X*, *Y*)为二维离散型随机变量.
- **定义2**设(X,Y)的所有可能取值为(x_i , y_j), $(i, j = 1, 2, \cdots)$, 称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, (i, j = 1, 2, \cdots),$$
为 (X,Y) 的分布列或 X 和 Y 的联合分布列.



二维离散型随机变量



(X,Y)的分布列也可用列表法表示:

$$XY$$
 y_1 y_2 \cdots y_j \cdots $\rightarrow (X,Y)$ 分布列的性质:
 x_1 p_{11} p_{12} \cdots p_{1j} \cdots x_2 p_{21} p_{22} \cdots p_{2j} \cdots x_j p_{j1} p_{j2} \cdots p_{jj} \cdots p_{jj} p_{jj}



例1 一盒中有4个球,分别标有数字1, 2, 2, 3, 现无放回地取两次, 每次取一个, 以X,Y分别表示第一次和第二次取出的球的标号, 求(X,Y)的分布列和 $P(X \ge 3,Y \ge 2)$.

解 X, Y的可能取值均为1,2,3,

由乘法定理
$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$
得

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1 | X = 1) = 0;$$

同理
$$P(X=1,Y=2)=\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$$
,

$$P(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}, P(X = 2, Y = 1) = \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$



M1 一盒中有4个球,分别标有数字1, 2, 2, 3, 现 无放回地取两次,每次取一个,以X,Y分别表示第 一次和第二次取出的球的标号, 求(X,Y)的分布列

和
$$P(X \ge 3, Y \ge 2)$$
.

解 $P(X = 2, Y = 2) = \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$,

 $P(X = 2, Y = 3) = \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$,

 $P(X = 3, Y = 1) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$,

 $P(X = 3, Y = 2) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$,

 $P(X = 3, Y = 3) = 0$.

X,Y的边缘分布列



设离散型随机变量(X,Y)的分布列为

$$P(X = x_i, Y = y_i) = p_{ij}, (i, j = 1, 2, \dots),$$

■ X的边缘分布列为

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i}$$

 $(i = 1, 2, \cdots),$

■ Y的边缘分布列为

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij}^{\Delta} = p_{.j}$$

$$(j = 1, 2, \cdots).$$

X,Y的边缘分布列



_	X^{Y}	y_1	$y_2 \cdots y_j \cdots$	$P(X=x_i)$
	$\boldsymbol{x_1}$	p_{11}	$p_{12} \cdots p_{1j} \cdots p_{2j} \cdots p_{2j} \cdots p_{2j} \cdots p_{ij} \cdots p$	$p_{1.}$
	\boldsymbol{x}_{2}	p_{21}	$p_{22} \cdots p_{2j} \cdots$	p ₂ .
		•••	•••	:
	x_i	p_{i1}	$p_{i2} \cdots p_{ij} \cdots$	p_{i}
_				
P(Y	$= y_j$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2} \cdots p_{\cdot j} \cdots$	1



例2 某箱装有100件产品,其中一、二和三等品分别为80、10和10件,现在从中随机抽取一件。记 (1 抽到:等品

一件,记
$$X_i = \begin{cases} 1, \text{ 抽到}i \oplus \mathbb{A}, \\ 0, \text{ 其他.} \end{cases}$$
 $(i = 1, 2, 3).$

求(1)
$$P(X_1=1|X_3=0)$$
;

- (2) (X_1, X_2) 的分布列及边缘分布列;
- (3) $P(X_1=X_2)$, $P(X_1+X_2=1)$, $P(X_1+X_2<1)$.

$$\mathbf{P}(X_1=1|X_3=0)=80/90=8/9$$
,



例2 某箱装有100件产品,其中一、二和三等品分别为80、10和10件,现在从中随机抽取一件,记 〔1,抽到*i*等品,

 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{抽到}i$ 等品, $(i = 1, 2, 3). \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 $(2)(X_1,X_2)$ 的分布列及边缘分布列;

解(2) X₁,X₂的取值均为 0, 1.

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = P(X_3 = 1) = 0.1,$$

 $P(X_1 = 0, X_2 = 1) = P(X_2 = 1) = 0.1,$
 $P(X_1 = 1, X_2 = 0) = P(X_1 = 1) = 0.8,$
 $P(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0.$

$X_2^{X_1}$	0	1	$p_{\cdot j}$
0	0.1	0.8	0.9
	0.1	0	0.1
$p_{i\cdot}$	0.2	0.8	1



例2 某箱装有100件产品,其中一、二和三等品分别为80、10和10件,现在从中随机抽取一件,记 〔1. 抽到*i*等品,

 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{抽到}i$ 等品, $(i = 1, 2, 3). \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

 $\Re(3)P(X_1=X_2), P(X_1+X_2=1), P(X_1+X_2<1);$

$$P(X_1 = X_2) = P(X_1 = X_2 = 0)$$
 $X_1 = X_2 = 0$
 $X_2 = 0$

 $P(X_1 + X_2 < 1) = P(X_1 = X_2 = 0) = 0.1.$



 \blacksquare 二维离散型随机变量(X,Y)的分布函数

$$F(x,y) = P(X \le x, Y \le y)$$

$$= \sum_{x_i \le x} \sum_{y_j \le y} P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$= \sum_{x_i \le x} \sum_{y_j \le y} p_{ij}$$

$$= \sum_{x_i \le x} \sum_{y_j \le y} p_{ij}$$

和式是对所有满足 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的i, j 求和.



谢 谢!