Санкт-Петербургский политехнический университет

Направление подготовки
«01.03.02 Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе №1:

Интерполяционные полиномы приближения табличных функций

Выполнил студент гр. 5030102/40003 Т.Р. Абдуллин
Преподаватель: К.Н. Козлов

Санкт-Петербург

Содержание

1 **Формулировка задачи и ее формализация** 3
1.1 Формулировка задачи: 3
1.2 Формализация задачи: 3

2 **Алгоритм метода, условия применимости** 4
2.1 Псевдокод метода 4
2.2 Условия применимости 4

3 **Проверка условий применимости** 5

4 **Тестовый пример** 6

5 **Подготовка контрольных тестов** 7

6 **Модульная структура программы** 7
6.1 Функции 7

7 **Численный анализ решения задачи** 9

8 **Выводы** 17

1 Формулировка задачи и ее формализация

1.1 Формулировка задачи:

В ходе лабораторной работы необходимо построить интерполяционный полином для заданных табличных функций с использованием формы Ньютона (прямой ход, слева направо) и провести численные исследования точности интерполяции.

Необходимо:

- реализовать вычисление значения интерполяционного полинома без приведения его к каноническому виду;
- провести интерполяцию на равномерной и чебышевской сетках;
- исследовать точность аппроксимации;
- исследовать зависимость ошибки от числа узлов;
- исследовать устойчивость метода к возмущению исходных данных.

1.2 Формализация задачи:

Пусть задана функция $f(x)$ на отрезке $[a,b]$ и набор узлов:

$$x_0, x_1, \ldots, x_n$$

Требуется построить интерполяционный полином в форме Ньютона:

$$P_n(x) = y[x_0] + y[x_0,x_1](x - x_0) + \cdots + y[x_0, \ldots ,x_n] \prod_{i=0}^{n-1}(x - x_i) \qquad (1)$$

где $y[x_i, \ldots ,x_j]$ — разделённые разности.
Ошибка интерполяции определяется как:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) \qquad (2)$$

Оценка ошибки имеет вид:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|. \qquad (3)$$

где:

$$M_{n+1} = \max_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)| \qquad (4)$$

2 Алгоритм метода, условия применимости

2.1 Псевдокод метода

Входные данные:

- функция $f(x)$
- отрезок $[a,b]$
- число узлов n

Выход:

- значения интерполяционного полинома в заданных точках

Алгоритм:

1. Сформировать сетку узлов x_i:
    - равномерную или чебышевскую
2. Вычислить значения функции:

$$y_i = f(x_i)$$

3. Вычислить таблицу разделённых разностей:
    - для $j = 1..n$
    - для $i = n..j$

$$f[x_i, \dots, x_{i-j}] = \frac{f[x_i, \dots, x_{i-j+1}] - f[x_{i-1}, \dots, x_{i-j}]}{x_i - x_{i-j}}$$

4. Для каждой точки x вычислить $P_n(x)$ по схеме Горнера:
    - $result = a_n$
    - для $i = n - 1..0$

$$result = result \cdot (x - x_i) + a_i$$

2.2 Условия применимости

- функция $f(x)$ должна быть определена в узлах интерполяции;
- узлы x_i должны быть попарно различны;
- функция должна иметь непрерывную производную порядка $n + 1$ на отрезке (для теоретической оценки ошибки);

3 Проверка условий применимости




Рис. 1: Проверка условий применимости для обеих функций

4 Тестовый пример




Рис. 2: Тестовый пример

5 Подготовка контрольных тестов

В работе рассматриваются следующие функции:

- $f_1(x) = \ln(1 + x^2) + x^3$
- $f_2(x) = x^5 + 0.4 \cdot \text{sign}(x) \cdot x^4 + 2$

Интервал интерполяции:

$$[a,b] = [-2,2]$$

Используются два типа сеток:

- равномерная сетка
- чебышевская сетка

Проверочная сетка содержит 10000 точек и не совпадает с узлами интерполяции. Максимальная ошибка считается на $5, ..., 100$ узлах, а полиномы строятся для $5, 7, 10$ узлов.

6 Модульная структура программы

6.1 Функции

- **divided_differences**
  функция, возвращающая разделенные разности

x	узлы
y	значения в узлах

- **uniform_grid**
  функция, возвращающая равномерную сетку

a	начальная точка
b	конечная точка
n	количество точек

- **chebyshev_grid**
  функция, возвращающая чебышевскую сетку

a	начальная точка
b	конечная точка
n	количество точек

- **newton_eval**
  функция, выполняющая интерполяционный метод Ньютона

x	начальная точка
coef	конечная точка
n	количество точек

7 Численный анализ решения задачи




Рис. 3: График первой функции (сетки: слева равномерная, справа чебышевская)

1) Построены изначальные полиномы для первой функции и сама функция (3).

Интерполяционный полином при малых узлах почти совпадает с исходной функцией. В связи с этим графики накладываются друг на друга. Ошибку нужно рассматривать на другом графике




Рис. 4: График второй функции (сетки: слева равномерная, справа чебышевская)

Построены изначальные полиномы для второй функции и сама функция (4).

Аналогично для второй функции. Хотя здесь уже и наблюдаются различия, но они минимальны чтобы делать выводы.




Рис. 5: График ошибки между интерполяционной зависимостью и функцией для первой функции

2) Далее был построен график ошибок для первой функции (5)

Как и ожидалось, на равномерной сетке наблюдаются скачки на концах графика. Этого не наблюдать на графике чебышевской сетки, здесь ошибка имеет один и тот же характер по всему отрезку.




Рис. 6: График ошибки между интерполяционной зависимостью и функцией для первой функции с теоретической ошибкой

На тот же график была добавлена теоретическая ошибка, которая была посчитана по формуле (3). Неравенство действительно выполняется, все ошибки легли под теоретическую кривую.




Рис. 7: График ошибки между интерполяционной зависимостью и функцией для второй функции

Аналогичный график ошибок был построен для второй функции (7).

Здесь наблюдается та же картина с ошибкой. Однако теоретическая ошибка здесь построена неверно, поскольку эта функция не прошла условие применимости для ее подсчета.




Рис. 8: График зависимости максимальной ошибки между интерполяцией и функцией от количества узлов для первой функции

3) Рассмотрена зависимость максимальной ошибки от количества узлов сначала для первой функции.

При увеличении числа узлов ошибка сначала уменьшается, однако затем начинает расти. Это связано с эффектом Рунге, а также накоплением численных ошибок. Для равномерной сетки этот эффект проявляется значительно сильнее.




Рис. 9: График зависимости максимальной ошибки между интерполяцией и функцией от количества узлов для первой функции

Для второй функции была построена аналогичная зависимость. Здесь чебышевская сетка ведет себя примерно аналогично, однако равномерная начинает расти уже на 15+ узлах.




Рис. 10: График зависимости ошибки от величины возмущения для первой функции (равномерная сетка)




Рис. 11: График зависимости ошибки от величины возмущения для первой функции (чебышевская сетка)

4) Дополнительно рассмотрены графики зависимости ошибки от величины возмущения сначала для первой функции.

Чебышевская сетка демонстрирует меньшую чувствительность к возмущениям данных. Это проявляется в меньшем разбросе ошибок и отсутствии выбросов. Равномерная сетка, напротив, усиливает случайные возмущения, что приводит к значительной вариативности результатов.




Рис. 12: График зависимости ошибки от величины возмущения для второй функции (равномерная сетка)




Рис. 13: График зависимости ошибки от величины возмущения для второй функции (чебышевская сетка)

Абсолютно такую же картину мы можем пронаблюдать и на графиках второй функции.

8 Выводы

Проделанная работа над анализом поведения метода интерполяции полиномом Ньютона позволяет сделать следующие выводы. Метод справляется со своей задачей интерполяции функции. Эффективен этот метод при малом числе узлов. Для устранения ошибок на концах отрезка следует выбирать чебышевскую сетку, которая позволяет стабилизировать ошибку и избавиться от выбросов. Немаловажно сказать о чувствительности метода к выбросам, с чем чебышевская сетка снова справляется лучше.