

# Devoir n° 1 \*

Claudéric DERoy

Alexandre PACHOT

1<sup>er</sup> octobre 2020

## Question 1

a) En utilisant les lois généralisées de De Morgan, montrez que  $\overline{A \cup B \cup C} = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ .

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\forall x, x \in \overline{A \cup B \cup C} &\Rightarrow x \notin A \cup B \cup C \\ &\Rightarrow x \notin A \quad \wedge \quad x \notin B \quad \wedge \quad x \notin C \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \quad \wedge \quad x \in \bar{B} \quad \wedge \quad x \in \bar{C} \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}\end{aligned}$$

$\Leftarrow$

$$\begin{aligned}\forall x, x \in \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} &\Rightarrow x \in \bar{A} \quad \wedge \quad x \in \bar{B} \quad \wedge \quad x \in \bar{C} \\ &\Rightarrow x \notin A \quad \wedge \quad x \notin B \quad \wedge \quad x \notin C \\ &\Rightarrow x \notin A \cup B \cup C \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B \cup C} \quad \square\end{aligned}$$

b) Prouvez ou infirmez : Pour tous ensembles finis non-vides  $A, B, C$

$$(\bar{A} \times B) \cup (A \times C) = (\bar{A} \cup A) \times (B \cup C)$$

$$\begin{aligned}x \in (\bar{A} \times C) &\Rightarrow x \notin (\bar{A} \times B) \quad \wedge \quad x \notin (A \times C) \\ &\Rightarrow x \notin (\bar{A} \times B) \cup (A \times C) \quad (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x \in (\bar{A} \times C) &\Rightarrow x \in (\bar{A} \cup A) \times (C \cup B) \\ &\Rightarrow x \in (\bar{A} \cup A) \times (B \cup C) \quad (2)\end{aligned}$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow (\bar{A} \times B) \cup (A \times C) \neq (\bar{A} \cup A) \times (B \cup C) \quad \square$$

---

\*IFT 1065 – Structures discrètes en informatique – Automne 2020 – Margarida CARVALHO

## Question 2

Donnez la table de vérité de la proposition suivante :

$$(p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$$

		(1)	(2)	
p	q	$p \Rightarrow q$	$p \wedge (1)$	$(2) \Rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

## Question 3

Sans avoir recours aux tables de vérité (utilisez le Théorème 1), montrez que les deux propositions suivantes sont équivalentes

$$\neg p \vee (r \Rightarrow (\neg q)) \equiv \neg p \vee \neg q \vee \neg r$$

$$\begin{aligned}
 \neg p \vee (r \Rightarrow (\neg q)) &\equiv \neg p \vee \neg(r \Rightarrow (\neg q)) \\
 &\equiv \neg p \vee \neg(r \wedge \neg(\neg q)) \\
 &\equiv \neg p \vee \neg r \vee \neg q
 \end{aligned}$$

## Question 4

Donnez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :

(a)  $\forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / (m \geq 2) \Rightarrow (m^2 > n^2 + 3)$

Posons  $n = 0$ . Pour  $m = 2$ , on a bien  $2^2 > 0^2 + 3$ . Pour  $m > 2$ , on a  $m^2 > 2^2 > 0^2 + 3$ . La proposition est vraie.

(b)  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} / x < -y^2$

Étudions la négation de cette proposition, c'est à dire :  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} / x \geq -y^2$

Posons  $y = \sqrt{|x|}$ . On a bien  $x \geq -(\sqrt{|x|})^2$ . La négation de la proposition est vraie. Par conséquent, la proposition initiale est fausse.