

## Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

Exercice 1.

Résoudre

$$y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 4 \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 1](#)

Exercice 2.

Résoudre

$$y'' - 3y' = 2 \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 2](#)

Exercice 3.

Résoudre

$$y'' - 3y' + 2y = e^{-x} \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 3](#)

Exercice 4.

Résoudre

$$y'' - 3y' + 2y = 36xe^{-x} \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 4](#)

Exercice 5.

Résoudre

$$y'' - 3y' + 2y = xe^x$$

Allez à : **[Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#)**

Exercice 6.

Résoudre

$$y'' + 2y' + y = 2e^{-x} \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 6](#)

Exercice 7.

Résoudre

$$y'' + 2y' + 5y = 5 \cos(2x) - 3 \sin(2x) \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 7](#)

Exercice 8.

Résoudre

$$y'' + 2y' + 5y = (4x + 6) \cos(x) + (-2x + 6) \sin(x) \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 8](#)

Exercice 9.

Résoudre

$$y'' + y = \sin(x) \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 9](#)

Exercice 10.

Résoudre

$$y'' + 2y' + 5y = e^{-x}(6 \cos(x) - 3 \sin(x)) \quad (E)$$

Allez à : [Correction exercice 10](#)

Exercice 11.

Résoudre

$$y'' + 2y' + 5y = e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x))$$

Allez à : [Correction exercice 11](#)

Exercice 12.

Résoudre

$$y'' - 3y' + 2y = e^{-x} + 6x$$

Allez à : [Correction exercice 12](#)

Exercice 13.

Résoudre

$$y'' + 4y = \cos^2(x)$$

Allez à : [Correction exercice 13](#)

Exercice 14.

Soit  $k \in \mathbb{R}$

1. Selon les valeurs de  $k$  résoudre

$$y'' - (1 + k)y' + ky = 0$$

2. Selon les valeurs de  $k$  résoudre

$$y'' - (1 + k)y' + ky = e^{2x}$$

Allez à : [Correction exercice 14](#)

Exercice 15.

Soit  $k \in \mathbb{R}$

1. Selon les valeurs de  $k$  résoudre

$$y'' - (1 + k)y' + ky = 0$$

2. Selon les valeurs de  $k$  résoudre

$$y'' - (1 + k)y' + ky = e^{2x}$$

Allez à : [Correction exercice 15](#)

## CORRECTIONS

Correction exercice 1.

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Leftrightarrow r = 1 \text{ ou } r = 2$$

Donc la solution générale de  $(E')$  est  $\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x}$

On cherche une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Ax^2 + Bx + C$$

$$\varphi'_P(x) = 2Ax + B$$

$$\varphi''_P(x) = 2A$$

On remplace cela dans  $(E)$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) - 3\varphi_P'(x) + 2\varphi_P(x) &= 2x^2 - 6x + 4 \Leftrightarrow 2A - 3(2Ax + B) + 2(Ax^2 + Bx + C) = 2x^2 - 6x + 4 \\ \Leftrightarrow 2Ax^2 + (-6A + 2B)x + 2A - 3B + 2C &= 2x^2 - 6x + 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 2A = 2 \\ -6A + 2B = -6 \\ 2A - 3B + 2C = 4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ -6 + 2B = -6 \\ 2 - 3B + 2C = 4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \\ C = 1 \end{cases}\end{aligned}$$

On en déduit que  $\varphi_P(x) = x^2 + 1$

Et la solution générale de (E) est :

$$\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x} + x^2 + 1$$

Allez à : **Exercice 1**

Correction exercice 2.

$$y'' - 3y' = 0 \quad (E')$$

L'équation caractéristique de (E') est :  $r^2 - 3r = 0 \Leftrightarrow r = 0$  ou  $r = 3$

La solution générale de (E') est :

$$\varphi(x) = \lambda_1 + \lambda_2 e^{3x}$$

0 est une solution simple de l'équation caractéristique et le degré du polynôme 2 est 0 donc il existe une solution particulière de (E) de la forme

$$\begin{aligned}\varphi_P(x) &= Ax \\ \varphi_P'(x) &= A \quad \text{et} \quad \varphi_P''(x) = 0\end{aligned}$$

On remplace cela dans (E)

$$\varphi_P''(x) - 3\varphi_P'(x) = 2 \Leftrightarrow -3A = 2 \Leftrightarrow A = -\frac{2}{3}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = -\frac{2}{3}x$$

Et la solution générale de (E)

$$\varphi(x) = \lambda_1 + \lambda_2 e^{3x} - \frac{2}{3}x$$

Remarque :

Si on pose  $z' = y$  alors (E) devient

$$z' - 3z = 2$$

Il s'agit d'une équation du premier ordre dont la solution est :

$$\psi(x) = \mu e^{3x} - \frac{2}{3}$$

Il ne reste plus qu'à intégrer cette équation pour retrouver la solution générale ci-dessus.

Allez à : **Exercice 2**

Correction exercice 3.

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Leftrightarrow r = 1 \quad \text{ou} \quad r = 2$$

Donc la solution générale de (E') est  $\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x}$

Le second membre est le produit d'une constante 1 (donc d'un polynôme de degré 0) par une exponentielle avec  $\alpha = -1$ ,  $-1$  n'est pas solution de l'équation caractéristique de (E') donc (E) admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Ae^{-x}$$

$$\varphi'_P(x) = -Ae^{-x} \quad \text{et} \quad \varphi''_P(x) = Ae^{-x}$$

On remplace cela dans (E)

$$\varphi''_P(x) - 3\varphi'_P(x) + 2\varphi_P(x) = e^{-x} \Leftrightarrow Ae^{-x} - 3(-e^{-x}) + 2Ae^{-x} = e^{-x} \Leftrightarrow 6A = 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{6}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = \frac{1}{6}e^{-x}$$

Et la solution générale de (E) est

$$\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x}$$

Allez à : **Exercice 3**

Correction exercice 4.

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Leftrightarrow r = 1 \quad \text{ou} \quad r = 2$$

Donc la solution générale de (E') est  $\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x}$

Le second membre est le produit d'un polynôme de degré 1 par une exponentielle avec  $\alpha = 2$ , or  $-1$  n'est pas solution de l'équation caractéristique de (E') donc (E) admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = (Ax + B)e^{-x}$$

$$\varphi'_P(x) = Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x} = (-Ax + A - B)e^{-x}$$

$$\varphi''_P(x) = -Ae^{-x} - (-Ax + A - B)e^{-x} = (Ax - 2A + B)e^{-x}$$

On remplace cela dans (E)

$$\begin{aligned} \varphi''_P(x) - 3\varphi'_P(x) + 2\varphi_P(x) &= 36xe^{-x} \\ \Leftrightarrow (Ax - 2A + B)e^{-x} - 3(-Ax + A - B)e^{-x} + 2(Ax + B)e^{-x} &= 36e^{-x} \\ \Leftrightarrow (6Ax - 5A + 6B)e^{-x} = 36xe^{-x} &\Leftrightarrow \begin{cases} 6A = 36 \\ -5A + 6B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 6 \\ B = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = (6x + 5)e^{-x}$$

Et la solution générale de (E) est :

$$\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x} + (6x + 5)e^{-x}$$

Allez à : **Exercice 4**

Correction exercice 5.

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Leftrightarrow r = 1 \text{ ou } r = 2$$

Donc la solution générale de  $(E')$  est  $\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x}$

Le second membre est le produit d'un polynôme de degré 1 par une exponentielle avec  $\alpha = 1$ , or 1 est solution de l'équation caractéristique de  $(E')$  donc  $(E)$  admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$$

$$\varphi'_P(x) = (2Ax + B)e^x + (Ax^2 + Bx)e^x = (Ax^2 + (2A + B)x + B)e^x$$

$$\begin{aligned}\varphi''_P(x) &= (2Ax + 2A + B)e^{-x} + (Ax^2 + (2A + B)x + B)e^{-x} \\ &= (Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B)e^{-x}\end{aligned}$$

On remplace cela dans  $(E)$

$$\begin{aligned}\varphi''_P(x) - 3\varphi'_P(x) + 2\varphi_P(x) &= xe^x \\ \Leftrightarrow (Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B)e^{-x} - 3(Ax^2 + (2A + B)x + B)e^{-x} \\ &\quad + 2(Ax^2 + Bx)e^{-x} = xe^x \\ \Leftrightarrow (A - 3A + 2A)x^2 + (4A + B - 6A - 3B + 2B)x + 2A + 2B - 3B &= x \\ \Leftrightarrow -2Ax + 2A - B = x &\Leftrightarrow \begin{cases} -2A = 1 \\ 2A - B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = -1 \end{cases}\end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = x\left(-\frac{1}{2}x - 1\right)e^x = \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^x$$

Et la solution générale de  $(E)$  est :

$$\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x} + \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^x = \lambda_2 e^{2x} + \left(-\frac{1}{2}x^2 - x + \lambda_1\right)e^x$$

Allez à : **Exercice 5**

Correction exercice 6.

$$y'' + 2y' + y = 0 \quad (E)$$

$$r^2 + 2r + 1 = 0 \Leftrightarrow (r + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow r = -1$$

$-1$  est une racine double de l'équation caractéristique de  $(E')$  donc la solution générale de  $(E')$  est :

$$\varphi(x) = (\lambda_1 + \lambda_2 x)e^{-x}$$

Le second membre est le produit d'une constante 2 (donc d'un polynôme de degré 0) par une exponentielle avec  $\alpha = -1$ ,  $-1$  est solution double de l'équation caractéristique de  $(E')$  donc  $(E)$  admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Ax^2 e^{-x}$$

$$\varphi'_P(x) = 2Ax - Ax^2 e^{-x} = A(-x^2 + 2x)e^{-x}$$

$$\varphi''_P(x) = A((-2x + 2)e^{-x} - (-x^2 + 2x)e^{-x}) = A(x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

On remplace cela dans (E)

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) + 2\varphi_P'(x) + \varphi_P(x) &= 2e^{-x} \Leftrightarrow A(x^2 - 4x + 2)e^{-x} + 2A(-x^2 + 2x)e^{-x} + Ax^2e^{-x} \\ &= 2e^{-x} \Leftrightarrow (A - 2A + A)x^2 + (-4A + 4A)x + 2A = 2 \Leftrightarrow A = 1\end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = x^2e^{-x}$$

Et la solution générale de (E) est :

$$\varphi(x) = (\lambda_1 + \lambda_2 x)e^{-x} + x^2e^{-x} = (\lambda_1 + \lambda_2 x + x^2)e^{-x}$$

Allez à : **Exercice 6**

Correction exercice 7.

$$y'' + 2y' + 5y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Leftrightarrow r = -1 + 2i \quad \text{ou} \quad r = -1 - 2i$$

La solution générale de (E') est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x))$$

Ici  $\omega = 2$  et  $2i$  n'est pas une racine de l'équation caractéristique, donc (E) admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x)$$

$$\varphi_P'(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$$

$$\varphi_P''(x) = -4A \cos(2x) - 4B \sin(2x)$$

On remplace cela dans (E)

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) + 2\varphi_P'(x) + 5\varphi_P(x) &= 5 \cos(2x) - 3 \sin(2x) \\ \Leftrightarrow -4A \cos(2x) - 4B \sin(2x) + 2(-2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)) \\ &+ 5(A \cos(2x) + B \sin(2x)) = 5 \cos(2x) - 3 \sin(2x) \\ \Leftrightarrow (-4A + 5A + 4B) \cos(2x) + (-4B - 4A + 5B) \sin(2x) \\ &= 5 \cos(2x) - 3 \sin(2x) \Leftrightarrow \begin{cases} A + 4B = 5 \\ -4A + B = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 1 \end{cases}\end{aligned}$$

Donc  $\varphi_P(x) = \cos(2x) + \sin(2x)$

Et la solution générale de (E) est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x)) + \cos(2x) + \sin(2x)$$

Allez à : **Exercice 7**

Correction exercice 8.

$$y'' + 2y' + 5y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Leftrightarrow r = -1 + 2i \quad \text{ou} \quad r = -1 - 2i$$

La solution générale de (E') est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x))$$

Ici  $\omega = 1$  et  $i$  n'est pas une racine de l'équation caractéristique, est un polynôme de degré 1, donc (E) admet une solution particulière de la forme

$$\begin{aligned}\varphi_P(x) &= (Ax + B) \cos(x) + (Cx + D) \sin(x) \\ \varphi'_P(x) &= A \cos(x) - (Ax + B) \sin(x) + C \sin(x) + (Cx + D) \cos(x) \\ &= (Cx + D + A) \cos(x) + (-Ax - B + C) \sin(x) \\ \varphi''_P(x) &= C \cos(x) - (Cx + D + A) \sin(x) - A \sin(x) + (-Ax - B + C) \cos(x) \\ &= (-Ax - B + 2C) \cos(x) + (-Cx - D - 2A) \sin(x)\end{aligned}$$

On remplace cela dans (E)

$$\begin{aligned}\varphi''_P(x) + 2\varphi'_P(x) + 5\varphi_P(x) &= (4x + 6) \cos(x) + (-2x + 6) \sin(x) \\ &\Leftrightarrow (-Ax - B + 2C) \cos(x) + (-Cx - D - 2A) \sin(x) \\ &\quad + 2((Cx + D + A) \cos(x) + (-Ax - B + C) \sin(x)) \\ &\quad + 5((Ax + B) \cos(x) + (Cx + D) \sin(x)) \\ &= (4x + 6) \cos(x) + (-2x + 6) \sin(x) \\ &\Leftrightarrow ((-A + 2C + 5A)x - B + 2C + 2D + 2A + 5B) \cos(x) \\ &\quad + ((-C - 2A + 5C)x - D - 2A - 2B + 2C + 5D) \sin(x) \\ &= (4x + 6) \cos(x) + (-2x + 6) \sin(x) \\ &\Leftrightarrow ((4A + 2C)x + 2A + 4B + 2C + 2D) \cos(x) \\ &\quad + ((-2A + 4C)x - 2A - 2B + 2C + 4D) \sin(x) \\ &= (4x + 6) \cos(x) + (-2x + 6) \sin(x) \Leftrightarrow \begin{cases} 4A + 2C = 4 \\ 2A + 4B + 2C + 2D = 6 \\ -2A + 4C = -2 \\ -2A - 2B + 2C + 4D = 6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2A + C = 2 \\ A + 2B + C + D = 3 \\ -A + 2C = -1 \\ -A - B + C + 2D = 3 \end{cases}\end{aligned}$$

Réolvons d'abord

$$\begin{matrix} L_1 \\ L_2 \end{matrix} \begin{cases} 2A + C = 2 \\ -A + 2C = -1 \end{cases} \Leftrightarrow L_1 + 2L_2 \begin{cases} 2A + C = 2 \\ 5C = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ C = 0 \end{cases}$$

On remet cela dans les deux autres équations

$$\begin{aligned}\begin{cases} A + 2B + C + D = 3 \\ -A - B + C + 2D = 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 2B + D = 3 \\ -1 - B + 2D = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \end{matrix} \begin{cases} 2B + D = 2 \\ -B + 2D = 4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_1 + 2L_2 \end{matrix} \begin{cases} 2B + D = 2 \\ 5D = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2B + D = 2 \\ D = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 0 \\ D = 2 \end{cases}\end{aligned}$$

Donc  $\varphi_P(x) = x \cos(x) + 2 \sin(x)$

Et la solution générale de (E) est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x)) + x \cos(x) + 2 \sin(x)$$

Allez à : **Exercice 8**

Correction exercice 9.

$$y'' + y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow r = -i \quad \text{ou} \quad r = i$$

La solution générale de  $(E')$  est  $\varphi(x) = \lambda_1 \cos(x) + \lambda_2 \sin(x)$

$\omega = 1$  et  $i\omega = i$  est solution de l'équation caractéristique de  $(E')$  donc  $(E)$  admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = x(A \cos(x) + B \sin(x))$$

$$\begin{aligned} \varphi'_P(x) &= A \cos(x) + B \sin(x) + x(-A \sin(x) + B \cos(x)) \\ &= (Bx + A) \cos(x) + (-Ax + B) \sin(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi''_P(x) &= B \cos(x) - (Bx + A) \sin(x) - A \sin(x) + (-Ax + B) \cos(x) \\ &= (-Ax + 2B) \cos(x) + (-Bx - 2A) \sin(x) \end{aligned}$$

On remplace cela dans  $(E)$

$$\begin{aligned} \varphi''_P(x) + \varphi_P(x) &= \sin(x) \\ \Leftrightarrow (-Ax + 2B) \cos(x) + (-Bx - 2A) \sin(x) + x(A \cos(x) + B \sin(x)) \\ &= \sin(x) \Leftrightarrow 2B \cos(x) - 2A \sin(x) = \sin(x) \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = -\frac{x}{2} \cos(x)$$

Et la solution générale de  $(E)$  est

$$\varphi(x) = \lambda_1 \cos(x) + \lambda_2 \sin(x) - \frac{x}{2} \cos(x)$$

Allez à : **Exercice 9**

Correction exercice 10.

$$y'' + 2y' + 5y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Leftrightarrow r = -1 + 2i \quad \text{ou} \quad r = -1 - 2i$$

La solution générale de  $(E')$  est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x))$$

$\alpha = -1$  et  $\omega = 1$  donc  $\alpha + i\omega = -1 + i$  n'est pas une racine de l'équation caractéristique de  $(E')$ , donc  $(E)$  admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = e^{-x}(A \cos(x) + B \sin(x))$$

$$\begin{aligned} \varphi'_P(x) &= -e^{-x}(A \cos(x) + B \sin(x)) + e^{-x}(-A \sin(x) + B \cos(x)) \\ &= e^{-x}((-A + B) \cos(x) + (-A - B) \sin(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi''_P(x) &= -e^{-x}((-A + B) \cos(x) + (-A - B) \sin(x)) \\ &\quad + e^{-x}(-(-A + B) \sin(x) + (-A - B) \cos(x)) \end{aligned}$$

$$= e^{-x}(-2B \cos(x) + 2A \sin(x))$$



On remet cela dans (E)

$$\begin{aligned}
 \varphi_p''(x) + 2\varphi_p'(x) + 5\varphi_p(x) &= e^{-x}(6 \cos(x) - 3 \sin(x)) \\
 &\Leftrightarrow e^{-x}(-2B \cos(x) + 2A \sin(x)) \\
 &\quad + 2e^{-x}((-A + B) \cos(x) + (-A - B) \sin(x)) + 5e^{-x}(A \cos(x) + B \sin(x)) \\
 &= e^{-x}(6 \cos(x) - 3 \sin(x)) \\
 &\Leftrightarrow (-2B - 2A + 2B + 5A) \cos(x) + (2A - 2A - 2B + 5B) \sin(x) \\
 &= 6 \cos(x) - 3 \sin(x) \Leftrightarrow 3A \cos(x) + 3B \sin(x) = 6 \cos(x) - 3 \sin(x) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 3A = 6 \\ 3B = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = -1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_p(x) = e^{-x}(2 \cos(x) - \sin(x))$$

Et la solution générale de (E) est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x)) + e^{-x}(2 \cos(x) - \sin(x))$$

Allez à : **Exercice 10**

Correction exercice 11.

$$y'' + 2y' + 5y = 0 \quad (E')$$

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Leftrightarrow r = -1 + 2i \quad \text{ou} \quad r = -1 - 2i$$

La solution générale de (E') est :

$$\varphi(x) = e^{-x}(\lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x))$$

$\alpha = -1$  et  $\omega = 2$  donc  $\alpha + i\omega = -1 + 2i$  est une racine de l'équation caractéristique de (E'), donc (E) admet une solution particulière de la forme

$$\varphi_p(x) = xe^{-x}(A \cos(2x) + B \sin(2x))$$

Là, on a un problème,  $\varphi_p$  est un produit de trois termes, la dérivée est la somme de trois termes qui eux-mêmes sont le produit de trois termes, la dérivée la somme de neuf termes qui eux-mêmes sont le produit de trois termes, certes on pourrait arranger  $\varphi_p'$  et  $\varphi_p''$  en regroupant des termes et en mettant  $e^{-x}$  en facteur mais il vaut mieux utiliser l'exponentielle complexe.

$$\begin{aligned}
 \varphi_p(x) &= xe^{-x}(A \cos(2x) + B \sin(2x)) = xe^{-x} \left( A \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} + B \frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} \right) \\
 &= x \frac{e^{-x}}{2} (e^{2ix}(A - iB) + e^{-2ix}(A + iB)) = \\
 &= x \frac{1}{2} (e^{(-1+2i)x}(A + iB) + e^{(-1-2i)x}(A - iB)) = x \frac{1}{2} \operatorname{Re} (e^{(-1+2i)x}(A + iB))
 \end{aligned}$$

On pose alors  $C = A + iB$

$$\varphi_p(x) = x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C)$$

$$\varphi_p'(x) = x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C) + \frac{1}{2} \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C)$$

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) &= x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0^2 e^{z_0 x} C) + \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C) + \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C) \\ &= x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0^2 e^{z_0 x} C) + \frac{1}{2} \times 2 \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C)\end{aligned}$$

On remet cela dans (E)

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) + 2\varphi_P'(x) + 5\varphi_P(x) &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \\ &\Leftrightarrow x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0^2 e^{z_0 x} C) + 2 \times \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C) \\ &\quad + 2 \left( x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C) + \frac{1}{2} \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C) \right) + 5 \left( x \frac{1}{2} \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C) \right) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \operatorname{Re}(x z_0^2 e^{z_0 x} C + 2 z_0 e^{z_0 x} C + 2(x \operatorname{Re}(z_0 e^{z_0 x} C) + \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C)) + 5 x e^{z_0 x} C) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \operatorname{Re}(x e^{z_0 x} C (z_0^2 + 2 z_0 + 5) + 2 z_0 e^{z_0 x} C + 2 e^{z_0 x} C) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x))\end{aligned}$$

Comme  $z_0^2 + 2z_0 + 5 = 0$

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) + 2\varphi_P'(x) + 5\varphi_P(x) &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \operatorname{Re}(2 z_0 e^{z_0 x} C + 2 e^{z_0 x} C) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \operatorname{Re}(2 e^{z_0 x} C (z_0 + 1)) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \Leftrightarrow \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C (z_0 + 1)) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x))\end{aligned}$$

Il reste à calculer la partie réelle de

$$\begin{aligned}2e^{z_0 x} C (z_0 + 1) &= 2e^{(-1+2i)x} (A + iB) ((-1 + 2i) + 1) = 2e^{-x} e^{2ix} (A + iB) 2i \\ &= 4ie^{-x} (\cos(2x) + i \sin(2x)) (A + iB) \\ &= 4ie^{-x} (A \cos(2x) - B \sin(2x) + i(B \cos(2x) + A \sin(2x))) \\ &= e^{-x} (-4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) + i(4 \cos(2x) - 4B \sin(2x)))\end{aligned}$$

Par conséquent

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) + 2\varphi_P'(x) + 5\varphi_P(x) &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \operatorname{Re}(e^{z_0 x} C (2z_0 + 1)) \\ &= e^{-x}(2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)) \Leftrightarrow \frac{1}{2} (-4B \cos(2x) - 4A \sin(2x)) \\ &= 2 \cos(2x) + 4 \sin(2x) \Leftrightarrow -2B \cos(2x) - 2A \sin(2x) \\ &= 2 \cos(2x) + 4 \sin(2x) \Leftrightarrow \begin{cases} -2B = 2 \\ -2A = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = -2 \end{cases}\end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_P(x) = x e^{-x} (-2 \cos(2x) - \sin(2x))$$

Et la solution générale de (E) est :

$$\begin{aligned}\varphi_P(x) &= e^{-x}(A \cos(2x) + B \sin(2x)) + x e^{-x}(-2 \cos(2x) - \sin(2x)) \\ &= e^{-x}((A - 2x) \cos(2x) + (B - x) \sin(2x))\end{aligned}$$

Allez à : **Exercice 11**

Correction exercice 12.

On appelle  $\varphi_{P_1}$  une solution particulière de  $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$

On appelle  $\varphi_{P_2}$  une solution particulière de  $y'' - 3y' + 2y = 6x$

$-1$  n'est pas solution de l'équation caractéristique donc il existe une solution particulière de  $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$  de la forme

$$\varphi_{P_1}(x) = A e^{-x}$$

Ce qui entraîne que  $\varphi'_{P_1}(x) = -A e^{-x}$  et  $\varphi''_{P_1}(x) = A e^{-x}$  ce que l'on remplace dans l'équation

$$\varphi''_{P_1}(x) - 3\varphi'_{P_1}(x) + 2\varphi_{P_1}(x) = e^{-x} \Leftrightarrow A e^{-x} - 3(-A e^{-x}) + 2A e^{-x} = e^{-x} \Leftrightarrow 6A = 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{6}$$

$$\varphi_{P_1}(x) = \frac{1}{6} e^{-x}$$

$6x$  est un polynôme de degré 1 donc il existe une solution particulière de  $y'' - 3y' + 2y = 6x$  de la forme

$$\varphi_{P_2}(x) = Ax + B$$

Ce qui entraîne que  $\varphi'_{P_2}(x) = A$  et  $\varphi_{P_2}(x) = 0$ , ce que l'on remplace dans l'équation

$$\begin{aligned}\varphi''_{P_2}(x) - 3\varphi'_{P_2}(x) + 2\varphi_{P_2}(x) &= 6x \Leftrightarrow 0 - 3A + 2(Ax + B) = 6x \Leftrightarrow 2Ax - 3A + 2B = 6x \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2A = 6 \\ -3A + 2B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 3 \\ B = \frac{9}{2} \end{cases}\end{aligned}$$

$$\varphi_{P_2}(x) = 3x + \frac{9}{2}$$

On solution particulière de  $y'' - 3y' + 2y = e^{-x} + 6x$  est

$$\varphi_P(x) = \varphi_{P_1}(x) + \varphi_{P_2}(x) = \frac{1}{6} e^{-x} + 3x + \frac{9}{2}$$

Et la solution générale de  $y'' - 3y' + 2y = e^{-x} + 6x$  est

$$\varphi(x) = \lambda_1 e^x + \lambda_2 e^{2x} + \frac{1}{6} e^{-x} + 3x + \frac{9}{2}$$

Allez à : **Exercice 12**

Correction exercice 13.

L'équation caractéristique de  $y'' + 4y = 0$  est  $r^2 + 4 = 0$ , ses racines est  $r_1 = -2i$  et  $r_2 = 2i$ , la solution générale de  $y'' + 4y = 0$  est

$$\varphi(x) = \lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x)$$

$\cos^2(x)$  n'est pas de la forme  $e^{\alpha x}(P(x)\cos(\omega x) + Q(x)\sin(\omega x))$  donc il faut linéariser  $\cos^2(x)$ , c'est-à-dire  $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$

On pose  $f_1(x) = \frac{1}{2}$  et  $f_2(x) = \frac{1}{2}\cos(2x)$

On appelle  $\varphi_{P_1}$  une solution particulière de  $y'' + 4y = \frac{1}{2}$ , la théorie veut qu'il existe une solution particulière de la forme  $\varphi_{P_1}(x) = A$ , mais il est clair que

$$\varphi_{P_1}(x) = \frac{1}{8}$$

Est une solution particulière.

On appelle  $\varphi_{P_2}$  une solution particulière de  $y'' + 4y = \frac{1}{2}\cos(2x)$

Ici  $\alpha + i\omega = 0 + 2i = 2i$  est solution de l'équation caractéristique de  $y'' + 4y = 0$ , donc il existe une solution particulière de  $y'' + 4y = \frac{1}{2}\cos(2x)$  de la forme

$$\varphi_{P_2}(x) = x(A\cos(2x) + B\sin(2x))$$

Ce qui entraîne que

$$\begin{aligned}\varphi'_{P_2}(x) &= A\cos(2x) + B\sin(2x) + x(-2A\sin(2x) + 2B\cos(2x)) \\ &= (2Bx + A)\cos(2x) + (-2Ax + B)\sin(2x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi''_{P_2}(x) &= 2B\sin(2x) - 2(2Bx + A)\sin(2x) - 2A\sin(2x) + 2(-2Ax + B)\cos(2x) \\ &= (-4Ax + 4B)\cos(2x) + (-4Bx - 4A)\sin(2x)\end{aligned}$$

Ce que l'on remplace dans l'équation

$$\begin{aligned}\varphi''_{P_2}(x) + 4\varphi_{P_2}(x) &= \frac{1}{2}\cos(2x) \\ \Leftrightarrow (-4Ax + 4B)\cos(2x) + (-4Bx - 4A)\sin(2x) + 4x(A\cos(2x) + B\sin(2x)) \\ &= \frac{1}{2}\cos(2x) \Leftrightarrow 4B\cos(2x) - 4A\sin(2x) = \frac{1}{2}\cos(2x) \Leftrightarrow \begin{cases} -4A = 0 \\ 4B = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{8} \end{cases}\end{aligned}$$

Donc  $\varphi_{P_2}(x) = \frac{x}{8}\sin(2x)$ , par conséquent une solution particulière de  $y'' + 4y = \cos^2(x)$  est :

$$\varphi_P(x) = \varphi_{P_1}(x) + \varphi_{P_2}(x) = \frac{1}{8} + \frac{x}{8}\sin(2x)$$

Et la solution générale est :

$$\varphi(x) = \lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 \sin(2x) + \frac{1}{8} + \frac{x}{8}\sin(2x)$$

Allez à : **Exercice 13**

Correction exercice 14.

1. L'équation caractéristique est  $r^2 - (1+k)r + k = 0$ , le discriminant vaut

$$\Delta = (1+k)^2 - 4k = 1 + 2k + k^2 - 4k = 1 - 2k + k^2 = (1-k)^2$$

Si  $k = 1$  alors il y a une racine réelle double  $r_0 = 1$ , la solution de l'équation est :

$$y = (\lambda_1 + \lambda_2 x)e^x$$

Si  $k \neq 1$  alors il y a deux racines réelles distinctes

$$r_1 = \frac{1+k-(1-k)}{2} = k \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{1+k+(1-k)}{2} = 1$$

La solution de l'équation est

$$y = \lambda_1 e^{kx} + \lambda_2 e^x$$

2. Si  $k \neq 2$ , il existe une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Ae^{2x}$$

Donc

$$\varphi'_P(x) = 2Ae^{2x} \quad \text{et} \quad \varphi''_P(x) = 4Ae^{2x}$$

En remplaçant dans l'équation

$$\begin{aligned} \varphi''_P(x) - (1+k)\varphi'_P(x) + k\varphi_P(x) &= e^{2x} \Leftrightarrow 4Ae^{2x} - (1+k)2Ae^{2x} + kAe^{2x} = e^{2x} \\ \Leftrightarrow A(4 - 2(1+k) + k) &= 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{2-k} \end{aligned}$$

Par conséquent

$$\varphi_P(x) = \frac{1}{2-k} e^{2x}$$

Si  $k = 1$  la solution générale est

$$y = (\lambda_1 + \lambda_2 x)e^x + e^{2x}$$

Si  $k \neq 1$  et  $k \neq 2$  la solution générale est

$$y = \lambda_1 e^{kx} + \lambda_2 e^x + \frac{1}{2-k} e^{2x}$$

Si  $k = 2$ , il existe une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Axe^{2x}$$

Donc

$$\varphi'_P(x) = 2Axe^{2x} + Ae^{2x} = (2Ax + A)e^{2x} \quad \text{et} \quad \varphi''_P(x) = 2Ae^{2x} + 2(2Ax + A)e^{2x} = (4Ax + 4A)e^{2x}$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} \varphi''_P(x) - 3\varphi'_P(x) + 2\varphi_P(x) &= e^{2x} \Leftrightarrow (4Ax + 4A)e^{2x} - 3(2Ax + A)e^{2x} + 2Axe^{2x} = e^{2x} \\ \Leftrightarrow 4Ax + 4A - 3(2Ax + A) + 2Ax &= 1 \Leftrightarrow (4A - 6A + 2A)x + 4A - 3A = 1 \Leftrightarrow A \\ &= 1 \end{aligned}$$

Dans ce cas la solution générale est

$$y = \lambda_1 e^{2x} + \lambda_2 e^x + xe^{2x}$$

Allez à : **Exercice 14**

Correction exercice 15.

3. L'équation caractéristique est  $r^2 - (1+k)r + k = 0$ , le discriminant vaut

$$\Delta = (1+k)^2 - 4k = 1 + 2k + k^2 - 4k = 1 - 2k + k^2 = (1-k)^2$$

Si  $k = 1$  alors il y a une racine réelle double  $r_0 = 1$ , la solution de l'équation est :

$$y = (\lambda_1 + \lambda_2 x)e^x$$

Si  $k \neq 1$  alors il y a deux racines réelles distinctes

$$r_1 = \frac{1+k-(1-k)}{2} = k \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{1+k+(1-k)}{2} = 1$$

La solution de l'équation est

$$y = \lambda_1 e^{kx} + \lambda_2 e^x$$

4. Si  $k \neq 2$ , il existe une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Ae^{2x}$$

Donc

$$\varphi'_P(x) = 2Ae^{2x} \quad \text{et} \quad \varphi''_P(x) = 4Ae^{2x}$$

En remplaçant dans l'équation

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) - (1+k)\varphi_P'(x) + k\varphi_P(x) &= e^{2x} \Leftrightarrow 4Ae^{2x} - (1+k)2Ae^{2x} + kAe^{2x} = e^{2x} \\ \Leftrightarrow A(4 - 2(1+k) + k) &= 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{2-k}\end{aligned}$$

Par conséquent

$$\varphi_P(x) = \frac{1}{2-k} e^{2x}$$

Si  $k = 1$  la solution générale est

$$y = (\lambda_1 + \lambda_2 x)e^x + e^{2x}$$

Si  $k \neq 1$  et  $k \neq 2$  la solution générale est

$$y = \lambda_1 e^{kx} + \lambda_2 e^x + \frac{1}{2-k} e^{2x}$$

Si  $k = 2$ , il existe une solution particulière de la forme

$$\varphi_P(x) = Axe^{2x}$$

Donc

$$\varphi_P'(x) = 2Axe^{2x} + Ae^{2x} = (2Ax + A)e^{2x} \quad \text{et} \quad \varphi_P''(x) = 2Ae^{2x} + 2(2Ax + A)e^{2x} = (4Ax + 4A)e^{2x}$$

Par conséquent

$$\begin{aligned}\varphi_P''(x) - 3\varphi_P'(x) + 2\varphi_P(x) &= e^{2x} \Leftrightarrow (4Ax + 4A)e^{2x} - 3(2Ax + A)e^{2x} + 2Axe^{2x} = e^{2x} \\ \Leftrightarrow 4Ax + 4A - 3(2Ax + A) + 2Ax &= 1 \Leftrightarrow (4A - 6A + 2A)x + 4A - 3A = 1 \Leftrightarrow A \\ &= 1\end{aligned}$$

Dans ce cas la solution générale est

$$y = \lambda_1 e^{2x} + \lambda_2 e^x + xe^{2x}$$

Allez à : **Exercice 15**