

## 《概率论与数理统计》习题

### 第十五讲 统计量

1. 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  和  $y_1, y_2, \dots, y_n$  是两组样本观测值, 且关系如下:

$$y_i = ax_i + b, i = 1, 2, \dots, n$$

其中,  $a$  和  $b$  为非零常数。试求:

- (a) 样本均值  $\bar{x}$  和  $\bar{y}$  间的关系;
- (b) 样本方差  $s_x^2$  和  $s_y^2$  间的关系。

2. 设总体  $X$  的 3 阶矩存在, 若  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是取自该总体的简单随机样本,  $\bar{x}$  为样本均值,  $s^2$  为样本方差, 试证:

$$\text{Cov}(\bar{x}, s^2) = \frac{\nu_3}{n},$$

其中  $\nu_3 = E(x - E(x))^3$ 。

3. 设  $\bar{x}_1$  和  $\bar{x}_2$  是从同一正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  独立抽取的容量相同的两个样本均值。试确定样本容量  $n$ , 使得两样本均值的差超过  $\sigma$  的概率不超过 0.01。

4. 从指数总体  $\text{Exp}(1/\theta)$  抽取了 40 个样品, 试求  $\bar{x}$  的渐近分布。

5. 设总体  $X$  的分布函数  $F(x)$  是连续的,  $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$  为取自此总体的次序统计量, 设  $\eta_i = F(x_{(i)})$ , 试证:

- (a)  $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_n$ ,  $\eta_i$  是来自均匀分布  $U(0, 1)$  总体的次序统计量;
- (b)  $E(\eta_i) = \frac{i}{n+1}$ ,  $\text{Var}(\eta_i) = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}$ ,  $1 \leq i \leq n$ ;
- (c)  $\eta_i$  和  $\eta_j$  的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} \\ \frac{a_2(1-a_1)}{n+2} & \frac{a_2(1-a_2)}{n+2} \end{pmatrix}$$

其中,  $a_1 = \frac{i}{n+1}$ ,  $a_2 = \frac{j}{n+1}$ 。

6. 假定总体的密度函数为

$$p(x) = 6x(1-x), 0 < x < 1.$$

求样本量为  $n$  的样本中位数  $m_{0.5}$  的渐近分布。

### 第十六讲 三大抽样分布

1.  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是来自  $N(\mu, 1)$  的样本, 试确定最小的常数  $c$  使得对任意的  $\mu \geq 0$  有  $P(|\bar{x}| < c) \leq \alpha$ 。

2. 设随机变量  $X \sim F(n, m)$ , 证明:

$$Z = \frac{\frac{n}{m}X}{(1 + \frac{n}{m}X)}$$

服从贝塔分布, 并指出其参数。

3. 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是来自  $N(\mu_1, \sigma^2)$  的样本,  $y_1, y_2, \dots, y_m$  是来自  $N(\mu_2, \sigma^2)$  的样本,  $c, d$  是任意两个不为 0 的常数, 证明

$$t = \frac{c(\bar{x} - \mu_1) + d(\bar{y} - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \sim t(n + m - 2)$$

$$\text{其中 } s_w^2 = \frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}。$$

(编程题) 使用随机模拟的方法得到样本峰度和样本偏度的分布 (输出分位数)。