# Verslag Taak 1

Robin Elskens en Lina Martens

## Opdracht 1

Stel $n \geq 2$, $r \in \mathbb{R}$ en verneem dat de recursierelatie van $A_i\,(r)$ geldt voor alle $i \in \mathbb{N}$ met $i < n$. Zoals in de gegeven hint; we gebruiken partiele integratie op $A_n(r)$.

$$\begin{aligned} A_n(r) &= \int_{-1}^{1} \left(1-x^2\right)^n \cos\left(rx\right)\, dx \\ &= \left[\left(1-x^2\right)^n \frac{\sin\left(rx\right)}{r}\right]_{-1}^{1} + \int_{-1}^{1} 2nx\left(1-x^2\right)^{n-1} \frac{\sin\left(rx\right)^2}{r}\, dx \end{aligned}$$

In deze uitdrukking kan de eerste term worden geschrapt omdat $(1-x^2)$ in zowel $-1$ als $1$ aan nul gelijk is. We zullen nu opnieuw de resterende term partieel integreren met

$$\begin{aligned} u &= 2nx\left(1-x^2\right)^{n-1} \quad \text{zodat} \quad du = 2n\left(1-x^2\right)^{n-1} - 4n(n-1)x^2\left(1-x^2\right)^{n-2}\, dx \\ dv &= \frac{\sin\left(rx\right)}{r} dx \quad \text{zodat} \quad v = \frac{\sin\left(rx\right)}{r} \end{aligned}$$

$du$ kan herschreven worden als

$$\begin{aligned} du &= \left[2n\left(1-x^2\right) - 4x^2 n\left(n-1\right)\right]\left(1-x^2\right)^{n-2} dv \\ &= \left[2n + 2x^2 n - 4x^2 n^2\right]\left(1-x^2\right)^{n-2} dv \\ &= \left[4n - 4n^2 - 2n\left(1-x^2\right) + 4n^2\left(1-x^2\right)\right]\left(1-x^2\right)^{n-2} dv \\ &= 2n\left(2n-1\right)\left(1-x^2\right)^{n-1} - 4n\left(n-1\right)\left(1-x^2\right)^{n-2} dv \end{aligned}$$

Dit geeft ons

$$A_n(r) = \left[2nx\left(1-x^2\right)^{n-1} \frac{-1}{r}\cos\left(rx\right)\right]_{-1}^{1}$$

$$+\frac{1}{r^2}\int_{-1}^{1}\left[2n(2n-1)(1-x^2)^{n-1}-4n(n-1)(1-x^2)^{n-2}\right]\cos(rx)\,dx.$$

Net als hierboven wordt de eerste term nul. Uit de lineariteit van de integraal en de formule voor de rij $A_n(r)$ wordt besloten dat

$$A_n(r)=\frac{1}{r^2}\left[2n(2n-1)A_{n-1}(r)-4n(n-1)A_{n-2}(r)\right] \tag{0.1}$$

# Opdracht 2

We gebruiken de volgende SymPy code om $A_0$ t.e.m. $A_{10}$ te bepalen[1].

```
1 import sympy as sp
2 r = sp.symbols('r', nonzero=True)
3 x = sp.symbols('x')
4 A = [None]*11
5 A[0] = sp.integrate((1-x**2)**0*sp.cos(r*x), (x, -1, 1))
6 A[1] = sp.integrate((1-x**2)**1*sp.cos(r*x), (x, -1, 1)).simplify()
7 for n in range(2, 11):
8     A[n] = (1/r**2)*(2*n*(2*n-1)*A[n-1]-4*n*(n-1)*A[n-2])
9     A[n] = A[n].simplify()
10 for f in A:
11     display(sp.collect(f, (sp.cos(r), sp.sin(r))))
```

Dit zijn de uitdrukkingen die we dan bekomen:

$$A_0(r)=\frac{2\sin(r)}{r}$$

$$A_1(r)=\frac{4\left(\sin(r)-r\cos(r)\right)}{r^3}$$

$$A_2(r)=\frac{16\left((3-r^2)\sin(r)-3r\cos(r)\right)}{r^5}$$

$$A_3(r)=\frac{96\left((15-6r^2)\sin(r)+(r^3-15r)\cos(r)\right)}{r^7}$$

$$A_4(r)=\frac{768\left((r^4-45r^2+105)\sin(r)+(10r^3-105r)\cos(r)\right)}{r^9}$$

$$A_5(r)=\frac{7680\left((15r^4-420r^2+945)\sin(r)+(-r^5+105r^3-945r)\cos(r)\right)}{r^{11}}$$

$$A_6(r)=\frac{92160\left((-r^6+210r^4-4725r^2+10395)\sin(r)+(-21r^5+1260r^3-10395r)\cos(r)\right)}{r^{13}}$$

$$A_7(r)=\frac{1290240}{r^{15}}\left(\left(-28r^6+3150r^4-62370r^2+135135\right)\sin(r)\right.$$

$$+\left(r^7-378r^5+17325r^3-135135r\right)\cos(r)\big)$$

$$A_8(r)=\frac{20643840}{r^{17}}\big(\left(r^8-630r^6+51975r^4-945945r^2+2027025\right)\sin(r)$$
$$+\left(36r^7-6930r^5+270270r^3-2027025r\right)\cos(r)\big)$$

$$A_9(r)=\frac{371589120}{r^{19}}\big(\left(45r^8-13860r^6+945945r^4-16216200r^2+34459425\right)\sin(r)$$
$$+\left(-r^9+990r^7-135135r^5+4729725r^3-34459425r\right)\cos(r)\big)$$

$$A_{10}(r)=\frac{7431782400}{r^{21}}\big(\left(-r^{10}+1485r^8-315315r^6+18918900r^4-310134825r^2+654729075\right)$$
$$\sin(r)+\left(-55r^9+25740r^7-2837835r^5+91891800r^3-654729075r\right)\cos(r)\big)$$

# Opdracht 3

We zullen de correctheid van (1.4) (uit de werktekst) aantonen met een inductie op $n$. Merk op dat we $A_0(r)$ en $A_1(r)$, zoals gevonden in de vorige opdracht, kunnen schrijven als

$$A_0(r)=\frac{0!}{r}\left(2\sin(r)+0\cos(r)\right)$$
$$A_1(r)=\frac{1!}{r^3}\left(4\sin(r)-4r\cos(r)\right).$$

Hiermee hebben we de basisstap aangetoond en vinden we alvast de beginwaarden $P_0(r)=2$ en $P_1(r)=4$. Zij nu $n\in\mathbb{N}$ met $n\geq 2$ en veronderstel van zodra $k<n$ dat we $A_k$ kunnen schrijven als in (1.4). We tonen nu dat ook $A_n$ aan (1.4) voldoet. Uit (0.1) is

$$\begin{aligned}A_n(r)&=\frac{1}{r^2}\left[2n(2n-1)A_{n-1}(r)-4n(n-1)A_{n-2}(r)\right]\\&=\frac{1}{r^2}\left[2n(2n-1)\frac{(n-1)!}{r^{2n-1}}R_{n-1}(r)-4n(n-1)\frac{(n-2)!}{r^{2n-3}}R_{n-2}(r)\right]\\&=\frac{n!}{r^{2n+1}}\left[\left(4n-2\right)R_{n-1}(r)-4r^2R_{n-2}\right],\end{aligned}$$

waardat $R_i(r)=P_i(r)\sin(r)-Q_i(r)\cos(r)$. We concluderen dat

$$A_n(r)=\frac{n!}{r^{2n+1}}\left[P_n(r)\sin(x)-Q_n(r)\cos(x)\right],$$

waarbij $P_n(r)$ en $Q_n(r)$ recursief werden gedefinieerd als

$$P_n(r)=\left(4n-2\right)P_{n-1}(r)-4r^2P_{n-2}(r)\quad\text{en}\tag{3.2}$$

[1]Lijn 11 van de code is afkomstig van `https://stackoverflow.com/a/16239378`.

$$Q_n(r) = (4n-2)\,Q_{n-1}(r) - 4r^2 Q_{n-2}(r). \tag{3.3}$$

We kunnen zonder te veel verbeelding te hoeven gebruiken zien dat; om $P_n$ te bekomen in (3.2) we telkens de coëfficienten van $P_{n-1}$ als $P_{n-2}$ vermenigvuldigen met gehele getallen. Omwille ervan dat initieel de coëfficienten van $P_0$ en $P_1$ geheel zijn, zal tevens ook in het algemeen $P_n$ enkel gehele coëfficienten bevatten.

## Graden van $P_n$ en $Q_n$

Voordat we een formule voor de graden van $P_n$ en $Q_n$ geven en aantonen is het handig de volgende proposities te beschouwen.

**propositie 1.** Zij $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ een recursief gedefinieerde rij met

$$a_n = \begin{cases} -4a_{n-2} & \text{als } n \text{ even is} \\ (4n-2)\,a_{n-1} - 4a_{n-2} & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

en beginvoorwaarden $a_0 = 2$ en $a_1 = 4$. Dan geldt voor elke oneven $k \in \mathbb{N}$ dat $a_k = k(k+1)a_{k-1}$.

*Bewijs.* We tonen dit aan met inductie. Merk op dat $a_1 = 2a_0$, zodat aan de basisstap voldaan wordt. Zij $k$ oneven en veronderstel dat de propositie geldt voor elke oneven $i < k$. Nu geldt dat

$$\begin{aligned} a_k &= (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} \\ &= (4k-2)a_{k-1} - 4(k-2)(k-1)a_{k-3} \\ &= (4k-2)a_{k-1} + (k-2)(k-1)a_{k-1} \\ &= a_{k-1}(k^2+k) = k(k+1)a_{k-1}. \end{aligned}$$

□

**propositie 2.** Zij $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ een recursief gedefinieerde rij met

$$b_n = \begin{cases} 0 & \text{als } n = 0 \\ -4b_{n-2} & \text{als } n \text{ oneven is} \\ (4n-2)\,b_{n-1} - 4b_{n-2} & \text{als } n \text{ even is} \end{cases}$$

en beginvoorwaarden $b_0 = 0$, $b_1 = 4$. Dan geldt voor elke even $k \in \mathbb{N}_0$ dat $b_k = k(k+1)b_{k-1}$.

*Bewijs.* We tonen dit aan met inductie. Merk op dat $b_2 = 24 = 6b_1$, zodat aan de basisstap voldaan wordt. Zij $k \neq 0$ even en veronderstel dat de propositie geldt voor elke even $i < k$. De redenering die opvolgt is nu volledig analoog aan die gegeven in propositie 1 door in het bewijs namelijk het woord even telkens om te wisselen met oneven en vice versa. □

Merk op dat deze proposities zeggen dat deze rijen nooit nul zullen zijn.

**Graad van $P_n$**

We tonen de volgende formule aan met inductie:

$$\text{Graad}(P_n) = \begin{cases} n & \text{als } n \text{ even is} \\ n-1 & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

Laat $a_n$ de leidende coëfficient van de veelterm $P_n$ zijn. Merk op dat voor zowel $P_0$ als $P_1$ de graad 0 is en dat ditgene in overeenstemming is met de formule. Zij $k \in \mathbb{N}$ en veronderstel dat de formule geldt voor elke $P_i$ met $i < k$. We hebben nu twee gevallen.

**1. $k$ is even**

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-2$ en $\text{Graad}(P_{k-2}) = k-2$. Volgens de recursieformule (3.2) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $-4r^2P_{k-2}(r)$. Er volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-2+2 = k$. en dat $a_n = -4a_{n-2}$

**2. $k$ is oneven**

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-1$ en $\text{Graad}(P_{k-2}) = k-3$. Volgens de recursieformule (3.2) zal de graad van $P_k(r)$ hoogstens $k-1$ zijn, maar ofdat $P_k(r) = k-1$ is enkel waar zolang dat de coëfficient van de $r^{n-1}$ term niet nul is. Dus willen we aantonen dat

$$a_k = (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} \neq 0$$

We merken op dat de $a_i$ met $i < k$ volgens de inductiehypothese niet nul zijn en dat de $a_i$ dezelfde recursieve formule volgen als in Propositie 1. Immers uit puntje 1 is

$$a_i = -4a_{i-2} \qquad \text{als } i \text{ even is}$$

en omwille van de redenering bij puntje 2 samen met onze inductiehypothese:

$$a_i = (4i-2)a_{i-1} - 4a_{i-2} \qquad \text{als } i \text{ oneven is}$$

Sinds de leidende coëfficienten van $P_0$ en $P_1$ resp. 2 en 4 zijn, wordt er aan alle voorwaarden van propositie 1 voldaan.
Zodat $a_k = k(k+1)a_{k-1} \neq 0$. Hieruit volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-1$.

**Graad van $Q_n$**

We tonen analoog als hierboven aan dat de volgende formule aan met inductie:

$$\text{Graad}(Q_n) = \begin{cases} 0 & \text{als } n = 0 \\ n-1 & \text{als } n \text{ even is} \\ n & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

Merk op dat voor $Q_0(r) = 0$, $Q_1(r) = 4r$ en $Q_2(r) = 24r$ de formule geldt. Zij $k \in \mathbb{N}$ en veronderstel dat dat de formule geldt voor elke $P_i$ met $i < k$. We hebben nu twee gevallen.

**1. $k$ is oneven**

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(Q_{k-1}) = k-2$ en $\text{Graad}(Q_{k-2}) = k-2$. Volgens de recursieformule (3.3) zal de graad van $Q_k(r)$ dus bepaald worden door $-4r^2Q_{k-2}(r)$. Er volgt dat $\text{Graad}(Q_k) = k - 2 + 2 = k$.

**2. $k$ is even**

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(Q_{k-1}) = k-1$ en $\text{Graad}(Q_{k-2}) = k-3$. Volgens de recursieformule (3.2) zal de graad van $Q_k(r)$ dus bepaald worden door $(4k-2)Q_{k-1}(r) - 4r^2Q_{k-2}(r)$. We merken op dat de leidende coëfficienten van $a_i$ van $Q_i$ met $i < k$ niet nul zijn en analoog aan het bewijs voor de graad van $P_n$ voldoen aan de recursieformule uit propositie 2. Sinds de leidende coëfficienten van $Q_0$, $Q_1$ en $Q_2$ resp. 0, 4 en 24 zijn, is aan de voorwaarden van propositie 2 voldaan, dus is $a_k = (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} = k(k+1)a_{k-1} \neq 0$. Hieruit volgt dat $\text{Graad}(Q_k) = k - 1$.

# Opdracht 4

Zoals beschreven in de opgavenbundel is voor $r = \pi/2$ de integrand van $A_n(r) = \int_{-1}^{1} (1-x^2)^n \cos(rx)\, dx$ positief en dus $0 < A_n\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Daarmee volstaat het om aan te tonen dat

$$\frac{a^{2n+1}}{n!} A_n\left(\frac{\pi}{2}\right) \in \mathbb{Z}. \tag{4.4}$$

Uit 0.1 is

$$\frac{a^{2n+1}}{n!} A_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{a^{2n+1}}{n!} \frac{n!}{\left(\frac{a}{b}\right)^{2n+1}} \left[ P_n\left(\frac{a}{b}\right) \sin\left(\frac{a}{b}\right) - Q_n\left(\frac{a}{b}\right) \cos\left(\frac{a}{b}\right) \right].$$

Ook sinds $a/b = \pi/2$, is probleem (4.4) te vereenvoudigen tot het aantonen van

$$b^{2n+1} P_n\left(\frac{a}{b}\right) \in \mathbb{Z}. \tag{4.5}$$

We doen met inductie. In opdracht 3 zagen we dat $P_0(r) = 2$ en $P_1(r) = 4$, dus voor de basisstap houd (4.5) stand. Zij nu $n \geq 2$ en veronderstel dat er aan (4.5) voldaan is voor elke $k < n$. We gebruiken de recursieformule voor $P_n$ zodat

$$\begin{aligned} b^{2n+1} P_n\left(\frac{a}{b}\right) &= b^{2n+1}\left[(4n-2)\, P_{n-1}\left(\frac{a}{b}\right) - 4\frac{a^2}{b^2} P_{n-2}\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= (4n-2)\, b^2\left[b^{2n-1} P_{n-1}\left(\frac{a}{b}\right)\right] - 4a^2b^2\left[b^{2n-3} P_{n-2}\left(\frac{a}{b}\right)\right]. \end{aligned}$$

Uit de inductiehypothese volgt dat alle termen in deze gelijkheid moeten geheel zijn en daarmee zal dus ook $b^{2n+1} P_n\left(\frac{a}{b}\right)$ geheel zijn.

# Opdracht 5

Stel $c = a^2$ en beschouw de rij $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{\frac{c^n}{n!}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$. We kiezen een $N > c$, zodat voor elke $n \in \mathbb{N}$ met $n > N$ geldt dat

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{c}{n} < 1.$$

Hieruit volgt dat $x_{n+1} < x_n$ en dus daalt de rij $\{x_n\}_{n>N}$ monotoon. Omdat $c > 0$, is deze rij steeds positief en dus langs onder begrensd. Hieruit volgt dat $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergeert. We noemen $x = \lim_{n\to\infty} x_n$. Aangezien $x_{n+1} = \frac{c}{n} x_n$ vinden we door de limiet van beiden leden te nemen dat

$$x = \lim_{n\to\infty} \frac{c}{n} x_n = 0 \cdot x, \quad \text{dus } x = 0.$$

Nu volgt dat

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^{2n+1}} = \frac{1}{a} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \infty.$$