共形场论笔记

郑元昊
复旦大学物理系

更新：2026 年 3 月 21 日

目录

1 绪论 **3**

1.1 Why CFT? 3

1.2 符号约定 3

2 共形变换 **5**

2.1 时空的共形变换 5

2.2 经典场的共形变换 9

2.3 共形量子场 13

3 关联函数 **16**

3.1 Ward Identity 及其应用 16

A 度规场变换下各量的变换 **19**

A.1 无穷小变换下各量的变换 19

A.2 有限大局域 Weyl 变换下各量的变换 21

参考文献 **22**

1 绪论

1.1 Why CFT?

1. CFT can emerge in ”critical” phen: Ising model.
2. Important to understand quantum gravity through string theory, AdS/CFT.
3. CFT is truly formulated QFT non-perturbatively: Operator Algebra.
4. CFT appears as fixed points of RG flow.

1.2 符号约定

欧式空间度规为 $\mathrm{diag}(1\cdots 1)$, Lorentz 空间度规为 $\mathrm{diag}(1,-1,\cdots -1)$.

定义 1.1 (Riemann 曲率张量)

$$R_{abc}{}^{d} \equiv 2\nabla_{[a}\nabla_{b]}\omega_c. \tag{1.2.1}$$

定义 1.2 (Ricci 张量)

$$R_{ac} \equiv R_{adc}{}^{d} = 2\nabla_{[a}\nabla_{b]}\omega_c. \tag{1.2.2}$$

定义 1.3 (Einstein 场张量)

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}. \tag{1.2.3}$$

定义 1.4 (标量曲率)

$$R = g^{ab}R_{ab}. \tag{1.2.4}$$

定义 1.5 (体元测度)

$$\epsilon = \sqrt{g}\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \mathrm{d}x^d. \tag{1.2.5}$$

其中 g 为 $g_{\mu\nu}$ 的行列式.

Einstein-Hilbert 作用量

$$S = S_{\text{gravity}} + S_{\text{matter}} = \int \left(-\frac{R}{16\pi} + \mathcal{L}_{\text{matter}}\right). \tag{1.2.6}$$

Einstien 引力场方程

$$G_{ab} = 8\pi T_{ab}. \tag{1.2.7}$$

定理 1.1 (物质场能动张量)

$$T_{ab} = \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{\text{matter}}}{\delta g^{ab}} \tag{1.2.8}$$

2 共形变换

2.1 时空的共形变换

考虑一个 d 维时空流形 M 上的单参微分同胚群, 其对应的光滑矢量场为 ξ^a, 时空度规 g_{ab}(未指定号差, 可以 Lorentz 也可以 Eucilidean) 在其下的 Lie 导数为

$$\mathscr{L}_\xi g_{ab} = \xi^c \nabla_c g\omega_{ab} + g_{ac}\nabla_b \xi^c + g_{cb}\nabla_a \xi^c = \nabla_b \xi_a + \nabla_a \xi_b. \tag{2.1.1}$$

若保持时空度规不变, 即等距群, 则 ξ^a 满足

$$\nabla_{(a}\xi_{b)} = 0. \tag{2.1.2}$$

即 ξ^a 为 Killing 矢量场.

在 Minkovski 时空中,

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(\pm 1), \tag{2.1.3}$$

容易解得 Killing 矢量场为

$$\xi^\mu = a^\mu + \omega^\mu{}_\nu x^\nu, \tag{2.1.4}$$

其中

$$\omega_{\mu\nu} = \omega_{[\mu\nu]}. \tag{2.1.5}$$

这就是 Poincare 群, 总共有三部分组成: 平移、旋转、Boost.

定义 2.1 (Weyl 变换) 变换

$$g_{ab} \to \Omega(x)^2 g_{ab} \tag{2.1.6}$$

称为 Weyl 变换.

如果我们放宽条件, 允许变换后的度规可以存在缩放, 即

$$g'_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \mathscr{L}_\xi g_{\mu\nu} = \Omega^2 g_{\mu\nu} = \mathrm{e}^{-2\sigma} g_{\mu\nu} \approx (1-2\sigma) g_{\mu\nu} \tag{2.1.7}$$

这就是共形变换. 不难发现, 从几何意义上说, 其实共性变换对称也就是保角变换. 或者说,

定义 2.2 (共形变换) 同时是微分同胚的 Weyl 变换为共形变换.

若 σ 为常数 λ, 则我们有

$$\partial_{(\mu}\xi_{\nu)} = \lambda g_{\mu\nu}, \tag{2.1.8}$$

可以解得其解为通解 + 特解:

$$\xi^\mu = a^\mu + \omega^\mu{}_\nu x^\nu + \lambda x^\mu. \tag{2.1.9}$$

如果再放宽条件, 我们让 $\sigma = \sigma(x)$, 和坐标有关, 则

定理 2.1 (共形 Killing 方程)

$$\partial_{(\mu}\xi_{\nu)} = \sigma g_{\mu\nu} \tag{2.1.10}$$

将式(2.1.10)与 $g_{\mu\nu}$ 缩并我们有

$$\partial_\mu \xi^\mu = d\sigma. \tag{2.1.11}$$

将式(2.1.10)与 ∂_μ 缩并我们有

$$\Box\xi_\nu + \partial_\nu\partial_\mu\xi^\mu = \Box\xi_\nu + d\partial_\nu\sigma = 2\partial_\nu\sigma, \tag{2.1.12}$$

即

$$\Box\xi_\nu = (2-d)\partial_\nu\sigma. \tag{2.1.13}$$

进一步将式(2.1.13)与 ∂_ν 缩并, 我们有

$$\Box(d\sigma) = (2-d)\Box\sigma \tag{2.1.14}$$

即

$$(1-d)\Box\sigma = 0. \tag{2.1.15}$$

对于 $d>1$, 我们有

$$\Box\sigma = 0. \tag{2.1.16}$$

我们将 ∂_μ 作用于式(2.1.13), 有

$$\Box\partial_\mu\xi_\nu = (2-d)\partial_\mu\partial_\nu\sigma. \tag{2.1.17}$$

同时全称化有,

$$(2-d)\partial_\mu\partial_\nu\sigma = (2-d)\partial_{(\mu}\partial_{\nu)}\sigma = \Box\partial_{(\mu}\xi_{\nu)} = g_{\mu\nu}\Box\sigma = 0. \tag{2.1.18}$$

即

$$(2-d)\partial_\mu\partial_\nu\sigma = 0. \tag{2.1.19}$$

对于 $d>2$ 的情况, 我们有

$$\partial_\mu\partial_\nu\sigma = 0. \tag{2.1.20}$$

可以解得

$$\sigma = \lambda + 2b_\mu x^\mu, \tag{2.1.21}$$

其中 b_μ 为某个常矢量. 然后代入求解 ξ^μ, 有

$$\partial_{(\mu}\xi_{\nu)} = (2b\cdot x + \lambda)g_{\mu\nu}. \tag{2.1.22}$$

不难得到其解

定理 2.2 (共形 Killing 矢量场)

$$\xi^\mu = a^\mu + \omega^\mu{}_\nu x^\nu + \lambda x^\mu + 2(b\cdot x)x^\mu - x^2 b^\mu. \tag{2.1.23}$$

这就是共性变换对应的全部矢量场. 某一个特定矢量场定义了流形上的一个单参微分同胚群, 不难验证将这些单参微分同胚群取并集, 仍然具有封闭性、结合律、单位元以及逆元, 因此构成一个群, 即共性变换群.

其中, a^μ 代表平移 (Translation), $\omega^\mu{}_\nu$ 代表旋转 (Rotation&Boost), λ 代表缩放 (Dilation), b^μ 代表特殊共形变换 (Special Conformal Transformation, SCT). 然后我们可以求这些无穷小变换对应的有限大坐标变换的表达式, 即微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \xi^\mu \tag{2.1.24}$$

在 $\tau = 1$ 时的解:

定理 2.3 (有限大共形变换)

$$\text{Translation:} x'^\mu = x^\mu + a^\mu, \tag{2.1.25}$$

$$\text{Boost:} x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \tag{2.1.26}$$

$$\text{Dilation:} x'^\mu = \mathrm{e}^\lambda x^\mu, \tag{2.1.27}$$

$$\text{SCT:} x'^\mu = \frac{x^\mu - x^2 b^\mu}{1 - 2b\cdot x + b^2 x^2}. \tag{2.1.28}$$

其中式(2.1.28)的得到并不显然, 补充推导如下, 首先有微分方程,

$$\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} = 2(b\cdot x)x^\mu - x^2 b^\mu. \tag{2.1.29}$$

与 x^μ 缩并我们有

$$\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}\tau} = 2(b\cdot x)x^2. \tag{2.1.30}$$

设

$$y^\mu = \frac{x^\mu}{x^2}, \tag{2.1.31}$$

有

$$\frac{\mathrm{d}y^\mu}{\mathrm{d}\tau} = -b^\mu \tag{2.1.32}$$

于是可得

$$\frac{x'^\mu}{x'^2} = \frac{x^\mu}{x^2} - b^\mu. \tag{2.1.33}$$

由此可见, SCT 可以将其视为三个步骤: 以原点为中心内外翻转, 平移 $-b^\mu$, 以原点为中心内外翻转. 最终化简我们有

$$x'^\mu = \frac{x^\mu - x^2 b^\mu}{1 - 2b\cdot x + b^2 x^2}. \tag{2.1.34}$$

于是我们发现几个特殊点:

$$\begin{cases} \text{origin} \to \text{origin} \\ \frac{b^\mu}{b^2} \to \infty \\ \infty \to -\frac{b^\mu}{b^2}. \end{cases} \tag{2.1.35}$$

定理 2.4 *设任意的六点 x_1, x_2, x_3 与 x_1', x_2', x_3', 存在共性变换将 x_1, x_2, x_3 变换为 x_1', x_2', x_3'.*

证明. 首先利用平移, 可以将 x_1 平移到原点. 然后利用 SCT, 可以将 x_2 变换到 ∞, 这个时候 x_3 位于 x_3''.

类似地我们可以做到将 x_1' 平移到原点, x_2' 变换到 ∞, x_3' 变换到 x_3'''.

如果我们对 x_3'' 再做一个缩放与旋转, 一定可以将之变换到 x_3'''. 由共性变换群的封闭性与逆元存在可知, 我们一定可以将 x_1, x_2, x_3 变换到 x_1', x_2', x_3'.

定理2.4告诉我们, 在 CFT 中计算关联函数时, 三点及以下的关联函数都是与点的位置关系没有任何关系的: 我们可以用共性变换将之变成任何形状!

2.2 经典场的共形变换

比较自洽清楚地考虑经典场共形变换的方式是直接在一个一般的流形上面考虑 Weyl 变换, 将物质与引力场的耦合考虑进去.

$$S = \int -\frac{R}{16\pi} + S_{\text{matter}} \tag{2.2.1}$$

其中

$$S_{\text{matter}} = \int \mathcal{L}. \tag{2.2.2}$$

因为质量是和标度有关的, 因此只有无质量标量场具有标度不变性, 所以我们只考虑无质量标量场:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} g^{ab} \partial_a \phi \partial_b \phi, \tag{2.2.3}$$

为了方便计算, 我们在一个特定坐标系中展开, 有

$$S_{\text{matter}} = \int \mathrm{d}^d x \sqrt{-g} \frac{1}{2} g^{ab} \partial_a \phi \partial_b \phi. \tag{2.2.4}$$

我们需要首先确定在缩放中 ϕ 场的缩放情况, 由于我们要求系统具有共形变换不变性, 因此缩放不应当改变 S, 为了简单起见, 我们可以考虑全局缩放: $\Omega(x) = \text{const}$. 这里我们可能会质疑, S 差一个任意的常函数都是可以的, 不过显然全局缩放作用只能带来 S 值的缩放, 并不能令 S 多出任何项.

Weyl 变换并不改变坐标, 因此 $\mathrm{d}^d x$ 不变, $\partial_a \phi = d\phi_a$, 微分算子与度规无关因而也不变. 而 g 为 $g_{\mu\nu}$ 的行列式, g^{ab} 为 g_{ab} 的逆矩阵, 从 $g_{ab} \to \Omega^2 g_{ab}$ 有:

$$g \to \Omega^{2d} g, \tag{2.2.5}$$

$$g^{ab} \to \Omega^{-2} g^{ab}. \tag{2.2.6}$$

设 $\phi \to \Omega^{-\Delta} \phi$, 根据 $S' = S$ 我们有

$$\Omega^{d-2-2\Delta} = 1 \tag{2.2.7}$$

于是有

$$\Delta = \frac{d-2}{2}. \tag{2.2.8}$$

这就是 ϕ 场的缩放规律.

然后我们考虑局域的 Weyl 变换 $\Omega(x)$ 依赖于坐标, 考虑 $\mathcal{L}'$ 的变化, 我们有

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}\Omega^{-2}g^{ab}\partial_a(\Omega^{-\Delta}\phi)\partial_b(\Omega^{-\Delta}\phi) \tag{2.2.9}$$

$$= \frac{1}{2}\Omega^{-2-2\Delta}(\mathcal{L} + \frac{d-2}{2}\phi^2\nabla_a\nabla^a\ln\Omega + \frac{(d-2)^2}{4}\phi^2 g^{ab}\partial_a\ln\Omega\partial_b\ln\Omega). \tag{2.2.10}$$

由于 Ω 是局域的, 这导致 $\mathcal{L}'$ 并不是一个单纯的缩放, 从而导致 S 在 Weyl 变换下不再是不变的了. 这暗示我们需要添加新的项到 $\mathcal{L}$ 中, 使它的变换能够刚好抵消掉 $\Omega(x)$ 局域性带来的新项.

考虑到新项本身需要在全局 Weyl 变换中与修改前 $\mathcal{L}$ 的缩放比例是一致的: $\Omega^{-2-2\Delta}$, 因此可以期待, 它一定正比于 $g^{ab}\phi^2$. 剩下的任务就是寻找一个在全局 Weyl 变换下不变的量, 将之与 $g^{ab}\phi^2$ 缩并即可. 很容易发现, 我们手头唯一合适的张量就是 Ricci 张量. 因此我们不妨设修改后的 Lagrangian 为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}g^{ab}\partial_a\phi\partial_b\phi + \frac{1}{2}\xi R\phi^2, \tag{2.2.11}$$

其中 ξ 为某一个未定无量纲常数.

经过繁琐的计算 (具体过程见附录A.2) 我们有

$$R' = \Omega^{-2}\left(R - 2(d-1)\nabla^a\nabla_a\ln\Omega - (d-1)(d-2)\nabla^a\ln\Omega\nabla_a\ln\Omega\right). \tag{2.2.12}$$

于是我们有

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}\Omega^{-2-2\Delta}\Big\{\mathcal{L} + \frac{d-2}{2}\phi^2\nabla_a\nabla^a\ln\Omega + \frac{(d-2)^2}{4}\phi^2 g^{ab}\partial_a\ln\Omega\partial_b\ln\Omega$$
$$- \xi[2(d-1)\phi^2\nabla_a\nabla^a\ln\Omega + (d-1)(d-2)\phi^2 g^{ab}\nabla_a\ln\Omega\nabla_b\ln\Omega]\Big\}. \tag{2.2.13}$$

对比可得, 若

$$\xi = \frac{d-2}{4(d-1)} \tag{2.2.14}$$

则可以将含有 $\nabla_a \ln \Omega$ 的项全部消掉, 从而 $\mathcal{L}' = \Omega^{-2-2\Delta}\mathcal{L}$.

于是我们得出结论, 弯曲时空中的共形标量场 Lagrangian 为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}g^{ab}\partial_a\phi\partial_b\phi + \frac{d-2}{8(d-1)}R\phi^2. \tag{2.2.15}$$

利用附录A.1中的结论, 对 S_{matter} 变分, 利用定义1.1, 我们可以得到能动张量

$$T_{ab} = \partial_a\phi\partial_b\phi - \frac{1}{2}g_{ab}\partial_a\phi\partial^a\phi - \frac{d-2}{4(d-1)}\left(\nabla_a\nabla_b - g_{ab}\nabla_c\nabla^c\right)\phi^2 + \frac{d-2}{8(d-1)}\phi^2 G_{ab}. \tag{2.2.16}$$

取平直时空极限 $G_{ab} = 0$, 我们有

$$T_{ab} = \partial_a\phi\partial_b\phi - \frac{1}{2}g_{ab}\partial_a\phi\partial^a\phi - \frac{d-2}{4(d-1)}\left(\nabla_a\nabla_b - g_{ab}\nabla_c\nabla^c\right)\phi^2. \tag{2.2.17}$$

考虑平直时空, 将 Weyl 变换提升为共形变换, 加入对标量场的拉回推出映射, 考虑共形 Killing 矢量场 ξ^a 生成的无穷小变换, 我们有

$$\delta S_{\text{matter}} = \int \mathrm{d}^d x\sqrt{-g}\left(\omega\nabla_{(a}\xi_{b)}T^{ab} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi + \Pi^a\partial_a\delta\phi\right). \tag{2.2.18}$$

其中 ω 为无穷小变换参数, 而

$$\delta\phi = -\omega\xi^b\partial_b\phi - \frac{\Delta}{d}\partial_a\xi^a\phi, \Pi^a = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_a\phi)}. \tag{2.2.19}$$

化简得

$$\delta S_{\text{matter}} = \omega\int \mathrm{d}^d x\sqrt{-g}\partial_a(a\xi_{b)}T^{ab}. \tag{2.2.20}$$

而代入共形 Killing 方程, 我们有

$$\delta S_{\text{matter}} = \omega\int \mathrm{d}^d x\sqrt{-g}(2b\cdot x + \lambda)g_{ab}T^{ab}. \tag{2.2.21}$$

因此如果要共形变换不改变运动方程, 即 δS, 我们需要满足 $g_{ab}T^{ab} = 0$, 即能动张量无迹.

代入 T_{ab} 具体形式, 我们不难发现求出来的能动张量确实是无迹的. 从此我们认为能动张量无迹是一默认成立的假设.

2.3 共形量子场

进入量子场, 我们的首要任务是非微扰地定义一个共形量子场. 于是我们可以从如下几点考虑定义

1. 具有一个 Hilbert 空间.
2. 具有局域的场算符 (Local Operator), 即对于类空间隔 x_1, x_2, 有

$$[\phi(x_1), \phi(x_2)] = 0. \tag{2.3.1}$$

3. 具有共形对称性, 即能动张量不止满足 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$, 同时还满足无迹 $T^\mu{}_\mu = 0$. 并且我们可以在其上定义共形变换各生成元对应的荷算符, 即 $D, P_\mu, K_\mu, M_{\mu\nu}$.
4. 具有真空态 $|0\rangle$, 并且真空态中因为什么都没有, 具有最高对称性, 因此满足

$$Q\,|0\rangle = 0. \tag{2.3.2}$$

其中 Q 为各共形变换对应的荷算符.

接下来我们就围绕这几点定义进行进一步讨论. 首先对于第三点, 我们可以更进一步地定义共形变换对场算符的变换. 对于某个共形变换荷 G, 以及参数 ω, 我们定义其对场算符的共形变换为

$$\phi(x) \to \Lambda_G \phi = \mathrm{e}^{iG\omega}\phi(x)\mathrm{e}^{-iG\omega}. \tag{2.3.3}$$

而 $\Lambda_G\phi$ 这个则是直接利用经典场的变换得出的.

根据平移生成元的定义, 我们有

$$\mathrm{e}^{ip\cdot y}\phi(x)\mathrm{e}^{-ip\cdot y} = \phi(x+y). \tag{2.3.4}$$

注意: 这里指数上的正负号非常 subtle, 我们可能会疑惑为什么是到 $\phi(x+y)$ 而不是 $\phi(x-y)$, 不是说平移是将 $\phi(x-y)$ 处的场移动到 $\phi(x)$ 吗? 原因在于这里变换是将整个场算符 $\phi(x)$ 平移, 而不是将场量平移, 因此是场算符整体就变换为了 $x+y$ 处的场算符.

对于无穷小变换 $y \to 0$, 我们可以得到对易子

$$i[p_\mu, \phi] = \partial_\mu \phi. \tag{2.3.5}$$

于是

$$[p_\mu, \phi(x)] = -i\partial_\mu \phi(x). \tag{2.3.6}$$

类似地, 对于任意自旋的场, 设其自旋算符为 $S_{\mu\nu}$, 则利用

$$\mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega^{\mu\nu}M_{\mu\nu}}\phi(x)\mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega^{\mu\nu}M_{\mu\nu}} = \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega^{\mu\nu}S_{\mu\nu}}\phi(\Lambda^\mu{}_\nu x^\nu), \tag{2.3.7}$$

我们有

$$[M_{\mu\nu}, \phi(x)] = i(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)\phi(x) + S_{\mu\nu}\phi(x). \tag{2.3.8}$$

对于 Dilation, 根据

$$\mathrm{e}^{i\lambda D}\phi(x)\mathrm{e}^{-i\lambda D} = \mathrm{e}^{\Delta\lambda}\phi(\mathrm{e}^\lambda x) \tag{2.3.9}$$

于是有对易子

$$[D, \phi(x)] = -i(x\cdot\partial + \Delta)\phi(x). \tag{2.3.10}$$

对于 SCT, 根据

$$\begin{aligned}(1+iKb)\phi(x)(1-iKb) = (1+2\Delta b\cdot x)(1+i(b_\nu x_\mu - x_\nu b_\mu)S^{\mu\nu}) \\ \phi(x^\mu + 2(b\cdot x)x^\mu - x^2 b^\mu)\end{aligned} \tag{2.3.11}$$

我们有

$$[K_\mu, \phi(x)] = -i(2x_\mu x^\nu - x^2\partial_\mu + 2\Delta x_\mu)\phi(x) - 2S_{\mu\nu}x^\nu\phi(x). \tag{2.3.12}$$

然后考虑各变换的复合, 我们有生成元之间的对易关系.

定理 2.5 (共形代数)

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i(-g^{\mu\rho}M^{\nu\sigma} - g^{\sigma\nu}M^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}M^{\mu\sigma}), \tag{2.3.13}$$

$$[M_{\mu\nu}, p_\rho] = -i(g_{\mu\rho}p_\nu - g_{\rho\nu}p_\mu), \tag{2.3.14}$$

$$[M_{\mu\nu}, K_\rho] = -i(g_{\mu\rho}K_\nu - g_{\rho\nu}K_\mu), \tag{2.3.15}$$

$$[p_\mu, D] = ip_\mu, \tag{2.3.16}$$

$$[K_\mu, D] = -iK_\mu, \tag{2.3.17}$$

$$[p_\mu, K_\nu] = 2i(M_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}D). \tag{2.3.18}$$

定理 2.6 对于旋转对称群 $\cong SO(m,n)$ 的流形, 其共形变换对称群 $\cong SO(m+1, n+1)$.

证明. 原本度规为 $g_{\mu\nu}$, 设一个新的 $m+n+2$ 维的度规

$$\bar{g}_{MN} = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu + \mathrm{d}x^M\mathrm{d}x^M - \mathrm{d}x^N\mathrm{d}x^N, \tag{2.3.19}$$

其旋转对称群的 Lie 代数对易满足

$$[L^{\mu\nu}, L^{\rho\sigma}] = i(-g^{\mu\rho}L^{\nu\sigma} - g^{\sigma\nu}L^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}L^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}L^{\mu\sigma}). \tag{2.3.20}$$

如果令

$$\begin{cases} D = L_{MN} = -L^{MN}, \\ p^\mu = L^{M\mu} - L^{N\mu}, \\ K^\mu = L^{M\mu} + L^{N\mu}, \\ M^{\mu\nu} = L^{\mu\nu}. \end{cases} \tag{2.3.21}$$

则可以使其满足全部的共形代数对易关系!

3 关联函数

在 CFT 中我们定义关联函数

定义 3.1 (关联函数)

$$\langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle \equiv \langle 0 | \phi_1 \cdots \phi_n | 0 \rangle \,. \tag{3.0.1}$$

3.1 Ward Identity 及其应用

我们知道

$$Q \left| 0 \right\rangle = 0, \langle 0 | \, Q = 0. \tag{3.1.1}$$

因此对于一串关联函数我们有

$$\langle 0 | [Q, \phi_1 \cdots \phi_n] | 0 \rangle = 0. \tag{3.1.2}$$

将对易子展开我们就有

定理 3.1 (Ward Identity)

$$\sum_i \langle 0 | \phi_1 \cdots [Q, \phi_i] \phi_{i+1} \cdots \phi_n | 0 \rangle = 0. \tag{3.1.3}$$

利用 Ward 等式我们可以尝试计算两点关联函数,

$$C(x_1, x_2) \equiv \langle \phi_1(x_1) \phi_2(x_2) \rangle \,. \tag{3.1.4}$$

其中, ϕ_1, ϕ_2 我们认为是两个不同的场, 它们的 Dilation 变换次数分别为 Δ_1, Δ_2.

我们首先考虑平移对称性, 由于

$$C(x_1 + a, x_2 + a) = \langle 0 | \mathrm{e}^{ipa} \phi_1 \mathrm{e}^{-ipa} \mathrm{e}^{ipa} \phi_2 \mathrm{e}^{-ipa} | 0 \rangle \,. \tag{3.1.5}$$

由于

$$\mathrm{e}^{ipa} \left| 0 \right\rangle = \left| 0 \right\rangle \tag{3.1.6}$$

所以

$$C(x_1+a, x_2+a) = \langle 0|\phi_1\phi_2|0\rangle = C(x_1, x_2). \tag{3.1.7}$$

所以我们得出结论

$$C(x_1, x_2) = C(x_1 - x_2). \tag{3.1.8}$$

再考虑旋转对称性, 由于

$$C(\Lambda(x_1-x_2)) = \langle \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}\phi_1\mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}\mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}\phi_2\mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}\rangle \tag{3.1.9}$$

$$= \langle 0|\phi_1\phi_2|0\rangle = C(x_1-x_2), \tag{3.1.10}$$

所以

$$C(x_1-x_2) = C(|x_1-x_2|). \tag{3.1.11}$$

再考虑 Dilation, 我们有

$$\lambda^{\Delta_1+\Delta_2}C(\lambda|x_1-x_2|) = \langle \lambda^{\Delta_1}\phi_1(\lambda x_1)\lambda^{\Delta_2}\phi_2(\lambda x_2)\rangle \tag{3.1.12}$$

$$= \langle 0|\mathrm{e}^{i\lambda D_1}\phi_1(x_1)\mathrm{e}^{-i\lambda D_1}\mathrm{e}^{i\lambda D_2}\phi_2(x_2)\mathrm{e}^{-i\lambda D_2}|0\rangle \tag{3.1.13}$$

$$= \langle 0|\phi_1(x_1)\mathrm{e}^{-i\lambda D_1}\mathrm{e}^{i\lambda D_2}\phi_2(x_2)|0\rangle \tag{3.1.14}$$

考虑 $\phi_1(x_1)\mathrm{e}^{-i\lambda D_1}\mathrm{e}^{i\lambda D_2}\phi_2(x_2)$, 由于 D_1 是作用在 ϕ_1 场上的, 对 $\mathrm{e}^{i\lambda D_2}\phi_2(x_2)$ 这样一个纯的对 ϕ_2 场的作用不起作用, 因此

$$\phi_1(x_1)\mathrm{e}^{-i\lambda D_1}\mathrm{e}^{i\lambda D_2}\phi_2(x_2) = \phi_1(x_1)\mathrm{e}^{i\lambda D_2}\phi_2(x_2). \tag{3.1.15}$$

同理,

$$\phi_1(x_1)\mathrm{e}^{i\lambda D_2} = \phi_1(x_1). \tag{3.1.16}$$

于是最终我们得到结果

$$\lambda^{\Delta_1+\Delta_2}C(\lambda|x_1-x_2|) = \langle\phi_1\phi_2\rangle = C(|x_1-x_2|). \tag{3.1.17}$$

这是一个很轻的约束, 直接要求了 C 是一个齐次函数, 并且

$$C(|x_1-x_2|) = \frac{C}{|x_1-x_2|^{\Delta_1+\Delta_2}}. \tag{3.1.18}$$

最后考虑 SCT, 我们考虑无穷小变换, 为了简单起见, 我们直接设

$$C(|x_1 - x_2|) = C(x_2) = \langle \phi_1(0)\phi_2(x_2)\rangle \tag{3.1.19}$$

, 代入 Ward Identity, 我们有

$$(2x_{2\mu}x_2 \cdot \partial_2 - x_2^2\partial_{2\mu} + 2\Delta_2 x_{2\mu})C(x_2) = 0. \tag{3.1.20}$$

代入验证我们发现这等价于要求

$$(\Delta_1 - \Delta_2)C = 0. \tag{3.1.21}$$

因此, 如果想要一个非平凡的关联函数, 必须要求

$$\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta. \tag{3.1.22}$$

从而有最终的两点关联函数形式

$$C(x_1, x_2) = \frac{C}{|x_1 - x_2|^{2\Delta}}. \tag{3.1.23}$$

A 度规场变换下各量的变换

A.1 无穷小变换下各量的变换

考虑无穷小变换

$$\tilde{g}_{ab} = g_{ab} + \delta g_{ab}. \tag{A.1.1}$$

所有变换后的量 X 都记为 $\tilde{X}$.

我们首先考虑 δg_{ab} 与 δg^{ab} 的关系. 利用

$$\delta^a{}_b = g^{ac} g_{cb} = (g^{ac} + \delta g^{ac})(g_{cb} + \delta g_{cb}). \tag{A.1.2}$$

我们有

$$\delta g^{ac} g_{cb} + \delta g_{bc} g^{ac} = 0. \tag{A.1.3}$$

然后考虑 g 在 $g^{ab} \to g^{ab} + \delta g^{ab}$ 下的变换. 利用线性代数知识我们知道

$$g^{\mu\nu} = \frac{A^{\mu\nu}}{g}, \tag{A.1.4}$$

其中 $A^{\mu}\nu$ 为 $g_{\mu\nu}$ 的代数余子式. 利用代数余子式我们还可以在特定行展开写出 g 的表达式:

$$g = A^{\mu\lambda} g_{\mu\lambda}. \tag{A.1.5}$$

其中 μ 是固定不动的, λ 才遵循 Einstein 求和约定. 于是我们有

$$\frac{\partial g}{\partial g_{\mu\nu}} = A^{\mu\nu} = g g^{\mu\nu}. \tag{A.1.6}$$

于是

$$\delta g = g g^{ab} \delta g_{ab} = -g g_{ab} \delta g^{ab}. \tag{A.1.7}$$

然后我们计算 δR_{ab}. 我们设变换后的与 $\tilde{g}_{ab}$ 适配的微分算子为 $\tilde{\nabla}$: $\tilde{\nabla} g_{ab} = 0$. 并且设 ∇ 与 $\tilde{\nabla}$ 间相差一个联络

$$\tilde{\nabla}_a \omega_b = \nabla_a \omega_b - C^c{}_{ab} \omega_c. \tag{A.1.8}$$

不难计算得到

$$C^d{}_{ab} = \frac{1}{2} \tilde{g}^{cd} \left(\nabla_b \tilde{g}_{ac} + \nabla_a \tilde{g}_{bc} - \nabla_c \tilde{g}_{ab} \right) \tag{A.1.9}$$

$$= \frac{1}{2} g^{cd} \left(\nabla_b \delta g_{ac} + \nabla_a \delta g_{bc} - \nabla_c \delta g_{ab} \right). \tag{A.1.10}$$

根据

$$R_{acb}{}^d \omega_d = 2 \nabla_{[a} \nabla_{c]} \omega_b \tag{A.1.11}$$

$$\tilde{R}_{acb}{}^d \omega_d = 2 \tilde{\nabla}_{[a} \nabla \nabla_{c]} \omega_b. \tag{A.1.12}$$

做差可得

$$\delta R_{acb}{}^d \omega_d = 2 \tilde{\nabla}_{[a} \nabla \nabla_{c]} \omega_b - 2 \nabla_{[a} \nabla_{c]} \omega_b \tag{A.1.13}$$

$$= (-2 \nabla_{[a} C^d{}_{c]b} + 2 C^e{}_{b[a} C^d{}_{c]e}) \omega_d. \tag{A.1.14}$$

于是

$$\delta R_{acb}{}^d = -2 \nabla_{[a} C^d{}_{c]b} + 2 C^e{}_{b[a} C^d{}_{c]e}. \tag{A.1.15}$$

由于 $C^d{}_{ac} \propto \delta g$, 因此在无穷小变换中, 上式的第二项为高阶无穷小可略去, 于是有

$$\delta R_{acb}{}^d = -2 \nabla_{[a} C^d{}_{c]b}, \tag{A.1.16}$$

从而

$$\delta R_{ab} = -2 \nabla_{[a} C^d{}_{d]b} = \frac{1}{2} \nabla^c \nabla_a \delta g_b c + \frac{1}{2} \nabla^c \nabla_b \delta g_{ac} - \frac{1}{2} g^{cd} \nabla_a \nabla_b \delta g_{cd} - \frac{1}{2} \nabla^c \nabla_c \delta g_{ab}. \tag{A.1.17}$$

于是有

$$g^{ab} \delta R_{ab} = \left(g_{ab} \nabla^c \nabla_c - \nabla_a \nabla_b \right) \delta g^{ab} = \nabla_a \left(g_{cd} \nabla^a \delta g^{cd} - \nabla_b \delta g^{ab} \right). \tag{A.1.18}$$

A.2 有限大局域 Weyl 变换下各量的变换

考虑 $g_{ab} \to \tilde{g}_{ab} = \Omega(x)^2 g_{ab}$ 的 Weyl 变换. 类似上节的推导我们有

$$C^d{}_{ab} = 2\delta^d_{(a}\nabla_{b)}\ln\Omega - g^{cd}g_{ab}\nabla_c \ln\Omega. \tag{A.2.1}$$

于是计算可得

$$g^{ab}\delta R_{ab} = -2(d-1)\nabla^a\nabla_a \ln\Omega - (d-1)(d-2)\nabla^a \ln\Omega\nabla_a \ln\Omega. \tag{A.2.2}$$

从而有

$$\tilde{R} = \Omega^{-2}g^{ab}R_{ab} + \Omega^{-2}g^{ab}\delta R_{ab} \tag{A.2.3}$$

$$= \Omega^{-2}\left(R - 2(d-1)\nabla^a\nabla_a \ln\Omega - (d-1)(d-2)\nabla^a \ln\Omega\nabla_a \ln\Omega\right). \tag{A.2.4}$$

参考文献

[1] Pierre Mathieu Philippe DiFrancesco and David Senechal. *Conformal Field Theory*. Springer, 1997.

[2] 梁灿彬 and 周彬. *微分几何入门与广义相对论 (下册·第二版)*. 科学出版社, 2009.

[3] 梁灿彬 and 周彬. *微分几何入门与广义相对论 (中册·第二版)*. 科学出版社, 2009.