

# Entrega Ejercicios Microcredencial

Arturo Olivares Martos

14 de marzo de 2025

## Resumen

En el presente documento, resolveremos diversos ejercicios de cada uno de los temas vistos en la Microcredencial de Lógica y Teoría Descriptiva de Conjuntos.

## Índice

1. Lógica Proposicional	2
-------------------------	---

---

# 1. Lógica Proposicional

**Ejercicio 1.2.** Demuestra que las siguientes proposiciones son tautologías.

1. Ley de doble negación:  $\neg\neg a \rightarrow a$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{\neg\neg a\} \models a.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(\neg\neg a) = 1$ . Entonces:

$$1 = I(\neg\neg a) = 1 + I(\neg a) = 1 + 1 + I(a) = 2 + I(a) = I(a)$$

Por tanto,  $I(a) = 1$ , y por lo tanto,  $\{\neg\neg a\} \models a$ .

2. Leyes de simplificación:

- a)  $(a \wedge b) \rightarrow a$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{a \wedge b\} \models a.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(a \wedge b) = 1$ . Entonces:

$$1 = I(a \wedge b) = I(a)I(b)$$

Por ser  $\mathbb{Z}_2$  un cuerpo, en particular es un DI. Si fuese  $I(a) = 0$ , entonces  $I(a)I(b) = 0$ , lo cual es una contradicción. Por tanto,  $I(a) = 1$ , y por lo tanto,  $\{a \wedge b\} \models a$ .

- b)  $a \rightarrow (a \vee b)$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{a\} \models a \vee b.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(a) = 1$ . Entonces:

$$I(a \vee b) = I(a) + I(b) + I(a)I(b) = 1 + I(b) + I(b) = 1 + 2I(b) = 1$$

Por tanto,  $\{a\} \models a \vee b$ .

3. Ley de conmutatividad de la conjunción:  $(a \wedge b) \rightarrow (b \wedge a)$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{a \wedge b\} \models b \wedge a.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(a \wedge b) = 1$ . Entonces:

$$1 = I(a \wedge b) = I(a)I(b) \stackrel{(*)}{=} I(b)I(a) = I(b \wedge a)$$

donde en  $(*)$  se usa la conmutatividad de la multiplicación en  $\mathbb{Z}_2$ . Por tanto,  $\{a \wedge b\} \models b \wedge a$ .

- 
4. Ley de conmutatividad de la disyunción:  $(a \vee b) \rightarrow (b \vee a)$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{a \vee b\} \models b \vee a.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(a \vee b) = 1$ . Entonces:

$$I(a \vee b) = I(a) + I(b) + I(a)I(b) \stackrel{(*)}{=} I(b) + I(a) + I(b)I(a) = I(b \vee a)$$

donde en  $(*)$  se usa la conmutatividad de la suma y la multiplicación en  $\mathbb{Z}_2$ .

Por tanto,  $\{a \vee b\} \models b \vee a$ .

5. Ley de Clavius:  $(\neg a \rightarrow a) \rightarrow a$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{\neg a \rightarrow a\} \models a.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(\neg a \rightarrow a) = 1$ . Entonces:

$$\begin{aligned} 1 &= I(\neg a \rightarrow a) = 1 + I(\neg a) + I(\neg a)I(a) = 1 + 1 + I(a) + (1 + I(a))I(a) = \\ &= I(a) + I(a) + I(a) = I(a) \end{aligned}$$

Por tanto,  $\{\neg a \rightarrow a\} \models a$ .

6. Ley de De Morgan:  $\neg(a \wedge b) \rightarrow (\neg a \vee \neg b)$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{\neg(a \wedge b)\} \models \neg a \vee \neg b.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(\neg(a \wedge b)) = 1$ . Entonces:

$$1 = I(\neg(a \wedge b)) = 1 + I(a \wedge b) = 1 + I(a)I(b) \implies 0 = I(a)I(b)$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} I(\neg a \vee \neg b) &= I(\neg a) + I(\neg b) + I(\neg a)I(\neg b) = 1 + I(a) + 1 + I(b) + (1 + I(a))(1 + I(b)) = \\ &= 1 + \cancel{I(a)} + 1 + \cancel{I(b)} + 1 + \cancel{I(a)} + \cancel{I(b)} + I(a)I(b) = 1 + I(a)I(b) = 1 \end{aligned}$$

Por tanto,  $\{\neg(a \wedge b)\} \models \neg a \vee \neg b$ .

7. Segunda ley de De Morgan:  $\neg(a \vee b) \rightarrow (\neg a \wedge \neg b)$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{\neg(a \vee b)\} \models \neg a \wedge \neg b.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(\neg(a \vee b)) = 1$ . Entonces:

$$1 = I(\neg(a \vee b)) = 1 + I(a \vee b) = 1 + I(a) + I(b) + I(a)I(b)$$

Por tanto:

$$I(\neg a \wedge \neg b) = I(\neg a)I(\neg b) = (1 + I(a))(1 + I(b)) = 1 + I(a) + I(b) + I(a)I(b) = 1$$

Por tanto,  $\{\neg(a \vee b)\} \models \neg a \wedge \neg b$ .

- 
8. Ley de inferencia alternativa:  $((a \vee b) \wedge \neg a) \rightarrow b$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{(a \vee b) \wedge \neg a\} \models b.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I((a \vee b) \wedge \neg a) = 1$ . Entonces:

$$\begin{aligned} 1 &= I((a \vee b) \wedge \neg a) = I(a \vee b)I(\neg a) = (I(a) + I(b) + I(a)I(b)) (1 + I(a)) = \\ &= \cancel{I(a)} + I(b) + I(a)I(b) + \cancel{I(a)} + \cancel{I(a)I(b)} + \cancel{I(a)I(b)} = \\ &= I(b)(1 + I(a)) \end{aligned}$$

Si fuese  $I(b) = 0$ , entonces  $I(b)(1 + I(a)) = 0$ , lo cual es una contradicción. Por tanto,  $I(b) = 1$ , y por lo tanto,  $\{(a \vee b) \wedge \neg a\} \models b$ .

9. Segunda ley de inferencia alternativa:  $((a \vee b) \wedge \neg b) \rightarrow a$ .

Se tiene de forma directa por el apartado anterior (intercambiando los papeles de  $a$  y  $b$ ). La demostración es análoga empleando la conmutatividad de  $\mathbb{Z}_2$ .

10. Modus ponendo ponens:  $((a \rightarrow b) \wedge a) \rightarrow b$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{(a \rightarrow b) \wedge a\} \models b.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I((a \rightarrow b) \wedge a) = 1$ . Entonces:

$$\begin{aligned} 1 &= I((a \rightarrow b) \wedge a) = I(a \rightarrow b)I(a) = (1 + I(a) + I(a)I(b)) I(a) = \\ &= I(a) + I(a) + I(a)I(b) = I(a)I(b) \end{aligned}$$

Si fuese  $I(b) = 0$ , entonces  $I(a)I(b) = 0$ , lo cual es una contradicción. Por tanto,  $I(b) = 1$ , y por lo tanto,  $\{(a \rightarrow b) \wedge a\} \models b$ .

11. Modus tollendo tollens:  $((a \rightarrow b) \wedge \neg b) \rightarrow \neg a$ .

Por el Teorema de la Deducción, esto equivale a demostrar:

$$\{(a \rightarrow b) \wedge \neg b\} \models \neg a.$$

Sea  $I$  una interpretación tal que  $I((a \rightarrow b) \wedge \neg b) = 1$ . Entonces:

$$\begin{aligned} 1 &= I((a \rightarrow b) \wedge \neg b) = I(a \rightarrow b)I(\neg b) = (1 + I(a) + I(a)I(b)) (1 + I(b)) = \\ &= 1 + I(a) + I(a)I(b) + I(b) + \cancel{I(a)I(b)} + \cancel{I(a)I(b)} = \\ &= 1 + I(a) + I(b) + I(a)I(b) = \\ &= (1 + I(b)) + I(a)(1 + I(b)) = (1 + I(a))(1 + I(b)) \end{aligned}$$

Si fuese  $1 + I(a) = 0$ , entonces  $(1 + I(a))(1 + I(b)) = 0$ , lo cual es una contradicción. Por tanto,  $1 + I(a) = 1 = I(\neg a)$ . Por tanto,  $\{(a \rightarrow b) \wedge \neg b\} \models \neg a$ .

---

**Ejercicio 1.3.** Dado un conjunto de proposiciones  $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$ . Si  $\Gamma \cup \{\alpha\} \models \beta$ , entonces  $\Gamma \models \alpha \rightarrow \beta$ .

Notemos que en este caso tan solo tenemos una de las implicaciones del Teorema de la Deducción. Sea  $I$  una interpretación tal que  $I(\gamma) = 1$  para todo  $\gamma \in \Gamma$ .

- Si  $I(\alpha) = 1$ , como  $\Gamma \cup \{\alpha\} \models \beta$ , entonces  $I(\beta) = 1$ . Por tanto:

$$I(\alpha \rightarrow \beta) = 1 + I(\alpha) + I(\alpha)I(\beta) = 1 + 1 + 1 = 1$$

- Si  $I(\alpha) = 0$ , entonces:

$$I(\alpha \rightarrow \beta) = 1 + I(\alpha) + I(\alpha)I(\beta) = 1 + 0 + 0 = 1$$

Por tanto,  $\Gamma \models \alpha \rightarrow \beta$ .

**Ejercicio 1.4.** El señor Pérez, empadronador de la isla de Tururulandia, tiene como objetivo el censar la población de dicha isla. La tarea no es fácil debido al hecho de que la población se divide en dos grupos bien distinguidos: los honrados y los embusteros. Los honrados siempre dicen la verdad, mientras que un embustero solo es capaz de producir mentiras. El gobierno de la isla encarga como trabajo al señor Pérez la ardua tarea de contar los honrados y embusteros de la isla. He aquí cuatro de los muchos problemas con los que se encontró nuestro empadronador.

1. Llama a la puerta de una casa, en la que sabía a ciencia cierta que vivía un matrimonio, y el marido abre la puerta para ver quién es. El empadronador le dice: “necesito información sobre usted y su esposa. ¿Cuál de ustedes, si alguno lo es, es honrado y cuál un embustero?,” a lo que el hombre de la casa respondió “ambos somos embusteros,” cerrando la puerta de golpe. ¿Qué es el marido y qué es la mujer?
2. La segunda casa que visita también está habitada por un matrimonio. Al llamar a la puerta y formular la misma pregunta que antes, el marido responde: “Por lo menos uno de nosotros es un embustero,” cerrando a continuación la puerta. ¿Qué es el marido y qué es la mujer?
3. Visita una tercera casa, y en las mismas condiciones de antes, recibe la respuesta: “Si yo soy honrado, entonces mi mujer también lo es.” ¿Qué es el marido y qué es la mujer?
4. En la última casa que visita, pues ya estaba cansado de partirse el coco, la respuesta es “Yo soy lo mismo que mi mujer.” ¿Qué es el marido y qué es la mujer?
5. De vuelta a su casa se encuentra con tres individuos, A, B y C, en la calle, y pensando en que quizás podía tener más suerte con ellos decide preguntarles qué son cada uno de ellos. Le pregunta al primero, A, y no entiende la respuesta, ya que en ese momento pasa una de esas motos que hacen un ruido ensordecedor y no corren nada. El segundo, B, le aclara que lo que ha dicho el primero es que es un embustero, pero el tercero, C, le advierte que no haga caso del segundo, B, ya que es un embustero. ¿Puedes deducir algo de lo ocurrido?