

# Álgebra II

## Examen I

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Álgebra II

## Examen I

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Arturo Olivares Martos

Granada, 2025

**Asignatura** Álgebra II.

**Curso Académico** 2017-18.

**Grado** Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

**Grupo** Único.

**Descripción** Parcial I.

**Fecha** Octubre de 2017.

**Ejercicio 1.**

1. Demostrar que en un grupo de orden par el número de elementos de orden 2 es impar.
2. Describe dos grupos de orden 6 que sean isomorfos y otros dos que no lo sean. Razona la respuesta.

**Ejercicio 2.** Razona cual es la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones:

1. Dados grupos  $G$  y  $H$ :
  - a) Si tienen el mismo orden son isomorfos.
  - b) Si son isomorfos tienen el mismo orden.
  - c) Si se pueden generar por el mismo número de elementos son isomorfos.
2. Elije la opción correcta:
  - a) En  $D_4$  todos los elementos tienen orden par.
  - b)  $D_4$  y  $S_4$  son grupos isomorfos.
  - c) Salvo isomorfismo,  $D_4$  es el único grupo no abeliano de orden 8.
3. Si  $f : G \rightarrow H$  es un homomorfismo de grupos, entonces:
  - a)  $O(x)$  divide a  $O(f(x)) \forall x \in G$ .
  - b)  $O(f(x))$  divide a  $O(x) \forall x \in G$ .
  - c)  $O(x) = O(f(x)) \forall x \in G$ .
4. Dadas las permutaciones  $\alpha = (236)(657134)$ ,  $\beta = (2473) \in S_{10}$  se tiene que  $\beta\alpha\beta^{-1}$ :
  - a) Es par.
  - b) Su orden es 12.
  - c) Es un ciclo de longitud 7.
5. Si  $\mu_6$  denota el grupo de las raíces sextas de la unidad, entonces:
  - a)  $\mu_6 \cong C_6$ .
  - b)  $\mu_6 \cong S_3$ .
  - c)  $\mu_6 \cong D_6$ .
6. En  $S_4$  se tiene que:
  - a)  $\{(12), (34)\}$  es un conjunto de generadores.
  - b)  $\{(1234)\}$  es un conjunto de generadores.
  - c)  $\{(12), (23), (34)\}$  es un conjunto de generadores.
7. Sea  $G$  un grupo y  $f : G \rightarrow G$  la aplicación dada por  $f(x) = x^{-1}$ . Entonces:

- a)  $f$  es un homomorfismo de grupos.
  - b)  $f$  es un automorfismo.
  - c) Si  $f$  es un homomorfismo entonces  $G$  es abeliano.
- 8. Para cualquier permutación  $\sigma \in S_n$ , si  $\varepsilon(\sigma)$  denota su signo o paridad, se tiene:
  - a)  $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$ .
  - b)  $\varepsilon(\sigma) = -\varepsilon(\sigma^{-1})$ .
  - c) Ninguna de las anteriores.
- 9. Cualquier permutación  $\sigma \in S_n$ :
  - a) Se descompone de forma única como producto de trasposiciones.
  - b) Es producto de trasposiciones.
  - c) Se descompone de forma única como producto de trasposiciones disjuntas.
- 10. El grupo  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$  de matrices invertibles  $2 \times 2$  con entradas en  $\mathbb{Z}_2$ :
  - a) Es un grupo no abeliano de orden 8.
  - b) Es un grupo isomorfo a  $Z_6$ .
  - c) Es un grupo isomorfo a  $S_3$ .

**Ejercicio 1.**

1. Demostrar que en un grupo de orden par el número de elementos de orden 2 es impar.

En primer lugar, dado un grupo arbitrario  $G$  y fijado  $k \in \mathbb{N}$ , se define el conjunto siguiente:

$$G_k = \{x \in G \mid O(x) = k\}$$

Sabemos que  $G_1 = \{1\}$ . Ahora, vamos a ver que el orden de  $G_k$  para todo  $k \geq 3$  es par. Dado  $x \in G$  con  $O(x) = k$ , entonces  $O(x^{-1}) = k$  y  $x^{-1} = x^{k-1}$ . Para  $k \geq 3$ , se tiene además que  $x \neq x^{-1}$ . Por tanto, para cada  $x \in G_k$  con  $k \geq 3$ , se tiene que  $x \neq x^{-1}$  y  $x^{-1} \in G_k$ , por lo que los elementos de  $G_k$  van por pares y, por tanto,  $|G_k|$  es par.

Supongamos ahora nuestra hipótesis,  $G$  un grupo de orden par (en particular, finito). Por tanto, todo elemento de  $G$  tiene orden finito y  $G$  se descompone en grupos disjuntos como sigue:

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k = \{1\} \cup G_2 \cup \left( \bigcup_{k=3}^{\infty} G_k \right)$$

Considerando cardinales, puesto que son disjuntos, se tiene que:

$$|G_2| = |G| - 1 - \sum_{k=3}^{\infty} |G_k|$$

Como  $|G|$  es par y  $|G_k|$  es par para todo  $k \geq 3$ , se tiene que  $|G_2|$  es impar. Por tanto, el número de elementos de orden 2 en un grupo de orden par es impar.

2. Describe dos grupos de orden 6 que sean isomorfos y otros dos que no lo sean. Razona la respuesta.

En un ejercicio, vimos que todo grupo de orden 6 o es cíclico o es isomorfo a  $D_3$ . Consideramos por tanto los grupos siguientes:

$$C_6 \not\cong D_3 \cong S_3$$

Sabemos que  $C_6$  es conmutativo y  $S_3$  no, por lo que  $C_6 \not\cong S_3$  y por tanto  $D_3 \cong S_3$ .

**Ejercicio 2.** Razona cual es la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones:

1. Dados grupos  $G$  y  $H$ :

a) Si tienen el mismo orden son isomorfos.

No es correcta, pues  $D_3 \not\cong C_6$  y ambos tienen orden 6.

b) Si son isomorfos tienen el mismo orden.

Correcta, pues si todo isomorfismo en particular es una biyección. Por tanto, si  $G \cong H$  entonces  $|G| = |H|$ .

c) Si se pueden generar por el mismo número de elementos son isomorfos.

No es correcta, pues  $D_3 \not\cong D_4$  y ambos se generan por dos elementos.

Por tanto, la opción correcta es la **b**).

2. Elije la opción correcta:

a) En  $D_4$  todos los elementos tienen orden par.

Sabemos que  $O(1) = 1$ , luego es incorrecta.

b)  $D_4$  y  $S_4$  son grupos isomorfos.

Falso, pues  $|D_4| = 8 \neq 24 = |S_4|$ .

c) Salvo isomorfismo,  $D_4$  es el único grupo no abeliano de orden 8.

Consideramos el grupo de los cuaternios  $Q_2$ . Tenemos que:

$$ij = k \neq -k = ji$$

Por tanto,  $Q_2$  no es abeliano, y  $|Q_2| = 8$ . Veamos que no es isomorfo a  $D_4$ . Los órdenes de los elementos de  $Q_2$  son:

$$O(1) = 1, \quad O(-1) = 2, \quad O(\pm i) = O(\pm j) = O(\pm k) = 4$$

Los órdenes de los elementos de  $D_4$  son:

$$\begin{aligned} O(1) &= 1, & O(r) &= O(r^3) = 4 \\ O(r^2) &= O(s) = O(sr) = O(sr^2) = O(sr^3) = 2 \end{aligned}$$

Por tanto,  $Q_2 \not\cong D_4$  y ambos son no abelianos y de orden 8. Por tanto, es incorrecta.

Por tanto, no hay ninguna opción correcta.

3. Si  $f : G \rightarrow H$  es un homomorfismo de grupos, entonces:

a)  $O(x)$  divide a  $O(f(x)) \forall x \in G$ .

b)  $O(f(x))$  divide a  $O(x) \forall x \in G$ .

c)  $O(x) = O(f(x)) \forall x \in G$ .

4. Dadas las permutaciones  $\alpha = (236)(657134)$ ,  $\beta = (2473) \in S_{10}$  se tiene que  $\beta\alpha\beta^{-1}$ :

a) Es par.

b) Su orden es 12.

c) Es un ciclo de longitud 7.

5. Si  $\mu_6$  denota el grupo de las raíces sextas de la unidad, entonces:

- a)  $\mu_6 \cong C_6$ .
  - b)  $\mu_6 \cong S_3$ .
  - c)  $\mu_6 \cong D_6$ .
6. En  $S_4$  se tiene que:
- a)  $\{(1\ 2), (3\ 4)\}$  es un conjunto de generadores.
  - b)  $\{(1\ 2\ 3\ 4)\}$  es un conjunto de generadores.
  - c)  $\{(1\ 2), (2\ 3), (3\ 4)\}$  es un conjunto de generadores.
7. Sea  $G$  un grupo y  $f : G \rightarrow G$  la aplicación dada por  $f(x) = x^{-1}$ . Entonces:
- a)  $f$  es un homomorfismo de grupos.
  - b)  $f$  es un automorfismo.
  - c) Si  $f$  es un homomorfismo entonces  $G$  es abeliano.
8. Para cualquier permutación  $\sigma \in S_n$ , si  $\varepsilon(\sigma)$  denota su signo o paridad, se tiene:
- a)  $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$ .
  - b)  $\varepsilon(\sigma) = -\varepsilon(\sigma^{-1})$ .
  - c) Ninguna de las anteriores.
9. Cualquier permutación  $\sigma \in S_n$ :
- a) Se descompone de forma única como producto de trasposiciones.
  - b) Es producto de trasposiciones.
  - c) Se descompone de forma única como producto de trasposiciones disjuntas.
10. El grupo  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$  de matrices invertibles  $2 \times 2$  con entradas en  $\mathbb{Z}_2$ :
- a) Es un grupo no abeliano de orden 8.
  - b) Es un grupo isomorfo a  $Z_6$ .
  - c) Es un grupo isomorfo a  $S_3$ .