

Topología I

Examen III

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología I

Examen III

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2023-2024

Asignatura Topología I.

Curso Académico 2023-24.

Grado Grado en Matemáticas.

Grupo B.

Profesor Miguel Ortega Titos.

Descripción Parcial 1.

Fecha 30 de octubre de 2023.

En \mathbb{R} , se considera la topología de Sorgenfrey, \mathcal{T}_S . En \mathbb{R}^2 , se considera la topología producto $\mathcal{T} = \mathcal{T}_S \times \mathcal{T}_S$.

Ejercicio 1. Dado el conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1, x + y \leq 0\}$, calcula:

1. (2 puntos) El interior de A .

Representemos en primer lugar el conjunto A :




Figura 1: Representación de A .

Tenemos que, dado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, una base de entornos de (x, y) en $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T})$ es:

$$\beta_{(x,y)} = \{[x, x + \varepsilon[\times [y, y + \varepsilon'[\mid \varepsilon, \varepsilon' \in \mathbb{R}^+\}$$

Por tanto, demostraremos que $A^\circ = \tilde{A}$, con:

$$\tilde{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1, x + y < 0\}$$

⊃) Veamos en primer lugar que $\mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}$. Una base de \mathcal{T} es:

$$\mathcal{B}_S = \{[a, b[\times [c, d[\mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, a < b, c < d\}$$

Una base de $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u)$ es:

$$\mathcal{B}_u = \{]a, b[\times]c, d[\mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, a < b, c < d\}$$

Sea $]a, b[\times]c, d[\in \mathcal{B}_u$, y sea $(x, y) \in]a, b[\times]c, d[$. Entonces, como $\mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}_S$, $\exists [a', b'[, [c', d'[$ tal que $x \in [a', b'[\subset]a, b[$ y $y \in [c', d'[\subset]c, d[$. Por tanto, $(x, y) \in [a', b'[\times [c', d'[\subset]a, b[\times]c, d[$. Por tanto, $\mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}$.

Como $\tilde{A} \in \mathcal{T}_u$ por ser intersección de dos abiertos, $\tilde{A} \in \mathcal{T}$. Además, como $\tilde{A} \subset A$, tenemos que $\tilde{A} \subset A^\circ$.

⊃) Veremos que, dado $(x, y) \in A \setminus \tilde{A}$, entonces $(x, y) \notin A^\circ$. Como $(x, y) \in A \setminus \tilde{A}$, entonces $x^2 + y^2 < 1$ y $x + y = 0$, es decir, $y = -x$. Veamos que $(x, -x) \notin A^\circ$.

Supongamos que $\exists V \in \beta_{(x,y)}$ tal que $V \subset A$. Entonces, $\exists \varepsilon, \varepsilon' \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$V = [x, x + \varepsilon[\times [y, y + \varepsilon'[= [x, x + \varepsilon[\times [-x, -x + \varepsilon'[\subset A$$

De esta forma, $(x + \frac{\varepsilon}{2}, -x + \frac{\varepsilon'}{2}) \in V \subset A$, pero:

$$x + \frac{\varepsilon}{2} + \left(-x + \frac{\varepsilon'}{2}\right) = \frac{\varepsilon + \varepsilon'}{2} > 0$$

Por tanto, llegamos a una contradicción, y $(x, y) \notin A^\circ$. De esta forma, $A^\circ \subset \tilde{A}$.

2. (2 puntos) La frontera de A .

Para calcular la frontera de A , calcularemos primero el cierre de A . Para ello, veremos que $\overline{A} = \hat{A}$, con:

$$\hat{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x + y \leq 0\}$$

⊂) Veamos que $\overline{A} \subset \hat{A}$. Como $\hat{A} \in C_{\mathcal{T}_u}$ y $\mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}$, entonces $\hat{A} \in C_{\mathcal{T}}$. Por tanto, como además $A \subset \hat{A}$, se tiene que $\overline{A} \subset \hat{A}$.

⊃) Veamos que $\hat{A} \subset \overline{A}$. Dado $(x, y) \in \hat{A}$, veremos que $\forall V \in \beta_{(x,y)}, V \cap A \neq \emptyset$. Como $A \subset \hat{A}$, tomaremos $(x, y) \in \hat{A} \setminus A$, ya que en el primer caso es trivial que $(x, y) \in V \cap A \neq \emptyset$. Por tanto, sea $(x, y) \in \hat{A} \setminus A$. Entonces, $x^2 + y^2 = 1$ y $x + y < 0$. Veamos que $(x, y) \in \overline{A}$.

Sea $V \in \beta_{(x,y)}$, por lo que $V = [x, x + \varepsilon[\times [y, y + \varepsilon'[\subset \mathbb{R}^2$ con $\varepsilon, \varepsilon' \in \mathbb{R}^+$.

Sea $\delta = \frac{\min\{\varepsilon, \varepsilon'\}}{2}$. Veamos que $(x, y) - \delta(x, y) \in A \cap V$.

a) Como $\delta \leq \varepsilon, \varepsilon'$, tenemos que pertenece a V .

b) Veamos que pertenece a A . Veamos primero que $x + y \leq 0$:

$$x - x \cdot (x, y) + y - y(x, y) = (x + y)(1 - (x, y))$$

a) Supongamos $y < 0$. Entonces, veamos que $\exists \delta \in \mathbb{R}^+, 0 < \delta < \varepsilon'$ tal que $(x, y + \delta) \in V \cap A$. Veamos que pertenece a A :

$$\begin{aligned} x^2 + (y + \delta)^2 &= x^2 + y^2 + 2y\delta + \delta^2 = 1 + 2y\delta + \delta^2 < 1 \iff \\ &\iff \delta(2y + \delta) < 0 \iff \delta < -2y \\ x + y + \delta &\leq 0 \iff \delta \leq -x - y = -(x + y) \end{aligned}$$

Como $y < 0$, entonces $-2y > 0$, y como $x + y < 0$, entonces sea $\delta = \min\{-2y, -(x + y)\}$, y sin pérdida de generalidad suponemos $\delta < \varepsilon$, que en caso contrario tomaríamos $0 < \delta' < \delta$ y se tendría.

b) Supongamos $y \geq 0$. Entonces, veamos que $\exists \delta \in \mathbb{R}^+, 0 < \delta < \varepsilon'$ tal que $(x + \delta, y) \in V \cap A$. Como $x + y < 0$ e $y \geq 0$, entonces $x < 0$. Entonces, para que pertenezca a A :

$$\begin{aligned} (x + \delta)^2 + y^2 &= x^2 + y^2 + 2x\delta + \delta^2 = 1 + 2x\delta + \delta^2 < 1 \iff \\ &\iff \delta(2x + \delta) < 0 \iff \delta < -2x \\ x + y + \delta &\leq 0 \iff \delta \leq -x - y = -(x + y) \end{aligned}$$

De manera análoga, tomando $\delta = \min\{-2x, -(x + y)\}$ y suponiendo $\delta < \varepsilon$, tenemos que pertenece a $A \cap V$.

Ejercicio 2 (1 punto). Estudia si el espacio topológico $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T})$ es o no T2.

Ejercicio 3 (1.5 puntos). Encuentra un subconjunto $B \subset \mathbb{R}^2$ tal que la topología inducida \mathcal{T}_B sea la discreta en B , pero la topología $(\mathcal{T}_u^2)_B$ no sea la discreta.

Ejercicio 4. Estudia si el espacio topológico es:

1. (1 punto) 1AN.
2. (1 punto) 2AN.

Ejercicio 5 (1.5 puntos). Un subconjunto C se dice frontera si $C \subset \partial C$. Encuentra un subconjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ que sea frontera, infinito y que no esté incluido en B .