

Topología I

Examen VIII

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología I

Examen VIII

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2023-2024

Asignatura Topología I.

Curso Académico 2023-24.

Grado doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo A.

Profesor Jose Antonio Gálvez López¹.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 18 de enero de 2023.

Duración 3 horas.

¹El examen lo pone el departamento

Ejercicio 1 (5 puntos). Sea $\|\cdot\|$ la norma euclídea usual en \mathbb{R}^2 . Se consideran los conjuntos $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| \geq 2\}$ y $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| = 2\}$. Para cada $p = (x, y) \in X$, se considera la siguiente familia:

- Si $p \in S$, $\beta_p = \{B((0, 0), r) \cup \{p\} \mid 0 < r < 1\}$.
- Si $p \notin S$, $\beta_p = \{B(p, r) \mid 0 < r < 2 - \|p\|\}$.

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

1. (1.5 puntos) Demuestra que existe una única topología \mathcal{T} en X tal que las familias anteriores forman una base de entornos de cada punto. En los siguientes apartados, se considera el espacio topológico (X, \mathcal{T}) .
2. (1 punto) Dado el subconjunto $A = \{(x, y) \in X : x > 0\}$, calcula el interior y la frontera de A .
3. (0.5 puntos) Estudia si (X, \mathcal{T}) Hausdorff o no.
4. (1 punto) Estudia si (X, \mathcal{T}) es conexo o no.
5. (1 punto) Estudia si (X, \mathcal{T}) es compacto o no.

Ejercicio 2 (2.5 puntos). Elige una de las siguientes preguntas (2a o 2b):

- 2a. Da una definición de subespacio compacto en un espacio topológico y prueba las siguientes afirmaciones:
 - a) Un subespacio cerrado de un espacio topológico compacto es compacto.
 - b) Todo subespacio compacto de un espacio topológico Hausdorff es cerrado.
- 2b. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
 - a) Todo entorno de un punto de un espacio topológico es abierto.
 - b) Si (X, \mathcal{T}) es un espacio topológico entonces la aplicación identidad dada por $Id : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{CF})$ es continua si y solo si (X, \mathcal{T}) es T1. Aquí, \mathcal{T}_{CF} denota la topología cofinita.
 - c) Si $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$ es una aplicación biyectiva entre espacios compactos y T2, entonces f es continua si, y solo si, f^{-1} es continua.

Ejercicio 3 (2.5 puntos). En $X = \mathbb{R} \times [-1, 1]$ consideramos la relación de equivalencia dada por:

$$(x_1, y_1) \mathcal{R}(x_2, y_2) \iff \begin{cases} (x_1, y_1) = (x_2, y_2), & \text{o bien} \\ x_1, x_2 > 1, & \text{o bien} \\ x_1, x_2 < -1. \end{cases}$$

Si sobre X consideramos la topología usual inducida de \mathbb{R}^2 , estudiese si:

1. La proyección canónica $p : X \rightarrow X/\mathcal{R}$ es una aplicación abierta,
2. X/\mathcal{R} es T2,
3. X/\mathcal{R} es compacto,
4. X/\mathcal{R} es conexo.