

Variable Compleja I

Examen XII

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Variable Compleja I

Examen XII

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2024-2025

Asignatura Variable Compleja I.

Curso Académico 2024-25.

Grado Grado en Matemáticas y Doble Grado en Matemáticas y Física.

Grupo Único.

Profesor Javier Merí de la Maza.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 17 de Enero de 2025.

Duración 3.5 horas.

Ejercicio 1 (2.5 puntos). Sea Ω un dominio y sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ de modo que $\overline{f}g \in \mathcal{H}(\Omega)$. Probar que $g \equiv 0$ en Ω o f es constante en Ω .

Ejercicio 2 (2.5 puntos). Sea $f \in \mathcal{H}(D(0, 1))$ no constante, continua en $\overline{D}(0, 1)$ y verificando que $|f(z)| = 1$ para cada $z \in \mathcal{C}$ con $|z| = 1$.

1. Probar que f tiene un número finito (no nulo) de ceros en $D(0, 1)$.
2. Probar que $f(\overline{D}(0, 1)) = \overline{D}(0, 1)$.

Ejercicio 3 (2.5 puntos). Para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos $a_n = 1/n$ y consideramos la función:

$$\begin{aligned} f_n : \mathbb{C} \setminus \{a_n\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{1}{z - a_n} \end{aligned}$$

1. Si $A = \overline{\{a_n : n \in \mathbb{N}\}}$, probar que la serie de funciones

$$\sum_{n \geq 1} \frac{f_n(z)}{n^n}$$

converge absolutamente en todo punto del dominio $\Omega = \mathbb{C} \setminus A$ y uniformemente en cada subconjunto compacto contenido en Ω .

2. Deducir que la función dada por

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(z)}{n^n}$$

es holomorfa en Ω y estudiar sus singularidades aisladas.

3. (Extra) Probar que para cada $\delta \in \mathbb{R}^+$ el conjunto $f(D(0, \delta) \setminus A)$ es denso en \mathbb{C} .

Ejercicio 4 (2.5 puntos). Sea f holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Supongamos que -1 y 1 son polos de f y que

$$\operatorname{Res}(f, 1) = -\operatorname{Res}(f, -1).$$

Probar que f admite primitiva en $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.

Ejercicio 1 (2.5 puntos). Sea Ω un dominio y sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ de modo que $\overline{f}g \in \mathcal{H}(\Omega)$. Probar que $g \equiv 0$ en Ω o f es constante en Ω .

Supongamos que $g \not\equiv 0$ en Ω . Entonces, $\exists z_0 \in \Omega$ tal que $g(z_0) \neq 0$. Por continuidad de g , $\exists \delta \in \mathbb{R}^+$ tal que $g(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, \delta)$, por lo que consideramos:

$$\begin{aligned} 1/g : D(z_0, \delta) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{1}{g(z)} \end{aligned}$$

Como g es holomorfa en $D(z_0, \delta)$, $1/g \in \mathcal{H}(D(z_0, \delta))$. Por tanto, restringiéndonos a $D(z_0, \delta)$, tenemos que:

$$\overline{f}g \cdot \frac{1}{g} = \overline{f} \in \mathcal{H}(D(z_0, \delta)).$$

Por tanto, $\overline{f} \in \mathcal{H}(D(z_0, \delta))$ y, por tanto:

$$\operatorname{Re} f = \frac{f + \overline{f}}{2} \in \mathcal{H}(D(z_0, \delta)).$$

Como $\operatorname{Re} f \in \mathcal{H}(D(z_0, \delta))$ y tiene parte imaginaria constante (en particular, nula), tenemos que $\operatorname{Re} f$ es constante en $D(z_0, \delta)$. De ahí, concluimos que f es constante en $D(z_0, \delta)$. Puesto que Ω es un dominio y $D(z_0, \delta) \subseteq \Omega$, como $D(z_0, \delta)$ no es numerable, por el Principio de Identidad, tenemos que f es constante en Ω .

Ejercicio 2 (2.5 puntos). Sea $f \in \mathcal{H}(D(0, 1))$ no constante, continua en $\overline{D}(0, 1)$ y verificando que $|f(z)| = 1$ para cada $z \in \mathbb{C}$ con $|z| = 1$.

1. Probar que f tiene un número finito (no nulo) de ceros en $D(0, 1)$.

En primer lugar, queremos ver que $Z(f) \neq \emptyset$. Por el principio del módulo máximo, como f es continua en $\overline{D}(0, 1)$ y holomorfa en $D(0, 1)$, tenemos que:

$$\max\{|f(z)| : z \in \overline{D}(0, 1)\} = \max\{|f(z)| : |z| = 1\} = 1.$$

Por otro lado, por ser $\overline{D}(0, 1)$ compacto y f y el módulo de f continuo, $\exists z_0 \in \overline{D}(0, 1)$ tal que:

$$|f(z_0)| = \min\{|f(z)| : z \in \overline{D}(0, 1)\}$$

Buscamos ahora aplicar el Principio del Módulo Mínimo en $D(0, 1)$, para lo que hemos de demostrar que $|z_0| < 1$. Supongamos que $|z_0| = 1$. Entonces, por hipótesis, tenemos que $|f(z_0)| = 1$, por lo que:

$$1 = |f(z_0)| = \min\{|f(z)| : z \in \overline{D}(0, 1)\} = \max\{|f(z)| : z \in \overline{D}(0, 1)\} = 1.$$

Por tanto, $|f(z)| = 1$ para todo $z \in \overline{D}(0, 1)$, por lo que $|f|$ es constante en $\overline{D}(0, 1)$. Por las consecuencias de Cauchy-Riemann, tenemos que f es constante en $D(0, 1)$, lo que contradice la hipótesis de que f no es constante. Por tanto, $|z_0| < 1$ y, por tanto, $z_0 \in D(0, 1)$. Por el Principio del Módulo Mínimo,

como f no es constante, tenemos que $f(z_0) = 0$, por lo que $Z(f) \neq \emptyset$.

Veamos ahora que $Z(f)$ es finito. Supongamos por el contrario que $Z(f)$ es infinito, y consideramos una sucesión $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ con $z_n \in D(0, 1)$ y $f(z_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por ser una sucesión acotada, admite una parcial convergente, digamos $\{z_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, que converge a un punto $w \in \overline{D}(0, 1)$. Por continuidad de f en $\overline{D}(0, 1)$, tenemos que:

$$f(w) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

Por tanto, $w \in Z(f)$ y, por tanto, $w \in D(0, 1)$. No obstante, hemos probado que $Z(f)$ tiene un punto de acumulación $w \in D(0, 1)$, algo que contradice el principio de los ceros aislados. Por tanto, $Z(f)$ es finito y no nulo.

2. Probar que $f(\overline{D}(0, 1)) = \overline{D}(0, 1)$.

Demostraremos mediante doble inclusión.

\subseteq) Consideramos la siguiente igualdad, ya mencionada anteriormente:

$$\max\{|f(z)| : z \in \overline{D}(0, 1)\} = \max\{|f(z)| : |z| = 1\} = 1.$$

Por tanto, $|f(z)| \leq 1$ para todo $z \in \overline{D}(0, 1)$, por lo que $f(\overline{D}(0, 1)) \subseteq \overline{D}(0, 1)$.

\supseteq) Sea $w_0 \in D(0, 1)$, y por reducción al absurdo supongamos que $w_0 \notin f(\overline{D}(0, 1))$. Consideramos el siguiente conjunto:

$$A = \{\lambda \leq 1 \mid \lambda w_0 \in f(\overline{D}(0, 1))\}.$$

Por el apartado anterior, como $0 \in f(\overline{D}(0, 1))$, tenemos que $A \neq \emptyset$, y por el Axioma del Supremo podemos considerar $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\lambda_0 = \sup A = \sup\{\lambda \leq 1 \mid \lambda w_0 \in f(\overline{D}(0, 1))\}.$$

Como $w_0 \notin f(\overline{D}(0, 1))$, tenemos que $1 \notin A$, luego $\lambda_0 \leq 1$. Por la continuidad de f en el compacto, tenemos que $\lambda_0 \in A$ con $\lambda_0 < 1$. Por tanto, $|\lambda_0 w_0| < 1$, y $\lambda_0 w_0 \in D(0, 1)$. Por tanto, y uniéndolo a que $\lambda_0 w_0 \in f(\overline{D}(0, 1))$, tenemos que $\exists z_0 \in \overline{D}(0, 1)$ tal que:

$$f(z_0) = \lambda_0 w_0.$$

Como f no es constante, por el Teorema de la Aplicación Abierta tenemos que $f(D(0, 1))$ es abierto en \mathbb{C} . Por tanto, como $f(z_0) \in f(D(0, 1))$, existe $\delta \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$D(f(z_0), \delta) \subseteq f(D(0, 1)).$$

No obstante, entonces veamos que $w_0(\lambda_0 + \delta) \in D(f(z_0), \delta)$, ya que:

$$|f(z_0) - w_0(\lambda_0 + \delta)| = |\lambda_0 w_0 - w_0(\lambda_0 + \delta)| = |w_0 \delta| < \delta.$$

donde la última igualdad se cumple porque $|w_0| < 1$. Por tanto, $\lambda_0 + \delta \in A$, lo que contradice el hecho de que $\lambda_0 = \sup A$. Por tanto, hemos llegado a una contradicción, por lo que:

$$D(0, 1) \subseteq f(\overline{D}(0, 1)).$$

Tomando cerrados, teniendo en cuenta que el conjunto $f(\overline{D}(0, 1))$ es cerrado por ser compacto, tenemos que:

$$\overline{D}(0, 1) \subseteq f(\overline{D}(0, 1)).$$

Ejercicio 3 (2.5 puntos). Para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos $a_n = 1/n$ y consideramos la función:

$$\begin{aligned} f_n : \mathbb{C} \setminus \{a_n\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{1}{z - a_n} \end{aligned}$$

1. Si $A = \overline{\{a_n : n \in \mathbb{N}\}}$, probar que la serie de funciones

$$\sum_{n \geq 1} \frac{f_n(z)}{n^n}$$

converge absolutamente en todo punto del dominio $\Omega = \mathbb{C} \setminus A$ y uniformemente en cada subconjunto compacto contenido en Ω .

Sea $K \subseteq \Omega = \mathbb{C} \setminus A$ compacto. como K, A son conjuntos compactos disjuntos, definimos $d(K, A) > 0$. Por tanto:

$$\left| \frac{f_n(z)}{n^n} \right| = \frac{1}{n^n} \cdot \frac{1}{|z - a_n|} \leq \frac{1}{n^n \cdot d(K, A)} \quad \forall z \in K, n \in \mathbb{N}.$$

Veamos que podemos aplicar el Test de Weierstrass a la serie de término general n^{-n} . Por el Criterio de la raíz, tenemos que:

$$\left\{ \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \right\} = \left\{ \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right\} \rightarrow 0$$

Por tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ converge. Por tanto, por el Test de Weierstrass, tenemos que la serie de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(z)}{n^n}$ converge uniformemente en K .

Generalizando, tenemos que la serie de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(z)}{n^n}$ converge uniformemente en cada compacto $K \subseteq \Omega$, y por tanto, converge absolutamente en todo punto de Ω .

2. Deducir que la función dada por

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(z)}{n^n}$$

es holomorfa en Ω y estudiar sus singularidades aisladas.

Por el Teorema de Convergencia de Weierstrass, gracias al apartado anterior deducimos que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.

3. (Extra) Probar que para cada $\delta \in \mathbb{R}^+$ el conjunto $f(D(0, \delta) \setminus A)$ es denso en \mathbb{C} .

Ejercicio 4 (2.5 puntos). Sea f holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Supongamos que -1 y 1 son polos de f y que

$$\operatorname{Res}(f, 1) = -\operatorname{Res}(f, -1).$$

Probar que f admite primitiva en $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.