

# Métodos Numéricos II

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Métodos Numéricos II

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Arturo Olivares Martos

Granada, 2025



# Índice general

<b>1. Relaciones de Ejercicios</b>	<b>5</b>
1.1. Resolución numérica de ecuaciones y sistemas . . . . .	5
1.1.1. Relación 1 . . . . .	5
1.1.2. Relación 2 . . . . .	9



# 1. Relaciones de Ejercicios

## 1.1. Resolución numérica de ecuaciones y sistemas

### 1.1.1. Relación 1

**Ejercicio 1.1.1.1.** Se considera el problema de encontrar las soluciones reales de la ecuación  $x + 1/2 - 2 \sin(\pi x) = 0$  en el intervalo  $[1/2, 3/2]$ .

1. ¿Se puede utilizar el método de bisección para resolver dicho problema tomando  $[1/2, 3/2]$  como intervalo inicial? ¿Por qué? En caso afirmativo, calcule las tres primeras iteraciones de dicho método.
2. Halle una cota del error que se comete si consideramos la última de las iteraciones del apartado anterior como el valor de la solución del problema dado.
3. ¿Cuántas iteraciones del método de bisección son necesarias para garantizar un error menor que  $10^{-5}$ ?

**Ejercicio 1.1.1.2.** Se quiere calcular el inverso de un número real  $c > 0$  sin efectuar divisiones. Para ello, se elige un valor  $x_0 > 0$  y se considera el método iterativo dado por  $x_{n+1} = x_n(2 - cx_n)$ ,  $n \geq 0$ .

1. Demuestre que la sucesión generada por dicho método converge a  $1/c$  si y sólo si  $0 < x_0 < 2/c$ .  
*Observación.* Comience demostrando por inducción que  $r_n = r_0^{2^n} \forall n \geq 0$  siendo  $r_n = 1 - cx_n$ .
2. Demuestre que la convergencia referida en a) es al menos cuadrática. ¿Cuál es la constante asintótica del error?
3. Compruebe que el método iterativo propuesto es el método de Newton-Raphson aplicado a una cierta ecuación  $f(x) = 0$  cuya única raíz es  $1/c$ .

**Ejercicio 1.1.1.3.** Demuestre que la ecuación  $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$  tiene una única solución en el intervalo  $[1, 4]$ . Elija una semilla  $x_0$  que permita hallar, usando el método de Newton-Raphson, una aproximación a dicha solución y justifique dicha elección. Calcule las dos primeras iteraciones.

**Ejercicio 1.1.1.4.** Deduzca la fórmula para el cálculo de las iteraciones del método de la secante a partir de su interpretación gráfica.

**Ejercicio 1.1.1.5.** Dada la ecuación  $x - \frac{1}{2}\cos(x) = 0$ , se pide:

1. Demuestre que tiene una única solución real en el intervalo  $[0, \pi/2]$ .
2. Describa un método de iteración funcional, distinto del método de Newton-Raphson, que permita aproximar dicha solución, razonando la respuesta.
3. Realice las dos primeras iteraciones del método descrito en el apartado anterior.
4. ¿Cuántas iteraciones es preciso realizar para garantizar un error menor que  $10^{-2}$  en el método dado en el apartado 2?

**Ejercicio 1.1.1.6.** Usando algún resultado sobre convergencia para los métodos de iteración funcional, demuestre el teorema de convergencia local para ceros simples del método de Newton-Raphson.

**Ejercicio 1.1.1.7.** Para resolver la ecuación  $f(x) = 0$  se considera el método  $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/m$ , donde  $m \neq 0$ .

1. Interprete gráficamente el cálculo de las iteraciones según dicho método.
2. ¿Qué condiciones para la función  $f$ , para la constante  $m$  y para el valor inicial  $x_0$  asegurarían unicidad de solución y convergencia a dicha solución del método considerado?

**Ejercicio 1.1.1.8.** Localice un intervalo  $[a, b]$  en el que se encuentren todas las soluciones reales de la ecuación  $2x^4 - 3x^2 + 3x - 4 = 0$ , y sepárelas. Tomando  $x_0 = -2$  como semilla, calcule las tres primeras iteraciones del método de Newton-Raphson usando el algoritmo de Horner.

**Ejercicio 1.1.1.9.** Sea  $s = \sqrt{3}$ . Para calcular  $s$  se considera el método de iteración funcional

$$x_{n+1} = g(x_n) \quad \text{con} \quad g(x) = ax + \frac{x^3}{3} + bx^2.$$

Halle los valores de  $a$  y  $b$  para que, partiendo de una semilla  $x_0$  suficientemente próxima a  $s$ , se asegure la convergencia al menos cuadrática. Para tales valores, calcule  $x_3$  para  $x_0 = 1$ .

**Ejercicio 1.1.1.10.** Se desea aplicar un método iterativo del siguiente tipo para obtener  $\sqrt[3]{7}$ .

$$x_{n+1} = p \cdot x_n + q \cdot 7/x_n^2 + r \cdot 7^2/x_n^5$$

Halle los valores de  $p$ ,  $q$ ,  $r$  para que la convergencia local del método sea al menos cúbica. Realice dos iteraciones partiendo de  $x_0 = 2$ .

**Ejercicio 1.1.1.11.** Sea  $f(x) = x^5 + x^2 - 1$ .

1. ¿Cuántas raíces tiene la ecuación  $f(x) = 0$  en el intervalo  $[0, 1]$ ?
2. Pruebe que el método de iteración funcional

$$x_{n+1} = g(x_n) = \sqrt[3]{\frac{1}{x_n^3 + 1}}$$

converge en el intervalo  $[0, 1]$  a una raíz de  $f(x) = 0$ .






Figura 1.1: Semilla para el método de Newton-Raphson en el Ejercicio 1.1.1.12.




Figura 1.2: Semilla para el método de la Secante en el Ejercicio 1.1.1.12.

3. Localice todas las raíces reales de  $f(x)$ .

**Ejercicio 1.1.1.12.** A partir de la gráfica de  $y = f(x)$  que se muestra, determine gráficamente las dos aproximaciones siguientes que generan los métodos de Newton-Raphson y de la secante partiendo de las semillas que aparecen en cada caso. Deduzca si hay convergencia y hacia qué solución de  $f(x) = 0$ .

1. Método de Newton-Raphson: Figura 1.1.
2. Método de la secante: Figura 1.2.

**Ejercicio 1.1.1.13.** Se considera la ecuación  $xe^{-x^3} + 1 = 0$  y los métodos de iteración funcional  $x_{n+1} = g(x_n)$  dados por las funciones

$$\begin{aligned} g_1(x) &= -e^{x/3}, & g_2(x) &= e^{x/3}, \\ g_3(x) &= 3 \ln(-x), & g_4(x) &= \frac{x - e^{x/3}}{2}. \end{aligned}$$

1. Encuentre un intervalo de amplitud 1 donde haya una única raíz de la ecuación.
2. Averigüe cuáles de los métodos propuestos son compatibles con la ecuación dada; es decir, para cuáles de ellos la solución es punto fijo.

- De entre los métodos compatibles con la ecuación ¿cuáles son convergentes localmente? Justifique la respuesta.
- De entre los métodos convergentes localmente ¿cuál es el más rápido? ¿Por qué?
- Para los métodos que hayan resultado divergentes, aplique Steffensen con  $x_0 = -0,5$  hasta que dos iteraciones consecutivas disten menos de  $10^{-3}$ .

**Ejercicio 1.1.1.14.** Supongamos que se modifica el método de bisección cambiando el punto de división del intervalo por el valor  $a + \frac{b-a}{3}$  (porque se cree que la solución está más cerca del extremo  $a$ ). ¿Es convergente dicho método? ¿Cuál es la cota del error absoluto después de  $n$  iteraciones?

**Ejercicio 1.1.1.15.** Demuestre el teorema de convergencia global de los métodos de iteración funcional para sistemas.

*Observación.* Generalice al caso  $k$ -dimensional la demostración del teorema de convergencia global de los métodos de iteración funcional unidimensional.

**Ejercicio 1.1.1.16.** Sea  $D = \prod_{i=1}^k [a_i, b_i]$  y sea  $G : D \rightarrow \mathbb{R}^k$  con  $G = (g_1, \dots, g_k)$  tal que  $G \in C^1(D)$ . Demuestre que si existe  $L \in ]0, 1[$  tal que  $\forall i, j = 1, \dots, k$  se verifique

$$\left| \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq \frac{L}{k} \quad \forall x \in D,$$

entonces  $G$  es contráctil.

*Observación.* Considere la norma  $\|\cdot\|_1$  o  $\|\cdot\|_\infty$ .

**Ejercicio 1.1.1.17.** Se considera el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - y^2}{2} - x + \frac{7}{24} &= 0, \\ xy - y + \frac{1}{9} &= 0. \end{aligned}$$

- Demuestre que tiene una única solución en el rectángulo  $D = [0, 0,4] \times [0, 0,4]$ .
- Encuentre una sucesión que converja a dicha solución, justificando la respuesta.
- Calcule, tomando  $x_0 = (0,1,0,2)$ , las dos primeras iteraciones del método de Newton-Raphson para el sistema.

**Ejercicio 1.1.1.18.** Se considera el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x - xy &= 1/16, \\ x^2 - y &= -1/8. \end{aligned}$$

- Demuestre que tiene una única solución en el rectángulo  $D = [0, 1/8] \times [0, 1/4]$ .
- Encuentre una sucesión que converja a dicha solución, justificando la respuesta.
- Calcule, tomando  $x_0 = (0,1,0,2)$ , las dos primeras iteraciones del método de Newton-Raphson para el sistema.

### 1.1.2. Relación 2

**Ejercicio 1.1.2.1.** Sea la función  $f(x) = e^x - ax^2$  con  $a \in [3, 4]$ .

1. Demuestra que tiene una raíz negativa, otra raíz en  $[0, 1]$  y otra mayor que 1.

Evaluamos  $f$  en los extremos del intervalo  $[0, 1]$ :

$$\begin{aligned} f(0) &= e^0 - a \cdot 0^2 = 1 \\ f(1) &= e^1 - a \cdot 1^2 = e - a < 0 \iff e < a \end{aligned}$$

Calculamos además los límites de  $f$  en  $\pm\infty$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - ax^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} -ax^2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x - ax^2 = \infty \end{aligned}$$

Para demostrar lo pedido, y debido a que  $f$  es continua, emplearemos el Teorema de Bolzano.

- Como  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  y  $f(0) = 1 > 0$ , por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene una raíz en  $\mathbb{R}^-$ .
  - Como  $f(0) = 1 > 0$  y  $f(1) = e - a < 0$ , por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene una raíz en  $[0, 1]$ .
  - Como  $f(1) = e - a < 0$  y  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ , por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene una raíz en  $[1, \infty[$ .
2. Demuestra que  $x = g_1(x) = \sqrt{\frac{e^x}{a}}$  y  $x = g_2(x) = -\sqrt{\frac{e^x}{a}}$  son ecuaciones equivalentes a la de partida.

Partiendo de las ecuaciones dadas, elevamos al cuadrado ambos lados, llegando en ambos casos a:

$$x^2 = \frac{e^x}{a} \iff a \cdot x^2 = e^x \iff e^x - ax^2 = 0$$

Por tanto, efectivamente son equivalentes. La ecuación  $x = g_1(x)$  tiene sentido para  $x \geq 0$  y la ecuación  $x = g_2(x)$  para  $x \leq 0$ .

3. Toma  $a = 3$ . Demuestra la convergencia local hacia la raíz próxima a  $-0,5$  partiendo de  $x_0 = 0$  usando  $g_2(x)$  y realiza dos iteraciones.

Trabajaremos en el intervalo  $[-1, 0]$ . Veamos que  $g_2([-1, 0]) \subset [-1, 0]$ . Para ello, como  $g_2 \in C^\infty(\mathbb{R})$ , calculamos su derivada:

$$g_2'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{\frac{e^x}{a}}} \cdot \frac{e^x}{a} = -\frac{e^x}{2a\sqrt{\frac{e^x}{a}}} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por tanto, tenemos que  $g_2$  es continua y estrictamente decreciente en  $\mathbb{R}$ . Además, evaluamos  $g_2$  en los extremos del intervalo:

$$g_2(-1) = -\sqrt{\frac{e^{-1}}{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3e}} \approx -0,35$$

$$g_2(0) = -\sqrt{\frac{e^0}{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0,58$$

Por tanto,  $g_2([-1, 0]) = \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3e}}\right] \subset [-1, 0]$ . Por tanto, podemos considerar  $g_2 : [-1, 0] \rightarrow [-1, 0]$ . Veamos ahora que  $g_2$  es una contracción en  $[-1, 0]$ :

$$|g_2'(x)| = \left| \frac{e^x}{6\sqrt{\frac{e^x}{3}}} \right| = \frac{e^x}{6\sqrt{\frac{e^x}{3}}} \leq \frac{e^0}{6\sqrt{\frac{e^{-1}}{3}}} \approx 0,47 < 1 \quad \forall x \in [-1, 0]$$

Por tanto,  $g_2$  es una contracción en  $[-1, 0]$ . Por el Teorema del Punto Fijo,  $g_2$  tiene un único punto fijo en  $[-1, 0]$ . Además, la sucesión  $x_{n+1} = g_2(x_n)$  converge a dicho punto fijo para cualquier  $x_0 \in [-1, 0]$ .

Veamos ahora las primeras dos iteraciones tomando  $x_0 = 0$ :

$n$	$x_n$	$g_2(x_n)$
0	0	-0,57735
1	-0,57735	-0,4325829
2	-0,4325829	-0,4650559

4. Toma  $a = 3$ . Demuestra la convergencia local hacia la raíz próxima a 1 partiendo de  $x_0 = 0$  usando  $g_1(x)$  y realiza dos iteraciones.

Trabajaremos en el intervalo  $[0, 2]$ . Veamos que  $g_1([0, 2]) \subset [0, 2]$ . Para ello, como  $g_1 \in C^\infty(\mathbb{R})$ , calculamos su derivada:

$$g_1'(x) = -g_2'(x) = \frac{e^x}{2a\sqrt{\frac{e^x}{a}}} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por tanto, tenemos que  $g_1$  es continua y estrictamente creciente en  $\mathbb{R}$ . Además, evaluamos  $g_1$  en los extremos del intervalo:

$$g_1(0) = -g_2(0) = \sqrt{\frac{e^0}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,58$$

$$g_1(2) = \sqrt{\frac{e^2}{3}} = \frac{e}{\sqrt{3}} \approx 1,5694$$

Por tanto,  $g_1([0, 2]) = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{e}{\sqrt{3}}\right] \subset [0, 2]$ . Por tanto, podemos considerar  $g_1 : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ . Veamos ahora que  $g_1$  es una contracción en  $[0, 2]$ :

$$|g_1'(x)| = |g_2'(x)| = \frac{e^x}{6\sqrt{\frac{e^x}{3}}} < 1 \iff e^{2x} < 36 \cdot \frac{e^x}{3} \iff e^x < 12 \iff x < \ln 12 \approx 2,48$$

Por tanto,  $g_1$  es una contracción en  $[0, 2]$ . Por el Teorema del Punto Fijo,  $g_1$  tiene un único punto fijo en  $[0, 2]$ . Además, la sucesión  $x_{n+1} = g_1(x_n)$  converge a dicho punto fijo para cualquier  $x_0 \in [0, 2]$ .

Veamos ahora las primeras dos iteraciones tomando  $x_0 = 0$ :

$n$	$x_n$	$g_1(x_n)$
0	0	0,57735
1	0,57735	0,770565
2	0,770565	0,848722

5. Toma  $a = 3$ . Comprueba que la raíz mayor que 1 está en  $[3, 4]$ . Demuestra la no convergencia hacia la raíz próxima a 4 partiendo de  $x_0$  muy próximo a ella (pero diferente de ella) usando  $g_1(x)$  y encuentra una función para la iteración funcional, alternativa a las anteriores que converja a la raíz cercana a 4. Partiendo de  $x_0 = 3,98$  obtén  $x_1$  y  $x_2$  con el método propuesto.

Evaluamos  $f$  en los extremos del intervalo  $[3, 4]$ :

$$\begin{aligned} f(3) &= e^3 - 3 \cdot 3^2 = e^3 - 3^3 < 0 \\ f(4) &= e^4 - 3 \cdot 4^2 = e^4 - 3 \cdot 4^2 > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene una raíz en  $[3, 4]$ .

Para estudiar la no convergencia hacia la raíz próxima a 4 partiendo de  $x_0$  muy próximo a ella, anteriormente vimos que:

$$|g'(x)| < 1 \iff x < \ln 12 \approx 2,48$$

Por tanto, como el punto fijo  $s$  está en  $[3, 4]$ , tenemos que  $g'(s) > 1$ . Por tanto, la sucesión  $x_{n+1} = g(x_n)$  no converge a  $s$  si  $x_0$  es muy próximo a  $s$ .

Para encontrar una función que converja a la raíz próxima a 4, tenemos que:

$$f(x) = 0 \iff e^x = ax^2 \iff x = \ln(ax^2)$$

Por tanto, consideramos la función  $h(x) = \ln(3x^2)$ . Veamos que  $h([3, 5]) \subset [3, 5]$ . Para ello, calculamos la derivada de  $h$ :

$$h'(x) = \frac{6x}{3x^2} = \frac{2}{x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Por tanto,  $h$  es continua y estrictamente creciente en  $[3, 5]$ . Además, evaluamos  $h$  en los extremos del intervalo:

$$\begin{aligned} h(3) &= \ln(3 \cdot 3^2) = \ln 27 \approx 3,3 \\ h(5) &= \ln(3 \cdot 5^2) = \ln 75 \approx 4,32 \end{aligned}$$

Por tanto,  $h([3, 5]) = [\ln 27, \ln 75] \subset [3, 5]$ . Por tanto, podemos considerar  $h : [3, 5] \rightarrow [3, 5]$ .

Veamos ahora que  $h$  es una contracción en  $[3, 5]$ :

$$|h'(x)| = \left| \frac{2}{x} \right| = \frac{2}{x} < \frac{2}{3} < 1 \quad \forall x \in [3, 5]$$

Por tanto,  $h$  es una contracción en  $[3, 5]$ . Por el Teorema del Punto Fijo,  $h$  tiene un único punto fijo en  $[3, 5]$ . Además, la sucesión  $x_{n+1} = h(x_n)$  converge a dicho punto fijo para cualquier  $x_0 \in [3, 5]$ .

Veamos ahora las primeras dos iteraciones tomando  $x_0 = 3,98$ :

$n$	$x_n$	$h(x_n)$
0	3,98	3,861176
1	3,861176	3,800556
2	3,800556	3,7689

**Ejercicio 1.1.2.2.** Sea la ecuación  $p(x) = x^3 - 8x^2 + 20x - 15,2 = 0$ .

1. Prueba que no tiene ninguna raíz menor que 1.

Como  $p \in C^\infty(\mathbb{R})$ , podemos calcular la derivada de  $p$  y estudiar su signo:

$$\begin{aligned} p'(x) &= 3x^2 - 16x + 20 = 0 \iff \\ \iff x &= \frac{16 \pm \sqrt{16^2 - 4 \cdot 3 \cdot 20}}{2 \cdot 3} \iff x = \frac{16 \pm 4}{6} \iff x \in \{2, 10/3\} \end{aligned}$$

Por tanto,  $p$  es estrictamente creciente en  $] -\infty, 2[$ . Tenemos que:

$$\begin{aligned} p(1) &= 1 - 8 + 20 - 15,2 = -2,2 < 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) &= -\infty \end{aligned}$$

Por tanto, deducimos que  $p$  no tiene raíces menores que 1.

2. Prueba que Newton-Raphson converge partiendo de  $x_0 = 0$  hacia la raíz más pequeña y realiza dos iteraciones.

Tenemos que:

$$\begin{aligned} p(1) &= -2,2 < 0 \\ p(2) &= 8 - 32 + 40 - 15,2 = 0,8 > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, por el Teorema de Bolzano,  $p$  tiene una raíz en  $[1, 2]$ , y sabemos que es única por ser  $p$  estrictamente creciente en  $] -\infty, 2[$ . Por último, es la raíz más pequeña por no tener ninguna raíz menor que 1. Comprobemos ahora que cumple las condiciones del Teorema de Convergencia del Método de Newton-Raphson en  $[1, 2]$ :

$$a) \quad p(1)p(2) < 0.$$

b)  $p'(x) \neq 0$  en  $]1, 2[$ .

c)  $p''(x) = 6x - 16$  no cambia de signo en  $]1, 2[$ , ya que:

$$p''(x) = 6x - 16 = 0 \iff x = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} \approx 2,67 \notin ]1, 2[$$

d)  $p(x_0)p''(x_0) = (-15,2) \cdot (-16) > 0$ .

Por tanto, el método de Newton-Raphson converge en  $[1, 2]$  a la raíz más pequeña partiendo desde  $x_0 = 0$ . Este método genera la siguiente sucesión:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{p(x_n)}{p'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 8x_n^2 + 20x_n - 15,2}{3x_n^2 - 16x_n + 20} = \\ &= \frac{2x_n^3 - 8x_n^2 + 15,2}{3x_n^2 - 16x_n + 20} \end{aligned}$$

Por tanto, las dos primeras iteraciones son:

$n$	$x_n$
0	0
1	0,76
2	1,196844

3. Calcula la sucesión de Sturm y decide si existen raíces múltiples.

Definimos:

$$\begin{aligned} f_0(x) &= p(x) = x^3 - 8x^2 + 20x - \frac{76}{5} \\ f_1(x) &= f'_0(x) = 3x^2 - 16x + 20 \end{aligned}$$

Calculamos ahora  $f_2(x)$ .

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 8x^2 + 20x - \frac{76}{5} & 3x^2 - 16x + 20 \\ -x^3 + \frac{16}{3}x^2 - \frac{20}{3}x & \frac{1}{3}x - \frac{8}{9} \\ \hline -\frac{8}{3}x^2 + \frac{40}{3}x - \frac{76}{5} & \\ -\frac{8}{3}x^2 - \frac{128}{9}x + \frac{160}{9} & \\ \hline -\frac{8}{9}x + \frac{116}{45} & \end{array}$$

Para simplificar, establecemos:

$$\begin{aligned} f_2(x) &= -45 \cdot R(f_0(x), f_1(x)) \\ &= -45 \cdot \left( -\frac{8}{9}x + \frac{116}{45} \right) \\ &= 40x - 116 \end{aligned}$$

Calculamos ahora  $f_3(x)$ .

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 - 16x + 20 & 40x - 116 \\ -3x^2 + \frac{87}{10}x & \frac{3}{40}x - \frac{73}{400} \\ \hline -\frac{73}{10}x + 20 & \\ -\frac{73}{10}x - \frac{2117}{100} & \\ \hline -\frac{117}{100} & \end{array}$$

Para simplificar, establecemos:

$$\begin{aligned} f_3(x) &= -\frac{100}{117} \cdot R(f_1(x), f_2(x)) \\ &= -\frac{100}{117} \cdot \left( -\frac{117}{100} \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión de Sturm es:

$$\begin{aligned} f_0(x) &= x^3 - 8x^2 + 20x - 15,2 \\ f_1(x) &= 3x^2 - 16x + 20 \\ f_2(x) &= 40x - 116 \\ f_3(x) &= 1 \end{aligned}$$

Estudiemos ahora la existencia de raíces múltiples. Por el algoritmo extendido de euclides, sabemos que:

$$\text{mcd}(f_0, f_1) = \text{mcd}(p, p') = 1$$

Supongamos ahora que existe una raíz múltiple de multiplicidad  $m > 1$ . Entonces:

$$\begin{aligned} p(x) &= (x - x_0)^m \cdot q(x) \\ p'(x) &= (x - x_0)^{m-1} [m \cdot q(x) + (x - x_0)q'(x)] \end{aligned}$$

Entonces,  $(x - x_0)^{m-1}$  divide a  $p, p'$ , lo que contradice que  $\text{mcd}(p, p') = 1$ . Por tanto, no existen raíces múltiples. De forma general, como el último resto no nulo es constante, entonces no existen raíces múltiples.

4. Separa las raíces reales de dicha ecuación.

En primer lugar, buscamos acotar las raíces reales. Tenemos:

$$\alpha = 20 \implies |s| \leq 21$$

Por tanto, sabemos que todas las raíces reales están en  $[-21, 21]$ . Por el primer apartado, sabemos que están en  $[1, 21]$ . Separemos ahora las raíces:

$x$	$\text{sgn}(f_0(x))$	$\text{sgn}(f_1(x))$	$\text{sgn}(f_2(x))$	$\text{sgn}(f_3(x))$	Nº Cambios Signo
1	—	+	—	+	3
2	+	0	—	+	2
3	—	—	+	+	1
4	+	+	+	+	0
21	+	+	+	+	0

Por tanto, tenemos una raíz en  $[1, 2]$ , otra en  $[2, 3]$  y otra en  $[3, 4]$ .

**Ejercicio 1.1.2.3.** Sea la ecuación  $f(x) = e^{x-1} - ax^3 = 0$  siendo  $a > 1$ .



1. Demuestra que tiene al menos una raíz en  $[0, 1]$ .

Como  $f$  es continua, podemos aplicar el Teorema de Bolzano. Evaluamos  $f$  en los extremos del intervalo:

$$\begin{aligned}f(0) &= e^{-1} > 0 \\f(1) &= e^0 - a = 1 - a < 0\end{aligned}$$

Por tanto, por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene al menos una raíz en  $[0, 1]$ .

2. A partir de ahora considera  $a = 2$ . Calcula las dos primeras aproximaciones  $x_1$  y  $x_2$  obtenidas con bisección (siendo  $x_0 = 0,5$ ). Indica el error máximo que se comete con  $x_2$ .

$n$	$a_n$	$b_n$	$x_n$	$f(x_n)$
0	0	1	0,5	0,3565
1	0,5	1	0,75	-0,0649
2	0,5	0,75	0,625	0,1990

El error máximo que se comete con  $x_2$  es:

$$|e_2| < \frac{1-0}{2^{2+1}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

3. Realiza dos iteraciones con el método de la secante tomando como valores iniciales (o semillas)  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1$ . Debes calcular  $x_2$  y  $x_3$ .

El método de la secante se define como:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})} = \\&= x_n - \frac{(e^{x_n-1} - 2x_n^3)(x_n - x_{n-1})}{e^{x_n-1} - 2x_n^3 - e^{x_{n-1}-1} + 2x_{n-1}^3}\end{aligned}$$

Por tanto, las dos primeras iteraciones son:

$n$	$x_n$
0	0
1	1
2	0,2689
3	0,4932

4. Evalúa la función en la segunda aproximación  $x_2$  obtenida con bisección e indica, razonadamente con los resultados que se te han pedido, si se puede asegurar, o no, que la segunda aproximación obtenida con bisección está más cerca de la raíz que la segunda aproximación obtenida con la secante.

Evaluamos  $f$  en  $x_2$  obtenido con el método de bisección:

$$f(x_2) = f(0,625) = 0,199 > 0$$

Además, sabemos que  $f(0,75) < 0$ . Por tanto, si la raíz es  $s$ :

$$x_2 = 0,625 < s < 0,75$$

Como la segunda iteración del método de secante es  $x_3 = 0,4932$ , tenemos que:

$$x_3 = 0,4932 < x_2 = 0,625 < s < 0,75$$

Por tanto, la segunda aproximación obtenida con bisección está más cerca de la raíz que la segunda aproximación obtenida con la secante.

**Ejercicio 1.1.2.4.** Considera la ecuación  $x^2 = a$  siendo  $a > 0$ .

1. Se pretende usar el método de Newton-Raphson en la ecuación anterior para hallar la raíz cuadrada de  $a$ . Deduce que el método se puede expresar, en este caso, de la forma

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

Sea la función  $f(x) = x^2 - a$ . Aplicando el método de Newton-Raphson, tenemos:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

2. Demuestra que el método es convergente partiendo de  $x_0 = \max\{1, a\}$ .

Si  $a = 1$ , entonces  $f(x_0) = f(1) = 0$ . Por tanto,  $x_0$  es raíz de  $f$  y hemos terminado. Suponemos por tanto en adelante que  $a \neq 1$ .

Emplearemos el intervalo  $[\min\{1, a\}, \max\{1, a\}]$ . Calculamos la derivada de  $f$ :

$$f'(x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Demostramos ahora los 4 puntos necesarios para el Teorema de Convergencia del Método de Newton-Raphson:

- a)  $f(a)f(1) < 0$ :

$$f(a) = a^2 - a = a(a - 1)f(1) = 1 - a$$

Por tanto:

$$f(a)f(1) = a(a - 1)(1 - a) = -a(a - 1)^2 < 0$$

- b)  $f'(x) \neq 0$  en  $[\min\{1, a\}, \max\{1, a\}]$ , pues el 0 no pertenece a dicho intervalo.
- c)  $f''(x) = 2 > 0$  no cambia de signo en  $\mathbb{R}$ .

$$d) f(x_0)f''(x_0)$$

$$f(x_0)f''(x_0) = 2f(x_0) > 0 \iff x_0^2 > a \iff (\max\{1, a\})^2 > a$$

que sabemos que es cierto.

Por tanto, sabemos que el método de Newton-Raphson es convergente partiendo de  $x_0 = \max\{1, a\}$ .

3. Apoyándose en la expresión anterior obtén la segunda aproximación  $x_2$  de la raíz cuadrada positiva de 13, partiendo de  $x_0 = 13$ .

Tomando  $a = 13$ , la segunda aproximación de la raíz cuadrada positiva de 13 es:

$n$	$x_n$
0	13
1	7
2	4,428571

4. Determina la expresión del método de Newton-Raphson para la raíz cúbica de un número diferente de cero y aplícalo dos veces para aproximar la raíz cúbica de 13 partiendo de  $x_0 = 13$ .

Sea la función  $g(x) = x^3 - a$ . Aplicando el método de Newton-Raphson, tenemos:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2} = x_n - \frac{x_n}{3} + \frac{a}{3x_n^2} = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

Por tanto, tomando  $a = 13$ , las dos primeras iteraciones para aproximar la raíz cúbica de 13 son:

$n$	$x_n$
0	13
1	8,692308
2	5,852224

Notemos que la convergencia a la raíz cúbica de 13 no la tenemos asegurada, sería necesario estudiarlo en este caso (similar al segundo apartado).

**Ejercicio 1.1.2.5.** Sea  $S$  la única solución en el dominio cuadrado  $D = [0, 1] \times [0, 1]$  del sistema no lineal

$$\begin{cases} xy^2 + 4x - 1 = 0 \\ 4yx^2 + 6y - 1 = 0 \end{cases}$$

¿Es convergente a  $S$  la sucesión de iteraciones del método de iteración funcional definido por

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{4 + y_n^2} \\ y_{n+1} = \frac{1}{6 + 4x_n^2} \end{cases}$$

cualquiera que sea la aproximación inicial  $(x_0, y_0) \in [0, 1] \times [0, 1]$ ?

Podemos reescribir el sistema dado como sigue:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{4 + y^2} \\ y = \frac{1}{6 + 4x^2} \end{cases}$$

Definimos ahora la función siguiente:

$$G = (G_1, G_2) : \quad D \longrightarrow D \\ (x, y) \longmapsto \left( \frac{1}{4 + y^2}, \frac{1}{6 + 4x^2} \right)$$

Por tanto, la solución del sistema dado es el punto fijo de  $G$ . Veamos ahora si el método de iteración funcional converge a dicho punto fijo. En primer lugar, veamos que  $G(D) \subset D$ :

$$G_1(x, y) = \frac{1}{4 + y^2} \in [0, 1] \\ G_2(x, y) = \frac{1}{6 + 4x^2} \in [0, 1]$$

Por tanto,  $G(D) \subset D$ . Veamos ahora que  $G$  es una contracción en  $D$ . Para ello, calculamos la matriz jacobiana de  $G$ :

$$J_G(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2y}{(4 + y^2)^2} \\ -\frac{8x}{(6 + 4x^2)^2} & 0 \end{pmatrix} \quad \forall (x, y) \in D$$

Además, tenemos que:

$$\frac{2y}{(4 + y^2)^2} \leq \frac{2}{4^2} = \frac{1}{8} \quad \forall y \in [0, 1] \\ \frac{8x}{(6 + 4x^2)^2} \leq \frac{8}{6^2} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \quad \forall x \in [0, 1]$$

Por tanto,  $\|J_G(x, y)\|_\infty \leq 2/9 < 1$ . Como además sus derivadas parciales son continuas,  $G$  es una contracción en  $D$ . Por tanto, por el Teorema del Punto Fijo,  $G$  tiene un único punto fijo  $S \in D$ , y la sucesión:

$$X_{n+1} = G(X_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

converge a dicho punto fijo para cualquier  $X_0 \in D$ . Por tanto, la sucesión de iteraciones del método de iteración funcional converge a  $S$  para cualquier aproximación inicial  $(x_0, y_0) \in [0, 1] \times [0, 1]$ .

**Ejercicio 1.1.2.6.** Se sabe que  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es una función continua en  $[a, b]$  y posee un único cero en dicho intervalo. ¿Se puede aproximar siempre dicho cero mediante el método de bisección?

No, no siempre se puede aproximar el cero de una función mediante el método de bisección. Por ejemplo, sea la siguiente función:

$$\begin{aligned} f : [-1, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

En este caso, sabemos que hay una única raíz en  $[-1, 1]$ , que es  $x = 0$ . Sin embargo, el método de bisección no converge a dicha raíz, puesto que no hay un cambio de signo en dicho intervalo, por lo que no podemos construir la sucesión  $x_n$  que converge a la raíz. De hecho:

$$f(-1) = f(1) = 1 > 0$$

Por tanto, la condición que falla es que no hay cambio de signo en el intervalo  $[-1, 1]$ , por lo que no se puede aplicar el método de bisección en este caso.

**Ejercicio 1.1.2.7.** Se considera la ecuación  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ . Se pide:

1. Demuestra que la ecuación anterior tiene una única solución real  $s$ .

Como  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ , podemos calcular la derivada de  $f$  y estudiar su signo:

$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Estudiamos la monotonía de  $f$ , estudiando a su vez si hay raíces en dicho intervalo (por el Teorema de Bolzano):

- En  $\left] -\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right[$ :  $f$  es estrictamente creciente. Además:

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0$$

Por tanto,  $f$  no tiene raíces en  $\left] -\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right[$ .

- En  $\left] -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right[$ :  $f$  es estrictamente decreciente. Además:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0$$

Por tanto,  $f$  no tiene raíces en  $\left] -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right[$ .

- En  $\left] \frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty \right[ : f$  es estrictamente creciente. Además:

$$f(1) = -1 < 0 \qquad f(2) = 5 > 0$$

Por tanto, por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene una raíz en  $]1, 2[$ .

Por tanto,  $f$  tiene una única raíz real  $s$ , y sabemos que:

$$s \in ]1, 2[$$

2. Encuentra un intervalo  $[a, b]$  en el que al tomar cualquier punto  $x_0 \in [a, b]$  como aproximación inicial del método de Newton-Raphson aplicado a  $f(x)$  se asegure que la sucesión de iteraciones de dicho método converja a  $s$  con convergencia al menos cuadrática y demuestra que eso es así.

Tomamos el intervalo  $[1, 2]$ . Estudiamos la función  $f$  en dicho intervalo:

- a)  $f(1)f(2) < 0$ .  
b)  $f'(x) \neq 0$  en  $[1, 2]$ .

$$\frac{1}{\sqrt{3}} < 1 \iff 1 < \sqrt{3} \iff 1 < 3$$

Por tanto,  $f'(x) \neq 0$  en  $[1, 2]$ .

- c)  $f''(x) = 6x$  no cambia de signo en  $[1, 2]$ .  
d) Comprobemos la última condición:

$$\left| \frac{f(1)}{f'(1)} \right| = \left| \frac{-1}{2} \right| < 1 \qquad \left| \frac{f(2)}{f'(2)} \right| = \frac{5}{11} < 1$$

Por tanto, el método de Newton-Raphson converge a  $s$  con convergencia al menos cuadrática partiendo de cualquier punto  $x_0 \in [1, 2]$ .

Para demostrar que efectivamente la convergencia es al menos cuadrática, consideramos la función  $g$  siguiente:

$$\begin{aligned} g : [1, 2] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{aligned}$$

Dada la raíz  $s$  de  $f$ , entonces:

$$g(s) = s - \frac{f(s)}{f'(s)} = s - \frac{0}{f'(s)} = s$$

Calculamos ahora la derivada de  $g$ :

$$g'(s) = 1 - \frac{f'(s)f'(s) - f(s)f''(s)}{f'(s)^2} = 1 - \frac{f'(s)^2}{f'(s)^2} = 1 - 1 = 0$$

Por tanto, el método iterativo de Newton-Raphson aplicado a  $f$ , que coincide con el método iterativo de punto fijo aplicado a  $g$ , converge a  $s$  con convergencia al menos cuadrática.

3. Calcula las dos primeras iteraciones del método de Newton-Raphson para resolver la ecuación dada tomando como aproximación inicial  $x_0 = 1$ .

El método de Newton-Raphson se define como:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n - 1}{3x_n^2 - 1}$$

Por tanto, las dos primeras iteraciones son:

$n$	$x_n$
0	1
1	1,5
2	1,347826

**Ejercicio 1.1.2.8.** Se pretende estimar el valor de  $\sqrt[7]{2}$  usando un método iterativo.

1. Determina justificadamente una función  $f$  y un intervalo  $[a, b]$  donde se pueda aplicar el método de bisección. ¿Cuántas iteraciones son necesarias para conseguir un error inferior a  $10^{-4}$ ?

Sea la función  $f$  siguiente:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^7 - 2 \end{aligned}$$

Estudiamos la función  $f$  en el intervalo  $[1, 2]$ :

$$f(1) = -1 < 0 \quad f(2) = 2^7 - 2 > 0$$

Por tanto, por el Teorema de Bolzano,  $f$  tiene una raíz en  $]1, 2[$ ; y podemos aplicar el método de bisección en dicho intervalo. Calculamos el número de iteraciones necesarias para conseguir un error inferior a  $10^{-4}$ :

$$\begin{aligned} e_n < \frac{2-1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} < 10^{-4} &\iff 2^{n+1} > 10^4 \iff \\ &\iff n+1 > \log_2(10^4) = 13,2877 \iff n > 12,2877 \end{aligned}$$

Por tanto, necesitamos al menos 13 iteraciones para conseguir un error inferior a  $10^{-4}$ .

2. Determina justificadamente un intervalo  $[a, b]$  y un valor inicial  $x_0$  que permita asegurar que el método de Newton-Raphson converge a  $\sqrt[7]{2}$  y realiza 3 iteraciones del método.

Consideramos el intervalo  $[1, 2]$ . Veamos que podemos aplicar el método de Newton-Raphson en dicho intervalo:

- a)  $f(1)f(2) < 0$ .  
 b)  $f'(x) = 7x^6$  no se anula en  $[1, 2]$ .  
 c)  $f''(x) = 42x^5$  no cambia de signo en  $[1, 2]$ .  
 d) Comprobamos la última condición:

$$\left| \frac{f(1)}{f'(1)} \right| = \left| \frac{-1}{7} \right| < 1 \quad \left| \frac{f(2)}{f'(2)} \right| = \frac{2^7 - 2}{7 \cdot 2^6} = \frac{2^6 - 1}{7 \cdot 2^5} = \frac{63}{7 \cdot 32} < 1$$

Por tanto, el método de Newton-Raphson converge a  $\sqrt[7]{2}$  para cualquier semilla  $x_0 \in [1, 2]$ . Realizamos 3 iteraciones del método tomando  $x_0 = 1$ :

$n$	$x_n$
0	1
1	1,142857
2	1,107819
3	1,104127

3. Se propone el método iterativo

$$x_{n+1} = \frac{8x_n + 3x_n^8}{6 + 4x_n^7}$$

Realiza 3 iteraciones del método empezando en el mismo valor  $x_0$  del apartado anterior.

Realizamos 3 iteraciones del método propuesto:

$n$	$x_n$
0	1
1	1,1
2	1,1040893
3	1,1040895

4. ¿Cuál de los dos métodos converge más rápidamente a la solución? Justifica la respuesta.

En primer lugar, hemos de demostrar que si  $s \in \mathbb{R}$  es una raíz de  $f$ ,  $f(s) = 0$ , entonces  $s$  es un punto fijo de la función  $g$  definida como:

$$\begin{aligned} g: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{8x + 3x^8}{6 + 4x^7} \end{aligned}$$

Tenemos que:

$$g(s) = \frac{8s + 3s^8}{6 + 4s^7} = \frac{8s + 3 \cdot 2s}{6 + 4 \cdot 2} = \frac{14s}{14} = s$$

De forma análoga, definimos la función  $h$  empleada en Newton-Raphson:

$$\begin{aligned} h: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{aligned}$$



Tenemos que  $h(s) = g(s) = s$ . Estudiamos las primeras derivadas:

$$\begin{aligned} g'(s) &= \frac{(8 + 8 \cdot 3s^7)(6 + 4s^7) - (8s + 3s^8)(28s^6)}{(6 + 4s^7)^2} = \\ &= \frac{8(1 + 3s^7)}{6 + 4s^7} - \frac{28(8s^7 + 3s^{14})}{(6 + 4s^7)^2} = \\ &= \frac{8(1 + 3 \cdot 2)}{6 + 4 \cdot 2} - \frac{28(8 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2)}{(6 + 4 \cdot 2)^2} = 0 \\ h'(s) &= 1 - \frac{f'(s)f'(s) - f(s)f''(s)}{f'(s)^2} = \frac{f(s)f''(s)}{f'(s)^2} = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, sabemos que ambos métodos convergen a la raíz  $s$  con convergencia al menos cuadrática. Estudiamos si convergerán con orden cúbico:

$$\begin{aligned} g''(s) &= 8 \cdot \frac{3 \cdot 7s^6(6 + 4s^7) - (1 + 3s^7)(4 \cdot 7s^6)}{(6 + 4s^7)^2} - \\ &\quad - 28 \cdot \frac{[8 \cdot 7s^6 + 3 \cdot 14s^{13}](6 + 4s^7) - [8s^7 + 3s^{14}] \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7s^6}{(6 + 4s^7)^3} = \\ &= 8 \cdot \frac{3 \cdot 7s^6 \cdot 14 - 7(4 \cdot 7s^6)}{14^2} - 28 \cdot \frac{[8 \cdot 7s^6 + 3 \cdot 28s^6]14 - 28 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7s^6}{14^3} = \\ &= 4s^6 - 4s^6 = 0 \\ h''(s) &= \frac{[f'(s)f''(s) + f(s)f'''(s)]f'(s)^2 - 2f(s)f''(s)f'(s)f''(s)}{f'(s)^4} = \\ &= \frac{[f'(s)f''(s) + \cancel{f(s)}^0 f'''(s)]f'(s) - 2\cancel{f(s)}^0 f''(s)^2}{f'(s)^3} = \\ &= \frac{[f'(s)f''(s)]f'(s)}{f'(s)^3} = \frac{f''(s)}{f'(s)} = 7 \cdot 6 \cdot s^5 \cdot 7 \cdot s^6 = \frac{6}{s} \neq 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el método de Newton-Raphson converge a  $s$  con convergencia al menos cuadrática, mientras que el método propuesto converge a  $s$  con convergencia al menos cúbica. Por tanto, el método propuesto converge más rápidamente a la solución.

**Ejercicio 1.1.2.9.** Relacionado con la Sucesión de Sturm:

1. Sea  $\{f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x)\}$  una sucesión de Sturm en el intervalo  $[a, b]$  y  $k_i \in \mathbb{R}$  con  $k_i > 0$  para  $i = 0, \dots, m$ . Demuestra que si se define  $\tilde{f}_i = k_i f_i$ , entonces  $\{\tilde{f}_0(x), \tilde{f}_1(x), \dots, \tilde{f}_m(x)\}$  es también una sucesión de Sturm en  $[a, b]$ .

En primer lugar, como el producto de funciones continuas por una constante es una función continua,  $\tilde{f}_i \in \mathcal{C}[a, b]$ . Hemos de comprobar ahora las 4 propiedades de la sucesión de Sturm:

- a) Como  $f_0 \in \mathcal{C}^1[a, b]$ , entonces  $\tilde{f}_0 = k_0 f_0 \in \mathcal{C}^1[a, b]$ .

b) Tenemos que:

$$\begin{aligned}\tilde{f}_0(x) = k_0 f_0(x) = 0 &\iff f_0(x) = 0 \implies f'_0(x) f_1(x) \neq 0 \implies \\ &\implies \tilde{f}'_0(x) \tilde{f}_1(x) = k_0 k_1 f'_0(x) f_1(x) \neq 0\end{aligned}$$

donde hemos usado que  $k_0, k_1 > 0$ .

c) Fijado  $j = 1, \dots, m-1$ , tenemos que:

$$\begin{aligned}\tilde{f}_j(x) = k_j f_j(x) = 0 &\iff f_j(x) = 0 \implies f_{j-1}(x) f_{j+1}(x) \neq 0 \implies \\ &\implies \tilde{f}_{j-1}(x) \tilde{f}_{j+1}(x) = k_{j-1} k_{j+1} f_{j-1}(x) f_{j+1}(x) \neq 0\end{aligned}$$

donde hemos usado que  $k_{j-1}, k_{j+1} > 0$ .

d)  $\tilde{f}_m(x) = k_m f_m(x) \neq 0$  en  $[a, b]$ .

Por tanto,  $\{\tilde{f}_0(x), \tilde{f}_1(x), \dots, \tilde{f}_m(x)\}$  es una sucesión de Sturm en  $[a, b]$ .

2. Dado el polinomio  $p(x) = x^3 - x + 1$ , determina justificadamente un intervalo en el que estén contenidas todas sus raíces.

Sea  $\alpha \in \mathbb{R}$  el máximo de los valores absolutos de los coeficientes de  $p$ ; es decir,  $\alpha = \max\{1, 1, 1\} = 1$ . Por el Teorema de Acotación de Raíces, sabemos que todas las raíces de  $p$  están contenidas en el intervalo  $[-1 - \alpha, 1 + \alpha] = [-2, 2]$ .

3. Construye una sucesión de Sturm para el polinomio  $p$  y utilízala para determinar el número de raíces reales así como intervalos de amplitud 1 en los que se encuentran.

Definimos:

$$\begin{aligned}f_0(x) &= x^3 - x + 1 \\ f_1(x) &= 3x^2 - 1\end{aligned}$$

Calculamos ahora  $f_2(x)$ .

$$\begin{array}{r|l} x^3 & -x + 1 \\ -x^3 + \frac{1}{3}x & \\ \hline & -\frac{2}{3}x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3x^2 - 1 \\ \hline \frac{1}{3}x \end{array}$$

Para simplificar, establecemos:

$$\begin{aligned}f_2(x) &= -3 \cdot R(f_0(x), f_1(x)) \\ &= -3 \cdot \left( -\frac{2}{3}x + 1 \right) \\ &= 2x - 3\end{aligned}$$

Calculamos ahora  $f_3(x)$ .

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 & -1 \\ -3x^2 + \frac{9}{2}x & \frac{2x-3}{\frac{3}{2}x + \frac{9}{4}} \\ \hline \frac{9}{2}x & -1 \\ -\frac{9}{2}x + \frac{27}{4} & \\ \hline \frac{23}{4} & \end{array}$$

Para simplificar, establecemos:

$$\begin{aligned} f_3(x) &= -\frac{4}{23} \cdot R(f_1(x), f_2(x)) \\ &= -\frac{4}{23} \cdot \left(\frac{23}{4}\right) \\ &= -1 \end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión de Sturm para el polinomio  $p$  es:

$$\begin{aligned} f_0(x) &= x^3 - x + 1 \\ f_1(x) &= 3x^2 - 1 \\ f_2(x) &= 2x - 3 \\ f_3(x) &= -1 \end{aligned}$$

Separamos ahora las raíces:

$x$	$\text{sgn}(f_0(x))$	$\text{sgn}(f_1(x))$	$\text{sgn}(f_2(x))$	$\text{sgn}(f_3(x))$	Nº Cambios Signo
-2	-	+	-	-	2
-1	+	+	-	-	1
0	+	-	-	-	1
1	+	+	-	-	1
2	+	+	+	-	1

Por tanto,  $p$  tiene una única raíz real, y está contenida en el intervalo  $[-2, -1]$ .

- Realiza dos iteraciones del método de la secante para calcular de forma aproximada el valor de la raíz más pequeña justificando la convergencia.

Tomemos como semillas los extremos del intervalo,  $x_0 = -2$  y  $x_1 = -1$ . El método de la secante se define, para  $n \geq 1$ , como:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Realizamos dos iteraciones del método de la secante:

$n$	$x_n$	$f(x_n)$
0	-2	-5
1	-1	1
2	-7/6	0,578704
3	3,101627	

**Ejercicio 1.1.2.10.** Contesta razonadamente a las siguientes preguntas:

1. Se pretende resolver la ecuación  $f(x) = 0$  utilizando el método de Newton-Raphson sabiendo que es convergente localmente ¿Qué debe cumplir la función  $f$  para que dicho método tenga convergencia local al menos cúbica?
2. Si sabemos que  $f$  tiene una única raíz real en el intervalo  $[-1, 1]$ , ¿Cuántas iteraciones del método de bisección hay que realizar para conseguir un error menor que  $10^{-7}$ ?
3. ¿Es el método de Newton-Raphson para resolver el sistema  $F(X) = 0$  invariante frente a transformaciones lineales de  $F$ ?

*Observación.* Que sea invariante frente a transformaciones lineales quiere decir que la secuencia de aproximaciones  $\{X_n\}$  es la misma si se aplica el método al sistema  $F(X) = 0$  o si se aplica al sistema  $AF(X) = 0$ , siendo  $A$  una matriz no singular, partiendo del mismo vector inicial  $X_0$ .

**Ejercicio 1.1.2.11.** El problema de trisección de un ángulo consiste en hallar las razones trigonométricas de  $\alpha/3$ , conociendo las de  $\alpha \in ]0, \pi/2[$ .

1. Llamando  $x = \sin(\alpha/3)$  y  $a = \sin \alpha$ , demuestra que  $x$  es solución de la ecuación  $-4x^3 + 3x - a = 0$ .
2. Construye una sucesión de Sturm de polinomios asociada al polinomio  $p(x) = -4x^3 + 3x - a$  y deduce que  $p$  tiene exactamente 3 raíces reales.
3. Demuestra que  $\sin(\alpha/3)$  es la única solución de la ecuación  $p(x) = 0$ , en el intervalo  $]0, \alpha/2[$  y que, tomando como valores iniciales  $x_0 = \alpha/3$  o  $x_0 = \alpha/2$ , el método de Newton-Raphson converge.
4. Para resolver la ecuación anterior, se propone el método iterativo

$$x_{n+1} = \frac{a}{3 - 4x_n^2}$$

Estudia bajo qué condiciones el método converge localmente a la solución. ¿Cuál de los dos métodos converge más rápidamente?

5. Tomando  $a = 1/2$ , realiza una iteración del método de Newton-Raphson partiendo de  $x_0 = 1/6$  para obtener una aproximación de  $\sin(\pi/18)$ .