

Variable Compleja I

Examen XIV

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Variable Compleja I

Examen XIV

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2024-2025

Asignatura Variable Compleja I.

Curso Académico 2023-24.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor Javier Merí de la Maza.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 10 de Junio de 2024.

Duración 3.5 horas.

Ejercicio 1 (2.5 puntos). Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : \mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{C}$ la función dada por

$$f_n(z) = \int_1^2 \frac{\log(nz + t^2)}{n^2 + t^2} dt.$$

1. Probar que $f_n \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-)$.
2. Probar que la serie de funciones $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ y que su suma es una función holomorfa en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$.

Ejercicio 2 (2.5 puntos). Probar que, para $a, t \in \mathbb{R}^+$, se tiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(tx)}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi}{2a^3}(1 + at)e^{-at}.$$

Ejercicio 3 (2.5 puntos). Probar que una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^*)$ que diverge en cero y en infinito tiene al menos un cero. Probar además que el número de ceros de f es finito y mayor o igual que 2 (contando multiplicidad).

Ejercicio 4 (2.5 puntos). Probar el *Lema de Schwarz*.

Lema (de Schwarz). Sea $f \in H(D(0, 1))$ verificando $f(0) = 0$ y $|f(z)| \leq 1$ para cada $z \in D(0, 1)$. Probar que $|f'(0)| \leq 1$ y $|f(z)| \leq |z|$ para cada $z \in D(0, 1)$. Además, si ocurre $|f'(0)| = 1$ o $|f(z_0)| = |z_0|$ para algún $z_0 \in D(0, 1) \setminus \{0\}$, entonces existe $\alpha \in \mathbb{C}$ de modo que $f(z) = \alpha z$ para cada $z \in D(0, 1)$.

Observación. Para cada $0 < r < 1$, estimar convenientemente el valor $\max\{|g(z)| : z \in \overline{D}(0, r)\}$ donde la función $g : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$ viene dada por $g(0) = f'(0)$ y $g(z) = f(z)/z$ para cada $z \in D(0, 1)$.

Ejercicio 1 (2.5 puntos). Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : \mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{C}$ la función dada por

$$f_n(z) = \int_1^2 \frac{\log(nz + t^2)}{n^2 + t^2} dt.$$

1. Probar que $f_n \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-)$.

Definimos la siguiente función:

$$\begin{aligned} \Phi : [1, 2] \times \mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^- &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (t, z) &\longmapsto \frac{\log(nz + t^2)}{n^2 + t^2} \end{aligned}$$

Veamos en primer lugar que Φ está bien definida. El denominador no se anula puesto que $n, t > 0$, por lo que vemos que $nz + t^2 \neq 0$. Tenemos que:

$$nz + t^2 = 0 \iff z = -\frac{t^2}{n} \in \mathbb{R}^-$$

Por tanto, $nz + t^2 \neq 0$ para todo $t \in [1, 2]$ y $z \in \mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$. Así que Φ está bien definida. Por tanto, Φ es continua en su dominio. Fijado ahora $t \in [1, 2]$, veamos que la función $z \mapsto \Phi(t, z)$ es holomorfa en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$. Para ello, es necesario ver que $nz + t^2 \notin \mathbb{R}^-$. Supongamos que $nz + t^2 \in \mathbb{R}^-$, por lo que $\exists r \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$nz + t^2 = -r \iff z = -\frac{t^2 + r}{n} \in \mathbb{R}^-.$$

Esto es una contradicción, ya que $z \in \mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$. Por tanto, $nz + t^2 \notin \mathbb{R}^-$. Por tanto, hemos visto que, fijado $t \in [1, 2]$, la función $\Phi(t, \cdot)$ es holomorfa en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$. Por tanto, por el Teorema de Holomorfía de Integrales dependientes de un parámetro, tenemos que:

$$f_n \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2. Probar que la serie de funciones $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ y que su suma es una función holomorfa en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$.

Puesto que $f_n \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, buscamos aplicar el Teorema de Convergencia de Weierstrass. Para ello, sea $K \subset \mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ compacto. Tenemos que, para cada $n \in \mathbb{N}$ y $z \in K$:

$$|f_n(z)| = \left| \int_1^2 \frac{\log(nz + t^2)}{n^2 + t^2} dt \right| \leq \sup \left\{ \left| \frac{\log(nz + t^2)}{n^2 + t^2} \right| : t \in [1, 2] \right\}$$

Veamos ahora qué acotaciones realizar.

$$\begin{aligned} |n^2 + t^2| &\geq n^2 + 1^2 = n^2 + 1 \\ |\log(nz + t^2)| &= |\ln |nz + t^2| + i \arg(nz + t^2)| \leq \ln |nz + t^2| + |\arg(nz + t^2)| \leq \\ &\leq \ln(n|z| + 4) + \pi \end{aligned}$$

donde en la última desigualdad hemos usado que el logaritmo real es creciente y el argumento principal está acotado por π . Como K es compacto, como el módulo es una función continua existe $M \in \mathbb{R}$ tal que:

$$M = \max \{|z| : z \in K\} > 0$$

Por tanto, tenemos que:

$$|f_n(z)| \leq \frac{\ln(nM+4) + \pi}{n^2 + 1}$$

Veamos ahora que la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(nM+4) + \pi}{n^2 + 1}$ converge. Tenemos que, para n suficientemente grande, se cumple que:

$$\begin{aligned} \frac{\ln(nM+4) + \pi}{n^2 + 1} &\leq \frac{\ln(n(M+1)) + \pi}{n^2} = \frac{\ln(n) + \ln(M+1) + \pi}{n^2} = \\ &= \frac{\ln(n)}{n^2} + \frac{\ln(M+1) + \pi}{n^2} \leq \frac{\sqrt{n}}{n^2} + \frac{\ln(M+1) + \pi}{n^2} = \\ &= \frac{1}{n^{3/2}} + \frac{\ln(M+1) + \pi}{n^2} \quad \forall n \geq 4 \end{aligned}$$

Como $n^{-3/2}$, ambas series sabemos que son convergentes. Por tanto, la serie en cuestión es convergente. Por el Test de Weierstrass, tenemos que la serie de funciones $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformemente en K .

Por el Teorema de Convergencia de Weierstrass, tenemos que la serie de funciones $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ y que su suma es una función holomorfa en $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$.

Ejercicio 2 (2.5 puntos). Probar que, para $a, t \in \mathbb{R}^+$, se tiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(tx)}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi}{2a^3} (1 + at) e^{-at}.$$

Calculamos las raíces del denominador:

$$x^2 + a^2 = 0 \implies x^2 = -a^2 \implies x \in A := \{-ai, ai\}.$$

Definimos la función:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus A &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{e^{itz}}{(z^2 + a^2)^2} \end{aligned}$$

Notemos que $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus A)$, y que $A' = \emptyset$, por lo que podemos aplicar el Teorema de los Residuos. Como \mathbb{C} es homológicamente conexo, podemos aplicar el Teorema de los Residuos para cualquier ciclo Σ en $\mathbb{C} \setminus A$.




Figura 1: Ciclo de integración Σ_R del Ejercicio 2.

Para todo $R > a$, consideramos el siguiente ciclo $\Sigma_R = \gamma_R + \sigma_R$, representado en la Figura ??, donde:

$$\begin{aligned} \gamma_R: [-R, R] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_R: [0, \pi] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto Re^{it} \end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que:

$$\int_{\Sigma_R} f(z) dz = \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{\sigma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_0 \in A} \text{Res}(f, z_0) \text{Ind}_{\Sigma_R}(z_0)$$

Calculemos la primera integral que nos ha resultado:

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{itz}}{(z^2 + a^2)^2} dz = \int_{-R}^R \frac{\cos(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz + i \int_{-R}^R \frac{\text{sen}(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz$$

Notemos que la integral pedida es la parte real de la integral. Veamos la siguiente integral:

$$\int_{\sigma_R} f(z) dz \leq \pi R \cdot \sup \left\{ \left| \frac{e^{itz}}{(z^2 + a^2)^2} \right| : z \in \sigma_R^* \right\} \leq \pi R \cdot \frac{|e^{itR}|}{(R^2 - a^2)^2} = \frac{\pi R}{(R^2 - a^2)^2}$$

donde hemos usado que, si $z \in \sigma_R^*$, entonces $|z| = R$ y, como $R > a > 0$, tenemos que $R^2 > a^2$, por lo que:

$$|z^2 + a^2| \geq ||z^2| - |a^2|| = |R^2 - a^2| = R^2 - a^2.$$

Además, también hemos usado que $|e^{itR}| = 1$. Por tanto, como la expresión anterior es válida para cualquier $R > a$, podemos hacer $R \rightarrow +\infty$ y tenemos que:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\sigma_R} f(z) dz = 0.$$

Calculamos ahora los índices. Por la forma en la que se ha definido el ciclo Σ_R , para todo $R > a$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\text{Ind}_{\Sigma_R}(-ai) &= 0 \\ \text{Ind}_{\Sigma_R}(ai) &= 1.\end{aligned}$$

Por tanto, tan solo hemos de calcular el residuo en el polo ai .

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow ai} (z - ai)f(z) &= \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai) \cdot \frac{e^{itz}}{[(z - ai)(z + ai)]^2} = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{itz}}{(z + ai)^2(z - ai)} = +\infty. \\ \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai)^2 f(z) &= \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{itz}}{(z + ai)^2} = \frac{e^{itai}}{(2ai)^2} = \frac{e^{-at}}{-4a^2} = -\frac{e^{-at}}{4a^2} \in \mathbb{C}^*\end{aligned}$$

Por tanto, deducimos que el orden del polo ai es 2, y que el residuo es:

$$\begin{aligned}\text{Res}(f, ai) &= \lim_{z \rightarrow ai} \frac{d}{dz} ((z - ai)^2 f(z)) = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{itz}}{(z + ai)^2} \right) = \\ &= \lim_{z \rightarrow ai} \frac{ite^{itz}(z + ai)^2 - e^{itz} \cdot 2(z + ai)}{(z + ai)^4} = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{ite^{itz}(z + ai) - 2e^{itz}}{(z + ai)^3} = \\ &= \cdot \lim_{z \rightarrow ai} e^{itz} \frac{it(z + ai) - 2}{(z + ai)^3} = e^{-at} \cdot \frac{it(2ai) - 2}{(2ai)^3} = e^{-at} \cdot \frac{-at - 1}{-4a^3i} = e^{-at} \cdot \frac{at + 1}{4a^3i}\end{aligned}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\int_{\Sigma_R} f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{at + 1}{4a^3i} \cdot 1 \right) = \frac{\pi \cdot e^{-at}(at + 1)}{2a^3}.$$

Por tanto, tenemos que:

$$\int_{-R}^R \frac{\cos(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz + i \int_{-R}^R \frac{\text{sen}(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz + \int_{\sigma_R} f(z) dz = \frac{\pi \cdot e^{-at}(at + 1)}{2a^3}.$$

Como esta expresión es válida para cualquier $R > a$, podemos hacer $R \rightarrow +\infty$ y tenemos que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\text{sen}(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz = \frac{\pi \cdot e^{-at}(at + 1)}{2a^3}.$$

Igualando las partes reales, tenemos que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(tz)}{(z^2 + a^2)^2} dz = \frac{\pi \cdot e^{-at}(at + 1)}{2a^3}.$$

como queríamos demostrar.

Ejercicio 3 (2.5 puntos). Probar que una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^*)$ que diverge en cero y en infinito tiene al menos un cero. Probar además que el número de ceros de f es finito y mayor o igual que 2 (contando multiplicidad).

Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^*)$ tal que:

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{z \rightarrow +\infty} f(z) = +\infty.$$

Como diverge en cero, tenemos que tiene un polo en cero. Sea k el orden de dicho polo, y por tanto $\exists \Psi \in \mathcal{H}(\mathbb{C}^*)$, con $\Psi(0) \neq 0$, tal que:

$$f(z) = \frac{\Psi(z)}{z^k} \quad \forall z \in \mathbb{C}^*.$$

Ejercicio 4 (2.5 puntos). Probar el *Lema de Schwarz*.

Lema (de Schwarz). Sea $f \in H(D(0, 1))$ verificando $f(0) = 0$ y $|f(z)| \leq 1$ para cada $z \in D(0, 1)$. Probar que $|f'(0)| \leq 1$ y $|f(z)| \leq |z|$ para cada $z \in D(0, 1)$. Además, si ocurre $|f'(0)| = 1$ o $|f(z_0)| = |z_0|$ para algún $z_0 \in D(0, 1) \setminus \{0\}$, entonces existe $\alpha \in \mathbb{C}$ de modo que $f(z) = \alpha z$ para cada $z \in D(0, 1)$.

Observación. Para cada $0 < r < 1$, estimar convenientemente el valor $\max\{|g(z)| : z \in \overline{D}(0, r)\}$ donde la función $g : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$ viene dada por $g(0) = f'(0)$ y $g(z) = f(z)/z$ para cada $z \in D(0, 1)$.