

Probabilidad

Examen V

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Probabilidad

Examen V

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos
José Juan Urrutia Milán

Granada, 2024-2025

Asignatura Probabilidad.

Curso Académico 2021-22.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Descripción Examen Ordinario

Fecha 21 de enero de 2022.

PARTE 1 (2.5 puntos)

Ejercicio 1 (0.25 puntos). Sean X_1, X_2, X_3 variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según una ley Binomial, $B(3, 1/2)$. Justificar que:

$$P[X_1 + X_2 + X_3 = 8] = \frac{9}{2^9}$$

Tenemos que:

$$X_1, X_2, X_3 \sim B(3, 1/2)$$

Por la reproductividad de la distribución binomial, como son independientes, tenemos que:

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim B(9, 1/2)$$

Por tanto, usando la función masa de probabilidad de la distribución binomial, tenemos que:

$$P[X_1 + X_2 + X_3 = 8] = \binom{9}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{9}{2^9}$$

Ejercicio 2 (0.25 puntos). Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según una ley de Poisson, $\mathcal{P}(3)$. Justificar que:

$$P[X_1 + X_2 > 0] = \frac{e^6 - 1}{e^6}$$

Tenemos que:

$$X_1, X_2 \sim \mathcal{P}(3)$$

Por la reproductividad de la distribución de Poisson, por ser independientes tenemos que:

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(6)$$

Por tanto, tenemos que:

$$P[X_1 + X_2 > 0] = 1 - P[X_1 + X_2 = 0] = 1 - \frac{e^{-6}6^0}{0!} = 1 - e^{-6} = \frac{e^6 - 1}{e^6}$$

Ejercicio 3. Para predecir los valores de una variable aleatoria X a partir de los de otra variable aleatoria Y se considera un modelo lineal:

1. **(0.50 puntos)** Obtener de forma razonada los coeficientes del modelo lineal considerado.

Se busca aproximar X como $\hat{X} = aY + b$. Para ello, se minimiza el error cuadrático medio:

$$\begin{aligned} \text{E.C.M.}(X | Y) &= E[(X - \hat{X})^2] = E[(X - aY - b)^2] = \\ &= E[X^2 - 2aXY - 2bX + a^2Y^2 + 2abY + b^2] = \\ &= E[X^2] - 2aE[XY] - 2bE[X] + a^2E[Y^2] + 2abE[Y] + b^2 \end{aligned}$$

Para ello, se busca minizar la siguiente función:

$$L(a, b) = \text{E.C.M.}(X | Y) = E[X^2] - 2aE[XY] - 2bE[X] + a^2E[Y^2] + 2abE[Y] + b^2$$

Se tiene demostrado en Teoría que llegamos a la siguiente expresión:

$$\begin{cases} a = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[Y]} \\ b = E[X] - aE[Y] \end{cases}$$

2. **(0.75 puntos)** Si $x - y = 1$ y $2y - 3x = -1$ son las dos rectas de regresión para el vector (X, Y) , se pide: identificar la recta de regresión del apartado anterior; obtener una medida de la bondad del ajuste y calcular la esperanza del vector (X, Y) .

Suponemos que las rectas de regresión de X sobre Y y de Y sobre X son $x - y = 1$ y $2y - 3x = -1$, respectivamente. Por tanto, tenemos que:

$$\begin{aligned} x &= y + 1 = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[Y]} \cdot y + E[X] - \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[Y]} \cdot E[Y] \\ y &= \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[X]} \cdot x + E[Y] - \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[X]} \cdot E[X] \end{aligned}$$

Identificando términos, obtenemos que:

$$\frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[X]} \cdot \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{Var}[Y]} = \rho_{X,Y}^2 = 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2} > 1$$

Por tanto, llegamos a una contradicción, por lo que la suposición es incorrecta. La recta de regresión de Y sobre X es $y = x - 1$ y la de X sobre Y es $x = \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}$.

La proporción de varianza de cada variable que queda explicada por el modelo de regresión lineal es el coeficiente de determinación, que en este caso es:

$$\rho_{X,Y}^2 = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} \approx 0,667 \%$$

Por último, por identificación de términos, tenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} E[X] - E[Y] = 1 \\ E[Y] - \frac{3}{2}E[X] = -\frac{1}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} E[X] = -1 \\ E[Y] = -2 \end{cases}$$

Por tanto, tenemos que:

$$E[(X, Y)] = (-1 \quad -2)$$

Ejercicio 4 (0.75 puntos). Las componentes de un vector aleatorio continuo son variables aleatorias continuas. Sin embargo, en general, un conjunto de variables aleatorias continuas no da lugar a un vector aleatorio continuo. Justificar que este recíproco sí es cierto si consideramos un conjunto X_1, X_2, \dots, X_n de variables aleatorias continuas independientes.

Definimos la siguiente función continua en \mathbb{R}^n :

$$\begin{aligned} f_{(X_1, X_2, \dots, X_n)} : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\longmapsto \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) \end{aligned}$$

y probaremos que es la función de densidad de (X_1, X_2, \dots, X_n) . En primer lugar, está bien definida por estarlo cada una de las funciones de densidad de las variables aleatorias. Veamos que:

$$F_{(X_1, X_2, \dots, X_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} \prod_{i=1}^n f_{X_i}(t_i) dt_1 \cdots dt_n$$

Para ello, como son independientes, tenemos que:

$$P[X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n] = \prod_{i=1}^n P[X_i \leq x_i]$$

Por ser f_{X_i} la función de densidad de X_i , tenemos que:

$$F_{(X_1, X_2, \dots, X_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{x_i} f_{X_i}(t_i) dt_i$$

Por tanto, tenemos que la función que hemos definido efectivamente es la función de densidad de (X_1, X_2, \dots, X_n) .

Aunque no sería necesario, veamos que cumple las condiciones de toda función de densidad. En primer lugar, es no negativa, ya que cada término es mayor o igual que 0. Veamos ahora que integra 1:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f_{(X_1, X_2, \dots, X_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n &= \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) dx_1 \cdots dx_n = \\ &= \prod_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} f_{X_i}(x_i) dx_i = \prod_{i=1}^n 1 = 1 \end{aligned}$$

PARTE 2 (7.5 puntos)

Ejercicio 1 (5 puntos). Dado el vector aleatorio continuo (X, Y) distribuido uniformemente en el recinto

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1 \wedge x, y < 0\}$$

Observación. A tener en cuenta:

- En el **apartado 1.2** se obtiene **hasta 1 punto** si las integrales se dejan indicadas y **hasta 1.5 puntos** si se obtienen sus primitivas de forma explícita.
- Si necesitara obtener la primitiva de la función $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, realizar el cambio de variable unidimensional $x = \sin(t)$.

- $\arcsen(0) = 0$, $\arcsen(-1) = -\frac{\pi}{2}$, $\arcsen\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\pi}{4}$.
- $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, $\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$.

1. **(0.25 puntos)** Obtener la función de densidad conjunta.
2. **(1.50 puntos)** Obtener la función de distribución de probabilidad conjunta.
3. **(0.75 puntos)** Obtener las funciones de densidad condicionadas.
4. **(0.50 puntos)** Obtener la probabilidad de que $X - Y > 0$.
5. **(1.50 puntos)** Obtener la mejor aproximación mínimo cuadrática a la variable aleatoria Y conocidos los valores de la variable X y el error cuadrático medio de esta aproximación.
6. **(0.50 puntos)** Obtener una medida de la bondad del ajuste del apartado anterior.

Ejercicio 2 (2.5 puntos). Dado el vector aleatorio (X, Y) con función generatriz de momentos

$$M_{(X,Y)}(t_1, t_2) = \exp\left(\frac{2t_1 + 4t_1^2 + 9t_2^2 + 6t_1t_2}{2}\right)$$

1. **(0.75 puntos)** Obtener la razón de correlación y el coeficiente de correlación lineal de las variables (X, Y) .
2. **(0.75 puntos)** Indicar las distribuciones de las variables aleatorias $Y/X = 1$ y $X/Y = 0$.
3. **(1 punto)** Obtener la distribución de probabilidad del vector aleatorio $(2X, Y - X)$. Justificar que las variables aleatorias $2X$ y $Y - X$ tienen cierta asociación lineal en sentido negativo.