

# Übungsblatt 06

## Stochastik 2

Abgabe von: **Linus Mußmächer**

31. Mai 2023

### 6.1 Zentralübung

- (i) Es ist  $p_{X|X}(x|x) = 1$ , also  $\mathbb{E}[X|X = x] = x$  und damit  $g : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x \cdot 1_{X(\Omega)}$ . Es folgt  $\mathbb{E}[X|X](\omega) = g(X(\omega)) = X(\omega)$  und damit  $\mathbb{E}[X|X] = X$ .
- (ii) Es ist  $p_{X|Y}(x|y) = \mathbb{P}(X = x)$  aufgrund der Unabhängigkeit. Somit ist  $\mathbb{E}[X|Y = y] = \mathbb{E}[X]$  sowie  $g : Y(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \mathbb{E}[X]$  konstant. Es folgt  $\mathbb{E}[X|Y](\omega) = g(Y(\omega)) = \mathbb{E}[X]$  und damit  $\mathbb{E}[X|Y] = \mathbb{E}[X]$ .
- (iii) Aus (i) folgt  $\mathbb{E}[X + Y|X + Y] = X + Y$ . Weiterhin ist, da  $X$  und  $Y$  gleichverteilt sind,  $\mathbb{E}[X|X+Y] = \mathbb{E}[Y|X+Y]$ . Zusammen mit der Linearität des (bedingten) Erwartungswertes liefert dies

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X + Y|X + Y] &= \mathbb{E}[X|X + Y] + \mathbb{E}[Y|X + Y] = 2 \cdot \mathbb{E}[X|X + Y] \\ \Leftrightarrow \mathbb{E}[X|X + Y] &= \frac{1}{2}\mathbb{E}[X + Y|X + Y] = \frac{1}{2}(X + Y)\end{aligned}$$

### 6.2

### 6.3

- (i) Wir setzen  $\Omega = \{0, 1\}^3$  sowie

$$Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto x + y + z \quad (6.1)$$

$$G : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto x + \frac{y + z}{2} \quad (6.2)$$

d.h. die erste Komponente von  $\omega \in \Omega$  beschreibt, ob die 1-Euro-Münze auf Zahl gefallen ist und die zweite und dritte Komponente betrachtet analog die 50-Cent-Münzen. Da alle acht Elementarereignisse in  $\Omega$  gleich wahrscheinlich sind, gilt für die Verteilungen:

$$\begin{aligned}P(Z = 0) &= \frac{1}{8} & A_0 &= \{(0, 0, 0)\} \\ P(Z = 1) &= \frac{3}{8} & A_1 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \\ P(Z = 2) &= \frac{3}{8} & A_2 &= \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)\} \\ P(Z = 3) &= \frac{1}{8} & A_3 &= \{(1, 1, 1)\}\end{aligned}$$

sowie

$$P(G = 0) = \frac{1}{8} \quad B_0 = \{(0, 0, 0)\}$$

$$\begin{aligned}
P(G = 0.5) &= \frac{2}{8} & B_{0.5} &= \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \\
P(G = 1) &= \frac{2}{8} & B_1 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 1)\} \\
P(G = 1.5) &= \frac{2}{8} & B_{1.5} &= \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\} \\
P(G = 2) &= \frac{1}{8} & B_2 &= \{(1, 1, 1)\}
\end{aligned}$$

und für den Erwartungswert folgt

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{8} \cdot 0 + \frac{3}{8} \cdot 1 + \frac{3}{8} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$$

- (ii)  $Z = 2$  wird genau für die Elementarereignisse in der Menge  $A_2$  realisiert. Wir betrachten also jeweils die Schnittmenge der  $B$ -Mengen mit  $A_2$ :

$$\begin{aligned}
P(G = 0|Z = 2) &= \frac{0}{3} & B_0 \cap A_2 &= \{\} \\
P(G = 0.5|Z = 2) &= \frac{0}{3} & B_{0.5} \cap A_2 &= \{\} \\
P(G = 1|Z = 2) &= \frac{1}{3} & B_1 \cap A_2 &= \{(0, 1, 1)\} \\
P(G = 1.5|Z = 2) &= \frac{2}{3} & B_{1.5} \cap A_2 &= \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\} \\
P(G = 2|Z = 2) &= \frac{0}{3} & B_2 \cap A_2 &= \{\}
\end{aligned}$$

Der zugehörige Erwartungswert ist damit  $\mathbb{E}[G|Z = 2] = 1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ .

- (iii) Es ist  $A_0 = \{(0, 0, 0)\}$ . Dieses Ereignis ist nur in  $B_0$  enthalten, womit  $\mathbb{E}[G|Z = 0] = 0$  folgt. Ebenfalls gilt  $A_3 = \{(1, 1, 1)\}$ . Auch hier liegt nur ein einziges Ereignis vor, dass nur in  $B_2$  enthalten ist. Somit folgt  $\mathbb{E}[G|Z = 3] = 2$ . Analog zur (ii) lässt sich  $\mathbb{E}[G|Z = 1] = \frac{2}{3}$  nachrechnen. Damit gilt für alle möglichen Realisierungen von  $Z$  tatsächlich  $\mathbb{E}[G|Z = z] = \frac{2}{3}z$ , also  $\mathbb{E}[G|Z] = \frac{2}{3}Z$ .

- (iv) Die Tower-Rule besagt nun

$$\mathbb{E}[G] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[G|Z]] = \mathbb{E}\left[\frac{2}{3}Z\right] = \frac{2}{3}\mathbb{E}[Z] = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1.$$

## 6.4