

кафедра «Математическое моделирование»

проф. П. Л. Иванов

Интегралы и дифференциальные уравнения

конспект лекций

для студентов 1-го курса 2-го семестра

специальностей РЛ1,2,3,6, БМТ1,2

Лекции 20-21

Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение линейного однородного дифференциального уравнения. Построение общего решения по корням характеристического уравнения (вывод для $n = 2$). Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения. Теорема о наложении частных решений. Метод Лагранжа вариации постоянных (вывод для $n = 2$). Структура частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида.

Рассмотрим линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0, \quad (1)$$

где a_1, \dots, a_n – вещественные числа. Уравнение

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

называется характеристическим уравнением дифференциального уравнения (1). Пусть λ_0 – вещественный корень характеристического уравнения. Тогда $y_0(x) = e^{\lambda_0 x}$ есть решение уравнения (1). В самом деле, $y_0^{(k)}(x) = \lambda_0^k e^{\lambda_0 x}$ (доказывается по индукции), поэтому

$$y_0^{(n)} + a_1 y_0^{(n-1)} + \dots + a_n y_0 = (\lambda_0^n + a_1 \lambda_0^{n-1} + \dots + a_n) \cdot e^{\lambda_0 x} = 0.$$

Пусть имеется комплекснозначная функция $w(x) = u(x) + i v(x)$ вещественной переменной x . Считая, что $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы (соответствующее число раз), положим по определению

$$w^{(k)}(x) = u^{(k)}(x) + i v^{(k)}(x), \quad k = 0, 1, \dots$$

При таком определении сохраняются правила дифференцирования суммы, произведения и частного, а также многие другие свойства операции дифференцирования. Далее, если $z = x + i y$, то будем считать по определению, что

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Пусть $\lambda = \alpha + i \beta$, и пусть x – вещественная переменная. Тогда

$$e^{\lambda x} = e^{\alpha x + i \beta x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x).$$

Поэтому

$$(e^{\lambda x})' = \alpha e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) + e^{\alpha x} (-\beta \sin \beta x + i \beta \cos \beta x) = (\alpha + i \beta) e^{(\alpha + i \beta) x} = \lambda e^{\lambda x} .$$

По индукции можно доказать формулу

$$(e^{\lambda x})^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x} , \quad k = 0, 1, 2, \dots .$$

Нетрудно проверить, что если функция $w(x) = u(x) + i v(x)$ есть решение уравнения (1), то ее вещественная часть $u(x)$ и мнимая часть $v(x)$ также будут решениями этого уравнения (при вещественных коэффициентах a_0, a_1, \dots, a_n). С помощью равенства $(e^{\lambda x})^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x}$ можно без труда проверить, что если $\lambda_0 = \alpha + i \beta \neq 0$, есть комплексный корень характеристического уравнения, то $w(x) = e^{\lambda_0 x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$ есть решение уравнения (1), а тогда и функции $u(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x$ и $v(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x$ также будут решениями этого уравнения. Мы видим, что, зная корни характеристического уравнения, можно находить частные решения соответствующего линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами. Если известны все корни характеристического уравнения, то можно построить и общее решение соответствующего дифференциального уравнения. Подробно рассмотрим уравнение второго порядка. Линейное однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0 , \quad (2)$$

где a_1 и a_2 - вещественные числа. Напишем соответствующее характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0 . \quad (3)$$

Для уравнения (3) возможен один (и только один) из следующих случаев.

1. Корни уравнения (3) вещественны и различны. Обозначим эти корни λ_1 и λ_2 . Тогда фундаментальную систему решений уравнения (2) образуют функции $y_1 = e^{\lambda_1 x}$ и $y_2 = e^{\lambda_2 x}$, а общее решение имеет вид

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} .$$

Здесь нужно проверить лишь линейную независимость решений y_1 и y_2 ; чтобы убедиться в этом, составим определитель Вронского:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 \cdot x} & e^{\lambda_2 \cdot x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 \cdot x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 \cdot x} \end{vmatrix} = e^{\lambda_1 \cdot x} \cdot e^{\lambda_2 \cdot x} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot x} \cdot (\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0 .$$

Таким образом, y_1 и y_2 линейно независимы и, следовательно, образуют фундаментальную систему решений уравнения (2).

2. Уравнение (3) имеет один вещественный корень кратности 2; обозначим этот корень λ_0 . Тогда фундаментальную систему решений уравнения (2) образуют функции $y_1 = e^{\lambda_0 \cdot x}$ и $y_2 = x e^{\lambda_0 \cdot x}$, а общее решение этого уравнения есть

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_0 \cdot x} .$$

Проверим, что y_2 есть решение уравнения (2). Т.к. λ_0 - корень кратности 2 характеристического уравнения (3), то $\lambda_0^2 + a_1 \lambda_0 + a_2 = 0$ и $2\lambda_0 + a_1 = 0$. Далее

$$\begin{aligned} y_2' &= (1 + \lambda_0 x) \cdot e^{\lambda_0 \cdot x} , \\ y_2'' &= (2\lambda_0 + \lambda_0^2 x) \cdot e^{\lambda_0 \cdot x} . \end{aligned}$$

Отсюда

$$y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = e^{\lambda_0 x} (2\lambda_0 + \lambda_0^2 x + a_1 + a_1 \lambda_0 x + a_2 x) = e^{\lambda_0 x} (2\lambda_0 + a_1 + x(\lambda_0^2 + a_1 \lambda_0 + a_2)) = 0 ,$$

т.е. y_2 – решение уравнения (2). Проверим линейную независимость y_1 и y_2 :

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_0 x} & x \cdot e^{\lambda_0 x} \\ \lambda_0 e^{\lambda_0 x} & (1 + \lambda_0 x) e^{\lambda_0 x} \end{vmatrix} = e^{2\lambda_0 x} \cdot \begin{vmatrix} 1 & x \\ \lambda_0 & 1 + \lambda_0 x \end{vmatrix} = e^{2\lambda_0 x} \neq 0 .$$

Таким образом, y_1 и y_2 образуют фундаментальную систему решений уравнения (2).

3. Характеристическое уравнение (3) имеет комплексно сопряженные корни $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, $\beta \neq 0$. В этом случае фундаментальная система решений уравнения (2) имеет вид

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x , \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x ,$$

а общее решение записывается так:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) .$$

Здесь в проверке нуждается лишь линейная независимость решений y_1 и y_2 ; имеем

$$\begin{aligned} W(x) &= \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta x \\ e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) & e^{\alpha x} (\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) \end{vmatrix} = \\ &= e^{2\alpha x} \cdot \begin{vmatrix} \cos \beta x & \sin \beta x \\ \alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x & \alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x \end{vmatrix} = \beta e^{2\alpha x} (\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) = \beta e^{2\alpha x} \neq 0 . \end{aligned}$$

Поэтому y_1 и y_2 линейно независимы.

В случае уравнения n -го порядка каждому вещественному корню λ_0 характеристического уравнения кратности r ставим в соответствие систему функций $e^{\lambda_0 x}$, $x e^{\lambda_0 x}$, \dots , $x^{r-1} e^{\lambda_0 x}$, а каждой паре комплексно сопряженных корней $\alpha \pm i\beta$, $\beta \neq 0$, кратности s – систему функций

$$\begin{aligned} e^{\alpha x} \cos \beta x , \quad x e^{\alpha x} \cos \beta x , \quad \dots , \quad x^{s-1} e^{\alpha x} \cos \beta x , \\ e^{\alpha x} \sin \beta x , \quad x e^{\alpha x} \sin \beta x , \quad \dots , \quad x^{s-1} e^{\alpha x} \sin \beta x . \end{aligned}$$

Можно доказать, что все такие функции являются решениями уравнения (1), а совокупность этих функций образует фундаментальную систему решений указанного уравнения.

Рассмотрим теперь линейное неоднородное дифференциальное уравнение n -го порядка

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = b(x) , \quad (4)$$

где $a_1(x), \dots, a_n(x), b(x)$ – функции, непрерывные на промежутке I .

Теорема (о структуре общего решения неоднородного линейного уравнения). Общее решение уравнения (4) может быть записано в виде

$$y = y_0(x) + C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) , \quad (5)$$

где $y_0(x)$ – частное решение уравнения (4), а $y_1(x), \dots, y_n(x)$ – фундаментальная система решений соответствующего однородного уравнения; C_1, \dots, C_n – произвольные постоянные.

Доказательство. Уравнение (4) с помощью рассмотренного выше дифференциального оператора можно записать так:

$$L[y] = b(x) ;$$

соответствующее однородное уравнение запишется в виде

$$L[y] = 0 .$$

Применяя этот дифференциальный оператор к (5), получим:

$$L[y] = L[y_0 + C_1 y_1 + \dots + C_n y_n] = L[y_0] + C_1 L[y_1] + \dots + C_n L[y_n] = b(x) ,$$

и, следовательно, при любых C_1, \dots, C_n функция y , определяемая равенством (5), является решением уравнения (4).

Проверим теперь, что при соответствующем подборе констант C_1, \dots, C_n можно получить решение, удовлетворяющее любым начальным условиям

$$y(x_0) = y_0 , \quad y'(x_0) = y'_0 , \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} .$$

Для определения констант C_1, \dots, C_n имеем такую систему:

$$\begin{aligned} y(x_0) + C_1 y_1(x_0) + \dots + C_n y_n(x_0) &= y_0 \\ \dots & \\ y_0^{(n-1)}(x_0) + C_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(x_0) &= y_0^{(n-1)} . \end{aligned}$$

Определитель этой системы

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \dots & & \dots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} \neq 0 ,$$

т.к. $y_1(x), \dots, y_n(x)$ – фундаментальная система решений однородного уравнения, соответствующего уравнению (4). Поэтому требуемый набор постоянных C_1, \dots, C_n существует. Оба условия, входящие в определение общего решения, проверены. Теорема доказана.

Теорема (о наложении частных решений). Пусть имеются два линейных неоднородных уравнения

$$L[y] = b_1(x) \quad \text{и} \quad L[y] = b_2(x) ;$$

где $L[y] = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y$, и пусть $y_1 = y_1(x)$ и $y_2 = y_2(x)$ – решения этих уравнений. Тогда $y_1(x) + y_2(x)$ будет решением уравнения $L[y] = b_1(x) + b_2(x)$.

Доказательство. Имеем $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2] = b_1(x) + b_2(x)$, т.е. $y_1 + y_2$ – решение уравнения $L[y] = b_1(x) + b_2(x)$. Теорема доказана.

Рассмотрим метод Лагранжа вариации постоянных. Пусть $y_1 = y_1(x), \dots, y_n = y_n(x)$ – фундаментальная система решений однородного уравнения $L[y] = 0$. Тогда частное решение неоднородного уравнения $L[y] = b(x)$ можно искать в виде

$$y(x) = C_1(x)y_1(x) + \dots + C_n(x)y_n(x) , \tag{6}$$

где функции $C_1 = C_1(x), \dots, C_n = C_n(x)$ определяются из системы

$$\begin{aligned} C'_1 y_1 + \dots + C'_n y_n &= 0 \\ \dots & \\ C'_1 y_1^{(n-2)} + \dots + C'_n y_n^{(n-2)} &= 0 \\ C'_1 y_1^{(n-1)} + \dots + C'_n y_n^{(n-1)} &= b(x) . \end{aligned}$$

Т.к. определитель

$$\begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0,$$

то из этой системы C'_1, \dots, C'_n определяются однозначно, а сами функции C_1, \dots, C_n – с точностью до произвольных постоянных. Если в (6) подставить именно эти функции $C_1 = C_1(x), \dots, C_n = C_n(x)$, то получим частное решение уравнения (4).

Докажем последнее утверждение для $n = 2$. Уравнение в этом случае имеет вид

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x) \text{ ,}$$

где $a_1(x)$, $a_2(x)$, $b(x)$ – непрерывные на некотором промежутке функции. Частное решение данного уравнения ищем в виде

$$y(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2 ,$$

где $y_1(x), y_2(x)$ – фундаментальная система решений однородного уравнения

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0,$$

а $C_1 = C_1(x)$ и $C_2 = C_2(x)$ – подлежащие определению функции. Предположим, что они удовлетворяют системе:

$$\begin{aligned} C_1' y_1 + C_2' y_2 &= 0 \\ C_1' y_1' + C_2' y_2' &= b(x) . \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} y'(x) &= C'_1 y_1 + C'_2 y_2 + C_1 y'_1 + C_2 y'_2 = C_1 y'_1 + C_2 y'_2 ; \\ y''(x) &= C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 = b(x) + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 . \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y &= b(x) + C_1 y_1'' + C_2 y_2'' + a_1(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + a_2(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2) = \\ &= b(x) + C_1 (y_1'' + a_2(x)y_1' + a_2(x)y_1) + C_2 (y_2'' + a_1(x)y_2' + a_2(x)y_2) = b(x) , \end{aligned}$$

т.е. $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x)$, и наше утверждение доказано.

Квазимногочленом называется сумма нескольких слагаемых вида

$$e^{\alpha \cdot x} (P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x) , \quad (7)$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены.

Частное решение линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами

$$L[y] = b(x)$$

и квазимногочленом в правой части рекомендуется искать методом неопределённых коэффициентов (методом подбора). Для каждого слагаемого вида (7), входящего в правую часть решаемого уравнения, частное решение уравнения $L[y] = e^{\alpha x}(P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x)$ ищется в виде

$$x^r e^{\alpha \cdot x} (R(x) \cos \beta x + S(x) \sin \beta x), \quad (8)$$

где $r = 0$, если $\alpha + i\beta$ не есть корень характеристического уравнения, и r равно кратности этого корня в противном случае; $R(x)$ и $S(x)$ – многочлены с неопределёнными коэффициентами, степень каждого из которых равна максимальной из степеней $P(x)$ и $Q(x)$. Для

нахождения неопределённых коэффициентов выражение (8) подставляется в соответствующее уравнение, и затем приравниваются коэффициенты при подобных членах слева и справа. После того, как частные решения найдены для всех слагаемых, входящих в $b(x)$, частное решение исходного уравнения определяется с помощью теоремы о наложении решений.

Пример. Пусть требуется найти частное решение уравнения

$$y'' - 2y' + y = x + 2e^x .$$

Здесь характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ имеет единственный корень $\lambda = 1$ кратности 2. Найдем частное решение уравнения

$$y'' - 2y' + y = x . \quad (9)$$

Здесь $\alpha = \beta = 0$; максимальная степень многочленов $P(x)$ и $Q(x)$ равна 1. Решение ищем в виде

$$y_{10} = ax + b .$$

Подставляя это в уравнение (9), получаем $-2a + ax + b = x$, откуда $a = 1$, $b = 2$ и $y_{10} = x + 2$.

Для уравнения

$$y'' - 2y' + y = 2e^x$$

$\alpha = 1$, $\beta = 0$, $r = 2$; частное решение ищем в виде $y_{20} = ax^2e^x$. Подставляя это в уравнение, получаем

$$a(x^2 + 4x + 2)e^x - 2a(x^2 + 2x)e^x + ax^2e^x = 2e^x , \quad a = 1 ;$$

частное решение $y_{20} = x^2e^x$. Для исходного уравнения частное решение y_0 находится по теореме о наложении решений:

$$y_0 = y_{10} + y_{20} = x + 2 + x^2e^x .$$