

Учреждение образования
“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИЭЛЕКТРОНИКИ”

Кафедра информатики

Ответ по лабораторной работе №6

Интерполяционные многочлены

Выполнил:

Студент гр. 953505

Басенко К. А.

Руководитель:

Доцент

Анисимов В. Я.

Минск 2021

Содержание:

1. Цель работы.....	3
2. Краткие теоретические сведения.....	3
3. Условие задания.....	10
4. Программная реализация.....	11
5. Заключение.....	13

Цель задания: изучить интерполяцию функций с помощью интерполяционных многочленов Лагранжа и Ньютона.

Краткие теоретические сведения:

Пусть $f(x)$ – функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$. Выберем на этом отрезке точки, называемые *узлами интерполяции*:

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b .$$

Предположим, что известны значения функции в узлах интерполяции:

$$f(x_k) = y_k, \quad k = 0, 1, \dots, n .$$

Ставится задача найти многочлен $P_n(x)$ такой, что

$$P_n(x_k) = y_k, \quad \forall k = 0, 1, \dots, n. \quad (6.1)$$

Такой многочлен $P_n(x)$ называется *интерполяционным многочленом*, а задача его нахождения – *задачей интерполяции*.

Можно показать, что задача интерполяции всегда имеет решение, причем единственное.

Обозначим

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$. Пусть $f(x) \in C^{n+1}[a, b]$. Тогда погрешность интерполяции оценивается по формуле

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|, \quad \text{где} \quad M_{n+1} = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|.$$

1) Интерполяционный многочлен Лагранжа

Пусть $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$,

$$\omega_j(x) = (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n).$$

Положим $l_j(x) = \frac{\omega_j(x)}{\omega_j(x_j)}$,

$$\text{т. е.} \quad l_j(x) = \frac{(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_j - x_0) \cdot \dots \cdot (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdot \dots \cdot (x_j - x_n)}.$$

Очевидно $l_j(x_i) = \begin{cases} 0, & \text{при } i \neq j \\ 1, & \text{при } i = j. \end{cases}$

Построим многочлен $L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) y_j$.

Легко видеть, что $L_n(x_i) = l_i(x_i)y_i = 1 \cdot y_i = y_i$, $i = \overline{0, n}$, т. е. это интерполяционный многочлен. Его называют интерполяционным многочленом Лагранжа.

2) Интерполяционный многочлен Ньютона

Пусть x_0, x_1, \dots, x_n - набор узлов интерполирования,

y_0, y_1, \dots, y_n - значения функции $f(x)$ в узлах.

Величину $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$ называют конечной разностью первого порядка в k -ом узле.

Аналогично определяются конечные разности высших порядков.

$$\Delta^2 y_k = \Delta y_{k+1} - \Delta y_k = y_{k+2} - y_{k+1} - (y_{k+1} - y_k) = y_{k+2} - 2y_{k+1} + y_k$$

.....

$$\Delta^i y_k = \Delta^{i-1} y_{k+1} - \Delta^{i-1} y_k = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} C_n^j y_{k+j} \quad \Delta^i y_k = \Delta^{i-1} y_{k+1} - \Delta^{i-1} y_k = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} C_n^j y_{k+j}.$$

Конечные разности обычно считают по схеме:

Конечные разности обычно считают по схеме:

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
x_0	y_0	$\Delta y_0 = y_1 - y_0$	$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$	$\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0$
x_1	y_1	$\Delta y_1 = y_2 - y_1$	$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$	
x_2	y_2	$\Delta y_2 = y_3 - y_2$		
x_3	y_3			

Разделенной разностью первого порядка называется выражение

$$f_1(x_k, x_{k+1}) = \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}.$$

Разделенной разностью второго порядка называется выражение

$$f_2(x_k, x_{k+1}, x_{k+2}) = \frac{f_1(x_{k+1}, x_{k+2}) - f_1(x_k, x_{k+1})}{x_{k+2} - x_k} \text{ и т. д.}$$

Пусть x – любая точка отрезка, не совпадающая с узлами. Тогда

$$f_1(x, x_0) = \frac{y_0 - f(x)}{x_0 - x},$$

откуда $f(x) = y_0 + f_1(x, x_0)(x - x_0)$.

(6.2)

$$\text{Далее } f_2(x, x_0, x_1) = \frac{f_1(x_0, x_1) - f_1(x, x_0)}{x_1 - x},$$

откуда $f_1(x, x_0) = f_1(x_0, x_1) + f_2(x, x_0, x_1)(x - x_1)$.

Подставляя в (6.2), получаем:

$$f(x) = y_0 + f_1(x_0, x_1)(x - x_0) + f_2(x, x_0, x_1)(x - x_0)(x - x_1).$$

(6.3)

$$\text{Далее } f_3(x, x_0, x_1, x_2) = \frac{f_2(x_0, x_1, x_2) - f_2(x, x_0, x_1)}{x_2 - x},$$

откуда $f_2(x, x_0, x_1) = f_2(x_0, x_1, x_2) + f_3(x, x_0, x_1, x_2)(x - x_2)$.

Подставляя в (6.3), имеем:

$$f(x) = y_0 + f_1(x_0, x_1)(x - x_0) + f_2(x, x_0, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + f_3(x, x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2). \quad (6.4)$$

Продолжая процесс, получим:

$$f(x) = N_n(x) + f_{n+1}(x, x_0, \dots, x_n)(x - x_0) \dots (x - x_n),$$

$$\text{где } N_n(x) = y_0 + f_1(x_0, x_1)(x - x_0) + \dots + f_n(x_0, \dots, x_n)(x - x_0) \dots (x - x_{n-1}).$$

$$\text{Очевидно при } x = x_i, \quad \forall i = \overline{0, n}, \quad f(x_i) = N_n(x_i), \quad i = \overline{0, n},$$

т. е. $N_n(x)$ - интерполяционный многочлен. Его называют *интерполяционным многочленом Ньютона*.

Достоинство интерполяционного многочлена Ньютона: он удобен при расширении интерполяции и добавлении узлов.

Недостаток: в какой-то степени он сложнее в подсчете конечных разностей по сравнению с многочленом Лагранжа.

ЗАДАНИЕ. Построить интерполяционные многочлены в

форме Лагранжа и Ньютона, используя номер варианта k , соответствующие значения параметров m и p_i и значения x_i , y_i из таблиц:

[illegible]

x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
p_i	0.0	0.41	0.79	1.13	1.46	1.76	2.04	2.3	2.55	2.79	3.01

$$y_i = p_i + (-1)^k m$$

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
m	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	1.8	2.53	3.96	5.33	1.96

Оценить погрешность. Вычислить значение f -ии в точке 0.47 с помощью интерполяционного многочлена и многочлена наилучшего приближения. Сравнить значения.

Программная реализация:

Сначала высчитываются значения u_i :


```
def yf(x):  
    res = d[x] + m * (-1)**k  
    return res
```

Затем и высчитываются многочлены:

```
ya = [lagrangeLAGRANGElagrange(x, y, i) for i in xa]
```

```
ya = newtoneNEWTONenewtone(x, y)
```

Результат:



Так же высчитываются значения в точке 0.47:

```
print(v1 := ya[47])
```

```
print(v2 := ya[47])
```

```
print("Error at point 0.47 is: ", abs(v1 - v2))
```

```
1.686597183217558
```

```
1.6865971832175584
```

```
Error at point 0.47 is: 4.440892098500626e-16
```

Погрешность:

$$M_{102} = 2.79$$

$$|R_n(x)| \leq (2.79/102!) \cdot \prod_{i=0}^{100} (x - i/100)$$

Заключение: изучил интерполяцию функций с помощью интерполяционных многочленов Лагранжа и Ньютона.