


Patologias

As patologias oculares são condições que comprometem a visão e a saúde dos olhos, podendo ser causadas por fatores genéticos, infecciosos ou degenerativos. O conhecimento dessas alterações é fundamental na área óptica, pois auxilia na identificação de sinais que precisam de encaminhamento ao especialista. Neste capítulo, serão apresentadas as principais patologias oculares.



HORDÉOLO

É uma inflamação na pálpebra causada por infecção nas glândulas sebáceas. Pode ser externo, quando aparece próximo aos cílios, ou interno, quando ocorre na parte interna da pálpebra.

Sinais e Sintomas:

- * Inchaço e vermelhidão na pálpebra;
- * Dor e sensação de corpo estranho no olho;
- * Pequeno ponto amarelado com possível saída de pus.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.

Interno



Externo



CALÁZIO

O calázio é uma inflamação não infecciosa da pálpebra, causada pela obstrução das glândulas responsáveis pela produção de óleo. Essa alteração forma um pequeno nódulo e é mais comum em pessoas com blefarite ou acne rosácea.



Sinais e Sintomas:

- * Inchaço e vermelhidão no início;
- * Carço endurecido e geralmente sem dor;
- * Em alguns casos, pode causar visão embaçada.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.

OLHOS SECOS

O olho seco é uma condição causada pela baixa produção de lágrimas ou pela má qualidade da lubrificação ocular. Isso pode provocar desconforto, irritação e dificuldade para manter os olhos bem hidratados. Entre as principais causas estão o envelhecimento, uso excessivo de lentes de contato, medicamentos e fatores ambientais, como clima seco e poluição.

Sinais e Sintomas:

- * Ardor, coceira e sensação de areia nos olhos;
- * Olhos vermelhos e cansados;
- * Visão embaçada que melhora ao piscar.



O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.

PTERÍGIO

O pterígio é uma alteração benigna na superfície do olho, geralmente causada pela exposição excessiva ao sol, vento e poeira. Ocorre quando um tecido cresce da conjuntiva em direção à córnea, podendo afetar a visão em casos mais avançados.

Sinais e Sintomas:

- * Área avermelhada ou esbranquiçada no olho;
- * Irritação, ardência e sensação de corpo estranho;
- * Em casos mais graves, pode causar visão embaçada.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.




CATARATA

A catarata acontece quando o cristalino, a lente natural do olho, perde sua transparência com o tempo. Isso dificulta a passagem da luz e causa visão embaçada. O envelhecimento é a principal causa, mas lesões, doenças, medicamentos e exposição ao sol também podem contribuir.

Sinais e sintomas:

- Visão embaçada;
- * Sensibilidade à luz;
- * Dificuldade para enxergar à noite;
- * Alteração nas cores;
- * Mudanças frequentes no grau dos óculos.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.



GLAUCOMA

O glaucoma é uma doença causada pelo aumento da pressão dentro do olho, podendo danificar o nervo óptico e comprometer a visão. Isso acontece quando o líquido ocular não é drenado corretamente. Sem tratamento, pode levar à perda da visão.

Sinais e sintomas:

- * Perda gradual da visão periférica;
- * Dificuldade para enxergar em estágios avançados;
- * Dor ou pressão nos olhos;
- * Vermelhidão ocular;
- * Visão embaçada ou halos ao redor das luzes.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.



TIPOS DE GLAUCOMA

Glaucoma de Ângulo Aberto: É o tipo mais comum, representando a maioria dos casos.

Desenvolve-se lentamente devido à má drenagem de fluidos, sendo assintomático no início e causando perda de visão periférica com o tempo.

Glaucoma de Pressão Normal: Ocorre quando o nervo óptico é danificado mesmo com a pressão intraocular dentro dos padrões normais, frequentemente associado à sensibilidade aumentada ou problemas de fluxo sanguíneo.

Glaucoma de Ângulo Fechado: Menos comum, mas muito mais grave. Ocorre quando a íris bloqueia subitamente a drenagem do olho, causando um aumento repentino e severo da pressão ocular que exige atenção médica de emergência.

Glaucoma Secundário: Desenvolve-se como consequência de outras condições ou fatores, como traumas, uso prolongado de medicamentos (especialmente corticoides), diabetes (glaucoma neovascular), ou inflamações (uveíte).

Glaucoma Congênito: Uma forma rara presente desde o nascimento, causada por um desenvolvimento anormal no sistema de drenagem ocular. Exige intervenção cirúrgica imediata em bebês para prevenir a cegueira.

CERATOCONE

O ceratocone é uma doença que afeta a córnea, deixando-a mais fina e irregular, o que causa visão embaçada e distorcida. Fatores genéticos e o hábito de coçar os olhos podem contribuir para o problema.

Sinais e sintomas:

- * Visão embaçada;
- * Aumento frequente do grau;
- * Sensibilidade à luz;
- * Dificuldade para enxergar à noite;
- * Visão dupla ou distorcida.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.




RETINOPATIA DIABÉTICA

A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que prejudica os vasos sanguíneos da retina, parte responsável pela visão. Com o tempo, os níveis elevados de açúcar no sangue podem danificar esses vasos, causando vazamentos ou crescimento de novos vasos, o que pode levar à perda de visão.

Sinais e Sintomas:

Visão embaçada ou turva;
Manchas escuras ou "flutuantes";
Dificuldade para enxergar à noite;
Perda de visão gradual ou súbita.

O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.



CONJUNTIVITE BACTERIANA

É uma infecção nos olhos causada por bactérias como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*. Muito contagiosa, pode atingir um ou os dois olhos.

Principais sintomas:

- Olhos vermelhos e irritados
- Secreção espessa amarelada ou esverdeada
- Pálpebras grudadas ao acordar
- Sensação de areia nos olhos e lacrimejamento

O paciente deve procurar um médico oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.



CONJUNTIVITE ALÉRGICA

É uma inflamação nos olhos desencadeada pelo contato com agentes alérgenos, como pólen, poeira, mofo, pelo de animais e substâncias químicas presentes em maquiagens ou perfumes.

Sinais e sintomas mais comuns:

- Coceira forte nos olhos
- Olhos vermelhos
- Lacrimejamento constante
- Sensação de areia ou corpo estranho
- Pálpebras inchadas

É importante que o paciente consulte um médico oftalmologista para avaliar o caso e indicar o tratamento correto.



CONJUNTIVITE VIRAL

A conjuntivite viral ocorre quando os olhos são infectados por vírus, geralmente associada a gripes, resfriados ou contato com secreções de pessoas contaminadas.

Sinais e Sintomas:

- Olhos vermelhos e irritados
- Lacrimejamento excessivo
- Sensação de areia nos olhos
- Inchaço nas pálpebras
- Sensibilidade à luz
- Pode haver secreção aquosa

O paciente deve ser encaminhado ao médico oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.



AMBLIOPIA

Popularmente conhecida como "olho preguiçoso", é uma condição ocular em que um dos olhos não se desenvolve normalmente, resultando em visão reduzida, mesmo com o uso de óculos ou lentes corretivas. A ambliopia ocorre quando o cérebro favorece um olho em detrimento do outro, levando ao desenvolvimento inadequado da visão no olho afetado. A condição é mais comum em crianças, mas pode ser tratada com sucesso se diagnosticada precocemente.

Sinais e Sintomas:

- Visão embaçada ou dupla no olho afetado;
- Dificuldade para enxergar de perto ou de longe com o olho afetado;
- Tendência a cobrir ou fechar o olho afetado;
- Pode não haver sintomas evidentes, por isso é importante monitorar as crianças desde cedo.



O paciente deve ser encaminhado ao médico oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.

ESTRABISMO

É uma condição em que os olhos não se alinham e apontam para direções diferentes. Pode ser contínuo ou intermitente e afetar um ou os dois olhos.

Sinais e Sintomas:

- Olhos desalinhados: um olho desvia para dentro, fora, cima ou baixo
- Visão dupla
- Dificuldade para ver em profundidade
- Esforço visual, cansaço ou dor de cabeça

O estrabismo pode levar à ambliopia se não tratado.

O paciente deve ser encaminhado ao médico oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.

