

# 高等数学笔记

作者：LoafPhilosopher

2024 年 4 月 3 日

# 前言

If a job is worth doing,it's worth doing well

2024 年 4 月 3 日如果一件事值得去做,那就值得去做好

# 目录

<b>第一章 函数</b>	<b>1</b>
1.1 数列 . . . . .	1
1.1.1 等差数列 . . . . .	1
1.1.2 等比数列 . . . . .	1
1.1.3 常见数列前 $n$ 项和 . . . . .	1
1.2 函数的基本概念与特性 . . . . .	2
1.2.1 函数的概念 . . . . .	2
1.2.2 反函数 . . . . .	2
1.2.3 复合函数 . . . . .	5
1.2.4 函数的四种特性及重要结论 . . . . .	5
1.2.5 三种特殊函数 . . . . .	10
1.3 函数图像 . . . . .	11
1.3.1 常数函数 . . . . .	11
1.3.2 幂函数 . . . . .	11
1.3.3 指数函数 . . . . .	12
1.3.4 对数函数 . . . . .	13
1.3.5 三角函数 . . . . .	15
1.3.6 初等函数 . . . . .	19
1.3.7 图像绘制 . . . . .	19
1.4 常用函数知识 . . . . .	20
1.4.1 三角函数 . . . . .	20
1.4.2 指数运算法则 . . . . .	21
1.4.3 对数运算法则 . . . . .	21
1.4.4 一元二次方程基础 . . . . .	21
1.4.5 因式分解公式 . . . . .	22
1.4.6 阶乘与双阶乘 . . . . .	22
1.4.7 绝对值等式 . . . . .	22
<b>第二章 极限</b>	<b>23</b>
2.1 数列的极限 . . . . .	23
2.1.1 数列极限的定义 . . . . .	23
2.1.2 收敛数列的性质 . . . . .	24
2.2 函数的极限 . . . . .	25

2.2.1	超实数系	25
2.2.2	邻域	25
2.2.3	函数极限的定义	25
2.2.4	函数极限的性质	29
2.3	无穷小与无穷大	32
2.3.1	无穷小	32
2.3.2	无穷小的性质	32
2.3.3	无穷小的比阶	33
2.3.4	无穷小的运算	33
2.3.5	无穷大	33
2.3.6	无穷大的比阶	34
2.3.7	无穷大的性质	34
2.3.8	无穷大与无界变量的关系	34
2.3.9	无穷大与无穷小的关系	34
2.4	函数极限的运算	34
2.4.1	极限的四则运算法则	34
2.4.2	泰勒公式	37
2.4.3	洛必达法则	40
2.4.4	等价替代求极限	43
2.4.5	抓大头和抓小头	48
2.4.6	利用函数和函数极限的性质求极限	49
2.4.7	拉格朗日中值定理求极限	50
2.4.8	七种未定式的计算	51
2.5	数列极限的运算	53
2.5.1	数列极限的运算法则	53
2.5.2	夹逼准则	54
2.5.3	单调有界准则	55
第三章	连续	57
3.1	函数的连续性	57
3.2	函数的间断点	57
3.2.1	间断点的相关概念	57
3.2.2	间断点的分类	59

# 第一章 函数

## 1.1 数列

### 1.1.1 等差数列

首项为  $a_1$ , 公差为  $d(d \neq 0)$  的数列  $a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, \dots, a_1 + (n-1)d, \dots$ .

#### 注 1.1.1: 等差数列相关性质

- 通项公式  $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 前  $n$  项的和  $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

### 1.1.2 等比数列

首项为  $a_1$ , 公比为  $r(r \neq 0)$  的数列  $a_1, a_1r, a_1r^2, \dots, a_1r^{n-1}, \dots$

#### 注 1.1.2: 等比数列相关性质

- 通项公式  $a_n = a_1r^{n-1}$
- 前  $n$  项的和  $S_n = \begin{cases} na_1, & r = 1, \\ \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}, & r \neq 1. \end{cases}$
- $1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{1-r^n}{1-r} (r \neq 1).$

### 1.1.3 常见数列前 $n$ 项和

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

## 1.2 函数的基本概念与特性

### 1.2.1 函数的概念

#### 定义 1.2.1: 函数定义

设数集  $D \subset \mathbb{R}$ , 则称映射  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  为定义在  $D$  上的函数, 通常简记为

$$y = f(x), x \in D$$

其中  $x$  称为自变量,  $y$  称为因变量,  $D$  称为定义域, 记作  $D_f$ , 即  $D_f = D$ .

函数的定义中, 对每个  $x \in D$ , 按对应法则  $f$ , 总有唯一确定的值  $y$  与之对应, 这个值称为函数  $f$  在  $x$  处的函数值, 记作  $f(x)$ , 即  $y = f(x)$ . 因变量  $y$  与自变量  $x$  之间的这种依赖关系, 通常称为函数关系. 函数值  $f(x)$  的全体所构成的集合称为函数  $f$  的值域, 记作  $R_f$  或  $f(D)$  即:

$$R_f = f(D) = \{y | y = f(x), x \in D\}$$

#### 注 1.2.1: 关于定义域的注意事项

- 定义域指的是  $x$  的定义域
- 括号内定义域相同

题目 1. 已知  $f(x+1)$  的定义域为  $[0, a] (a > 0)$ , 则  $f(x)$  的定义域为,  $f(x+10)$  的定义域为

解答. 定义域指的是  $x$  的定义域, 因此  $x \in [0, a]$ , 那么  $x+1 \in [1, a+1]$ . 括号内定义域相同, 那么可以得知  $f(x)$  定义域为  $[1, a+1]$ .  $f(x+10)$  定义域为  $[-9, a-9]$ .

### 1.2.2 反函数

#### 定义 1.2.2: 反函数定义

设函数  $y = f(x)$  的定义域为  $D^a$ , 值域为  $R$ . 如果对于每一个  $y \in R$ , 必存在唯一的  $x \in D^b$  使得  $y = f(x)$  成立, 则由此定义了一个新的函数  $x = \varphi(y)$ , 这个函数称为函数  $y = f(x)$  的反函数<sup>c</sup>, 一般记作  $x = f^{-1}(y)$ , 它的定义域为  $R$ , 值域为  $D$ . 相对于反函数来说, 原来的函数也被称为直接函数.

<sup>a</sup>在求反函数时要标明区间, 函数在区间上连续且单调, 例如  $y = \arctan x$  默认的是在  $y = \tan x$  第一个区间  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  上的反函数, 因为在这个区间上没有间断点, 是单调的

<sup>b</sup>该条件“唯一性”非常重要, 如函数  $y = x^2$ , 当  $y = y_0$  时, 有不同的  $x$  值满足  $f(x) = y_0$ , 因此  $x^2$  不存在反函数, 而  $y = \ln x$  取任意  $y_0 \in R_y$  都存在唯一的  $x$  满足  $f(x) = y_0$


<sup>c</sup>一般地,  $y = f(x), x \in D$  的反函数记成  $y = f^{-1}(x), x \in f(D)$

#### 注 1.2.2: 关于反函数图像和 $x, y$ 值转换的问题

基本解释: 若以函数  $y = e^x$  为例, 其中  $y = e^x$  为原函数, 记为  $y = f(x)$ , 其反函数为  $x = \ln y$ , 记为  $x = f^{-1}(y)$ , 自变量转换, 转换为  $y = \ln x$ , 记为  $y = f(x)$ . 此时, 在同一直角坐标系中,  $y = f(x)$  和  $x = f^{-1}(y)$  的图形重合,  $y = f(x)$  和  $y = f^{-1}(x)$  的图形关于直线  $y = x$  对称.


详细解释: 若把  $x = f^{-1}(y)$  与  $y = f(x)$  的图形画在同一坐标系中, 则它们完全重合. 只有把  $y = f(x)$

的反函数  $x = f^{-1}(y)$  写成  $y = f^{-1}(x)$  后, 它们的图形才关于  $y = x$  对称<sup>a</sup>. 以函数  $y = 2x + 1$  为例:



原函数为  $y = 2x + 1$ , 其中自变量为  $x$ , 定义域为  $[1, 2]$ , 因变量  $y$ , 值域为  $[3, 5]$ .

如上图所示  $x = f^{-1}(y)$  中自变量为  $y$ , 定义域为  $[3, 5]$ , 因变量  $x$ , 值域为  $[1, 2]$ <sup>b</sup>.



最终化为  $y = f^{-1}(x)$ , 其中自变量为  $x$ , 定义域为  $[3, 5]$ , 因变量  $y$ , 值域为  $[1, 2]$ . 此时反函数改写为  $y = f^{-1}(x)$ , 该函数图像与  $y = f(x)$  关于直线  $y = x$  对称


<sup>a</sup>这是因为在  $x = f^{-1}(y)$  中  $y$  是自变量而  $x$  是因变量, 而在  $y = f(x)$  中恰恰相反 (这个时候的图像应该一个是  $x$ - $y$  坐标系函数图像, 一个是  $y$ - $x$  坐标系函数图像), 因此如果此时不交换变量, 那么其域没有变化, 画在一起会重合, 只有交换了变量之后才不会重合.

<sup>b</sup>此时仅发生了变量改变,  $x = f^{-1}(y)$  和  $y = f(x)$  图像在同一坐标轴中

### 定义 1.2.3: 反函数的性质

- $f^{-1}f(x) = x, f(f^{-1}(x)) = x$

- 严格单调函数必有反函数, 但是有反函数的函数不一定是单调函数. 如函数  $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ \frac{1}{x}, & x < 0, \end{cases}$ , 其函数图像为



- 连续可导的函数如果具有反函数, 那么一定单调, 但是单调函数不一定推出导数一定都不为 0, 如  $f(x) = x^3$  在  $x = 0$  处的导数
- 若函数  $f(x)$  有反函数, 则  $f(x)$  与任意水平线有且仅有一个交点.<sup>a</sup>

<sup>a</sup>反函数的唯一性见此处定义1.2.2

**题目 2.** 求函数  $y = f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  的反函数的表达式以及定义域

**解答.** 已知  $y = f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ , 则  $-y = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x)$   
对两边可以进行如下操作

$$\begin{aligned} e^{-y} &= \sqrt{x^2 + 1} - x \\ e^y &= \sqrt{x^2 + 1} + x \end{aligned}$$

那么可以得到  $x = \frac{1}{2}(e^y - e^{-y})$  交换之后可以得到函数  $f(x)$  的反函数, 即  $y = f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ .

**题目 2 的注记.**

- 在上面的例子中, 函数  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  为反双曲正弦函数, 其反函数为双曲正弦函数. 除此之外, 函数  $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  是双曲余弦函数.




图 1.1: 双曲正弦函数  $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$




图 1.2: 双曲余弦函数  $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

- 下列有关反双曲正弦函数结论需要记住

–  $x \rightarrow 0$  时,  $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \sim x$ .

–  $[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ , 于是  $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C$ .



- 由于  $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  是奇函数, 于是  $\int_{-1}^1 [\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + x^2] dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$ .
- 泰勒展开前两项为  $x - \frac{1}{6}x^3$ <sup>1</sup>

### 1.2.3 复合函数

设函数  $y = f(u)$  的定义域为  $D_1$ , 函数  $u = g(x)$  在  $D$  上有定义, 且  $g(D) \subset D_1$ , 则由

$$y = f[g(x)](x \in D)$$

确定的函数, 称为由函数  $u = g(x)$  和函数  $y = f(u)$  构成的**复合函数**, 它的定义域为  $D$ ,  $u$  称为中间变量. 内层函数的值域是外层函数的子集<sup>2</sup>.

**题目 3.** 设  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x^4, & x < 0, \end{cases} g(x) = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases}$  若  $y = f(g(x))$ , 则  
 (A)  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 1$ . (B)  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$  不存在. (C)  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0$ . (D)  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$  不存在.

**解答.**<sup>3</sup> 函数  $y$  为  $f(x)$  和  $g(x)$  复合函数, 若求复合函数在  $x = 1$  和  $x = 0$  时的导数, 那么可以将复合函数写为  $f(x) = \begin{cases} g(x)^2, & x \geq 0 \\ g(x)^4, & x < 0 \end{cases}$ , 由此, 作出  $g(x)$  函数图像, 结合图像, 可以将上述图像函数表达式更改为

$$f(g(x)) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^4, & x < 0 \end{cases}. \text{ 则函数 } f(g(x)) \text{ 在 } x = 1 \text{ 处的导数为 } 0.$$

### 1.2.4 函数的四种特性及重要结论

#### 有界性

有界性分为三种情况, 一种是有上界, 一种是有下界, 一种是有界. 其中有界包含了有上界和有下界.

#### 定义 1.2.4: 有界性的定义

设  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 数集  $I \subset D$ . 如果存在某个正数  $M$ , 使对任一  $x \in I$ , 有  $|f(x)| \leq M$ , 则称  $f(x)$  在  $I$  上有界; 如果这样的  $M$  不存在, 则称  $f(x)$  在  $I$  上无界.

- 有界是指, 同时有上界和下界
- 从几何上看, 如果在给定的区间, 函数  $y = f(x)$  的图形能够被直线  $y = -M$  和  $y = M$  完全包起来, 则为有界; 从定义上说, 找到某个正数  $M$ , 使得  $|f(x)| \leq M$ , 则为有界.
- 在讨论有界还是无界的时候首先要指明区间, 如果没指名区间, 则无法讨论有界性. 如函数  $y = \frac{1}{x}$  则  $(2, +\infty)$  上有界, 但是在  $(0, 2)$  上无界.

<sup>1</sup>前两项和  $\sin x$  一样

<sup>2</sup>需要注意的是, 不是任何两个函数都可以进行复合, 如果函数  $A$  的定义域与函数  $B$  的值域的交集为  $\emptyset$ , 则两个函数不可进行复合

<sup>3</sup>看见复合函数, 应把复合函数带入, 把表达式求出来

## 有界性的判断

- 利用定义
- $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续  $\Rightarrow f(x)$  在  $[a, b]$  上有界
- $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 且  $f(a^+)$  和  $f(b^-)$  存在  $\Leftrightarrow f(x)$  在  $(a, b)$  上有界.
- $f'(x)$  在区间  $I$  (有限)<sup>4</sup> 上有界  $\Rightarrow f(x)$  在  $I$  上有界

证明. — 使用拉格朗日中值定理进行证明: 设区间  $I(a, b)$  由拉格朗日中值定理可得  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ , 固定点  $a$ , 那么对区间  $I(a, b)$  上每一个点求拉格朗日中值定理, 那么  $f(x) = f(a) + f'(\xi)(x - a)$ , 其中  $f(a)$  为固定值,  $(x - a)$  为有界值,  $f'(\xi)$  在  $I(a, b)$  上有界, 综上  $f(x)$  在区间上必有界。

— 使用斜率进行证明: 由几何意义可知,  $f'(x)$  为  $f(x)$  的斜率, 那么如果  $f'(x)$  有界, 那么斜率有界, 那么说明  $f(x)$  的变化是有界的, 那么更说明  $f(x)$  不可能无界。

— 使用面积进行证明:  $f'(x)$  在有限区间上有界, 则该区间上  $f'(x)$  与  $x$  轴所围成的面积是有界的, 那么说明  $f(x)$  的变化是有界的, 那么更说明  $f(x)$  不可能无界。

□

题目 4. 已知函数  $f(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha}$  在  $(0, +\infty)$  上有界, 则  $\alpha$  的取值范围为

解答. 如果说  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上有界, 那么  $f(x)$  应该在区间两端点连续单侧极限存在. 即  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  极限存在. 下面进行分情况讨论:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha} \\ &\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

若要  $x \rightarrow \infty$  时函数有界, 那么分母应趋近于无穷. 则  $\alpha - 1 > 0$ .

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha} \\ &\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}} \\ &\stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\alpha x^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

若要该极限成立.  $\alpha - 1 \leq 2$  使得极限整体趋于 0. 综上所述,  $\alpha$  的取值范围应为  $(1, 3]$ .

题目 5. 以下四个命题中正确的是:

- (A) 若  $f'(x)$  在  $(0, 1)$  内连续, 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界
- (B) 若  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内连续, 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界
- (C) 若  $f'(x)$  在  $(0, 1)$  内有界, 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界
- (D) 若  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界, 则  $f'(x)$  在  $(0, 1)$  内有界

<sup>4</sup>长度有限

解答. A,B 选项. 无论是导数还是原函数在区间上连续, 都不可以推出原函数在区间上有界, 比如函数  $\frac{1}{x}$  其在  $(0, 1)$  区间上连续, 但是其原函数  $\ln x$  在区间上无界.

一元函数中, 优先看导数, 由导数推函数<sup>5</sup>. 同时此处可以使用有界性判断1.2.4的定理三, 可以得出导函数如果在有限区间  $I$  上有界, 那么函数在区间  $I$  上有界. 本题选 C.

题目 6. 设函数  $f(x)$  连续, 且  $f'(0) > 0$ , 则存在  $\delta > 0$  使得:

- (A)  $f(x)$  在  $(0, \delta)$  内单调增加
- (B)  $f(x)$  在  $(0, \delta)$  内单调减少
- (C) 对任意的  $x \in (0, \delta)$  有  $f(x) > f(0)$
- (D) 对任意的  $x \in (-\delta, 0)$  有  $f(x) > f(0)$

解答. 导数若存在, 则导数要么连续, 要么只可能有振荡间断点. A,B 选项<sup>6</sup>: 一点可导推不出区间可导, 已知  $f'(0) > 0$  那么假若函数  $f(x)$  在邻域内震荡, 显然也满足  $x = 0$  该点可导, 但是在邻域内震荡, 若 A 选项要正确. 则需要增加条件  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续. C, D 选项, 由导数的定义得:  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ .

## 单调性

### 定义 1.2.5: 单调性的定义

设  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 区间  $I \subset D$ . 如果对于区间上任意两点  $x_1, x_2$  当  $x_1 < x_2$  时, 恒有  $f(x_1) < f(x_2)$ , 则称  $f(x)$  在区间  $I$  上单调增加. 如果对于区间  $I$  上任意两点  $x_1, x_2$  当  $x_1 < x_2$  时, 恒有  $f(x_1) > f(x_2)$ , 则称  $f(x)$  在区间  $I$  上单调减少.

### 判断单调性的方法

1. 利用导数进行判断, 若  $f(x)$  在区间  $I$  上可导, 则
  - $f'(x) > 0 (< 0) \Rightarrow f(x)$  单调增 (单调减)
  - $f'(x) \geq 0 (\leq 0) \Leftrightarrow f(x)$  单调不减 (单调不增)
2. 利用导数的定义, 对任意  $x_1, x_2 \in D, x_1 \neq x_2$ , 有
  - $f(x)$  是单调增函数  $\Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0$
  - $f(x)$  是单调减函数  $\Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] < 0$
  - $f(x)$  是单调不减函数  $\Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] \geq 0$
  - $f(x)$  是单调不增函数  $\Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] \leq 0$

<sup>5</sup>导数可以决定函数的变化, 因此出现该类型的题目时, 优先看有导数的选项

<sup>6</sup>在本题中, 答案给出了一个例子可以满足该题, 即  $f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ , 在考研中常用的一个例子是  $k \times \sin \frac{1}{x} \pm M \pm f(x)$

## 奇偶性

### 定义 1.2.6: 奇偶性的定义

设  $f(x)$  的定义域  $D$  关于原点对称 (即若  $x \in D$ , 则  $-x \in D$ ). 如果对于任一  $x \in D$ , 恒有  $f(-x) = f(x)$ , 则称  $f(x)$  为偶函数. 如果对于任一  $x \in D$ , 恒有  $f(-x) = -f(x)$ , 则称  $f(x)$  为奇函数.

### 注 1.2.3: 奇偶性的性质

#### 1. 奇偶函数运算后的奇偶性:

- 奇函数乘 (除) 偶函数 = 奇函数;
- 奇函数乘 (除) 奇函数 = 偶函数;
- 偶函数乘 (除) 偶函数 = 偶函数;
- 奇函数加 (减) 奇函数 = 奇函数;
- 偶函数加 (减) 偶函数 = 偶函数;
- 不恒为零的偶 (奇) 函数加减不恒为零的奇 (偶) 函数为非奇非偶函数;
- 偶 (奇) 函数乘以非奇非偶函数, 一般不再是偶 (奇) 函数, 为非奇非偶函数.

#### 2. $f(\varphi(x))$ (内偶则偶, 内奇看外)<sup>a</sup>

#### 3. 对任意的 $x, y$ 都有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ , 则 $f(x)$ 是奇函数<sup>b</sup>.

#### 4. 求导后奇偶性互换

#### 5. 连续的奇函数的一切原函数都是偶函数

连续的偶函数的原函数中仅有一个原函数是奇函数<sup>c</sup>

#### 6. 设 $f(x)$ 连续, 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 是偶函数;

若  $f(x)$  是偶函数, 则  $\int_0^x f(t) dt$  是奇函数<sup>d</sup>

#### 7. 对于任意函数 $f(x)$ , 令 $u(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$ , $v(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$ , 其中, $u(x)$ 是偶函数, $v(x)$ 是奇函数. 因为 $f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = u(x) + v(x)$

#### 8. 奇函数 $y = f(x)$ 的图形关于坐标原点对称, 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义时, 必有 $f(0) = 0$ .

#### 9. 偶函数 $y = f(x)$ 的图形关于 $y$ 轴对称, 且当 $f(0)$ 存在时, 必有 $f'(0) = 0$ .

#### 10. 设 $f(x)$ 是定义在 $[-l, l]$ 上的任意函数, 则

$$F_1(x) = f(x) - f(-x) \text{ 必为奇函数; } F_2(x) = f(x) + f(-x) \text{ 必为偶函数}^e$$

<sup>a</sup>奇 [偶]  $\Rightarrow$  偶; 偶 [奇]  $\Rightarrow$  偶; 奇 [奇]  $\Rightarrow$  奇; 偶 [偶]  $\Rightarrow$  偶; 非奇非偶 [偶]  $\Rightarrow$  偶

<sup>b</sup>证明如下: 令  $x = y = 0$ , 则  $f(0) = 2 * f(0)$ , 则  $f(0) = 0$ , 令  $y = -x$ , 则  $f(0) = f(x) + f(-x)$ .

<sup>c</sup>证明如下: 设  $f(x)$  是连续函数, 则其一个原函数可以表示为  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ . 若  $f(x)$  是连续的奇函数, 即有  $f(x) = -f(-x)$ , 且  $\int_a^a f(t) dt = 0$ , 则  $F(-x) = \int_a^{-x} f(t) dt \xrightarrow{t=-u} -\int_a^x f(-u) du = \int_a^x f(u) du + \int_a^x f(u) du = 0 + F(x) = F(x)$ . 若  $f(x)$  是连续的偶函数, 即有  $f(-x) = f(x)$ , 且  $\int_a^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$ , 则  $F(-x) = \int_a^{-x} f(t) dt \xrightarrow{t=-u} -\int_a^x f(-u) du = -\int_a^x f(u) du - \int_a^x f(u) du = -2 \int_0^x f(u) du - F(x)$  则当  $\int_0^a f(u) du = 0$  时,  $F(x)$  为奇函数.

<sup>d</sup>证明如下: 设  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  由变上限积分求导公式可得:  $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$ , 已知  $f(x)$  为奇/偶函数, 由奇偶性的性质 1.2.4 中第5条可得

<sup>e</sup>证明如下: 已知  $f(x)$  是任意函数,  $-1$  带入可得,  $F_1(-x) = f(-x) - f(x) = -F_1(x)$ , 同理可证  $F_2$  成立.

**题目 7.** 设  $f(x)$  连续且为奇函数, 则下列函数中必为偶函数的为

- (A)  $\int_0^x du \int_a^u tf(t)dt$  (B)  $\int_a^x du \int_0^u f(t)dt$   
 (C)  $\int_a^x du \int_0^u tf(t)dt$  (D)  $\int_0^x du \int_a^u f(t)dt$

**解答.**  $A$  选项已知函数  $f(x)$  连续为奇函数, 那么  $tf(t)$  为偶函数, 若其想为奇函数, 其积分形式应为  $\int_0^u tf(t)dt$ .

$B$  选项为奇函数,  $\int_0^x f(t)dt$  为偶函数, 再次积分, 无法满足过原点, 因此无奇偶性.

$C$  选项, 同理,  $tf(t)$  为偶函数, 积分后为奇函数, 再次积分后为偶函数, 正确

$D$  选项, 第一次积分后为非奇非偶函数

## 周期性

### 定义 1.2.7: 周期函数的定义

设  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 如果存在一个正数  $T$ , 使得对于任一  $x \in D$ , 有  $x \pm T \in D$ , 且  $f(x+T) = f(x)$ , 则称  $f(x)$  为周期函数,  $T$  称为  $f(x)$  的周期. 从几何图形上看, 在周期函数的定义域内, 相邻两个长度为  $T$  的区间上, 函数的图形完全一样.

需要注意的是函数的周期性只与  $x$  的参数有关, 比如若函数  $f(x)$  以  $T$  为周期, 则  $f(ax+b)$  以  $\frac{T}{|a|}$  为周期. 可以观察到其周期只与  $x$  的系数有关

## 重要结论

- 若  $f(x)$  是可导的周期为  $T$  的周期函数, 则  $f'(x)$  也是以  $T$  为周期的周期函数.
- 设  $f(x)$  连续且以  $T$  为周期, 则  $F(x) = \int_0^x f(t)dt$  是以  $T$  为周期的周期函数  $\Leftrightarrow \int_0^T f(x)dx = 0$ .<sup>7</sup>
- 周期函数的原函数是周期函数的充要条件是其在一个周期上的积分为 0.

## 周期性的判断


- 利用周期性的定义
- 根据定义1.2.4第一条可导的周期函数其导函数为周期函数
- 根据定义1.2.4第三条周期函数的原函数不一定是周期函数<sup>8</sup>

<sup>7</sup>证明如下:  $F(x+T) = \int_a^{x+T} f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+T} f(t)dt$ , 因为  $f(x)$  以  $T$  为周期, 于是  $\int_x^{x+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt$ , 即  $F(x+T) - F(x) = \int_0^T f(t)dt$ , 所以当且仅当  $\int_0^T f(t)dt = 0$ , 即  $\int_0^T f(x)dx = 0$  时,  $F(x)$  以  $T$  为周期.

<sup>8</sup>如函数  $1 + \cos x$

1.2.5 三种特殊函数


符号函数



取整函数

$$y = [x]$$

数值上向下取整, 数轴上向左取整<sup>9</sup>, 即  $x - 1 < [x] \leq x$



狄利克雷函数

<sup>10</sup>

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{Q}^c. \end{cases}$$

<sup>9</sup>坐标轴上向左移, 在现实生活中就是年龄

<sup>10</sup>本函数图像无法绘制

## 1.3 函数图像

### 1.3.1 常数函数

$y = A, A$  为常数, 其图形为平行于  $x$  轴的水平直线




图 1.3: 常数函数图像

### 1.3.2 幂函数

$$y = x^{\mu} (\mu \text{ 是实数})$$




图 1.4: 幂函数图像

### 注 1.3.1: 幂函数常用技巧

- 当  $\mu > 0$  且  $0 < x < 1$  时, 函数随着  $\mu$  的增大而变小 (越大越低)
- 当  $\mu > 0$  且  $x > 1$  时, 函数随着  $\mu$  的增大而变大 (越大越高)
- 当  $\mu < 0$  且  $0 < x < 1$  时, 函数随着  $\mu$  的增大而变小 (越大越低)
- 当  $\mu < 0$  且  $x > 1$  时, 函数随着  $\mu$  的增大而变大 (越大越高)
- 当  $x > 0$  时, 由  $y = x$  与  $y = \sqrt{x}, y = \sqrt[3]{x}, y = \ln x$  具有相同的单调性, 因此可以利用这一特性来研究最值
- 见到  $\sqrt{u}, \sqrt[3]{u}$  时, 可用  $u$  来研究最值
- 见到  $|u|$  时, 由  $|u| = \sqrt{u^2}$ , 可用  $u^2$  来研究最值
- 见到  $u_1, u_2, u_3, \ln(u_1 + u_2 + u_3) = \ln u_1 + \ln u_2 + \ln u_3$  来研究最值
- 见到  $\frac{1}{u}$  时, 可用  $u$  来研究最值 (结论相反), 即  $\frac{1}{u}$  与  $u$  的最大值点、最小值点相反

### 1.3.3 指数函数

$$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$$




图 1.5: 指数函数图像



### 注 1.3.2: 指数函数相关性质

- 定义域: $(-\infty, +\infty)$ . 值域: $(0, +\infty)$ .
- 单调性: 常用的指数函数  $y = e^x$
- 极限: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ (由于极限的唯一性, 因此在趋于不同的无穷时, 极限值的不同).
- 特殊函数值: $a^0 = 1, e^0 = 1$
- 指数运算法则:

$$a^\alpha \times a^\beta = a^{\alpha+\beta}, \frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}, (a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}, (ab)^\alpha = a^\alpha b^\alpha, \left(\frac{a}{b}\right)^\alpha = \frac{a^\alpha}{b^\alpha},$$

---

$${}^a eg: e^{\tan x} - e^{\sin x} = e^{\sin x} (e^{\tan x - \sin x} - 1)$$

### 1.3.4 对数函数

$$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$$




图 1.6: 对数函数图像

### 注 1.3.3: 对数函数相关性质

- 定义域: $(0, +\infty)$ . 值域: $(-\infty, +\infty)$ .
- 单调性: 当  $a > 1$  时,  $y = \log_a x$  单调增加; 当  $0 < a < 1$  时,  $y = \log_a x$  单调减少;

- 常用对数函数:  $y = \ln x$
- 特殊函数值:  $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1, \ln 1 = 0, \ln e = 1$
- 极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ .
- 对数运算法则
  - $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$  (积的对数 = 对数的和).
  - $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$  ( = 对数的差).
  - $\log_a M^n = n \log_a M, \log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$  (幂的对数 = 对数的倍数).
- 常用公式:  $x = e^{\ln x} (x > 0), u^v = e^{\ln u^v} = e^{v \ln u} (u > 0)$
- 当  $x > 0$  时, 常用于中值定理:

$$\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x; \ln \frac{1}{x} = -\ln x; \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) = \ln \frac{x+1}{x} = \ln(x+1) - \ln x.$$

### 1.3.5 三角函数

#### 正弦和余弦函数




图 1.7: 正余弦函数图像

#### 注 1.3.4: 正余弦函数相关性质


- 定义域:  $(-\infty, +\infty)$ , 值域:  $[-1, 1]$
- 奇偶性:  $y = \sin x$  是奇函数,  $y = \cos x$  是偶函数,  $x \in (-\infty, +\infty)$
- 周期性:  $y = \sin x$  和  $y = \cos x$  均以  $2\pi$  为最小正周期.  $x \in (-\infty, +\infty)$
- 有界性:  $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$


## 正切和余切函数

$$y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\tan x}$$



(a) 正切函数图像



(b) 余切函数图像

图 1.8: 正余切函数图像


### 注 1.3.5: 正余切函数相关性质

- $y = \tan x$  的定义域为  $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})\}$ ;  
 $y = \cot x$  的定义域为  $\{x | x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})\}$ ;  
 值域均为  $(-\infty, +\infty)$
- 奇偶性: 均为奇函数
- 周期性: 均以  $\pi$  为最小正周期

## 正割和余割函数

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$



(a) 正割函数图像

(b) 余割函数图像

图 1.9: 正余割函数图像

#### 注 1.3.6: 正余割函数相关性质


- 定义域:  $y = \sec x$  的定义域是  $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})\}$ ;  $y = \csc x$  的定义域为  $\{x | x \neq k\pi, (k \in \mathbf{Z})\}$   
值域均为:  $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
- 奇偶性:  $y = \sec x$  为偶函数,  $y = \csc x$  为奇函数
- 周期性: 最小正周期均为  $2\pi$
- $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ ;  $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$

### 反三角函数


#### 反正弦和反余弦函数

$$y = \arcsin x$$

$$y = \arccos x$$



(a) 反正弦函数图像



(b) 反余弦函数图像

图 1.10: 反正余弦函数图像

由于这两个函数分别是  $\sin x$  和  $\cos x$  的反函数, 因此可以知道的是,  $\sin x$  的值域是  $\arcsin x$  的定义域. 因此可以得到下面的结论

### 注 1.3.7: 反正余弦函数相关性质

- 定义域  $[-1, 1]$ ,  $y = \arcsin x$  值域 (主值区间)<sup>a</sup> $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ,  $y = \arccos x$  值域 (主值区间) $[0, \pi]$  需要注意的是其值需要在值域内. 因为只有在这个区间上, 函数才满足反函数定义1.2.2中的唯一性. 那么可以推断出如下的反函数:

$$\text{当 } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ 时, } x = \arcsin y$$

$$\text{当 } x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], x = \pi - \arcsin y$$

$$\text{当 } x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi], x = 2\pi + \arcsin y$$

- 性质:  $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$  (求导后可以发现导数为 0)

<sup>a</sup>描述一个函数所有值的区间

### 注 1.3.8: 反三角函数恒等式

$$\sin(\arcsin x) = x, x \in [-1, 1], \sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}, x \in [-1, 1];$$

$$\cos(\arccos x) = x, x \in [-1, 1], \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}, x \in [-1, 1]^a;$$

上述两个式子可抽象为  $f^{-1}f(x) = x$ . 除此之外, 还有下面的等式

$$\arcsin(\sin y) = y, y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$


$$\arccos(\cos y) = y, y \in [0, \pi]$$

<sup>a</sup>证明如下: 令  $t = \arccos x \in [0, \pi]$ ,  $\cos t = x$ , 又  $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ , 那么  $\sin t = \sqrt{1 - x^2}$ , 即  $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$


## 反正切和反余切函数

$$y = \arctan x$$

$$y = \operatorname{arccot} x$$



(a) 反正切函数图像



(b) 反余切函数图像

图 1.11: 反正余切函数图像

#### 注 1.3.9: 反正余切函数相关性质

- 定义域  $[-\infty, +\infty]$ ,  $y = \arctan x$  值域  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ,  $y = \operatorname{arccot} x$  值域  $(0, \pi)$
- 性质:  $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$  (求导后可以发现导数为 0)

### 1.3.6 初等函数

由基本初等函数经过有限次的四则运算, 以及有限次的复合步骤所构成的并且可以由一个式子所表示的函数称为初等函数.

#### 注 1.3.10

幂指函数  $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$  也是初等函数, 如  $x > 0$  时,  $f(x) = x^x = e^{x \ln x}$ . 其函数图像如下所示:




图 1.12: 函数  $x^x$  图像

### 1.3.7 图像绘制

#### 极坐标下的图像

- 用描点法绘制函数图像: 就是把每一个点求出来, 然后连接起来即可, 但是需要点足够多
- 用直角坐标系观点画极坐标系的图像, 以函数  $r = 2(1 + \cos \theta)$  为例.




图 1.13: 函数  $r = 2(1 + \cos \theta)$  图像

可以看到  $\theta - r$  的坐标系的关键点为  $(0, 4), (\frac{\pi}{2}, 2), (\pi, 0), (\frac{3}{2}\pi, 2), (2\pi, 4)$  这五个点, 那么在极坐标系下可以绘制出这些点, 比如在  $x = 4$  时,  $\theta = 0, x = 2$  时,  $\theta = \frac{\pi}{2}, x = 0$  时,  $\theta = \pi$ .

### 参数方程

通过第三个变量即参数来表示别的两个变量.

摆线参数方程:

$$\begin{cases} x = r(t - \sin t) \\ y = r(1 - \cos t) \end{cases}$$

星型线参数方程:

$$\begin{cases} x = r \cos^3 t \\ y = r \sin^3 t \end{cases}$$

## 1.4 常用函数知识

### 1.4.1 三角函数

三角函数基本关系

$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$	$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$	$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$
$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$	$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$	

倍角公式

$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$	$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$
$\sin 3\alpha = -4 \sin^3 \alpha + 3 \sin \alpha,$	$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$
$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha},$	$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}.$

### 半角公式

$$\begin{aligned}\sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha), & \cos^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1}{2}(1 + \cos \alpha), \\ \sin \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, & \cos \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}, \\ \tan \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}, \\ \cot \frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}.\end{aligned}$$

### 和差公式

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} \\ \cot(\alpha \pm \beta) &= \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}.\end{aligned}$$

### 积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], & \cos \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)], \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)], & \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].\end{aligned}$$

### 和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, & \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, & \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

### 万能公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \\ \cos \alpha &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}\end{aligned}$$

### 1.4.2 指数运算法则

$$a^a \times a^b = a^{a+b}, \quad \frac{a^a}{a^b} = a^{a-b}, \quad (a^a)^b = a^{ab}, \quad (ab)^a = a^a b^a, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^a = \frac{a^a}{b^a}$$



### 1.4.3 对数运算法则

$$\begin{aligned}\log_a(MN) &= \log_a M + \log_a N \\ \log_a \frac{M}{N} &= \log_a M - \log_a N \\ \log_a M^n &= n \log_a M. \\ \log_a \sqrt[n]{M} &= \frac{1}{n} \log_a M.\end{aligned}$$

### 1.4.4 一元二次方程基础

- 一元二次方程组:  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$
- 根的公式:  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- 根与系数的关系:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ .
- 判别式:  $\Delta = b^2 - 4ac$
- 抛物线顶点坐标:  $(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a})$

### 1.4.5 因式分解公式

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 & (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 & (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) & (a^3 - b^3) &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\ a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^n - b^n &= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \quad (n \text{ 是正整数}) \\ n \text{ 是正奇数时, } a^n + b^n &= (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - ab^{n-2} + b^{n-1}) \\ (a+b)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = \\ a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k + \dots + nab^{n-1} + b^n\end{aligned}$$

### 1.4.6 阶乘与双阶乘

- $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ , 规定  $0! = 1$ .
- $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n) = 2^n \cdot n!$
- $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)$

### 1.4.7 绝对值等式

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|] \\ \psi(x) &= \min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|]\end{aligned}$$

## 第二章 极限

### 2.1 数列的极限

#### 2.1.1 数列极限的定义

##### 定义 2.1.1

设  $|x_n|$  为一数列, 若存在常数  $a$ , 对于任意的  $\varepsilon > 0$  (不论它多么小), 总存在正整数  $N$ , 使得当  $n > N$  时  $|x_n - a| < \varepsilon$  恒成立, 则称数  $a$  是数列  $|x_n|$  的极限, 或者称数列  $|x_n|$  收敛于  $a$ , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 或 } x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$$

该定义的  $\varepsilon - N$  语言描述是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正整数 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

<sup>a</sup> $\varepsilon - N$  几何意义: 对于点  $a$  的任何  $\varepsilon$  邻域即开区间  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  一定存在  $N$ , 当  $n > N$  即第  $N$  项以后的点  $x_n$  都落在开区间  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  内, 而只有有限个 (最多有  $N$  个) 在区间之外.

在上面的定义中,  $\varepsilon > 0$  的  $\varepsilon$  任意性是非常重要的, 只有这样才能表示出无限接近的意义. 总存在正整数  $N$ , 使得  $n > N$  这个条件用于表达  $n \rightarrow \infty$  的过程.

##### 注 2.1.1

- 数列的极限值与数列的前有限项无关, 只与后面无穷项有关
- 若数列  $\{a_n\}$  收敛, 则其任何子列  $\{a_{n_k}\}$  也收敛, 且  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ <sup>a</sup>
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$
- 关于数列  $(1 + \frac{1}{n})^n$  的结论
  - 单调增加
  - $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

<sup>a</sup>此条定理提供了一个判断数列发散的方法: 1. 至少一个子数列发散. 2. 两个子数列收敛, 但是收敛值不同.

题目 8. 证明: 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$

证明. 已知数列  $a_n$  极限为  $A$ , 那么  $|a_n - A| < \varepsilon$ , 由不等式1可得,  $||a_n| - |A|| \leq |a_n - A| < \varepsilon$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| =$

$|A|$ .

□

### 题目 8 的注记.

1. 此命题反过来则错误, 如取  $a_n = (-1)^n$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n| = 1$ . 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$  不存在.
2. 在本题中若  $A = 0$ , 则  $||a_n| - |A|| = ||a_n| - 0| = |a_n - 0|$ , 即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0,$$

此结论常用, 即若要证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 可转换为证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ , 由于  $|a_n| \geq 0$ , 若使用了夹逼准则, 只需证明  $|a_n| \leq 0$  即可

3. 此结论对函数亦成立, 即若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$ .

## 2.1.2 收敛数列的性质

### 唯一性

#### 定义 2.1.2

如果数列  $\{x_n\}$  收敛, 那么它的极限唯一

### 有界性

#### 定义 2.1.3

如果数列  $\{x_n\}$  收敛, 那么数列  $\{x_n\}$  一定有界<sup>a</sup>.

<sup>a</sup>如果数列有界, 但是不一定存在极限, 如数列  $(-1)^n$

### 保号性

#### 定义 2.1.4

如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 且  $a > b$  (或  $a < b$ ), 那么存在正整数  $N$ , 当  $n > N$  时, 都有  $x_n > b$  (或  $x_n < b$ ).

如果数列  $|x_n|$  从某项起有  $x_n \geq b$  (或  $x_n \leq b$ ), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 那么  $a \geq b$  ( $a \leq b$ )<sup>a</sup>.

<sup>a</sup>其中  $b$  可以为任意实数, 常考  $b=0$  的情况

## 2.2 函数的极限

### 2.2.1 超实数系

#### 定义 2.2.1: 超实数系的概念

超实数 (Hyperreal number) 是一个包含实数以及无穷大和无穷小的域, 它们的绝对值分别大于和小于任何正实数。

### 注 2.2.1

- 超实数集是为了严格处理无穷量 (无穷大量和无穷小量) 而提出的。
- 超实数集, 或称为非标准实数集, 记为  ${}^*\mathbb{R}$ , 是实数集  $\mathbb{R}$  的一个扩张。

## 2.2.2 邻域

1

### 定义 2.2.2: 邻域的相关概念

- $\delta$  邻域: 设  $x_0$  是数轴上一个点,  $\delta$  是某一正数, 则称  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  为点  $x_0$  的  $\delta$  邻域, 记作  $U(x_0, \delta)$ , 即:

$$U(x_0, \delta) = \{x | x_0 - \delta < x < x_0 + \delta\} = \{x | |x - x_0| < \delta\}$$

- 去心  $\delta$  邻域: 定义点  $x_0$  的去心邻域  $\dot{U}(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$
- 左, 右  $\delta$  邻域:  $\{x | 0 < x - x_0 < \delta\}$  称为点  $x_0$  的右  $\delta$  邻域, 记作  $U^+(x_0, \delta)$ ;  $\{x | 0 < x_0 - x < \delta\}$  称为点  $x_0$  的左  $\delta$  邻域, 记作  $U^-(x_0, \delta)$ .

## 2.2.3 函数极限的定义

函数极限的定义主要分为自变量趋于有限值 ( $x \rightarrow x_0$ ) 时的极限和自变量趋于无穷大时函数的极限 ( $x \rightarrow \infty$ )

### 自变量趋于有限值时的函数极限

#### 定义 2.2.3: 当自变量趋于有限值时函数极限定义

设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某一去心邻域内有定义. 如果存在常数  $A$ , 对于任意给定的正数  $\varepsilon$  (不论它多么小)<sup>a</sup>, 总存在正数  $\delta$ , 使得当  $x$  满足不等式  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 对应的函数值  $f(x)$  都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

那么常数  $A$  就叫做函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  时的极限, 记作:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (\text{当 } x \rightarrow x_0)$$

其  $\varepsilon - N$  语言为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  在证明中, 这两句是白给, 直接写. 后面的才是关键。

<sup>a</sup> $\varepsilon$  用于衡量  $|f(x) - A|$  的值有多小

<sup>1</sup>邻域与区间不同, 邻域属于区间的范畴. 但是邻域通常表示“一个局部位置”. 比如“点  $x_0$  的  $\delta$  邻域”, 可以理解为“点  $x_0$ ”的附近, 而区间是明确指出在实数系下的范围

### 注 2.2.2

1. 在函数极限中  $x \rightarrow \infty$  指的是  $|x| \rightarrow \infty$ , 需要  $x$  趋于正无穷和负无穷, 但在数列中的  $n \rightarrow \infty$  是  $n \rightarrow +\infty$
2. 函数的极限值只与邻域内的函数值有关, 而与该点的函数值无关.

### 单侧极限

#### 定义 2.2.4: 单侧极限的定义

若当  $x \rightarrow x_0^-$  时,  $f(x)$  无限接近于某常数  $A$ , 则常数  $A$  叫作函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  时的左极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0^-) = A.$$

若当  $x \rightarrow x_0^+$  时,  $f(x)$  无限接近于某常数  $A$ , 则常数  $A$  叫作函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  时的右极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0^+) = A$$

题目 9. 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} \right]$  存在, 求  $a$  的值

解答. 由于存在  $\arctan$  与  $|x|$  函数, 则对于 0 点的极限值需要分左右进行计算.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[ a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^-} a \arctan \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - x)^{\frac{1}{x}} = -\frac{\pi}{2}a + \frac{1}{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} a \arctan \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \frac{\pi}{2}a + e$$

若极限存在, 则  $a = \frac{1 - e^2}{\pi e}$

题目 9 的注记. 由于自变量趋向的双向性, 以下类型的函数因此需要进行特殊讨论:

- 形如  $f(x) = \max\{h(x), g(x)\}$  此类函数也需要注意在函数变化点的自变量取值问题
- $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x: \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}: \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x: \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} [x]: \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$

### 自变量趋于无穷大时函数的极限

#### 定义 2.2.5: 自变量趋于无穷大时函数极限定义

设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某一去心邻域内有定义. 如果存在常数  $A$ , 对于任意给定的正数  $\varepsilon$ . (不论它多么小), 总存在正数  $\delta$ , 使得当  $x$  满足不等式  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 对应的函数值  $f(x)$  都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

那么常数  $A$  叫做函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  的极限, 记作:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (\text{当 } x \rightarrow x_0)$$

其  $\varepsilon - N$  语言为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  在证明中, 这两句是白给, 直接写。后面的才是关键。

需要注意的是趋向的值不同时,  $\varepsilon - N$  写法不同, 不能照抄。其  $\varepsilon - N$  的表达为如下表格:

	$f(x) \rightarrow A$	$f(x) \rightarrow \infty$	$f(x) \rightarrow +\infty$	$f(x) \rightarrow -\infty$
$x \rightarrow x_0$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 <  x - x_0  < \delta$ 时, 即有 $ f(x) - A  < \varepsilon.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 <  x - x_0  < \delta$ 时, 即有 $ f(x)  > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 <  x - x_0  < \delta$ 时, 即有 $f(x) > M.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 <  x - x_0  < \delta$ 时, 即有 $f(x) < -M$
$x \rightarrow x_0^+$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 即有 $ f(x) - A  < \varepsilon.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 即有 $ f(x)  > M.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 即有 $f(x) > M.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 即有 $f(x) < -M$
$x \rightarrow x_0^-$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 > x - x_0 > -\delta$ 时, 即有 $ f(x) - A  < \varepsilon.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 > x - x_0 > -\delta$ 时, 即有 $ f(x)  > M.$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 > x - x_0 > -\delta$ 时, 即有 $f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $0 > x - x_0 > -\delta$ 时, 即有 $f(x) < -M$
$x \rightarrow \infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 使当 $ x  > X$ 时, 即有 $ f(x) - A  < \varepsilon.$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $ x  > X$ 时, 即有 $ f(x)  > M$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $ x  > X$ 时, 即有 $f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $ x  > X$ 时, 即有 $f(x) < -M.$
$x \rightarrow +\infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x > X$ 时, 即有 $ f(x) - A  < \varepsilon.$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x > X$ 时, 即有 $ f(x)  > M$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x > X$ 时, 即有 $f(x) > M.$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x > X$ 时, 即有 $f(x) < -M$
$x \rightarrow -\infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x < -X$ 时, 即有 $ f(x) - A  < \varepsilon.$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x < -X$ 时, 即有 $ f(x)  > M$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x < -X$ 时, 即有 $f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists X > 0,$ 使当 $x < -X$ 时, 即有 $f(x) < -M.$

### 注 2.2.3: 上表的部分解释

- 以  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  为例: 不管  $f(x)$  与  $A$  的距离多远 ( $\forall \varepsilon > 0$ ), 总有  $x$  不断靠近  $x_0$ , 使得  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- 以  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  为例: 不管  $M$  多大, 总有当  $x > \infty$  时, 使得  $|f(x)| > M$ , 即满足  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ .

## 2.2.4 函数极限的性质

### 唯一性

#### 定理 2.2.1

如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在, 那么极限唯一

### 注 2.2.4: 关于唯一性的说明

- 对于  $x \rightarrow \infty$ , 意味着  $x \rightarrow +\infty$  且  $x \rightarrow -\infty$
  - 对于  $x \rightarrow x_0$ , 意味着  $x \rightarrow x_0^+$  且  $x \rightarrow x_0^-$
- 对于上述问题, 我们称为自变量取值的“双向性”. 以下有一些常见的问题:
- $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$  不存在,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}$  不存在,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$  不存在,  $\lim_{x \rightarrow x_0} [x]$  不存在.
  - 其不存在的原因均为分段函数分段点极限表达式不同, 需要分别求左右极限.

### 注 2.2.5: 极限存在的充要条件

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A, \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A^a$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0 (\text{无穷小量 } \alpha(x) = 0)^b$$

<sup>a</sup>左右极限都存在且相等

<sup>b</sup>对于此概念, 如果引入超实数系的解释应为  $A$  是  $f(x)$  的标准实数部分, 而  $f(x)$  的值是超实数系下的值, 因此其值应为  $f(x) = A + \alpha(x)$

### 注 2.2.6: 极限不存在的情况

- 函数在该点附近趋于无穷
- 函数在该点的左右极限只存在一个, 或两者都存在但不相等
- 函数在该点附近不停地震荡
- 该点是函数无定义点的聚点

## 局部有界性

### 定理 2.2.2

若极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在<sup>a</sup>, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  某去心邻域内有界.

<sup>a</sup>对局部有界性的描述需要指明是在那个区间上

### 注 2.2.7: 局部有界性的性质

- 极限存在必有界, 有界函数极限不一定存在.
- 若  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上为连续函数, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上必有界.
- 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  内为连续函数, 且  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$  都存在, 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  内必定有界.
- 有界函数与有界函数的和, 差, 积仍为有界函数<sup>a</sup>.

<sup>a</sup>商不是有界函数, 因为:  $y_1 = 1, y_2 = 0, \frac{y_1}{y_2} = \infty$

题目 10. 在下列区间内, 函数  $f(x) = \frac{x \sin(x-3)}{(x-1)(x-3)^2}$  有界的是:  
A:  $(-2, 1)$     B:  $(-1, 0)$     C:  $(1, 2)$     D:  $(2, 3)$

解答. 又题意可知, 函数的分段点为  $x = 3, 0, 1$ , 对上述三点求极限, 分析可得, 当  $x = 3, 1$  时, 函数极限为  $\infty$ , 因此函数在上述两点的极限不存在, 因此根据局部有界性的性质可得, 含这两个点的区间无界, 因此排除 A, C, D. 答案为 B.

## 局部保号性

### 定理 2.2.3

如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 且  $A > 0$  (或  $A < 0$ ), 那么存在常数  $\delta > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时有  $f(x) > 0$  ( $f(x) < 0$ )<sup>a</sup>.

如果在  $x_0$  的某去心邻域内  $f(x) \geq 0$  (或  $f(x) \leq 0$ ), 而且  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 那么  $A \leq 0$  或  $(A \leq 0)$ <sup>b</sup>.

<sup>a</sup>如果函数在  $x_0$  附近的极限值为正, 那么  $x_0$  附近的函数值为正

<sup>b</sup>如果函数在  $x_0$  附近的函数值  $\leq 0$ , 那么  $x_0$  此处的极限值  $\leq 0$

对上述定理中, 为什么一个可以等于 0, 一个不能等于 0? 其解释如下: 如果第一个定理中  $A \leq 0, f(x) \leq 0$ , 那么以函数  $f(x) = x^2$  为例, 虽然  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ , 但是邻域内的函数值都大于 0. 对于第二个定理中如果  $f(x) < 0, A < 0$ , 那么以函数  $f(x) = -x^2$  为例, 虽然邻域内的函数值都小于 0, 但是  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .

### 注 2.2.8

由保号性可推出保序性: 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ , 则:

1. 若  $A > B \Rightarrow \exists \delta > 0$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$  时,  $f(x) > g(x)$ .
2. 若  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$  时,  $f(x) \geq g(x) \Rightarrow A \geq B$ .



### 题目 11. 局部保号性的证明:

证明. 如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ , 所以, 取  $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$ ,  $\exists \delta > 0$  当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|f(x) - A| < \frac{A}{2} \Rightarrow f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

□

由上述证明可得如下推论

#### 推论 2.2.1

如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0 (A \neq 0)$ , 那么就存在  $x_0$  的某一去心邻域  $\dot{U}(x_0)$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0)$  时, 就有  $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$

### 函数极限与数列极限的关系 (海涅定理)


#### 定理 2.2.4

设  $f(x)$  在  $\dot{U}(x_0, \delta)$  内有定义, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  存在  $\Leftrightarrow$  对任何  $\dot{U}(x_0, \delta)$  内以  $x_0$  为极限的数列  $\{x_n\} (x_n \neq x_0)$ , 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$  存在.


把这个定理简化一下, 主要意思就是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \Updownarrow \\ \text{所有的 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L \end{aligned}$$


其不同之处在于是离散的趋近还是连续的趋近



除此之外,  $f(x)$  和  $f(a_n)$  的函数图像如下所示




函数  $f(x)$




函数  $f(a_n)$

如上图所示  $f(a_n)$  其实是  $f(x)$  的抽样



用  $\varepsilon - \delta$  求它的极限



用海涅定理求它的极限

需要注意的是, 是所有的数列 (抽样) 才能完全代表整体. 不能说选了某个数列有极限就代表函数有极限. 总结: 海涅定理表述了离散与连续、数列极限与函数极限的关系.

## 2.3 无穷小与无穷大

### 2.3.1 无穷小

#### 定义 2.3.1: 无穷小的定义

如果函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  (或  $x \rightarrow \infty$ ) 时的极限为零, 那么称函数  $f(x)$  为当  $x \rightarrow x_0$  (或  $x \rightarrow \infty$ ) 时的无穷小.

$f(x)$  是可以本身为 0 或者无限趋近于零, 其中 0 可以作为无穷小唯一常数.

#### 注 2.3.1: 无穷小与函数极限的关系 (脱帽法)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha$ , 其中  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  为超实数值, 其实数部分为  $A$ , 函数  $f(x)$  的函数值为  $A + \alpha$

### 2.3.2 无穷小的性质

1 有限个无穷小的和是无穷小<sup>2</sup>

<sup>2</sup>无穷个无穷小的和不一定是无穷小, 如  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} \cdots + \frac{1}{n+n}) = \ln 2$

证明. 设  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  为无穷小量. 则  $0 \leq |\alpha_1 + \alpha_2| \leq |\alpha_1| + |\alpha_2|$ ,  $|\alpha_1| + |\alpha_2|$  的极限为 0. 证明完毕。  $\square$

2 有界函数与无穷小的乘积是无穷小<sup>3</sup>

证明.  $|\alpha_1| \leq M, \alpha_2$  是无穷小量. 那么  $0 \leq |\alpha_1 \times \alpha_2| = |\alpha_1| \times |\alpha_2| \leq M \times |\alpha_2|$  证明完毕。  $\square$

3 有限个无穷小的乘积是无穷小<sup>4</sup>

### 2.3.3 无穷小的比阶

#### 定义 2.3.2

- 如果  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$ , 那么就说  $\beta$  是比  $\alpha$  高阶的无穷小, 记作  $\beta = o(\alpha)$ ;
- 如果  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$ , 那么就说  $\beta$  是比  $\alpha$  低阶的无穷小;
- 如果  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$ , 那么就说  $\beta$  与  $\alpha$  是同阶无穷小;
- 如果  $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$ , 那么就说  $\beta$  是关于  $\alpha$  的  $k$  阶无穷小<sup>a</sup>;
- 如果  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$ , 那么就说  $\beta$  与  $\alpha$  是等价无穷小, 记作  $\alpha \sim \beta$

<sup>a</sup>不是相等, 超实数系下没有加减运算, 只可以进行替换运算

前三个定义解释:  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$  是指分子趋于 0 的速度比分母快,  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$  是指分子趋于 0 的速度比分母慢,  $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$  是指趋于 0 的速度一样.

同时需要注意的是, **并不是任意两个无穷小都可进行比阶的**. 例如, 当  $x \rightarrow 0$  时,  $x \sin \frac{1}{x}$  与  $x^2$  虽然都是无穷小, 但是却不可以比阶, 也就是说既无高低阶之分, 也无同阶可言, 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$  不存在, 其值为  $\infty$  和 0。

### 2.3.4 无穷小的运算

<sup>5</sup> 设  $m, n$  为无穷小, 则

1.  $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^l), l = \min\{m, n\}$
2.  $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$
3.  $o(x^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m), k \neq 0$

<sup>3</sup>无界函数  $\times$  无穷小量不一定是无穷小, 如  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \times \frac{1}{x} = 1$

<sup>4</sup>这个地方虽然张宇老师给出了证明, 但是好像存在一定的争议性

<sup>5</sup>此处多用于泰勒公式的应用中, 会对上述高阶无穷小的运算提出要求

### 2.3.5 无穷大

#### 定义 2.3.3: 无穷大的定义

设函数  $f(x)$  在  $x_0$  的某一去心邻域内有定义 (或  $|x|$  大于某一正数时有定义). 如果对于任意给定的正数  $M$  (不论它多么大), 总存在正数  $\delta$  (或数  $X$ ), 只要  $x$  适合不等式  $0 < |x - x_0| < \delta$  (或  $|x| > X$ ), 对应的函数值  $f(x)$  总满足不等式

$$|f(x)| > M$$

那么称函数  $f(x)$  是当  $x \rightarrow x_0$  (或  $x \rightarrow \infty$ <sup>a</sup>) 时的无穷大.<sup>b</sup> 其  $\varepsilon - N$  语言为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x)| > M.$$

<sup>a</sup>等价于  $x \rightarrow -\infty$  同时  $x \rightarrow +\infty$

<sup>b</sup>无穷大一定无界, 但无界不一定是无穷大量. 与无穷小相同, 都是一个极限过程, 因此无穷大也是一个极限, 所以无界不一定是无穷大量

题目 12. 证明  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$

解答.  $\forall M > 0$  令  $\delta = \frac{1}{4M} > 0$ , 当  $0 < |x-1| < \delta$  时, 即  $0 < |x-1| < \frac{1}{4M}$  时,  $|x-1| < \frac{1}{M}$ , 所以  $\frac{1}{|x-1|} > M$ .  
这就证明了  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$

### 2.3.6 无穷大的比阶

- 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x$ , 其中  $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$ .<sup>6</sup>
- 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$ , 其中  $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$ .

### 2.3.7 无穷大的性质

- 两个无穷大量的积仍未无穷大量
- 无穷大量与有界变量的和仍是无穷大量

### 2.3.8 无穷大与无界变量的关系

无穷大量一定是无界变量, 但无界变量不一定是无穷大量.<sup>7</sup>

### 2.3.9 无穷大与无穷小的关系

在自变量的同一变化过程中, 若  $f(x)$  是无穷大, 则  $\frac{1}{f(x)}$  是无穷小; 若  $f(x)$  是无穷小, 且  $f(x) \neq 0$ , 则  $\frac{1}{f(x)}$  是无穷大.

<sup>6</sup>由洛必达公式证明

<sup>7</sup>如数列  $x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ , 是无界变量, 但不是无穷大. 无穷大是一个极限

## 2.4 函数极限的运算

### 2.4.1 极限的四则运算法则

#### 利用极限的四则运算法则求极限

<sup>8</sup> 如果极限不存在, 那么极限属于超实数系的范畴, 在超实数系下不可以进行代数运算, 只可以进行替换运算。但是如果极限均存在, 那么可以进行代数计算。那么就可以使用下面的运算法则:

若  $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$ , 那么

- $\lim[kf(x) \pm lg(x)] = k \lim f(x) \pm l \lim g(x) = kA \pm lB$ , 其中  $k, l$  为常数
- $\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) \equiv A \cdot B$ , 特别的, 若  $\lim f(x)$  存在,  $n$  为正整数, 则  $\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$
- $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$

#### 注 2.4.1: 常用结论

- 存在  $\pm$  不存在 = 不存在 (只有这个是不存在, 其余都是不一定或者存在)
- 不存在  $\pm$  不存在 = 不一定<sup>a</sup>
- 存在  $\times(\div)$  不存在 = 不一定
- 不存在  $\times(\div)$  不存在 = 不一定

<sup>a</sup>反例:  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}) = 0$

题目 13. (1) 证明:  $\lim f(x) = A \neq 0 \Rightarrow \lim f(x)g(x) = A \lim g(x)$

(2) 证明:  $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$  存在,  $\lim g(x) = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 0$

证明. (1)  $\lim f(x) = \lim \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = \lim \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim g(x) = A \cdot 0 = 0$ .

(2) 由于  $g(x) = \frac{f(x)}{\frac{f(x)}{g(x)}}$ , 则  $\lim g(x) = \lim \frac{f(x)}{\frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{\lim f(x)}{\lim \frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{0}{A} = 0$  □

题目 13 的注记. 此题的两个证明是常用结论

题目 14. 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}$ . 极限

解答. 由于该极限的分子  $e^x$  的极限为无穷大, 无穷大属于极限中的不存在情况, 因此不可以使用极限的四则运

<sup>8</sup>易错, 在计算中往往容易忽视极限不存在的情况

算法则2.4.1, 也不可以对分母使用两个重要无穷小进行化简. 只能使用等价变换进行求解. 即

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})} \\ &\stackrel{\text{泰勒展开}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x - x + \frac{1}{2}} \\ &= e^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

**题目 15.** 已知  $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x}}{f'(x)}$

**解答.** 如果想把分子写  $x \rightarrow 0$  时的导数形式, 然后进行计算, 即  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)-f(0)}{x-0}}{\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}} = \frac{f'(0)}{f'(0)} = 1$  进行运算, 则不满足极限四则运算法则2.4.1, 因为其分母为 0, 违背了极限的四则运算法则, 因此不可这样计算, 需要对其进行恒等变形计算. 即

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x^2}}{\frac{f'(x)-f'(0)}{x}} \\ &= \frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x^2} \\ &\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \quad (\text{此处的处理不可再次使用洛必达, 因为二阶导在此不连续}) \\ &= \frac{1}{f''(0)} \frac{1}{2} f''(0) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

**题目 15 的注记.** **使用极限运算法则的注意事项:** 在求分式这种形式的极限时, 一定要注意分子的极限是不是无穷, 如果极限为无穷则不可以使用极限运算法则对极限进行拆分计算, 同时还要注意分母的极限是不是 0, 如果是 0, 则也不可以使用极限运算法则计算, 只能进行等价替换进行运算.

**题目 16.** 求  $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \cot^2 x)$

**解答.**

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x}) \\ &= \frac{(\tan x + x)(\tan x - x)}{x^2 \times \tan^2 x} \\ &= \frac{2x \times \frac{1}{3}x^3}{x^4} \\ &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

**题目 16 的注记.** 本题的有另一个解法, 但是相较上面的解法相比有些复杂, 但是记录一个常见的错误, 即什么

时候可以用等价无穷小的问题, 其写法为:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right) = \left( \frac{1}{x^2} - \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^4} \right)\end{aligned}$$

此处有一个常见的错误, 就是能不能把  $\cos^2 x$  替换为 1, 其实是不能的, 即使最后答案正确, 此时  $x \rightarrow 0$  时, 分母也趋于 0, 如果进行替换, 则违背了极限的运算法则, 因此不能进行替换

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x \cos x)(\sin x + x \cos x)}{x^4} \xrightarrow{\text{泰勒公式}} \frac{2}{3}$$

**题目 17.** 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$

证明.  $g(x) = \frac{f(x)}{\frac{f(x)}{g(x)}}$ . 求极限得  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}} = 0$ . 证明完毕  $\square$

**题目 17 的注记.** 此证明为结论, 经常使用

## 2.4.2 泰勒公式

泰勒公式的目的是提高精确度, 用更高次的多项式来逼近函数

带拉格朗日余项的  $n$  阶泰勒展开式

如果函数  $f(x)$  在  $x_0$  的某个邻域  $U(x_0)$  内具有  $(n+1)$  阶导数, 那么对任一  $x \in U(x_0)$ , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

带佩亚诺余项的  $n$  阶泰勒展开式

如果函数  $f(x)$  在  $x_0$  处具有  $n$  阶导数, 那么存在  $x_0$  的一个邻域, 对于该邻域内的任一  $x$ , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

带有佩亚诺余项的麦克劳林公式

对带有佩亚诺余项的泰勒公式取  $x_0 = 0$ , 则可以得到带有佩亚诺余项的麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

当  $x \rightarrow 0$  时, 由麦克劳林公式可得, 有以下结论

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

#### 注 2.4.2: 泰勒公式应用时的展开原则

- $\frac{A}{B}$  型, 适用于“上下同阶”原则: 具体来说, 如果分母或者分子是  $x$  的  $k$  次幂, 则应把分子或分母展开到  $x$  的  $k$  次幂。如:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$ , 此处  $\ln(1+x)$  应展开为  $x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
- $A - B$  型, 适用“幂次最低”原则: 将  $A, B$  分别展开到他们系数不相等的  $x$  的最低次幂为止。如: 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}$  与  $ax^b$  为等价无穷小, 求  $a, b$ . 则应展开为  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$ ,  $e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!} \frac{x^4}{4} + o(x^4)$ .

#### 注 2.4.3: 泰勒公式的解题技巧

1. 泰勒公式构建了函数与其高阶导之间的联系, 因此看见高阶导数, 要条件反射的想到泰勒公式
2. 奇函数的泰勒展式只有奇数次幂, 偶函数的泰勒展式只有偶数次幂<sup>a</sup>
3. 极限当中, 用佩亚诺余项  $O(x$  的  $n$  次幂), 证明题中, 用拉格朗日余项, 找提供信息最多的点作为展开点
4. 等价无穷小的本质是泰勒的低精度形式, 加减法不建议使用等价无穷小, 建议直接泰勒
5. 加项减项的本质也是泰勒<sup>b</sup>

<sup>a</sup>如  $\sin x$  和  $\cos x$

<sup>b</sup>如  $\ln(x) = \ln(1+x-1) \sim x-1$

题目 18.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) - x}{x^2}$

解答. 对等式进行泰勒展开即:

$$\frac{\ln(1+x+x^2) - x}{x^2} = \frac{(x+x^2 - \frac{1}{2}(x+x^2)^2 - x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$$



**题目 19.**  $f(x)$  在  $x=0$  处二阶可导且满足  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \sin x + \ln(1+x)}{x^3} = 0$ , 求  $f(0), f'(0), f''(0)$

**解答.** 对原式中  $f(x)$  和  $\sin x$  和  $\ln(1+x)$  各项进行泰勒展开得:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \sin x + \ln(1+x)}{x^3} &= 0 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2)(x - \frac{1}{6}x^3) - (x - \frac{1}{6}x^3) + (x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3})}{x^3} = 0 \\ &= \frac{(f(0) + 1)x + (f''(0) - \frac{1}{2})x^2 + (-\frac{1}{6}f(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{1}{3})x^3 + o(x^3)}{x^3} = 0. \end{aligned}$$

可以得到的是, 分子的极限一定为 0, 那么 
$$\begin{cases} f(0) + 1 = 0 \\ f'(0) - \frac{1}{2} = 0 \\ -\frac{1}{6}f(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{1}{3} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(0) = -1 \\ f'(0) = \frac{1}{2} \\ f''(0) = -1 \end{cases}$$

**题目 19 的注记.** 看见各阶导数应想到泰勒公式

**题目 20.** 已知函数  $f(x)$  在  $x=0$  的某领域内连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x}) = 2$ , 试求  $f(0), f'(0)$

**解答.** 对原式进行通分然后对  $\sin x$  进行泰勒展开:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^2} &= 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + xf(x) + o(x^2)}{x^2} = 2 \end{aligned}$$

根据函数极限与无穷小的关系2.3.1可知,  $1 + f(x) = 2x + o(x), f(x) = 2x - 1 + o(x)$  因为函数在  $x=0$  上连续, 因此  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x), f(x) = 2x - 1 + o(x)$  的表达式是  $x \rightarrow 0$  时的表达式, 将  $x=0$  带入可得  $f(0) = -1$ , 使用导数定义求得  $f(x)$  在点 0 处的导数, 即  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{2x + o(x)}{x} = 2$

**题目 20 的注记.** 看见此类问题, 第一步应先通分, 然后将具体函数的泰勒进行展开 (因为此题中的条件是连续而不是可导, 如果是可导的话可以全部进行展开), 然后把  $f(x)$  的表达式给求出来

**题目 21.** 设函数  $f(x) = \sec x$  在  $x=0$  处的 2 次泰勒多项式为  $1 + ax + bx^2$ , 则  
(A)  $a=1, b=\frac{1}{2}$  (B)  $a=1, b=\frac{1}{2}$  (C)  $a=0, b=-\frac{1}{2}$  (D)  $a=0, b=\frac{1}{2}$

**解答.**  $f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ , 该函数为偶函数, 因此泰勒展开只有偶数次幂, 那么  $a=0$ , 该函数一定大于 0, 因此  $b \geq 0$ , 排除 C, A, B.

**题目 21 的注记.** 本题也可以将  $\sec x$  展开, 但是较为麻烦, 可以采用上述的方法进行运算.

**题目 22.** 设函数  $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$  在  $x=0$  处的 3 次泰勒多项式为  $ax + bx^2 + cx^3$ , 则

(A)  $a=1, b=0, c=-\frac{7}{6}$  (B)  $a=1, b=0, c=\frac{7}{6}$   
(C)  $a=-1, b=-1, c=-\frac{7}{6}$  (D)  $a=-1, b=-1, c=\frac{7}{6}$

解答. 法 1: 对分子进行泰勒展开, 然后使用整式除法

$$1+x^2 \begin{array}{r} x - \frac{7}{6}x^3 \\ x - \frac{7}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 \\ \hline x + x^3 \\ -\frac{7}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 \\ \hline -\frac{7}{6}x^3 - \frac{7}{6}x^5 \end{array}$$

法 2: 对整式进行泰勒展开与等价无穷小替换  $f(x) = (x - \frac{x^3}{6})(1 - x^2) = x - \frac{7}{6}x^3$

法 3: 对整式进行泰勒展开计算可得  $x - \frac{7}{6}x^3$

**题目 22 的注记.** 遇见此类问题, 解题方法的优先级为长除法, 利用等价替换, 使用定义 (利用泰勒公式直接所有项都展开)

### 2.4.3 洛必达法则

#### 定义 2.4.1: 洛必达法则定义

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0(\infty)$
- $f(x)$  和  $g(x)$  在  $x_0$  的某去心邻域内可导, 且  $g'(x) \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  存在 (或  $\infty$ )

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

需要注意的是使用过洛必达法则之后的极限必须存在, 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  必须存在.

**题目 23.** 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \times \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$

解答. 该函数也是  $\frac{0}{0}$  型, 但是如果使用洛必达法则, 则  $2x \times \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ , 极限显然不存在, 因此不可以使用洛必达法则. 则正确求法为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \times \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \times \sin \frac{1}{x} = 0$ .

#### 注 2.4.4: 洛必达可以洛到几阶

- $n$  阶导连续, 则最多可以洛到  $n$  阶.
- $n$  阶导存在/ $n$  阶邻域内可导, 则最多能洛到  $n-1$  阶.
- 实际上,  $n$  阶导连续, 不一定能够洛到  $n$  阶<sup>a</sup>. 结论如下:

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^m}$  到底能用多少次洛必达法则假设  $m$  和  $n$  均为正整数, 并且  $f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$ .

1. 如果  $f(x)$  在  $x_0$  的  $n$  阶导数连续, 则:

(a) 若  $m \leq n$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^m}$  可以用  $m$  次洛必达  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(m)}(x)}{m!} = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}$

(b) 若  $m > n$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^m}$  则一次都不能用洛必达.

2. 如果  $f(x)$  在  $x_0$  有  $n$  阶导数 (没说  $n$  阶导函数连续), 则:

(a) 若  $m \leq n-1$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^m}$  可以用  $m$  次洛必达  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(m)}(x)}{m!} = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}$

(b) 若  $m = n$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^m}$  可以用  $m-1$  次洛必达出现  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(m-1)}(x)}{m!(x-x_0)}$ , 然后利用导数定义  $f^{(n)}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}$  进一步计算

(c) 若  $m \geq n+1$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^m}$  一次都不能用洛必达

<sup>a</sup>但是考研中这点没有难为过人, 因此可以粗略的认为上述两条是成立的

**题目 24.** 设  $f(x)$  有二阶连续导数, 并且  $f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=0$ , 并且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$ , 问  $\frac{f(x)}{x^3}$  是否可以洛必达法则? 如果可以请求出  $f'''(0)$ ; 如果不存在, 请说明理由.

**解答.** 看到此题的二阶导数连续, 一般都认为可以进行洛必达, 但是其实该方程式一次洛必达都不可以进行, 假设函数  $f(x)$  表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{28}{9}} \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + x^3, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

那么

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{28}{9} x^{\frac{19}{9}} \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{3} x^{\frac{16}{9}} \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 3x^2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

二阶导为

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{532}{82} x^{\frac{10}{9}} \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{44}{27} x^{\frac{7}{9}} \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{9} x^{\frac{4}{9}} \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 6x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

可知函数  $f'(0) = 0$ , 且  $f''(0) = 0$ , 该函数完全满足题意, 但是对  $\frac{f(x)}{x^3}$  使用第一次洛必达时, 为

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{28}{9} x^{\frac{19}{9}} \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{3} x^{\frac{16}{9}} \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 3x^2}{3x^2}$$

洛必达之后的极限显然不存在, 因此该情况下不可以使用洛必达法则.

**题目 24 的注记.** 本题需要注意, 不是所有的条件下都可以进行洛必达法则, 由此可以抽象出来一个样例:

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{\sqrt[b]{x}} + x^c, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

**题目 25.** 已知函数  $f(x)$  在  $x = 0$  的某领域内可导, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x}) = 2$ , 试求  $f(0), f'(0)$  以及  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + e^x}$

**解答.** 本题中未说明  $f(x)$  在邻域内连续可导, 只说明一阶导存在, 因此一阶都不可以进行洛必达法则, 但是可以使用泰勒公式对上述式子进行泰勒展开, 因此上述式子的解法为对原式进行通分然后对  $\sin x$  进行泰勒展开:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^2} &= 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + xf(x) + o(x^2)}{x^2} = 2\end{aligned}$$

根据函数极限与无穷小的关系2.3.1可知,  $1 + f(x) = 2x + o(x)$ ,  $f(x) = 2x - 1 + o(x)$  因为函数在  $x = 0$  上连续, 因此  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ,  $f(x) = 2x - 1 + o(x)$  的表达式是  $x \rightarrow 0$  时的表达式, 将  $x = 0$  带入可得  $f(0) = -1$ , 使用导数定义求得  $f(x)$  在点 0 处的导数, 即  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{2x + o(x)}{x} = 2$ , 然后带入极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + e^x} = \frac{x}{-1 + 2x + e^x} = \frac{1}{3}$$

**题目 25 的注记.** 看见此类问题, 第一步应先通分, 然后将具体函数的泰勒进行展开 (因为此题中的条件是连续而不是可导, 如果是可导的话可以全部进行展开), 然后把  $f(x)$  的表达式给求出来

**题目 26.** 求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - e^\pi)$

**解答.** (1) 拉格朗日中值定理:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \times e^{(\varepsilon)} \left( \arctan x - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= e^\pi \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= -e^\pi\end{aligned}$$

(2) 提后项:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^\pi (e^{\arctan \frac{\pi}{2}} - 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^\pi \times \arctan \frac{-\pi x}{2} \\ &= -e^\pi\end{aligned}$$

(3) 直接洛:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\pi + \arctan x}{2}} - e^\pi}{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \times \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= -e^\pi\end{aligned}$$

**题目 26 的注记.** 该形式为无穷大乘以无穷小, 可以构造无穷大比无穷大, 或无穷小比无穷小, 之后进行洛必达。方法多了, 往往会忽视洛必达, 但有时洛必达反而会简单一些。

**题目 27.** 设  $y = f(x)$  是方程  $y'' + 2y' + y = e^{3x}$  的解, 且满足  $y(0) = y'(0) = 0$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时, 与  $y(x)$  为等价无穷小的是 ()

(A).  $\sin x^2$       (B).  $\sin x$       (C).  $\ln(1 + x^2)$       (D).  $\ln \sqrt{1 + x^2}$

**解答.** 等价无穷小具有传递性, 因此  $\sin x^2 \sim x^2, \sin x \sim x, \ln(1+x^2) \sim x^2, \ln(\sqrt{1+x^2}) \sim \frac{1}{2}x^2$ . 若与  $y(x)$  为等价无穷小, 那么  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{f(x)} = 1$ . 对  $y(x)$  进行泰勒展开  $y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2}x^2$ . 当  $x = 0$  时, 有  $y''(0) = 1$ , 易知一阶导是连续的, 对函数形式进行分析, 可知函数在二阶导也是连续的, 那么就可以展开到二阶, 那么  $y(x) = \frac{1}{2}x^2$ .

除此之外, 还可以这样解决, 已知二阶导连续, 那么对  $\frac{y(x)}{A/B/C/D}$  进行洛必达可知 D 选项正确.

## 2.4.4 等价替代求极限

利用基本极限求极限

$\lim_{\square \rightarrow \infty} (1 +  \square )^{\frac{1}{\square}} = e^{ \square ^{\frac{1}{\square}}}$	$\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$

等价无穷小求极限

等价无穷小的本质是泰勒的低精度形式

关于等价无穷小, 有以下两个定理

**定义 2.4.2: 等价无穷小的充要条件**

$\beta$  与  $\alpha$  是等价无穷小的充分必要条件为

$$\beta = \alpha + o(\alpha)$$

**定义 2.4.3: 等价无穷小的替换准则**

设  $\alpha \sim \tilde{\alpha}, \beta \sim \tilde{\beta}$ , 且  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$  存在, 则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}.$$

等价无穷小的本质还是在做恒等替换, 所以一般情况下整式的乘除法可以直接用等价无穷小替换, 分子及分母都可用等价无穷小来代替. 但是需要遵循以下代换原则<sup>a</sup>

- 乘除关系可以换: 若  $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$ , 则  $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$
- 加减关系一定条件下可以换<sup>b</sup>
  - 若  $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$ , 且  $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$ , 则  $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$
  - 若  $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$ , 且  $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$ , 则  $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$

加减关系代换准则证明如下:

证明.

$$\lim \frac{\alpha - \beta}{\alpha_1 - \beta_1} = \lim \frac{\beta(\frac{\alpha}{\beta} - 1)}{\beta_1(\frac{\alpha_1}{\beta_1} - 1)} = 1$$

□

<sup>a</sup>其实没有什么替换原则, 本质其实是因为超实数系下不能进行实数运算, 只能进行替换运算

<sup>b</sup>这样的形式其实不经常用, 看见加减最好使用泰勒公式进行替换运算

以下为常用等价无穷小

当  $x \rightarrow 0$  时, 有

1.

$$\begin{aligned}x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \\&\sim \ln(1+x) \\&\sim e^x - 1\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(1+x)^a &\sim 1+ax \\a^x - 1 &\sim x \ln a \\1 - \cos^\alpha x &\sim \frac{\alpha}{2}x^2\end{aligned}$$

3. 上述结论的推广:

当  $x \rightarrow 0$  时, 若

$$(1+x)^a - 1 \sim ax,$$

则

$$\alpha(x) \rightarrow 0, \alpha(x)\beta(x) \rightarrow 0,$$

那么

$$[1 + \alpha(x)]^{\beta(x)} - 1 \sim \alpha(x)\beta(x)$$

4.

$$\frac{1}{2}x^2 \sim \sec x - 1 \sim x - \ln(1+x)$$

5.

$$\frac{1}{6}x^3 \sim x - \sin \sim \arcsin x - x$$

6.

$$\frac{1}{3}x^3 \sim x - \arctan x \sim \tan x - x$$

7.  $x \rightarrow 1$  时,  $\ln x \sim x - 1$ , 因为  $\ln(1+x-1) \sim x-1$

8. 当  $A \rightarrow 0, B \rightarrow 0$  时,  $e^A - e^B \sim A - B$ , 因为  $e^B(e^{A-B} - 1) \sim A - B$

**题目 28.** 假设  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x}$  存在

解答. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x}$  存在, 那么构造恒等变形:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2} \times \frac{\frac{1}{2}x^2}{1 - \cos x} \right) \\ &\stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2} \end{aligned}$$

题目 28 的注记. 整体的乘除法本质是构造恒等变形

题目 29. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$

解答. 由常用不等式 2.5.2 的  $x \rightarrow 0, |\sin x| \leq |x|$ , 那么  $|\frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}| \leq |\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}|$ , 由夹逼准则得:  $0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} |\frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}| \leq \lim_{x \rightarrow 0} |\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}|$  左右极限都为 0, 因此  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$  极限为 0

题目 29 的注记. 等价无穷小替换的本质是构造恒等变形. 需要谨记: 在使用等价无穷小时, 需要按照上述步骤进行编写, 不可以省去恒等变形步骤, 如果省去则可能导致错误. 如下:

本题有一个常见的错误做法, 就是直接把  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$  进行等价无穷小替换, 写为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}$ , 但是这是错误的, 如果这样写, 那么  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x^2 \sin \frac{1}{x}} \times \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}$ , 在  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x^2 \sin \frac{1}{x}}$  的分母中, 存在  $x = \frac{1}{n\pi}$  的间断点, 根据极限定义, 极限如果存在, 那么去心邻域一定要有定义, 那这样写就违背了极限的存在准则, 因此极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}$  不存在, 不可以这样写.

抽象函数使用等价无穷小求极限

抽象函数等价的条件是  $f(x) \rightarrow 0$  只有  $f(x) \neq 0$ , 才能将  $\sin(f(x)) \sim f(x)$ ,

题目 30. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$ , 则下列命题中正确的个数为

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$ .
- (3) 若  $f'(x_0) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)} = A$

解答. 这三个都是错的, 因为  $\varphi(x)$  在分母上, 都可能为 0. 比如函数  $\varphi(x) = x \times \sin \frac{1}{x}$ , 其极限为 0, 但是又存在  $x = \frac{1}{n\pi}$  的无定义点.

积分等价替换求极限

定义 2.4.4: 积分等价替换法则

设  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $x = 0$  的某邻域内连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ , 则  $\int_0^x f(t)dt \sim \int_0^x g(t)dt$ .

**定义 2.4.5: 变限积分求导公式**

设  $F(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt$ , 其中  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 可导函数  $\varphi_1(x)$  和  $\varphi_2(x)$  的值域在  $[a, b]$  上, 则在函数  $\varphi_1(x)$  和  $\varphi_2(x)$  的公共定义域上, 有

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt \right] = f[\varphi_2(x)]\varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)]\varphi_1'(x).$$

**题目 31.** 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2} dt}{x e^{x^2} + x^2}$  导数

**解答.** 看见变上限积分类型计算题应首先想到洛必达法则, 对原式进行洛必达法则得:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2} + x^2 e^{x^2}}{e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2} + 2x} \\ &= \frac{1 + x^2}{1 + 2x^2 + \frac{2x}{e^{x^2}}} \end{aligned}$$

对极限取大头可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x^2}{1 + 2x^2 + \frac{2x}{e^{x^2}}} = \frac{1}{2}$$

**题目 31 的注记.** 在极限中, 处理变上限积分的最好办法是洛必达。能洛则洛, 不能洛的话就换元之后再洛。

**题目 32.** 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}} dt}{bx - \sin x} = 1$ , 求  $a, b$ , 其中  $a, b$  为正数

**解答.**

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}}{b - \cos x} \\ &= \frac{1}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{b - \cos x} \end{aligned}$$

若分子趋近于零, 但是该等式的极限为 1, 那么该分母的极限一定趋近于 0, 那么  $b$  一定为 1

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} \\ a &= 2 \end{aligned}$$

综上所述  $a = 2, b = 1$

**题目 32 的注记.** 对于本题, 还可以可被积函数进行等价运算 2.4.4, 但是这不是通法, 因此应当对此类问题首先



进行洛必达. 以下为使用被积函数等价运算计算过程: 由于当  $t \rightarrow 0$  时,  $\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}} \sim \frac{t^2}{a^2}$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}} dt}{bx - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{a} dt}{bx - \sin x} \\ &= \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{bx - \sin x} \stackrel{b \neq 1}{=} \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{bx - x} = 0\end{aligned}$$

等式矛盾, 因此  $b = 1$ , 对上式进行泰勒展开得:

$$1 = \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x} = \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\frac{x^3}{6}} = \frac{2}{a}$$

综上所述  $a = 2, b = 1$

**题目 33.** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^2 - \sin^2 x}$

**解答.**

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(1+t^2) dt}{(x - \sin x)(x + \sin x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(1+t^2) dt}{2x \times \frac{1}{6}x^3} \\ &= \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = 1\end{aligned}$$

**题目 33 的注记.** 看见形如  $x^2 - \sin^2 x$  的形式, 就应当想到  $(x + \sin x)(x - \sin x)$  的展开, 然后可以通过泰勒展开进行计算

**题目 34.** 设函数  $f(x)$  连续, 且  $f(0) \neq 0$ , 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt}$

**解答.** 由于分母有两个变量, 因此不好进行洛必达, 那么此时就要对分母进行换元, 换元过程如下: 令  $(x-t) = u$ , 对等式两边求微分得:  $d(-t) = du$ .

首先, 对分子展开, 对分母换元得:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt}{x \int_0^x f(t) dt}$$

对原式进行洛必达法则得

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x)}{\int_0^x f(t) dt + xf(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt + xf(x)}\end{aligned}$$

如果此时还要进行洛必达, 那么分母则会出现  $f'(x)$ , 那么最后是不可计算的, 因此此时应进行积分中值定理, 则  $\int_0^x f(t) dt = xf(\varepsilon) (\varepsilon \in (0, x))$ <sup>9</sup>

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(c)}{xf(c) + xf(x)} \\ &= \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

**题目 34 的注记.** 如果出现两个变量则换元之后再洛, 如果实在洛不了的话, 再考虑使用积分中值定理。积分中值定理和拉格朗日中值定理中出现的  $\varepsilon$ , 最后一步想说明最终结果时, 严格来说需要夹逼准则。(卷面上可以不体现出来, 但脑子里必须把这些事情想明白)

本题也可以积分替换进行计算, 但是不推荐, 写法如下:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt}{x \int_0^x f(t) dt} \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t) dt}{x \int_0^x f(t) dt} \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(0)}{2} x^2}{f(0) x^2} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

## 2.4.5 抓大头和抓小头

本质是同时处以最高阶/最低阶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n > m \\ \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n = m \\ \infty, & \text{当 } n < m \end{cases}$$

还有一个重要的等价  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \sim e^{-1} \times n$  该等价由斯特林公式  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$  而来, 又可写

为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = e^{-1}$

<sup>9</sup>这个地方一定要可以夹起来, 如果夹起来的极限不一样, 那么则不可以使用积分中值定理

题目 35. 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + x^2 + 3x + 10}{3x^3 + 2x + 7}$

解答. 对等式上下同除以  $x^3$  得  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{10}{x^3}}{3 + \frac{2}{x^2} + \frac{7}{x^3}} = \frac{4}{3}$

题目 36. 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2x^2 + 3x^4}{2x + 4x^3 + x^5}$

解答. 上下同除以  $x$  得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2x + 3x^3}{2 + 4x^2 + x^4} = \frac{1}{2}$

## 2.4.6 利用函数和函数极限的性质求极限

夹逼准则

定义 2.4.6: 函数极限夹逼准则

如果

- 当  $x \in U^\circ(x_0, r)$  (或  $|x| > M$ ) 时

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

- $\lim_{x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)} g(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)} h(x) = A$

那么  $\lim_{x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)} f(x)$  存在, 且等于  $A$ .

- 夹逼准则处主要通过放缩来求极限
- 常用的结论有: 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}$ , 其中  $a_i > 0 (i = 1, 2, 3, \dots, m)$ , 令  $\max a_i = a$ , 则  $\sqrt[n]{a^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{ma^n}$ ,  
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m \cdot a^n} = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = a$

单调有界准则

定义 2.4.7: 函数的单调有界准则

设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某个左邻域内单调并且有界, 则  $f(x)$  在  $x_0$  的左极限  $f(x_0^-)$  一定存在

幂指数函数求极限

一般主要是进行恒等变换, 即  $a^b = e^{b \ln a}$ . 如果两个函数的指数相同, 则可以提后项/前项除此之外, 还有一个常用的结论: 对于  $\forall a, b > 0$  均有:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^b = 0$ , 证明如下:

证明.

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \cdot \ln^b x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^b x}{x^{-a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b \ln^{b-1} x \cdot \frac{1}{x}}{-ax^{-a-1}}\end{aligned}$$

每洛一次, 分子次数-1. 分母次数不变, 一直洛下去, 分子次数要么洛到 0 (即  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{c}{x^{-a}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} cx^a = 0$ ), 要么洛成负数 ( $\lim_{x \rightarrow 0^+} c \frac{\ln^m x}{x^{-a}} = 0$ ), 最终结果都是 0  $\square$

对数函数性质求极限

### 2.4.7 拉格朗日中值定理求极限

如果两个函数的形式一样, 那么可以使用拉格朗日中值定理进行计算, 但是处理之后的  $\varepsilon$  需要可以使用夹逼准则.

**题目 37.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left( a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} \right) (a > 0)$

**解答.** 该题存在相近的函数形式, 使用拉格朗日中值定理进行解析  $a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} = a^{\frac{1}{\varepsilon}} \ln a \frac{1}{\varepsilon^2}, \varepsilon \in (x, x+1)$

$$\text{原式} = x^2 a^{\frac{1}{\varepsilon}} \ln a \frac{1}{\varepsilon^2}$$

当  $\varepsilon \rightarrow x+1$  时, 原式的极限为  $x^2 a^{\frac{1}{x+1}} \ln a \frac{1}{(x+1)^2} = \ln a$

当  $\varepsilon \rightarrow x$  时, 原式的极限为  $x^2 a^{\frac{1}{x}} \ln a \frac{1}{x^2} = \ln a$

综上, 函数极限为  $\ln a$

**题目 38.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right) (a > 0)$

**解答.** 该题存在相近的函数形式, 使用拉格朗日中值定理进行解析  $\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} = -\frac{a}{\varepsilon^2 + a^2}$

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( -\frac{a}{\varepsilon^2 + a^2} \right), (\varepsilon \in (n, n+1))$$

当  $\varepsilon \rightarrow n+1$  时, 原式的极限为  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( -\frac{a}{(n+1)^2 + a^2} \right) = -a$

当  $\varepsilon \rightarrow n$  时, 原式的极限为  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( -\frac{a}{n^2 + a^2} \right) = -a$

综上, 函数极限为  $-a$

**题目 39.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - \cos x}{x^2}$

解答. 对分子进行泰勒展开得:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{1 - \frac{4}{2}x^2 - 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} \\ &= -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

**题目 39 的注记.** 本题看似可以存在两个形式相同的函数形式, 但是如果对其使用拉格朗日中值定理解析, 则  $\sin \varepsilon, \varepsilon \in (x, 2x)$ , 此时  $\sin \varepsilon$  的极限不可以通过夹逼准则得到, 因此不可以使用这种方法, 只可以使用泰勒展开.

### 2.4.8 七种未定式的计算

主要有以下类型  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty, \infty - \infty, \infty^0, 1^\infty$

形如  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty$

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty$  可以直接计算或者简单转换可以直接计算.

形如  $\infty - \infty$

$\infty - \infty$  可以通过取倒数或者取对数进行计算

**题目 40.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 (e^{\frac{1}{x}} - 1) - x]$

解答. 原式  $\stackrel{\text{令 } u = \frac{1}{x}}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1 - u}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1}{2u} = \frac{1}{2}$

形如  $\infty^0, 0^0$

$\infty^0$  与  $0^0$  通常使用  $u^v = e^{v \ln u}$  来计算

**题目 41.** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ , 其中  $n$  是给定的自然数.

解答.

$$\begin{aligned}\text{原式} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)}{x}} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x + 2e^{2x} + \dots + ne^{nx}}{n}}{\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2e^{2x} + \dots + ne^{nx}}{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}} \\ &= \frac{1 + 2 + \dots + n}{1 + 1 + \dots + 1} \\ &= \frac{n+1}{2} \\ \text{原式} &= e^{\frac{n+1}{2}}\end{aligned}$$

形如  $1^\infty$

$1^\infty$  通常使用  $\lim u^v = e^{\lim(u-1)v}$  来计算, 需要知道的是  $1^\infty$  可以化为第二个重要极限.

题目 42.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^2 + x}{(x-a)(x-b)} \right]^x$

解答.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x}{x-a} \right)^x \times \left( \frac{x+1}{x-b} \right)^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{a}{x-a} \right)^x \times \left( 1 + \frac{1-b}{x+b} \right)^x \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax}{x-a}} \times e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-b)x}{x+b}} \\ &= e^{a+1-b} \end{aligned}$$

题目 43.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{\sqrt{n+a} + \sqrt{n+b} + \sqrt{n+c}}{3\sqrt{n}} \right]^n$ , 其中  $a > 0, b > 0, c > 0$ .

解答.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{\sqrt{n+a} + \sqrt{n+b} + \sqrt{n+c}}{3\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \sqrt{1+\frac{a}{n}} + \ln \sqrt{1+\frac{b}{n}} + \ln \sqrt{1+\frac{c}{n}}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx} + \sqrt{1+cx} + 3 - 3}{3}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx} + \sqrt{1+cx} - 3}{3x}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a}{2\sqrt{1+ax}} + \frac{b}{2\sqrt{1+bx}} + \frac{c}{2\sqrt{1+cx}}}{3} \\ &= \frac{a+b+c}{6} \end{aligned}$$

综上所述, 答案为  $e^{\frac{a+b+c}{6}}$

题目 44. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^2 \ln(1+x)}$

解答.

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x(1 - (\frac{\sin x}{x})^x)}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{x \ln \sin x}{x}}}{x^3} \quad (\text{当 } x \text{ 趋于 } 0 \text{ 的时候 } x^x, \text{ 趋于 } 1) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2} \quad (\text{此处不可以用等价无穷小}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \frac{\sin x - x}{x})}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^3} \\
 &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

综上所述, 答案为  $\frac{1}{6}$

**题目 45.** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{n}{x}}$ , 其中  $a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$

解答.

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x - n}{n} \right)^{\frac{n}{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x - n} \cdot \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x - n}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x - n}{x} = \ln(a_1 a_2 \cdots a_n) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x - n}{n} \right)^{\frac{n}{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x - n}} = e
 \end{aligned}$$

综上所述, 答案为  $a_1 a_2 a_3 a_4 \cdots a_n$

## 2.5 数列极限的运算

### 2.5.1 数列极限的运算法则

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ , 则

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = ab$
- 若  $b \neq 0, y_n \neq 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$

上述运算规则可推广至有限个数列的情况

## 2.5.2 夹逼准则

### 定理 2.5.1: 数列极限夹逼准则

如果数列  $\{x_n\}, \{y_n\}$  及  $\{z_n\}$  满足下列条件:

- 从某项开始, 即  $\exists n_0 \in N_+$  (即  $n \rightarrow \infty$ ), 当  $n > n_0$  时, 有

$$y_n \leq x_n \leq z_n$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$

那么数列  $\{x_n\}$  的极限存在, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

以下为放缩的常用方法

- 利用简单放大与缩小

$$\begin{cases} n \times u_{\min} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \times u_{\max}, \\ \text{当 } u_i \geq 0 \text{ 时, } 1 \times u_{\max} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \times u_{\max}. \end{cases}$$

- 利用如下重要不等式

1. 设  $a, b$  为实数, 则  $|a + b| \leq |a| + |b|$ ;  $||a| - |b|| \leq |a - b|$ <sup>10</sup>

2.  $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} (a, b > 0)$ <sup>11</sup>

3.  $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}} (a, b, c > 0)$

4. 设  $a \geq b \geq 0$ , 则  $\begin{cases} \text{当 } n \geq 0 \text{ 时, } a^n \geq b^n, \\ \text{当 } n \leq 0 \text{ 时, } a^n \leq b^n. \end{cases}$

5. 若  $0 < a < x < b, 0 < c < y < d$ , 则  $\frac{c}{b} < \frac{y}{x} < \frac{d}{a}$ .<sup>12</sup>

6.  $\sin x < x < \tan x \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$

7.  $\sin x < x (x > 0)$

8. 当  $0 < x < \frac{\pi}{4}$  时,  $x < \tan x < \frac{4}{\pi}x$

9. 当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时,  $\sin x > \frac{2}{\pi}x$

10.  $\arctan x \leq x \leq \arcsin x (0 \leq x \leq 1)$

11.  $e^x \geq x + 1 (\forall x)$ <sup>13</sup>

12.  $x - 1 \geq \ln x (x > 0)$ <sup>14</sup>

<sup>10</sup>可以将上述式子推广为  $n$  个实数的情况:  $|a_1 \pm a_2 \pm \cdots \pm a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$ .

<sup>11</sup>还有一个不等式是  $|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}$

<sup>12</sup>当  $n\pi < x < (n+1)\pi, 2n < S(x) < 2(n+1)$  时,  $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$ .

<sup>13</sup>当  $x_{n+1} = e^{x_n} - 1$  时, 由  $e^{x_n} - 1 \geq x_n$ , 得  $x_{n+1} \geq x_n$ , 即  $\{x_n\}$  单调不减

<sup>14</sup>当  $x_n > 0$  时, 若  $x_{n+1} = \ln x_n + 1$ , 由  $\ln x_n + 1 \leq x_n$ , 得  $x_{n+1} \leq x_n$ , 即  $\{x_n\}$  单调不减



13.  $\frac{1}{1+x} < \ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x} (x > 0)$  或  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x (x > 0)$ <sup>15</sup>

14. 在处理如下数列时, 可以在前面加一个减项, 如  $(1 + \frac{1}{2^2})(1 + \frac{1}{2^{2^2}}) \dots (1 + \frac{1}{2^{2^n}})$ , 可化为  $(1 - \frac{1}{4})(1 + \frac{1}{2^2})(1 + \frac{1}{2^{2^2}}) \dots (1 + \frac{1}{2^{2^n}}) * \frac{4}{3}$

15. 关于重要数列  $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$  的重要结论:

— 单调递增

—  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

- 利用闭区间上连续函数必有最大值与最小值
- 利用压缩映射原理

题目 46.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$

证明.

□

题目 47. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}$ , 其中  $a_i (i = 1, 2, \dots, m)$  都是非负数

证明.

□

### 2.5.3 单调有界准则

定理 2.5.2: 数列的单调有界准则

单调有界数列必有极限, 即若数列  $\{x_n\}$  单调增加 (减少) 且有上界 (下界), 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在

证明数列单调性的方法:

1.  $x_{n+1} - x_n > 0$  或  $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$  (同号)

2. 利用数学归纳法

3. 利用重要不等式


4.  $x_n - x_{n-1}$  与  $x_{n-1} - x_{n-2}$  同号, 则  $x_n$  单调

5. 利用结论: 对  $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots), x_n \in \text{区间 } I$


• 若  $f'(x) > 0, x \in \text{区间 } I$ , 则数列  $\{x_n\}$  单调, 且  $\begin{cases} \text{当 } x_2 > x_1 \text{ 时, 数列 } \{x_n\} \text{ 单调增加} \\ \text{当 } x_2 < x_1 \text{ 时, 数列 } \{x_n\} \text{ 单调减少} \end{cases}$

证明. 若  $f(x)$  单调增加, 且  $x_1 < x_2$ , 则数列单增的图像是这样的:

<sup>15</sup> 令  $f(x) = \ln x$ , 并在区间  $[x, x+1]$  上对其使用拉格朗日中值定理, 有  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln(1+x) - \ln x = \frac{1}{\xi}$  其中  $0 < x < \xi < x+1$ , 因此对任意的  $x > 0$ , 有  $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$




若  $f(x)$  单调增加, 且  $x_1 > x_2$ , 则数列单增的图像是这样的



□

- 若  $f'(x) < 0, x \in$  区间  $I$ , 则数列  $\{x_n\}$  不单调

证明. 若  $f(x)$  单调递减, 且  $x_1 < x_2$  时, 则图像为



□

## 第三章 连续

### 3.1 函数的连续性

#### 定义 3.1.1: 连续点的定义

设函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  的某一邻域内有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

那就称为函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  连续.

#### 注 3.1.1

- 当极限需要讨论时:  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow f(x)$  在点  $x_0$  处连续
- 连续性的四则运算: 设  $f(x)$  与  $g(x)$  都在点  $x = x_0$  处连续, 则  $f(x) \pm g(x)$  与  $f(x)g(x)$  在点  $x = x_0$  处连续, 当  $g(x_0) \neq 0$  时,  $f(x)/g(x)$  在点  $x = x_0$  处也连续。
- 复合函数的连续性: 设  $u = \varphi(x)$  在点  $x = x_0$  处连续,  $y = f(u)$  在点  $u = u_0$  处连续, 且  $u_0 = \varphi(x_0)$ , 则  $f[\varphi(x)]$  在点  $x = x_0$  处连续。
- 反函数的连续性: 设  $y = f(x)$  在区间  $I_x$  上单调且连续, 则反函数  $x = \varphi(y)$  在对应的区间  $I_y = \{y | y = f(x), x \in I_x\}$  上连续且有相同的单调性
- $f(x)$  在点  $x = x_0$  处连续, 且  $f(x_0) > 0$  (或  $f(x_0) < 0$ ), 则存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时  $f(x) > 0$  (或  $f(x) < 0$ )。

### 3.2 函数的间断点

#### 3.2.1 间断点的相关概念

- 可去间断点: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$  ( $f(x_0)$  甚至可以无定义), 则这类间断点称为可去间断点




图 3.1: 可去间断点函数图像

- 跳跃间断点<sup>1</sup>: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  都存在, 但  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ , 则这类间断点称为跳跃间断点




图 3.2: 跳跃间断点函数图像

- 无穷间断点: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ , 则这类间断点称为无穷间断点, 如  $y = \tan x$




图 3.3: 无穷间断点函数  $\tan$  图像

- 振荡间断点: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  振荡不存在, 则这类间断点称为振荡间断点

---

<sup>1</sup>一点极限存在  $f(x)$  在  $x_0$  连续




图 3.4: 振荡间断点函数  $\sin \frac{1}{x}$  图像

### 3.2.2 间断点的分类

通过求函数在该点的左右极限来判断

- 第一类间断点:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  和  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  均存在
  - 可去<sup>2</sup>:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$
  - 跳跃:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
- 第二类间断点: 除第一类以外的间断点  $\implies \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  和  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  均至少一个不存在

---

<sup>2</sup>可去间断点上极限存在但是导数不存在