

PRUEBA PARCIAL – NOVIEMBRE 2019

102712 Señales y Sistemas Discretos

Profesores: Rafael Gallego Terris

Instrucciones: 120 minutos. Se puede utilizar calculadora y las tablas de TF y DFT del Campus Virtual si se tienen imprimidas. Las respuestas correctas suman 1 y las respuestas incorrectas restan 1/3. La muestra correspondiente al índice $n = 0$, o al índice $k = 0$ se indica subrayada.

Permutación 1

Respuestas (marca con una “x” la letra correspondiente para cada pregunta de la tabla)

Pregunta 1	a) <input checked="" type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 2	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta 3	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta 4	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input checked="" type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 5	a) <input checked="" type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 6	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input checked="" type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 7	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 8	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 9	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta 10	a) <input checked="" type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 11	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta 12	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 13	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta 14	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 15	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input checked="" type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 16	a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta 17	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 18	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 19	a) <input type="checkbox"/>	b) <input checked="" type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>
Pregunta 20	a) <input checked="" type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>	d) <input type="checkbox"/>

Pregunta 1

Siendo $x[n]$ la entrada e $y[n]$ la salida del sistema, ¿cuál de las relaciones siguientes define un sistema lineal, invariante, causal y estable?

- a) $y[n] = x[n] \cos \omega_0 + x[n - 2] \sin \omega_0$
- b) $y[n] = ax[n] + b$
- c) $y[n] = \sum_{k=n-N}^{n+N} x[k]$
- d) $y[n] = n \cdot x[n]$

Solución: a) es la única que cumple con los requisitos, pues b) es no lineal (debido a la constante b), c) no es causal (porque depende de valores futuros de la entrada) y d) es variante (debido a que la respuesta del sistema depende del origen de tiempo por el factor multiplicativo 'n')

Pregunta 2

Considere el sistema LTI con respuesta impulsional

$$h[n] = \left(\frac{j}{2}\right)^n u[n - 1]$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**?

- a) Es un sistema inestable
- b) Es un sistema no causal
- c) Es un sistema variante
- d) Todas las anteriores son falsas

Solución: d) es la respuesta correcta, pues se trata de un sistema estable, casual, lineal e invariante.

Pregunta 3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **incorrecta**?

- a) Una secuencia se denomina de duración finita cuando el número de elementos no nulos es finito.
- b) Se puede demostrar que la parte par de una secuencia es una secuencia par y que la parte impar de una secuencia es una secuencia impar
- c) A una transformación mediante escalado 'temporal' de una secuencia $x[n] \rightarrow x[kn]$ tal que $k > 1$ se le conoce con el nombre de diezmado
- d) Un proceso de interpolación se realiza mediante un submuestreo de la secuencia.

Solución: d) es falsa por el proceso de interpolación se realiza mediante un sobremuestreo de la secuencia.

Pregunta 4

Dada la siguiente respuesta impulsional de un sistema:

$$h[n] = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]$$

Obtenga el valor de la salida $y[10]$ cuando la entrada es:

$$x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 100 \\ 0, & \text{para otro } n \end{cases}$$

Respuesta:

- a) 10
- b) 40
- c) 8
- d) Ninguna de las anteriores

Solución: se trata de un sistema que promedia las últimas 5 muestras de la entrada, por lo que $y[10] = 0.2 (y[6] + y[7] + y[8] + y[9] + y[10]) = 0.2 (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = 0.2 (40) = 8$.

Pregunta 5

Considere que la siguiente señal analógica, con $f_0 = 1200$ Hz,

$$x(t) = \exp(j2\pi f_0 t)$$

se muestrea a una frecuencia f_s . ¿Para cuál de los siguientes valores de f_s la señal digital resultante es un tono a frecuencia $f = 0.5$?

- a) $f_s = 2.400$ Hz
- b) $f_s = 2\pi \cdot 2.400$ Hz
- c) $f_s = 600$ Hz
- d) $f_s = 2\pi \cdot 600$ Hz

Solución: a) es la respuesta correcta porque $x[n] = x(t = nT) = \exp(j2\pi f_0 nT) = \exp(j2\pi n \frac{f_0}{f_s})$ es igual a $x[n] = \exp(j2\pi n(0.5))$ cuando $f_s = 2.400$ Hz.

Pregunta 6

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**?

- a) La energía de una señal discreta se define como $E_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|$
- b) La potencia media de una señal discreta se define como $P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$
- c) Una señal tal que $x[n] = x[n + P] \forall n$ con P entero positivo es de energía infinita, pero de potencia finita
- d) Tanto la señal escalón unidad como la señal rampa unidad son de energía infinita, pero de potencia media finitas

Solución: a) es falsa porque $E_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$; b) es falsa porque $P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$; d) es falsa porque la señal rampa unidad es de energía y potencia media infinitas

Pregunta 7

Tenemos una secuencia $x[n]$ definida como

$$x[n] = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi}{6}n\right)}{\pi n} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Determine la energía de la secuencia $x[n]$:

- a) $E_x = 2/9$
- b) $E_x = 1/27$
- c) $E_x = 2/3$
- d) $E_x = 4\pi/9$

Solución: b) es la respuesta correcta porque, teniendo que la transformada de $\frac{\sin(\frac{\pi}{a}n)}{\pi n}$ es igual a $\Pi\left(\frac{\omega}{2\pi/a}\right)$ y que el $\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$ se puede descomponer en $\frac{e^{j\frac{\pi}{2}} - e^{-j\frac{\pi}{2}}}{2j}$ (lo que produce dos replicas del pulso desplazadas en frecuencia), si aplicamos la igualdad de Parseval obtenemos que $E_x = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{2\pi}{6} + \frac{2\pi}{6}\right) = \frac{1}{27}$.

Pregunta 8

¿Cuánto vale el periodo de la siguiente señal?

$$x[n] = \cos\left(\pi \frac{3}{20}n + \frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\pi \frac{3}{10}n + \frac{\pi}{5}\right)$$

- a) 20 muestras
- b) 40 muestras
- c) 60 muestras
- d) 80 muestras

Solución: b) es la respuesta correcta porque siendo el segundo coseno de frecuencia doble que el primero, es el periodo del primer coseno es que establece la periodicidad de la suma; este último se obtiene comparando cuando $\cos\left(\pi \frac{3}{20}n + \frac{\pi}{5}\right)$ es igual a $\cos\left(\pi \frac{3}{20}(n + P) + \frac{\pi}{5}\right)$ y ello ocurre cuando $\pi \frac{3}{20}P = 2\pi k$. El valor mínimo de k que producto un P entero es $k = 3$, y para ese valor el periodo es $P = \frac{2\pi 3}{\pi} \cdot \frac{20}{3} = 40$ muestras.

Pregunta 9

Dada la siguiente salida de un sistema en relación con su entrada:

$$y[n] = x[n] + 3u[n + 2]$$


Podemos afirmar que:

- a) El sistema es invariante
- b) El sistema es lineal
- c) El sistema necesita memoria
- d) Ninguna de las anteriores

Solución: d) es la respuesta correcta, pues el sistema es variante y no lineal (debido a la señal escalón) y no necesita memoria (pues la salida solo depende del instante actual de la entrada)

Pregunta 10

Calcule la señal cuya transformada de Fourier es:



- a) $x[n] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n} - \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n}$
- b) $x[n] = \frac{\sin(\frac{3}{8}n)}{\pi n} - \frac{\sin(\frac{1}{8}n)}{3\pi n}$
- c) $x[n] = \frac{\sin(\frac{3}{8}n)}{\pi n} - \frac{2\sin(\frac{1}{8}n)}{3\pi n}$

$$d) \quad x[n] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n} + \frac{2\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n}$$

Solución: a) es cierta porque se la transformada se puede interpretar como la diferencia de un filtro paso bajo con pulsación de corte $\omega_c = 2\pi\frac{3}{8}$ y amplitud 1 y un filtro paso bajo de pulsación de corte $\omega_c = 2\pi\frac{1}{8}$ y amplitud $-1/3$, por lo que $x[n] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{8}n)}{\pi n} - \frac{1}{3} \frac{\sin(\frac{2\pi}{8}n)}{\pi n} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n} - \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n}$. También podría calcularse como la suma de tres filtros paso bajo, dos con pulsación de corte $\omega_c = 2\pi\frac{1}{8}$ y amplitud 1 desplazados a las pulsaciones $\omega = -\frac{\pi}{2}$ y $\omega = +\frac{\pi}{2}$, y un filtro paso bajo de corte $\omega_c = 2\pi\frac{1}{8}$ y amplitud $2/3$, que daría el mismo resultado:

$$x[n] = \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} [e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n}] + \frac{2}{3} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} [2 \cos \frac{\pi}{2}n] + \frac{2}{3} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n} - \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n} + \frac{2}{3} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n} - \frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{3\pi n}, \text{ donde hemos usado que } \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)].$$

Pregunta 11

Un sistema se define mediante la siguiente ecuación de diferencias con coeficientes constantes:

$$y[n] = x[n] + x[n-2] + y[n-1]$$

¿Cuál es su respuesta frecuencial?

a) $H(e^{j\omega}) = \frac{1+e^{-j2\omega}}{1+e^{-j\omega}}$

b) $H(e^{j\omega}) = je^{-\frac{j\omega}{2}} \tan \frac{\omega}{2}$

c) $H(e^{j\omega}) = \frac{1-e^{-j2\omega}}{1+e^{-j\omega}}$

d) $H(e^{j\omega}) = -je^{-\frac{j\omega}{2}} \cdot \frac{\cos \omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$

Solución: d) es la respuesta correcta teniendo en cuenta que $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) + X(e^{j\omega})e^{-j2\omega} + Y(e^{j\omega})e^{-j\omega}$, por lo que la respuesta frecuencia es $H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1+e^{-j2\omega}}{1-e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\omega}(e^{j\omega}+e^{-j\omega})}{e^{-\frac{j\omega}{2}}(e^{\frac{j\omega}{2}}-e^{-\frac{j\omega}{2}})} = \frac{e^{-j\omega}}{e^{-\frac{j\omega}{2}}} \cdot \frac{2 \cos \omega}{2j \sin \frac{\omega}{2}} = -je^{-\frac{j\omega}{2}} \cdot \frac{\cos \omega}{\sin \frac{\omega}{2}}.$

Pregunta 12

Dada la siguiente secuencia:

$$x[n] = \begin{cases} 2, & -2 \leq n \leq 0 \\ 1, & 0 < n \leq 2 \\ 0, & \text{para otro } n \end{cases}$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**?

a) La parte par de la secuencia es $\text{Par}\{x[n]\} = [\dots, 0, 3, 3, 4, 3, 3, 0, \dots]$

b) La parte impar de la secuencia es $\text{Impar}\{x[n]\} = [\dots, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \dots]$

c) La parte par de la secuencia es $\text{Par}\{x[n]\} = [\dots, 0, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 0, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 0, \dots]$

d) Ninguna de las anteriores

Solución: *b)* es la única cierta, pues $\text{Impar}\{x[n]\} = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n]) =$
 $\frac{1}{2}([\dots, 0, 2, 2, \underline{2}, 1, 1, 0, \dots] - [\dots, 0, 1, 1, \underline{2}, 2, 2, 0, \dots]) = \frac{1}{2}([\dots, 0, 1, 1, \underline{0}, -1, -1, 0, \dots]) =$
 $[\dots, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \underline{0}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \dots]$.

Pregunta 13

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**?

- a) La señal signo puede expresarse como $\text{sign}[n] = u[-n] - u[n]$
- b) La señal pulso puede expresarse como $p_L[n] = u[n] - u[n + L]$
- c) Una señal exponencial compleja con módulo unitario puede expresarse como $x[n] = e^{j(\omega n + \theta)} = \cos(\omega n + \theta) - j \sin(\omega n + \theta)$
- d) Una senoide compleja $x[n] = e^{j(\omega_0 n + \theta)}$ es periódica con período P solo si $\omega_0 P$ es múltiple de 2π .

Solución: *a)* es falsa porque $\text{sign}[n] = u[n] - u[-n]$; *b)* es falsa porque $p_L[n] = u[n] - u[n - L]$; *c)* es falsa porque $x[n] = e^{j(\omega n + \theta)} = \cos(\omega n + \theta) + j \sin(\omega n + \theta)$.

Pregunta 14

Considere los siguientes dos sistemas:

$$y_1[n] = \sum_{k=-n-n_0}^{n_0} x[k]$$

$$y_2[n] = \sum_{k=-n-n_0}^{-n+n_0} x[k]$$

donde n_0 es un número entero. ¿Qué respuesta es **correcta**?

- a) Solo el primero es estable
- b) Solo el segundo es estable
- c) Ambos son estables
- d) Ninguno es estable

Solución: *b)* es la respuesta correcta pues mientras que en el primer caso podemos llegar un número infinito de muestras y dar como resultado una salida no acotada (al estilo de un acumulador), en el segundo caso solo sumamos $2n_0 + 1$ muestras, por lo que si la entrada $x[n]$ está acotada, la salida $y_2[n]$ también lo estará (al estilo de un promediador)

Pregunta 15

Calcule la salida $y[n]$ del siguiente sistema LTI definido por $h[n]$ teniendo en cuenta que a su entrada tenemos $x[n]$:

$$x[n] = \{\underline{2}, -1, -2, 5\}$$

$$h[n] = \{\underline{5}, 4, 3, 2, 1\}$$


El resultado es:

- a) $y[n] = \{\underline{10}, -4, -6, 10, 0, 0, 0, 0\}$
- b) $y[n] = \{\underline{2}, 3, 2, 6, 10, 6, 10, 25\}$
- c) $y[n] = \{\underline{10}, 3, -8, 18, 14, 10, 8, 5\}$
- d) $y[n] = \{\underline{10}, -4, -6, 10, 10, -4, -6, 10\}$

Solución: la respuesta correcta es c), pues podemos ver que es la única secuencia que cumple con la ecuación de convolución $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$, donde $y[0] = \sum_k x[k]h[-k] = 10$ y $y[1] = \sum_k x[k]h[1-k] = 3$ y así sucesivamente.

Pregunta 16

Sea el sistema descrito por este diagrama de bloques:



La relación entre entrada y salida viene dada por:

- a) $y[n] = -0.3y[n-1] + 0.7y[n-2] + 0.2x[n-1] - 0.4x[n-2]$
- b) $y[n] = -0.3y[n-1] + 0.7y[n-2] + x[n] + 0.2x[n-1] - 0.4x[n-2]$
- c) $y[n] = -0.3y[n-1] + 0.7y[n-3] + 0.2x[n-1] + 0.4x[n-3]$
- d) $y[n] = 0.2y[n-1] - 0.4y[n-3] + x[n] - 0.3x[n-1] + 0.7x[n-3]$

Solución: d) es la respuesta correcta pues si separamos el sistema en dos, los multiplicadores 0.2 y -0.4 aplican a la señal $y[n]$ y los multiplicadores -0.3 y 0.7 aplican a la señal $x[n]$; además, hay que tener en cuenta que el retardo de la segunda rama acumula tres muestras (una del primer retardador y dos del segundo).

Pregunta 17

Una señal temporal con frecuencia máxima 4 kHz se muestra con una pulsación de 20.000π radianes por segundo, con la que se obtiene una secuencia $x[n]$. ¿Cuál será la resolución en frecuencia de su DFT realizada con $N = 10$ para una señal obtenida como $x[n]p_N[n]$?

- a) 20.000 rad/s
- b) 1 kHz
- c) 5π rad/s
- d) 400 Hz

Solución: teniendo en cuenta que la frecuencia de muestreo es de $f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{20.000\pi}{2\pi} = 10$ kHz, la resolución de la DFT es $f_s/N = 1$ kHz.

Pregunta 18

Dada una secuencia definida $x[n] = 2\delta[n-1] + 2\delta[n-7] + \frac{1}{2}j\delta[n-1] - \frac{1}{2}j\delta[n-7]$, ¿cuál de las siguientes expresiones define la DFT de $x[n]$ con $N=8$ puntos?

- a) $X[k] = 4 \cos \frac{\pi k}{8} + \cos \frac{7\pi k}{8}$

- b) $X[k] = 4 \cos \frac{\pi k}{4} + \sin \frac{\pi k}{4}$
 c) $X[k] = 2 \cos \frac{\pi k}{4} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi k}{4}$
 d) $X[k] = 2 \cos \frac{\pi k}{8} + \frac{1}{2} \sin \frac{7\pi k}{8}$

Solución: b) es la respuesta correcta pues, teniendo en cuenta que $x[n]$ solo está tiene valores no nulos en $n = 1$ y $n = 7$, la DFT es $X[k] = x[1]e^{-j\frac{2\pi}{8}k1} + x[7]e^{-j\frac{2\pi}{8}k7} = (2 + \frac{j}{2})e^{-j\frac{\pi}{4}k} + (2 - \frac{j}{2})e^{+j\frac{\pi}{4}k} = 2(e^{+j\frac{\pi}{4}k} + e^{-j\frac{\pi}{4}k}) - \frac{j}{2}(e^{+j\frac{\pi}{4}k} - e^{-j\frac{\pi}{4}k}) = 2(2\cos \frac{\pi}{4}k) - \frac{j}{2}(2j \sin \frac{\pi}{4}k) = 4 \cos \frac{\pi}{4}k + \sin \frac{\pi}{4}k$.

Pregunta 19

Sean las secuencias

$$x_1[n] = \{\underline{1}, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0\}$$

$$x_2[n] = \{\underline{0}, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1\}$$

donde la muestra subrayada corresponde a $n = 0$. Se define

$$y[n] = IDFT\{X_1[k] \cdot X_2[k]\}$$

donde $X_1[k]$ y $X_2[k]$ son las DFT de $N=9$ puntos correspondientes a $x_1[n]$ y $x_2[n]$, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes secuencias es realmente la secuencia $y[n]$?:

- a) $y[n] = \{\underline{2}, 4, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 3\}$
 b) $y[n] = \{\underline{2}, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 3\}$
 c) $y[n] = \{\underline{3}, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3\}$
 d) Ninguna de las anteriores

Solución: b) es la respuesta correcta

Pregunta 20

Calcule la convolución circular con $N = 7$ entre estas dos señales:

$$x[n] = \{\underline{1}, -1, 3, 5\}$$

$$y[n] = \{\underline{4}, 2, 0, -2, -4\}$$

La muestra correspondiente a $n = 0$ se indica subrayada.

El resultado es:

- a) $x[n] \otimes y[n] = \{\underline{-16}, -2, 10, 24, 8, -2, -22\}$
 b) $x[n] \otimes y[n] = \{\underline{-4}, 2, -10, -24, -8, -2, -20\}$
 c) $x[n] \otimes y[n] = \{\underline{4}, -2, 10, 24, 8, -2, -22\}$
 d) $x[n] \otimes y[n] = \{\underline{4}, -2, 10, 24, 4, -2, 10\}$

Solución: la respuesta correcta es a)

P.20

$$x[n] = \{1, -1, 3, 5\}$$

$$y[n] = \{4, 2, 0, -2, -4\}$$

calculer la convolution circulaire en $N=7$.

	1	-1	3	5	0	0	0	
$n=0$	4	0	0	-4	-2	0	2	$\rightarrow 4-20=-16$
$n=1$	2	4	0	0	-4	-2	0	$\rightarrow 2-4=-2$
$n=2$	0	2	4	0	0	-4	-2	$\rightarrow -2+12=10$
$n=3$	-2	0	2	4	0	0	-4	$\rightarrow -2+2+20=24$
$n=4$	-4	-2	0	2	4	0	0	$\rightarrow -4+2+10=8$
$n=5$	0	-4	-2	0	2	4	0	$\rightarrow 4-6=-2$
$n=6$	0	0	-4	-2	0	2	4	$\rightarrow -12-10=-22$

⊕

$$x[n] \otimes y[n] = \left\{ -16, 2, 10, 24, 8, -2, -22 \right\}$$

↑
 $n=7$