

Devoir maison 2

THÉORÈME 1:

Les conditions suivantes sont équivalentes pour une application $f \in \mathcal{C}^2(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^n)$

- ★ f est propre et df_x est inversible pour tout $x \in \mathbf{R}^n$
- ★★ f est un difféomorphisme \mathcal{C}^2 de \mathbf{R}^n dans lui même.

Démonstration. 1. On montre que ★★ implique ★. Comme f est un \mathcal{C}^2 difféomorphisme f^{-1} est en particulier continue, ainsi pour tout compact $K \subset \mathbf{R}^n$, $f^{-1}(K)$ est compact et donc f est propre. Fixons $x \in \mathbf{R}^n$, comme

$$f^{-1} \circ f = Id,$$

remarquons de plus que la formule de dérivation d'une fonction composée nous donne

$$d(f^{-1})(f(x))df_x = I_n,$$

et ainsi df_x est inversible.

Supposons à présent et pour le reste de l'exercice ★. Montrons dans un premier temps que f est surjective. Pour ce faire montrons que $f(\mathbf{R}^n)$ est un ouvert fermé de \mathbf{R}^n , comme cet ensemble est non vide et que \mathbf{R}^n est connexe on en déduira $f(\mathbf{R}^n) = \mathbf{R}^n$.

Soit $y_0 \in f(\mathbf{R}^n)$ et $x_0 \in \mathbf{R}^n$ satisfaisant $f(x_0) = y_0$. Par hypothèse nous savons que df_{x_0} est inversible, par le théorème d'inversion locale il existe donc deux voisinages ouverts $U \subset \mathbf{R}^n$ et $V \subset f(\mathbf{R}^n)$ contenant respectivement x_0 et y_0 tels que

$$f(U) = V \subset f(\mathbf{R}^n).$$

Nous venons de montrer que $f(\mathbf{R}^n)$ est ouvert. Montrons à présent qu'il est fermé.

Soit $(y_k)_{k \in \mathbf{N}}$ une suite dans $f(\mathbf{R}^n)$, convergente avec pour limite y , et soit $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$ une suite de \mathbf{R}^n satisfaisant

$$f(x_k) = y_k \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

L'ensemble

$$K := \{y_k, k \in \mathbf{N}\} \cup \{y\} \subset \mathbf{R}^n$$

est compact puisque fermé et borné par convergence de $(y_k)_k$ vers y . Comme nous avons supposé f propre $f^{-1}(K)$ est aussi compact et contient chacun des x_k pour $k \in \mathbf{N}$. Nous pouvons alors exhiber une sous suite convergente vers une limite que nous pouvons noter x

$$x_{k_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x.$$

Par continuité de f et comme la convergence de la suite y_k entraîne la convergence vers la même limite de la sous suite extraite y_{k_j} on obtient

$$\begin{aligned} y &= \lim_{j \rightarrow \infty} y_{k_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) \\ &= f(\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j}) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Ainsi $y \in f(\mathbf{R}^n)$ qui est donc fermé. Nous pouvons conclure.

2. Fixons $z \in \mathbf{R}^n$ et considérons l'ensemble

$$\begin{aligned} S_z &:= \{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) = f(z)\} \\ &= \{x \in \mathbf{R}^n \mid g(x) = 0\}, \end{aligned}$$

où g est la fonction auxiliaire donnée par

$$\begin{aligned} g : \mathbf{R}^n &\longmapsto \mathbf{R}^n \\ x &\longmapsto f(x) - f(z). \end{aligned}$$

Puisque f est propre on en déduit directement que g l'est aussi. Ainsi S_z est compact comme préimage du singleton $\{0\}$ lui même compact. De plus on voit facilement que f et g ont la même différentielle. Si par l'absurde S_z disposait d'un nombre infini de points il contiendrait un point d'accumulation, a disons. Comme dg_a est inversible nous pouvons appliquer à nouveau le théorème d'inversion locale pour trouver un voisinage ouvert U de a tel que

$$g : U \longrightarrow g(U)$$

soit une bijection. Soit $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$ une suite de S_z convergeant vers a , on peut trouver au moins un x_i de cette suite dans U mais alors

$$g(x_i) = 0 = g(a)$$

comme $x_i, a \in S_z$, ce qui contredit l'injectivité de la restriction de g à U . S_z est donc

nécessairement fini.

3. Posons

$$X(x) := (dg_x)^{-1}g(x),$$

et considérons l'équation différentielle donnée par

$$\mathcal{E}_z : \begin{cases} x'(t) = -X(x(t)) \\ x(0) = x_0 \in \mathbf{R}^n \end{cases}.$$

a. Comme f est \mathcal{C}^2 , g l'est aussi et X est \mathcal{C}^1 . Par le cours \mathcal{E}_z admet pour un $\alpha > 0$ une solution maximale x sur $[0, \alpha[$. Montrons que $\alpha = +\infty$ en utilisant le lemme des bouts. Soit $t \in [0, \alpha[$, on a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(g(x(t))) &= dg_{x(t)}x'(t), && \text{par la formule de dérivation composée} \\ &= -dg_{x(t)}(dg_{x(t)})^{-1}g(x(t)), && \text{comme } x \text{ est solution} \\ &= -g(x(t)). \end{aligned}$$

On en déduit que

$$g(x(t)) = e^{-t}g(x_0),$$

et donc comme $t > 0$ on obtient

$$\|g(x(t))\| \leq \|g(x_0)\|.$$

Comme g est propre $g^{-1}(\overline{B(0, \|g(x_0)\|)})$ est compact et comme

$$x(t) \in g^{-1}(\overline{B(0, \|g(x_0)\|)}), \quad \forall t \in [0, \alpha[,$$

par le lemme des bouts $\alpha = +\infty$.

b. Notons $S_z = \{z_1, \dots, z_m\}$. Remarquons dans un premier temps par définition de S_z que

$$X(z_i) = (dg_{z_i})^{-1}g(z_i) = 0, \quad \text{comme } g(z_i) = 0.$$

Par hypothèse df_{z_i} est inversible et nous avons montré que $dg_x = df_x \forall x \in \mathbf{R}^n$. On en déduit par le théorème d'inversion locale l'existence d'un $\delta_i > 0$ et d'un voisinage V de 0, tel que la restriction de g

$$g : B(z_i, \delta_i) \longrightarrow V$$

soit un difféomorphisme.

Soit $y \in V$ et $x_0 := g^{-1}(y)$. Considérons l'application

$$h : t \longmapsto g^{-1}(e^{-t}y),$$

montrons qu'il s'agit d'une solution, on pourra conclure par unicité. En effet $h(0) = g^{-1}(y) = x_0$ et

$$\begin{aligned} h'(t) &= d(g^{-1})_{e^{-t}y}(-e^{-t}y) \\ &= -d(g^{-1})_{g(h(t))}g(h(t)) \\ &= -(dg_{h(t)})^{-1}g(h(t)) \\ &= -X(h(t)). \end{aligned}$$

On obtient finalement par unicité de la solution que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} g^{-1}(e^{-t}y) = g^{-1}(0) = z_i.$$

Puisque le choix de $y \in V$ et donc de $x_0 \in B(z_i, \delta_i)$ était arbitraire on a le résultat voulu. \square

4. Une application a. Soit $g : \mathbf{R}^n \longmapsto \mathbf{R}^n$ continue avec

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|g(x)\| = +\infty. \quad (1)$$

Soit $K \subset \mathbf{R}^n$ un compact. Par Borel Lebesgue K est fermé et borné. Par continuité de g , $g^{-1}(K)$ est fermé. Par un argument ensembliste on a de plus

$$g(g^{-1}(K)) \subset K.$$

En particulier comme K est borné, par (1) $g^{-1}(K)$ doit aussi être borné. $g^{-1}(K)$ est donc fermé borné, par Borel Lebesgue c'est donc un compact et g est propre.

b. Par équivalence des normes sur \mathbf{R}^n nous pouvons considérer la norme 2 afin de faciliter les calculs. L'application

$$\begin{aligned} \|\cdot\|^2 : \mathbf{R}^n &\longmapsto \mathbf{R}^n \\ x &\longmapsto \langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{aligned}$$

est \mathcal{C}^∞ . L'application induite par $A \in GL_n(\mathbf{R})$ est clairement \mathcal{C}^∞ On en déduit que f est \mathcal{C}^∞ comme somme de compositions de fonctions \mathcal{C}^∞ .

f est en particulier continue, nous appliquons le critère précédent pour montrer qu'elle est propre. Dès que $\|x\| > \sqrt{2}$ on a

$$\varphi(\|x\|^2) = 0 \quad \text{donc,} \quad f(x) = x.$$

Ainsi

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|f(x)\| = +\infty,$$

et f est propre.

Soit $x \in \mathbf{R}^n$, on calcule à présent la différentielle df_x de f en x .