

Дискретная математика. Коллоквиум весна 2017.

Определения

Потом заполню

12 марта 2017 г.

1. Пространством элементарных исходов Ω («омега») называется конечное множество, содержащее все возможные результаты данного случайного эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один. Элементы этого множества называют элементарными исходами и обозначают буквой ω («омега») с индексами или без.

Событиями мы будем называть подмножества множества Ω . Говорят, что в результате эксперимента произошло событие $A \subseteq \Omega$, если в эксперименте произошел один из элементарных исходов, входящих в множество A .

Поставим каждому элементарному исходу $\omega_i \in \Omega$ в соответствие число $p(\omega_i) \in [0,1]$ так, что

$$\sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) = 1.$$

Назовем число $p(\omega_i)$ вероятностью элементарного исхода ω_i . Вероятностью события $A \subseteq \Omega$ называется число

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i),$$

равное сумме вероятностей элементарных исходов, входящих в множество A .

2. Случайный граф на n вершинах — элемент вероятностного пространства Ω , состоящего из всевозможных графов на n вершинах, каждому из которых приписана некоторая вероятность. В терминологии данного курса, граф не содержит петель и кратных ребер, поэтому всего графов на n вершинах $2^{\binom{n}{2}} \Rightarrow |\Omega| = 2^{\binom{n}{2}}$. Понятно, что случайным будет множество ребер графа.

Пример конструкции — каждому графу Ω присвоена одинаковая вероятность, т.е. все графы равно вероятны (т.е. для любого графа $G = (V, E) \in \Omega$, для каждой пары вершин $u, v \in V$, $Pr[(u, v) \in E] = \frac{1}{2}$).

Случайные графы используются для изучения каких-то свойств графов. Например, нестрогая постановка вопроса при работе со случайными графами: велика ли вероятность того, что граф обладает данным свойством? Более конкретный пример использования: доказательство того, что при достаточно большом числе вершин, случайный граф (в равновозможной модели) будет почти всегда связан. Формально: Ω_n — вероятностное пространство состоящее из графов на n вершинах, все графы равновозможны, событие A_n — случайный граф на n вершинах связан; доказать $\lim_{n \rightarrow \infty} Pr[A_n] = 1$.

3. Условная вероятность — вероятность наступления одного события при условии, что другое событие уже произошло.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(A|B)$ – условная вероятность итога А;

$P(A \cap B)$ – вероятность совместного появления событий А и В;

$P(B)$ – вероятность события В.

4. События А и В называются независимыми, если вероятность композиции событий $P(AB)$ равна произведению вероятностей $P(A) \cdot P(B)$

Свойства независимых событий:

- (а) Если $p(B) \neq 0$, то условная вероятности $p(A \cap B)$ равна вероятности события $p(A)$.
- (б) Если события А и В независимы, то события \bar{A} и В, А и \bar{B} и \bar{A} и \bar{B} также независимы.

5. Случайная величина – функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ из вероятностного пространства U .

Матожидание случайной величины – произведение значений случайной величины на соответствующие вероятности. Говоря простым языком, это среднееожидаемое значение при многократном повторении испытаний. Пусть случайная величина Х принимает значения $x_1, x_2 \dots x_n$ с вероятностями $p_1, p_2 \dots p_n$ соответственно. Тогда математическое ожидание данной случайной величины равно сумме произведений всех её значений на соответствующие вероятности:

$$\mathbb{E}(x) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

6. Множества называются *равномощными*, если между ними существует *биекция*, или взаимно-однозначное соответствие. Равномощность множеств обозначают значком \sim .

Свойства равномощности:

- (а) *Симметричность*: $A \sim B \Rightarrow B \sim A$.
- (б) *Рефлексивность*: $\forall A : A \sim A$
- (с) *Транзитивность*: $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$

7. Бесконечное множество называется *счетным*, если оно равномощно множеству \mathbb{N} .

Примеры:

- (а) Натуральные числа
- (б) Целые числа
- (с) Рациональные числа

Примером несчетных множеств могут являться следующие множества:

- (а) Вещественные числа
- (б) Комплексные числа

8. Счетные множества обладают некоторыми свойствами:

- (а) Объединение счетных множеств счетно

- (b) Всякое подмножество счетного множества конечно или счетно
- (c) Всякое бесконечное множество содержит счетное подмножество
- (d) Множество \mathbb{Q} рациональных чисел счетно
- (e) Конечное либо счетное объединение конечных либо счетных множеств конечно либо счетно.
- (f) Декартово произведение счетных множеств $A \times B$ счетно.
- (g) Число слов в конечном или счетном алфавите счетно.

9. Континуум - мощность множества $[0,1]$. Примеры:

- (a) Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц
- (b) Множество вещественных чисел
- (c) Квадрат $[0,1] \times [0,1]$.

10. Свойства континуума:

- (a) В любом континуальном множестве есть счетное подмножество.
- (b) Мощность объединения не более чем континуального семейства множеств, каждое из которых не более чем континуально, не превосходит континуума.

11. Булева функция от n аргументов - отображение из B^n в B , где $B = \{0,1\}$. Количество всех n -арных булевых функций равно 2^{2^n} . Булеву функцию можно задать таблицей истинности.

12. Полный базис - это такой набор, который для реализации любой сколь угодно сложной логической функции не потребует использования каких-либо других операций, не входящих в этот набор. Примеры полных базисов:

- (a) Конъюнкция, дизъюнкция, отрицание.
- (b) Конъюнкция, отрицание.
- (c) Конъюнкция, сложение по модулю два, константа один - базис Жегалкина.
- (d) Штрих Шеффера (таблица истинности - 0111).

13. Разложением Шеннона функции $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ по переменной x_i называется представление функции f в виде:

$$f(x_n, \dots, x_i, \dots, x_1) = \bar{x}_i \cdot f(x_n, \dots, 0, \dots, x_1) \vee x_i \cdot f(x_n, \dots, 1, \dots, x_1)$$

Разложением Рида называется следующее представление функции:

$$f(x_n, \dots, x_i, \dots, x_1) = g_0 \oplus (g_0 \oplus g_1) \cdot x_i,$$

$$g_0 = f(x_n, \dots, 0, \dots, x_1)$$

$$g_1 = f(x_n, \dots, 1, \dots, x_1)$$

16. Булевой схемой от n переменных x_1, \dots, x_n называется последовательность булевых функций g_1, \dots, g_s , в которой всякая g_i или равна одной из переменных, или получается из предыдущих применением одной из логических операций из базиса схемы. Также в булевой схеме задано некоторое число $m \geq 1$ и члены последовательности g_{s-m+1}, \dots, g_s называются выходами схемы. Число m называют числом выходов. Число s называют размером схемы.

18. Свойства вычислимой функции:

- (a) Если функция f вычислима, то её область определения $D(f)$ является перечислимым множеством.
- (b) Если функция f вычислима, то её область значений $E(f)$ является перечислимым множеством.
- (c) Если функция f вычислима, то для любого перечислимого множества X его образ $f(X)$ является перечислимым множеством.
- (d) Если функция f вычислима, то для любого перечислимого множества X его прообраз $f^{-1}(X)$ является перечислимым множеством.

19. Множество называется *разрешимым*, если для него существует разрешающий алгоритм, который на любом входе останавливается за конечное число шагов (*разрешающий алгоритм для множества — алгоритм, получающий на вход натуральное число и определяющий, принадлежит ли оно данному множеству*).

20. Множество называется *перечислимым*, если все его элементы могут быть получены с помощью некоторого алгоритма.

21. Свойства перечислимых множеств:

- (a) Если множества A и B перечислимы, то их объединение $A \cup B$ и пересечение $A \cap B$ также перечислимы (*отсюда следует, что объединение или пересечение конечного числа перечислимых множеств перечислимо*).
- (b) Если множество A перечислимо, то оно является областью значений некоторой вычислимой функции (*это также является достаточным условием перечислимости*).
- (c) Если множество A перечислимо, то оно является областью определения некоторой вычислимой функции (*это также является достаточным условием перечислимости*).

22. Функция $U : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется универсальной, если для любой функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ существует такое p , что $U(p, x) = f(x)$ для любых x (*равенство здесь понимается в том смысле, что при любом x обе функции либо принимают одинаковое значение, либо не определены*).

23.

24. Универсальную вычислимую функцию $U(p, x)$ называют *главной*, если для любой вычислимой функции $V(q, y)$ существует *транслятор* — вычислимая тотальная функция, такая что

$$\forall q, y : V(q, y) = U(s(q), y)$$

Такие функции также называются *главными нумерациями*.

25. Пусть $F = \{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$ — множество вычислимых функций. Пусть $A \subseteq F$ — подмножество функций. Говорят, что функция удовлетворяет некому *свойству*, если она лежит в A . Пусть $U(p, x)$ — универсальная функция. Пусть $P_A = \{p \mid U(p, x) \in A\}$. Утверждается, что если A — нетривиально (т.е. $A \neq \emptyset, \bar{A} \neq \emptyset$), то множество P_A неразрешимо.

26. Пусть $U(p, x)$ — главная нумерация. Тогда для любой тотальной вычислимой функции $p(t) \exists t : U(p(t), x) = U(t, x)$. Это утверждение называется теоремой о неподвижной точке.

27. *Машиной Тьюринга (MT)* называется модель вычислений, состоящая из

- (a) бесконечной в обе стороны *ленты*, в которой могут быть записаны символы *конечного алфавита* A ;
- (b) *головки*, которая может двигаться по ленте и которая может работать в один момент времени только с одной ячейкой;
- (c) *множества состояний* Q ;
- (d) *таблицы переходов*, которая задает функцию

$$\delta : A \times Q \rightarrow A \times Q \times \{-1, 0, +1\}$$

МТ может быть *многоленточной*, тогда число головок будет соответствовать числу лент, и наша функция δ на МТ с n лент примет вид

$$\delta : A^n \times Q \rightarrow A^n \times Q \times \{-1, 0, +1\}^n$$

28. Функция $f : B^* \rightarrow B$, где B – подмножество алфавита машины без пустого символа, вычислима на МТ, если для любого x из области определения функции результат работы МТ равен $f(w)$, иначе МТ не останавливается. Иными словами, функция вычислима на МТ, если для любого входа, на котором функция определена, МТ останавливается и выдает правильный ответ, иначе она не останавливается.