

IFT-2002 Informatique Théorique

Devoir 2


111 124 564
Raphaël Sylvain

Question 1.

Montrez que les langages ci-dessous sont non-contextuels. Vous pouvez le faire soit en donnant une grammaire non-contextuelle qui génère le langage, soit un automate à pile qui accepte le langage. (Notez que si vous donnez une grammaire et un automate, les deux seront corrigés mais seul le premier des deux sera noté)

1. $L = \{uba^nba^nbv : n \in \mathbb{N} \wedge u, v \in \{a, b\}^*\}$.
2. Soit K l'ensemble des mots de la forme $x\$y$ où x et y sont des mots de longueur impaire sur l'alphabet $\{a, b\}$ et la lettre médiane de x est égale à la lettre médiane de y . Par exemple $abb\$b$ et $aaaaa\$bab$ sont des mots dans K mais $aa\$aaa$ n'est pas dans K (le mot à gauche est de longueur paire), $aaa\$aab\$$ n'est pas dans K (pas de la forme $x\$y$) et $aba\$abaab$ n'est pas dans K (pas la même lettre médiane).

Réponse 1:



Réponse 2:


$S \rightarrow A\$A; \quad S \rightarrow B\$B;$
 $A \rightarrow CAC; \quad A \rightarrow a;$
 $B \rightarrow CBC; \quad B \rightarrow b;$
 $C \rightarrow a; \quad C \rightarrow b;$

Question 2.

Montrez que le langage suivant est non-contextuel. (*Je pense qu'il est plus facile de construire un automate à pile pour ce langage plutôt que de fournir une grammaire non-contextuelle mais vous pouvez faire l'un ou l'autre.*)


$T = \{x\$y^r : x \text{ est la représentation en binaire d'un entier } n_x \text{ et } y \text{ représente l'entier } n_x + 1\}$
Rappelons que y^r est le mot y renversé. Par exemple $10010\$11001 \in T$ parce que 10010 représente l'entier 18 et que le renversé du mot qui suit le \$ est 10011 qui représente l'entier 19. De la même façon $11011\$00111$ est dans le langage puisque 11011 représente 27 et 11100 représente 28.

Réponse:



Question 3.

Considérez l'automate à pile suivant:



- Dites si les séquences suivantes sont acceptées par l'automate à pile ci-dessus: ab , acc , aac , $aaacb$.
- Décrivez le langage accepté par cet automate. (Par une expression ensembliste ou de toute autre façon qui est suffisamment claire et précise pour que le correcteur vous comprenne)
- Donnez une grammaire non-contextuelle qui génère le même langage.

Réponse:

- $ab \rightarrow$ Oui
 - $acc \rightarrow$ Non
 - $aac \rightarrow$ Oui
 - $aaacb \rightarrow$ Oui
- C'est le langage débutant par une série de a et suivi par des b et/ou c . Le nombre de a est égal est égal au nombre de b plus deux fois le nombre de c .
- $S \rightarrow aaSc; \quad S \rightarrow aSb; \quad S \rightarrow \epsilon;$

Question 4.

Considérez la grammaire G donnée par les règles ci-dessous. (L'alphabet terminal est $\{a, b, c\}$.)

$S \rightarrow abPR$; $S \rightarrow QTba$;

$P \rightarrow abPR$; $P \rightarrow c$;

$T \rightarrow QTba$; $T \rightarrow c$;

$R \rightarrow Ra$; $R \rightarrow ba$;

$Q \rightarrow Qb$; $Q \rightarrow ab$;

a) Décrivez le langage généré par cette grammaire. (Par une expression ensembliste ou de toute autre façon qui est suffisamment claire et précise pour que le correcteur vous comprenne. Je suggère d'illustrer votre explication avec quelques exemples bien choisis de séquences qui appartiennent au langage et de séquences qui n'appartiennent pas au langage)

b) Montrez que G est ambiguë en donnant deux arbres de dérivation distincts pour un même mot.

Réponse: a)

$\{ \{(ab)^i c(x)^i | x = ba^j \wedge i \in \mathbb{N} \wedge j \in \mathbb{N}\} \cup \{(x)^i c(ba)^i | x = ab^j \wedge i \in \mathbb{N} \wedge j \in \mathbb{N}\} \}$

C'est un langage dont le mot peut avoir deux formes:

1) débutant par une suite de ab suivie d'un c suivi d'autant de groupe ayant la forme $ba^n \wedge n > 0$

2) finissant par une suite de ba précédée d'un c précédé d'autant de groupe ayant la forme $ab^n \wedge n > 0$


Mots acceptés par la forme 1: $abcba$, $abcbaa$, $ababcbaaba$

Mots acceptés par la forme 2: $abcba$, $abbcba$, $ababbcbaba$


Mots refusées: $abbcbba$ $aabcbbba$

Réponse: b)

$S \Rightarrow abPR \Rightarrow abcR \Rightarrow abcba$



$S \Rightarrow QTba \Rightarrow abTba \Rightarrow abcba$



Question 5.

Utilisez le lemme de pompage pour les langages non-contextuels pour montrer que le langage suivant n'est pas non-contextuel.

$$L = \{a^\ell b^n c^m \mid \ell, n, m \in \mathbb{N} \wedge \ell < n < m\}$$

Réponse:

Montrons que L n'est pas non-contextuel. Il satisfait donc le corrolaire de pompage pour tout $p > 0$.

Quel que soit p , considérons le mot $z = a^p b^{p+1} c^{p+2}$. Ce mot est de longueur $3p + 3$ et appartient à L il devra donc être "pompe".

Plus précisément, il existe $z = svuwt$ avec $|vw| \geq 1$ et $|vuw| \leq p$ et $\{\forall i \mid sv^i uw^i t \in L\}$

Il reste à montrer qu'en fait, peu importe le découpage, il existe un i tel que $sv^i uw^i t \notin L$

1) v contient des a

Donc uw ne peut pas contenir de c car sinon $|vuw| > p$. Alors $sv^5 uw^5 t$ n'est pas dans le langage, car il y aura plus de a que de c

2) v contient des b mais pas de a

Alors aucun a est pompable et $sv^0 uw^0 t$ n'est plus dans le langage, car l'on enlève au moins un b et le nombre de a sera plus grand ou égal au nombre de b

3) v contient des c mais pas de b

Alors aucun b est pompable et $sv^0 uw^0 t$ n'est plus dans le langage, car l'on enlève au moins un c et le nombre de b sera plus grand ou égal au nombre de c

4) Puisque v

Ne peut contenir de c sans contenir de b (3)

Ne peut contenir de b sans contenir de a (2)

Ne peut contenir de a (1)

alors $v = \epsilon$.

5) w contient des c mais pas de b

Alors aucun b est pompable puisque $v = \epsilon$ (4) et $sv^0 uw^0 t$ n'est plus dans le langage, car l'on enlève au moins un c et le nombre de b sera plus grand ou égal au nombre de c

6) w contient des b mais pas de a

Alors aucun a est pompable puisque $v = \epsilon$ (4) et $sv^0 uw^0 t$ n'est plus dans le langage, car l'on enlève au moins un b et le nombre de a sera plus grand ou égal au nombre de b

7) w contient des a Donc w ne peut pas contenir de c car sinon $|vuw| > p$. Alors $sv^5 uw^5 t$ n'est pas dans le langage, car il y aura plus de a que de c

8) Puisque w

Ne peut contenir de c sans contenir de b (5)

Ne peut contenir de b sans contenir de a (6)

Ne peut contenir de a (7)

alors $w = \epsilon$.

9) Nous avons que $v = \epsilon$ et $w = \epsilon$. Ceci est impossible car $|vw| > 1$

L n'est pas non-contextuel.

Question facultative

Soit $\{a, b\}$ un alphabet et définissons la relation \sim sur les mots de $\{a, b\}^*$ par $x \sim y$ si x et y ont le même nombre de a et ont le même nombre de b . Par exemple $abaa \sim baaa$ et $ababb \sim bbaab$. Si L est un langage sur $\{a, b\}^*$ on peut maintenant définir

$$K_L = \{x : \exists y \ x \sim y \wedge y \in L\}.$$

Donc un mot x appartient à K_L si ses lettres peuvent être réordonnées pour former un mot de L .

1. Donnez un exemple de langage régulier L tel que K_L n'est pas régulier.

Réponse:

$L = (ab)^*$ Le langage de suites de paires ab (ex: $abababab$)

Supposons que K_L est régulier. Il satisfait donc le lemme de pompage pour une certaine longueur de pompage $p > 0$

Quel que soit p , considérons le mot $w = a^p b^p$. Ce mot est de longueur $2p$ et appartient à K_L donc il peut être "pompe".

Plus précisément, il existe $w = xyz$ tel que

- (a) $|xy| \leq p$
- (b) $|y| > 0$
- (c) $xy^i z \in K_L$ pour tout $i \in \mathbb{N}$.

Puisque $|xy| \leq p$ et puisque les p premiers symboles de w sont des a , on sait que y ne contient que des a .

On ne sait pas combien de a sont contenus dans y , mais on sait qu'il en a j pour un certain j compris entre 1 et p .

Prenons $i = 0$. On a $xy^0 z = xz = a^{p-j} b^p$. Ce mot ne fait pas partie du langage, puisque $j > 0$ et que $p - j \neq p$ alors que le mot doit avoir autant de a et de b pour être une série de ab et appartenir à L .

K_L n'est pas régulier.

2. Montrez que si L est un langage régulier alors le langage K_L est toujours non-contextuel.
3. Montrez si l'alphabet est maintenant $\{a, b, c\}$ alors on peut trouver un langage régulier L tel que K_L n'est pas non-contextuel. (Évidemment, on ajuste la définition de \sim , c'est-à-dire $x \sim y$ si x et y ont le même nombre de a , le même nombre de b et le même nombre de c .)