

Biologie Cellulaire : Généralités - Techniques

A partir du cours du Pr Poncet

Lyon Sud

I. Les origines de la vie 1
A. Les origines 1
B. Des briques communes aux êtres vivants (EV) 3
II. Une cellule eucaryote type 3
A. Un modèle de la cellule eucaryote 3
B. Le cytosquelette 4
C. Le noyau 4
D. Le RE 5
E. Le Golgi 5
F. Le trafic vésiculaire 6
G. La mitochondrie 6
H. Les lysosomes et peroxysomes 6
III. Les programmes cellulaires 8
A. Le système de contrôle qualité 8
B. L'UPS = Ubiquitin protéasome system 8


I. Les origines de la vie

Comprendre, retenir le vocabulaire en bleu, ne pas apprendre les notions en grisé

ne pas retenir les détails à savoir


A. Les origines

Si la terre avait 24h d'existence, l'apparition d'homo sapiens aurait lieu à 23H59 et 56 secondes…




LUCA = last universal common ancestor 3,5-4 milliards d'années (ancêtre des eu- et procaryotes)
LECA = last eucaryotic common ancestor, il a 2 milliards d'années, ancêtre des cellules eucaryotes, c'est une association symbiotique d'une **alpha protéobactérie et d'une archébactérie**.

➔ Nous avons acquis cette connaissance grâce à l'étude des liens de parentés établis à partir des régions codant les ARNr.



Les bactéries, les cellules eucaryotes et les archaebactéries représentent 3 domaines, (clades, empires) du vivant.
La phylogénie nous montre la distance et les divergences génétiques entre les cellules.

Organisation génétique/génomique proche.



Caractéristique	Bactéries (procaryotes)	Archées (procaryotes)	Eucaryotes
Noyau	✗ Absent	✗ Absent	☑ Présent (avec enveloppe nucléaire)
Taille des cellules	Petite (1–5 µm)	Petite (1–5 µm)	Plus grande (10–100 µm)
Organites	✗ Aucun	✗ Aucun	☑ Présents
ADN	1 chromosome circulaire	1 chromosome circulaire	Plusieurs chromosomes linéaires
Présence d'introns	Rare	☑ Fréquent (comme chez eucaryotes)	☑ Oui
Nombre d'espèces estimées	≈ 1 million- 1 milliard	~100 000 à plusieurs millions	≈ 8,7millions
Nombre d'espèces décrites	~20 000 à 30 000	~500 à 1 000	~1,8 à 2 millions
Paroi cellulaire	☑ Peptidoglycane (muréine)	☑ Pas de peptidoglycane, mais autres polymères (pseudo-muréine, S-layer)	☑ Chez plantes et champignons (cellulose ou chitine)
Membrane plasmique	Lipides ester	Lipides éther (spécifiques aux archées)	Lipides ester
Type de reproduction	Asexuée (fission binaire)	Asexuée (fission binaire)	Asexuée ou sexuée (mitose/méiose)
Ribosomes	70S	70S	80S (dans le cytoplasme), 70S dans mitochondries/chloroplastes
Milieu de vie	Milieux variés	Souvent extrêmes (thermophiles, halophiles, etc.)	Milieux variés
Méthanogenèse	✗ Non	☑ Oui (exclusif aux archées)	✗ Non
Sensibilité aux antibiotiques	☑ Oui (ex. pénicilline)	✗ Non	Variable
Exemples	*E. coli, Streptococcus*	*Methanopyrus, Halobacterium*	*Amoeba, Humain, Chêne*

➔ On retiendra la présence ou l'absence du noyau, des organites, la taille des cellules ainsi que la forme que prend l'ADN dans ces trois clades.
➔ Bien connaitre les différences soulignées sur les 4 premières lignes entre pro et Eucaryotes

Ex : 85% des archae contribuent à l'effet de serre, elles sont méthanogènes anaérobie (présentes dans les milieux extrêmes, et dans la panse des bovins…)

B. Des briques communes aux êtres vivants (EV)

Les EV ont des composés élémentaires communs :

- Les composés organiques formés de C, H, O, N
- Les sels minéraux (Ca++, Mg+, K+, Fe++ …)
- Les lipides (composition des membranes, hormones, sources d'énergie...)
- Les protéines (enzymes, récepteurs, transporteurs, cytosquelette etc…)
- Les glucides (source d'énergie, glycoprotéines, glycolipides, participent au squelette de l'ADN et de l'ARN , le D-glucose est commun aux êtres vivants)
- Les acides nucléiques (ARN et ADN)
- L'ATP = ribonucléotide (donc acide nucléique) source d'énergie directement utilisable par les cellules

1) D'après vos connaissances sur les origines des cellules vous pouvez dire que :

A. LUCA est la dernière cellule apparue au cours de l'évolution **FAUX**
B. LECA est la première cellule eucaryote apparue au cours de l'évolution **VRAI**
C. LECA a un noyau **VRAI**
D. LUCA a un noyau **FAUX**
E. LECA et LUCA apparaissent toutes les deux il y a 2 milliards d'années **FAUX 2 pour LECA et 3,5 pour LUCA**

2) D'après vos connaissances sur les origines des cellules vous pouvez dire que :

A. LECA est une association symbiotique entre une mitochondrie et une protéobactérie **FAUX entre protéo et archébactérie**
B. Les évolutionnistes comparent les ARNm de tous les êtres vivants pour construire l'arbre phylogénique du vivant **FAUX les ARNr**
C. Ni les archées ni les bactéries, ne présentent un noyau **VRAI**
D. Les archées présentent des organites **FAUX**
E. Les archées et les bactéries ont quasi la même taille **VRAI**

3) D'après vos connaissances sur les origines des cellules vous pouvez dire que :

A. Les archées produisent du méthane en milieu anaérobie **VRAI**
B. Tous les êtres vivants sont formés de CHOP **FAUX, CHON**
C. Les êtres vivants sont tous formés de protéines glucides lipides et acides nucléiques **VRAI**
D. L'ATP est un désoxyribonucléotide **FAUX, ribonucléotide**
E. Les cellules eucaryotes produisent du méthane **FAUX**


II. Une cellule eucaryote type

A. Un modèle de la cellule eucaryote

On peut énumérer :

- **La membrane plasmique** (voir cours CM2), formée d'une bicouche lipidique, elle sépare le LIC du LEC. La membrane plasmique n'est pas un sac étanche.
  Elle assure les échanges avec le milieu extracellulaire grâce à des transporteurs, des pores et des récepteurs. Des imports et des exports sont réguliers, ils assurent la communication avec l'extérieur proche et plus à distance.
- **Les organelles** ou organites, ce sont des compartiments subcellulaires séparés du cytosol par une ou deux membranes

- **Le cytosol**, c'est une solution aqueuse baignant les organelles et les vésicules, elle a une composition et un équilibre ionique spécifique.
  Le cytosol contient le cytosquelette qui est le siège de nombreuses réactions enzymatiques.
  Attention : cytoplasme = cytosol + organelles (sans le noyau)




B. Le cytosquelette

Il existe trois types de filaments :

- **Les microfilaments d'actine** : ils assurent le mouvement de la cellule (migration, division) et la structure cellulaire
- **Les microtubules** : ce sont des rails qui organisent le trafic vésiculaire et le positionnement des organelles
- **Les filaments intermédiaires** : ils confèrent une rigidité et une structure aux cellules

C. Le noyau

La membrane du noyau est une double bicouche lipidique, la bicouche la plus externe est en lien avec le RE. Des pores nucléaires assurent un trafic régulé = contrôlé
Le nucléoplasme est l'équivalent du cytosol, dans le noyau
Le noyau n'est pas homogène, il présente des domaines comme le nucléole où a lieu la transcription des ARNr
La chromatine est un assemblage d'ADN et de protéines comme les histones



Fonctions du noyau :

- Il protège le génome = notre identité génétique, l'ADN ne sort pas du noyau, c'est seulement l'ARNm qui sort …

- Il structure et organise notre génome : 46 K organisés en 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Les K sont organisés en territoire chromosomiques (ils ne sont pas placés au hasard dans le noyau…)
- Il permet l'expression génique :
    - en contrôlant la transcription, épissage, maturation des ARN puis export des ARNm dans le cytosol
    - l'ADN est le mode d'emploi pour fabriquer des protéines (> 20000 chez l'homme) via un intermédiaire : l'ARNm
    - les marques épigénétiques (cela concerne l'ADN mais aussi les protéines de la chromatine = les histones) vont cibler un choix du programme transcriptionnel, comme un jeu de gènes par type cellulaire…



D. Le RE

- Le REL assure :
    - Les flux calciques
    - La synthèse des lipides (phospholipides, triglycérides et cholestérol,
    - Modification des acides gras (AG)
    - Formation de gouttelettes lipidiques (→ dans les hépatocytes on parle de stéatose)
    - Détoxification (surtout dans les cellules du foie)
- Le REG c'est du RE + ribosomes, ce complexe couple la traduction à l'intégration dans la membrane du RE de la protéine en cours de synthèse.
    - Il assure le repliement des protéines
    - Il assure les modifications post-traductionnelles comme la glycosylation des protéines
    - Les protéines ainsi traitées seront soit sécrétées, soit intégrées aux membranes


E. Le Golgi

Il présente 3 zones : cis, médian et trans-Golgi.
Il permet :

- La modification des protéines (glycosylation, sulfatation, phosphorylation, pamiloylation, maturation protéolytique
- La modification des lipides (sphingolipides, glycosylation)
- Sécrétion de vésicules → vers la membrane (sécrétion ou renouvellement de la membrane ou vers le lysosome

F. Le trafic vésiculaire

- de intérieur vers l'intérieur : Golgi → organelles
- de l'intérieur vers l'intérieur : l'autophagie = recyclage par autophagie
- de l'intérieur vers l'extérieur : l'exocytose
- de l'extérieur vers l'intérieur : endocytose (phagocytose, pinocytose transcytose, récepteur interposé ..)



G. La mitochondrie

C'est un carrefour métabolique majeur qui assure aussi le métabolisme intermédiaire (glucides, lipides et protéique)
C'est une centrale énergétique de la cellule, elle synthétise de l'ATP sous forme directement utilisable

H. Les lysosomes et peroxysomes

Le lysosome assure :

- la digestion et la dégradation de macromolécules (protéines, glucides, lipides, acides nucléiques
- il dégrade les autophagosomes
- sécrétion/exocytose lysosomale

Le peroxysome :

- il assure l'oxydation des AG longs pour les dégrader
- il gère le stress oxydatif
- il synthétise les précurseurs de la myéline

4) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que :

A. Le cytosol est une solution aqueuse **VRAI**
B. La membrane plasmique est étanche et isole le LIC du LEC **FAUX, non étanche**
C. Le cytosol contient un cytosquelette formé de microfilaments d'actine, de filaments intermédiaire et de microtubules **VRAI**
D. Les microtubules assurent la rigidité de la cellule **FAUX, ce sont les filaments intermédiaires**
E. Les microfilaments d'actine sont des rails sur lesquels circulent les vésicules **FAUX**

5) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le noyau structure et organise notre génome **VRAI**
B. Le noyau protège notre identité génétique **VRAI**
C. Nous avons 22 paires de gonosomes et une paire d'autosome par noyau **FAUX, inverse**
D. Notre code génétique code pour plus de 20000 protéines **VRAI**
E. Les marques épigénétiques ne se situent que sur l'ADN **FAUX**

6) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Sur le REL on observe des ribosomes **FAUX**
B. Le complexe RE + ribosomes permet la traduction et l'intégration des protéines dans le RE **VRAI**
C. Dans le RER, on a le repliement des protéines et son contrôle **VRAI**
D. Les modifications post-traductionnelles se font toujours dans le Golgi **FAUX, ajout de sucres dans le RE**
E. Le REL contrôle les flux calciques dans la cellule **VRAI**

7) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. La modification des AG se fait dans le Golgi **FAUX, dans le REL**
B. La synthèse des triglycérides a lieu dans le REL **VRAI**
C. La sulfatation a lieu dans le REL **FAUX, dans le Golgi**
D. La phosphorylation des protéines a lieu dans le Golgi **VRAI**
E. Les vésicules vouées à l'exocytose se forment à partir du trans-Golgi **VRAI**

8) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. L'autophagie est un transit : intérieur vers extérieur **FAUX**
B. L'endocytose est un trafic : extérieur vers intérieur **VRAI**
C. La mitochondrie est un carrefour métabolique majeur en plus d'être un centre énergétique de synthèse d'ADP **FAUX, ATP**
D. Les vésicules d'autophagie sont dégradées dans le protéasome **FAUX, lysosome**
E. Les vésicules d'endocytose sont dirigées vers le lysosome **VRAI**

9) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le péroxysome = le protéasome **FAUX**
B. Le peroxysome permet de gérer le stress oxydatif subi par la cellule **VRAI**
C. Dans le protéasome on a l'oxydation des AG longs **FAUX**
D. Dans le lysosome on a l'oxydation des AG longs **FAUX**
E. Dans le lysosome on a la synthèse des précurseurs de la myéline **FAUX, peroxysome**

III. Les programmes cellulaires

Des fonctions/programmes commun(e)s (Attention faux pour les GR qui n'ont pas de noyau)

- Réplication, réparation de ADN (Cf. biochimie)
- Synthèse protéique, transcription, traduction + régulations épigénétiques (Cf. biochimie)
- La mitose/division cellulaire (Cf CM9 C Léonce, CM4 D Poncet) et la méiose (Cf Embryoloygie)
- Communication : récepteurs (Cf UEspe C.Léonce), endocytose/exocytose (Cf CM7 Pr. Buffoni)
- La migration/adhésion, organisation tissulaires (Cf. histologie, CM5 D Poncet)
- La mort cellulaire, la sénescence (cf CM10 D Poncet)
- Système de contrôle qualité

A. Le système de contrôle qualité

Les organelles dysfonctionnelles du cytosol sont enfermés dans des autophagosomes et voués à **l'autophagie**.

Comment en revanche, dégrader ou recycler des protéines ?

- **Cas des protéines cytosoliques**
  - Elles sont ubiquitinées par le système UPS, ce complexe enzymatique ajoute des groupements Ub sur les protéines à dégrader, elles sont alors prises en charge par le protéasome → cela concerne 80 à 90% des protéines cytosoliques à dégrader
  - Pour les autres, les 10 à 20% restants, elles sont emballées par des micro autophagosomes, on parle de microautophagie. Ces complexes sont dirigés via des protéines chaperonnes vers le lysosome


- **Dans le RER** :
  - les protéines mal repliées, sont à nouveau contrôlées. On refait des tentatives jusqu'à résoudre le problème, mais au final si le mauvais repliement persiste, elles ressortent du RER et sont prises en charge par le complexe UPS dans le cytosol → protéasome
  - Si l'accumulation de protéines mal repliées existe dans la lumière du RER, un autre système intervient, c'est le système UPR (unfolded protein response), il stoppe la traduction et peut induire la mort de la cellule entière (= l'apoptose)

- **Les protéines mitochondriales** sont soumises à un système local (dans la matrice) de protéases spécifiques et de contrôle qualité


B. L'UPS = Ubiquitin protéasome system

Ce complexe fonctionne en 3 temps :


- Il sélectionne la protéine à dégrader
  - Composition d'AA particuliers en Nterm, ou elles peuvent être clivées
  - Modification post-traductionnelle = phosphorylation (charges -) mise en place sur les protéines à dégrader → modifier la conformation de la protéine à dégrader
- Il la marque
  - L'ubiquitine est une petite prot de 76AA, elle sera greffée sur la protéine à dégrader



- Il existe un code Ub : mono, multi et polyUb, cela se fait sur des AA spécifiques de la protéine à dégrader. Dans le cas de l'UPS il s'agit de la polyUbiquitination
- Le complexe de l'Ubiquitine ligase comporte 3 sous unités E1 (enzyme d'activation de l'Ub), E2 (enzyme de conjugaison, il transfère Ub sur la protéine), E3 (ligase, elle lie l'Ub à son substrat)



- Il la dégrade
  - Les protéines polyubiquitinées sont apportées au protéasome . C'est un complexe protéique qui permet de protéolyser les protéines identifiées par une chaine poly-ubiquitine sur K48. Le protéasome permet ainsi le recyclage des acides aminés.



Rôles du système UPS :

- Il dégrade les protéines dysfonctionnelles
- Il contrôle la demi-vie des protéines (rôle homéostasique)

- C'est un acteur de nombreuses voies de signalisation → lors du cycle cellulaire, au moment de la mitose le système UPS contrôle la séparation des chromatides de chaque chromosome (K)…

Pathologies liées à l'UPS :

- Cancer : dégradation de protéines suppresseur de tumeur (→sarcomes mdm2 : E3 augmente et p53 baisse)…., stabilisation des oncogènes,
- Protéinopathie : neuro-dégénérescence = défaut de dégradation, agrégation de protéines → parkinson, Alzheimer …
- Fibrose kystique, mucoviscidose : à cause d'une mutation du gène CFTR, on a une dégradation excessive du transporteur CFRT

A savoir dans le contrôle qualité

- Organelles (partie ou entière), fraction cytosolique → autophagie
- Protéines cytosoliques
    - MCA : (micro)autophagie médiée par les chaperonnes (10-20%)
    - UPS : Ubiquitin Proteasome System (80-90%) :
        - étapes (ubiquitine (polyubiquitinylation K48), E1/E2/E3, protéasome),
        - rôles cellulaires (dégradation/homéostasie/signalisation),
        - implications en pathologie (cancer, neurodégénescence, mucoviscidose)

A savoir dans les programmes cellulaires :

- Chaque type cellulaire remplit des fonctions spécialisées
    - Macrophage et phagocytose
    - Lymphocytes et réponse cytotoxique
    - Fibroblaste et matrice extra-cellulaire
    - Cellule épithéliale et épithélium de revêtement (peau..)
    - Neurone et transmission nerveuse ….

➔ Chaque type C possède des **marques épigénétiques** spécifiques, active des **programmes transcriptionnels** et des **signalisations spécifiques**, présente une **morphologie**, un nombre **d'organelles**, un **métabolisme**, un protéome … adaptés à sa fonction

10) D'après vos connaissances sur le système du contrôle qualité des protéines dans les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le système UPS contrôle le repliement des protéines dans le RE **FAUX**
B. Le système UPS n'intervient que dans la matrice mitochondriale **FAUX**
C. Le système UPS n'intervient que dans le cytosol **VRAI**
D. Le système UPS entraine les protéines mal repliées vers le lysosome **FAUX**
E. Le système UPS assurent la dégradation des 80% de protéines synthétisées dans le cytosol **FAUX, 80% des prot dans le cytosol mal repliées (dont notamment celles qui ont été rétro=transloquées)**

11) D'après vos connaissances sur le système du contrôle qualité des protéines dans les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le système UPS est capable de sélectionner les protéines mal repliées qui sont ressorties du RER **VRAI**
B. Le système UPS marque les protéines mal repliées e ressorties du RE grâce à une mono-ubiquitination **FAUX, polyUb**
C. Le complexe UPS est formé de quatre enzymes E1, E2, E3 et E4 **FAUX, 3**
D. E3 est l'enzyme de conjugaison de UPS **FAUX, E2**
E. E2 est l'enzyme ligase de UPS **FAUX, E3**

12) D'après vos connaissances sur le système du contrôle qualité des protéines dans les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le protéasome est un complexe protéique recouvert d'une membrane **FAUX**
B. Si le système UPS ne fonctionne pas, il peut en résulter l'apparition d'une maladie comme celle d'Alzheimer **VRAI**
C. L'autophagie concerne des organelles usagées et des fractions du cytosol **VRAI**
D. Il existe un système de microautophagie dit MCA qui concerne des protéines mal repliées dans le cytosol mais ne faisant pas intervenir le système UPS **VRAI**
E. Le système MCA concerne 20% des protéines dans le cytosol **FAUX, 20% des prot mal repliées dans le cytosol**

13) D'après vos connaissances sur le programme cellulaire, vous pouvez dire que

A. Chaque type cellulaire possède des marques épigénétiques **VRAI**
B. L'épigénétique contrôle la transcription de certains gènes dans une cellule **VRAI**
C. Toutes les cellules de notre corps ont le même nombre d'organites **FAUX**
D. Les cellules du foie sont particulièrement riches en peroxysomes **VRAI**
E. L'ensemble des protéines de nos cellules s'appelle le protéome **VRAI**