

FICHE ORGANES ET EPITHELIUMS

<table>
<tr>
<td>Peau
Protection mécanique</td>
<td>Epiderme
Epithélium stratifié pavimenteux kératinisé ou Malpighien
Epais, imperméable protection UV
Particularités : cellules pavimenteuses remplies de cytokératine, disparition du N et des organites → desquamation</td>
<td colspan="2">Les glandes sudoripares : sueur (produit complexe), les canaux excréteurs sont cubiques stratifiés, glande alvéolaire apocrine
Les glandes sébacées : sébum (produit complexe), glande holocrine</td>
</tr>
<tr>
<td>Appareil respiratoire

Protection chimique mouvement</td>
<td>voies aériennes sup : cavité nasale
voies aériennes inférieures : Larynx, Trachée, bronches

Alvéoles pulmonaires → pavimenteux simple</td>
<td>Epithélium pseudostratifié, toutes les cellules cylindriques touchent la MB mais n’atteignent pas forcément la lumière de la cavité
- cils (coloration TM)
- c/ caliciformes muqueuses isolées= cellules exocrines
- c/ endocrine isolées
-c/ souches disséminées
Pseudostratifié cilié
 
Cils
Microvillosités
c/ endocrines → mucus
c/ exocrines
c/ souches</td>
<td>Les cils → élimination des poussières et mucus → tapis muco-ciliaire
Barrière air/ sang → pour les alvéoles
Coloration spécifique : PAS → mucines, MB
Coloration topo : trichrome de Masson
  </td>
</tr>
<tr>
<td>Appareil digestif
Protection chimique :
- Ep gastrique
- Ep intestinal

protection mécanique :
- œsophage : protection mécanique contre l’abrasion</td>
<td>Cavité buccale + pharynx : Malpighien non kératinisé

Langue : Malpighien non kératinisé

Œsophage : Malpighien non kératinisé

Estomac
Intestin grêle } E Simple prismatique avec microvillosités

Canal anal : Malpighien non kératinisé
- zone ano-cutanée : malpighien kératinisé

Vésicule biliaire : simple cylindrique (concentration de la bile)</td>
<td colspan="2">Dans l’intestin grêle :
- Cellules caliciformes isolées → mucus PAS ++:
- Cellules souches renouvellement rapide en 48h des cellules intestinales
- Epithélium simple prismatique avec microvillosités en plateau strié
- Rôles : absorption/réabsorption grâce aux microvillosités qui x la surface d’absorption
Les glandes exocrines
Estomac : sécrétion exocrine de suc gastrique avec H+(produit complexe)
Cellules principales de l’estomac sont des cellules glandulaires séreuses : pepsine, les glandes fundiques de l’estomac sont tubulaires
Glandes salivaires :
Glandes salivaires de la langue : acinus à lumière bien visible avec des cellules muqueuses
Glandes salivaires parotides : acinus à petite lumière avec cellules glandulaires acineuses (amylase), canal excréteur cubique stratifié
Les glandes sous maxillaires : séro-muqueuses
Les glandes sublinguales : muco-séreuses
Les glandes amphicrines :
- les cellules du foie sont amphicrines (bile + sécrétion endocrine)
- le pancréas présente des ilots de Langerhans endocrine (insuline et glucagon) et des acinus exocrines (suc pancréatiques)
Le mucus des cellules glandulaires : GAGs, Protéoglycanes et lubrifiant</td>
</tr>
<tr>
<td>Les voies génitales Et glandes mammaires</td>
<td colspan="2">Chez l’homme :
Tractus génital masculin : Epididyme et tubes séminifères : simple prismatique cilié



Chez la femme :
Vagin + col utérin : épithélium Malpighien non kératinisé
Utérus : simple cylindrique
Trompes utérines : épithélium cylindrique simple cilié

Surface de l’ovaire : cubique simple</td>
<td>Chez l’homme testicule :
- les tubes séminifères → fabrication de spermatozoïdes
- les cellules de Leidig en amas sont endocrines → testostérone
Les glandes mammaires : glandes alvéolaire composée, sécrétion apocrine → lait (produit complexe</td>
</tr>
</table>

FICHE ORGANES ET EPITHELIUMS

<table>
<tr><td>L'œil</td><td colspan="3">La conjonctive palpébrale : épithélium cylindrique stratifié
Glande de Meibomius : glande tubuleuse contournée ramifiée</td></tr>
<tr><td>L'appareil cardio vasculaire</td><td>Les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les 4 cavités cardiaques sont tapissées avec un épithélium simple pavimenteux
Pour les vaisseaux sanguins on parle d'intima
Pour les cavités cardiaques on parle d'endocarde</td><td>Cellules endothéliales : présence de vimentine
JS
MB continue ou discontinue</td><td>  </td></tr>
<tr><td>Les mésothéliums</td><td colspan="3">Séreuse (= mésothélium + TC sous-jacent) recouvre les parois des cavités creuses : le péricarde, la plèvre, le péritoine
Cellules pavimenteuses sans MB avec vimentine Pas de JS
FI = vimentine (origine mésenchymateuse)</td></tr>
<tr><td>L'appareil urinaire

Transport des éléments entre l'urine et le sang :
- TCP
- anse de Henlé
- TCD</td><td>Appareil urinaire: épithélium stratifié transitionnel = urothélium
- uretère
- urètre masculin et féminin
- vessie

Urètre moyen chez l'homme et la femme : présence d'un épithélium cylindrique stratifié</td><td>Le néphron = élément constitutif du rein : absorption/réabsorption
 
TCP : simple cubique avec microvillosités en bordure
Anse grêle de Henlé : simple pavimenteux
Branche ascendante : cubique simple
TCD : simple cubique
Canal d'union : simple cubique
Tubes de Bellini = canaux collecteurs : simple prismatique</td><td> 
vessie vide (à gauche): 3 couches cellulaires
vessie pleine (à droite) : épithélium distendu

La couche supérieure présente des cellules arrondies parfois binucléées en forme de parapluie, présence de plaques membranaires rigides et épaisses hydrophobes = plaques d'uroplakines (protéines)
L'imperméabilité est assurée par des interdigitations des membranes entre les cellules
la couche intermédiaire présente des cellule polygonales en raquettes
la couche basale est cubique</td></tr>
</table>

Les parties encadrées en rouge concernent le cours 2 sur les épithéliums