QRU 1 : D'après vos connaissances générales en histologie, les étapes pour l'étude d'une coupe en paraffine en MO sont : (attention cette liste n'est pas forcément exhaustive) :

A. Une fixation au formol par perfusion veineuse chez le patient
B. L'échantillon fixé est déshydraté dans des bains d'alcool de degré décroissant
C. D'une immersion dans un bain de paraffine à 40°C
D. D'une coupe au microtome semi-automatique d'une épaisseur de 1 micron
E. Un dépôt sur des lames de verres pré-gélatinées

QRM 2 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la description morphologique d'une coupe en paraffine de tissu humain, les différents colorants possibles sont (attention cette liste n'est pas forcément exhaustive) :

A. Un anticorps marqué à un fluorochrome
B. Le HES qui permet de distinguer le tissu conjonctif du tissu épithélial
C. Le trichrome de Masson contenant notamment le rouge ponceau qui colore en vert le cytoplasme des cellules
D. L'éosine qui colore les noyaux cellulaires en violet
E. L'éosine est un colorant acide

QRM 3 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la coupe en congélation, vous pouvez dire que:

A. L'inclusion est réalisée par une inclusion des tissus, dans l'araldite
B. les coupes de 20 microns sont réalisées au cryostat
C. Les coupes au cryostat sont réalisées dans une enceinte à -20°C
D. La morphologie des coupes en congélation est meilleure que celle des coupes en résine
E. L'échantillon protégé par un cryoprotecteur est plongé dans l'isopentane

QRM 4 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la coupe en résine utilisée en MET, vous pouvez dire que :

A. Les coupes sont traversées par un faisceau d'électrons
B. L'épaisseur des coupes en résine est identique pour la ME et la MO
C. Les coupes pour la ME sont obtenues avec un ultra-microtome
D. Dans la demarche de fabrication d'une coupe destinée à la ME on doit employer à un moment un milieu d'inclusion comme la résine Epoxy
E. La résine est utilisée à 40°C

QRM 5 : D'après vos connaissances générales en histologie, les différents fixateurs disponibles pour une étude morphologique de tissu en microscopie optique sont :

A. L'éthanol ou le méthanol
B. Le formaldéhyde
C. Un mélange d'acide chlorhydrique et de formol appelé liquide de Bouin
D. La fixation est une étape indispensable, d'une durée fixe pour tout type d'échantillon et qui permet la précipitation des protéines de l'échantillon
E. L'araldite

QRM 7 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur les généralités sur les techniques, vous pouvez dire que :

A. La résolution en MO est de l'ordre de 2 microns
B. La résolution en ME, est de l'ordre de 0,2nm
C. L'analyse moléculaire in situ permet de marquer la présence de constituants biochimiques comme par exemple l'ensemble des glucides

D. La description morphologique des tissus ne se fait qu'en MO
E. La théorie cellulaire met en relief que les organes sont formés de tissus

QRM 8 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur les échantillons hospitaliers, vous pouvez dire que :

A. Les cellules en culture in vitro sont observées en MO inversée
B. Les cellules en culture in vitro sont placées soit dans des boites de pétri, soit dans des flacons de culture
C. Les cellules en culture in vitro sont maintenues dans une étuve à 37°C dont l'atmosphère est dépourvue de CO2
A. Les cultures ex vivo sont des cellules que l'on maintient en survie pour les réinjecter au patient
D. Dans les prélèvements cytologiques, on a les frottis cervico-vaginaux

QRM 9 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur les échantillons hospitaliers, vous pouvez dire que :

A. Les produits de brossage bronchique peuvent être étalés sur une lame et colorés avec le MGG
B. Les appositions permettent d'observer en MO, des cellules isolées restées collées sur la lame de verre après tamponnage d'une tranche de ganglion par exemple
C. Les cellules obtenues par apposition sont colorées avec un colorant de routine comme le PAS
D. La technique d'apposition entre dans la catégorie d'étude cytologiques
E. Les coupes de tissu permettent les études morphologiques ainsi que les études in situ

QRM 10 : D'après vos connaissances générales en histologie, les différents échantillons hospitaliers disponibles sont

A. Les cellules en culture in vitro
B. Les cellules d'une biopsie chirurgicale
C. Les cellules issues d'une apposition
D. Une coupe réalisée dans un tissu
E. Des cellules en suspension recueillies par brossage

QRM 13 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la description morphologique d'une coupe en paraffine de tissu humain, les différents colorants possibles sont (attention cette liste n'est pas forcément exhaustive) :

A. La résine
B. Le crésyl violet qui est particulièrement utilisé pour l'étude du cerveau
C. Le HES qui permet de distinguer le tissu conjonctif du tissu épithélial
D. Le trichrome de Masson contenant notamment le ponceau de xylidine qui colore en rose le cytoplasme des cellules
E. Le MGG qui permet de mettre en évidence les glucides de la membrane basale


QRM 14 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la recherche in situ d'une molécule sur une coupe de tissu humain, les différentes propositions suivantes correspondent à des caractéristiques du microscope à fluorescence :

A. La source lumineuse provient d'une lampe émettant des photons
B. La longueur d'onde d'excitation du fluorochrome doit être inférieure à celle émise par le fluorochrome
C. Les anticorps marqués par des fluorochromes sont surtout des IgM
D. Afin de repérer les noyaux des cellules en MO à fluorescence, on marque l'ADN par l'hématoxyline
E. Sur un microscope confocal à fluorescence les objectifs sont forcément inversés

QRM 16 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la coupe en résine vous pouvez dire que :

F. Les coupes semi-fines sont de 100nm
G. Le milieu d'inclusion est la résine Epoxy ou l'araldite
H. L'épaisseur des coupes en résine est identique pour la ME et la MO
I. Les coupes semi-fines sont déposées sur une lame de verre pré-gélatinées
J. Les coupes pour la ME sont obtenues avec un ultra-microtome

QRM 17 A partir de vos connaissances en histologie sur les techniques, vous pouvez reconnaitre ce document C ci-dessous et dire que :



Document C

A. On peut voir ici un canal coupé en coupe transversale
B. Les noyaux des cellules épithéliales sont probablement colorés au rouge Ponceau
C. La coupe est observée au ME
D. Le collagène du TC est mis en évidence au trichrome de Masson par le safran
E. La recherche d'une protéine particulière par immunohistologie est préférable sur une coupe en congélation