



Η μέθοδος της επανάληψης χρησιμοποιείται για την επίλυση της αναδρομικής σχέσης

$$T(n) = \begin{cases} \alpha T(n - b) + c, & n > n_0 \\ d, & n = n_0 \end{cases}$$

- Όταν το ζητάει ρητά η εκφώνηση
- Προσοχή:  $\alpha \neq 1$

1. Κάνουμε 3 εφαρμογές της αναδρομικής σχέσης (μέχρι να φτάσουμε στη μορφή:  $T(n) = \alpha^3 T(n - bk)$ ). Χρήσιμο το πρόχειρο

2. Εκτίμηση της σειράς που προκύπτει μετά από k επαναλήψεις (μας καθοδηγεί ο όρος:  $T(n - bk)$ )

3. Υπολογίζουμε πότε σταματάει η αναδρομή (Θέτουμε  $n - bk = n_0$  και λύνουμε ως προς k). Π.χ. αν  $n_0 = 0$ , τότε  $k = n/b$

4. Αντικατάσταση του k στον τύπο του βήματος 2

5. Υπολογισμός της σειράς που προκύπτει. Χρήσιμοι οι τύποι:  $\sum_{i=0}^n x^i = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$

Πρόχειρο:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(n - 2) + 4 \\ T(n - 2) &= 3T(n - 4) + 4 \\ T(n - 4) &= 3T(n - 6) + 4 \end{aligned}$$

Παράδειγμα: Να λύσετε την αναδρομή:

$$T(n) = \begin{cases} 3T(n - 2) + 4 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Λύση:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(n - 2) + 4 = 3[3T(n - 4) + 4] + 4 \\ &= 3^2 T(n - 4) + 3 \cdot 4 + 4 = 3^2 [3T(n - 6) + 4] + 3 \cdot 4 + 4 \\ &= 3^3 T(n - 6) + 3^2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 4 = \\ &= \dots = \\ &= 3^k T(n - 2k) + 3^{k-1} \cdot 4 + \dots + 3^2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 4 = \end{aligned}$$

Η αναδρομή σταματά όταν  $n - 2k = 0 \Rightarrow k = n/2$

$$\begin{aligned} &= 3^{\frac{n}{2}} T(0) + 3^{\frac{n}{2}-1} \cdot 4 + \dots + 3^2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 4 = \\ &= 3^{\frac{n}{2}} + 4 \left[ 3^{\frac{n}{2}-1} + \dots + 3^2 + 3 + 1 \right] = \\ &= 3^{\frac{n}{2}} + 4 \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}-1} 3^i = \\ &= 3^{\frac{n}{2}} + 4 \frac{3^{\frac{n}{2}} - 1}{3 - 1} = \\ &= 3^{\frac{n}{2}} + 2 \left[ 3^{\frac{n}{2}} - 1 \right] = \Theta \left( 3^{\frac{n}{2}} \right) \end{aligned}$$



Η μέθοδος της επανάληψης (κάνοντας άθροισμα κατά μέλη) χρησιμοποιείται για την επίλυση της αναδρομικής σχέσης

$$T(n) = \begin{cases} T(n - b) + f(n), & n > n_0 \\ c, & n = n_0 \end{cases}$$

1. Γράφουμε όλους τους αναδρομικούς όρους  $T(n)$ ,  $T(n-1)$ , ... μέχρι και την οριακή περίπτωση της αναδρομής

2. Προσθέτουμε τις εξισώσεις κατά μέλη

3. Υπολογισμός της σειράς που προκύπτει. Χρήσιμοι οι τύποι:  $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$   $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Παράδειγμα: Να λύσετε την αναδρομή:

$$T(n) = \begin{cases} T(n-1) + 3n & n > 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Λύση:

$$T(n) = T(n-1) + 3n$$

$$T(n-1) = T(n-2) + 3(n-1)$$

$$T(n-2) = T(n-3) + 3(n-2)$$

...

$$T(2) = T(1) + 3 \cdot 2$$

$$T(1) = T(0) + 3 \cdot 1$$

$$T(0) = 1 \quad (+)$$

$$T(n) = 3n + 3(n-1) + 3(n-2) + \dots + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1$$

$$= 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + \dots + 3(n-2) + 3(n-1) + 3n$$

$$= 1 + 3[1 + 2 + \dots + (n-2) + (n-1) + n]$$

$$= 1 + 3 \sum_{i=1}^n i = 1 + 3 \frac{n(n+1)}{2} =$$

$$= 1,5n^2 + 1,5n + 1$$



Λύση της αναδρομής:  $T(n) = T\left(\frac{n}{a}\right) + T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$

Υπολογίζουμε την ποσότητα  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

1. Αν  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} < 1$  τότε  $T(n) = \Theta(f(n))$  (δραστ.3.6)

2. Αν  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$  τότε  $T(n) = \Theta(f(n) \cdot \log n)$  (δραστ.3.6)

3. Αν  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > 1$  τότε η δραστηριότητα 3.6 έχει αποτύχει και πάμε υποχρεωτικά με δένδρο αναδρομής

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Να υπολογίσετε μια ασυμπτωτική εκτίμηση της

αναδρομής:  $T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2$

**Λύση:**  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12} < 1$  άρα από την

δραστ.3.6 ισχύει:  $T(n) = \Theta(n^2)$

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Να υπολογίσετε μια ασυμπτωτική εκτίμηση της

αναδρομής:  $T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + n$


**Λύση:**  $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$  άρα από την

δραστ.3.6 ισχύει:  $T(n) = \Theta(n \cdot \log n)$

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

$$T(n) = \begin{cases} T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & \alpha \nu n > 1 \\ 1, & \alpha \nu n = 1 \end{cases}$$

## Λύση:



Το ύψος του δένδρου είναι  $\log_2 n$  (αν  $c$  είναι ο μικρότερος από τους δύο παρονομαστές (δηλ.  $c = \min\{a, b\}$ ) έπεται ότι το ύψος του δένδρου είναι  $\log_c n$ .)

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{\log n} 5^i \frac{n}{6^i} = n \sum_{i=0}^{\log n} \frac{5^i}{6^i} = \\ &= n \sum_{i=0}^{\log n} \left(\frac{5}{6}\right)^i = n \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^{\log n+1} - 1}{\frac{5}{6} - 1} = \\ &= 6n \cdot (0,83)^{\log n+1} - 6n \end{aligned}$$