



Ορισμός: Ένα **Μη Κατευθυνόμενο Γράφημα** *G* είναι μία διατεταγμένη δυάδα (V, E) όπου:

- V είναι το σύνολο των κορυφών (ή κόμβων): $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$
- Ε είναι το σύνολο των ακμών (ή πλευρών ή τόξων): $E = \{e_1, e_2, ..., e_m\}$
 - Κάθε ακμή συνδέει δύο κορυφές, δηλαδή $e_k = [v_i, v_i]$ ή $e_k = \{v_i, v_i\}$ με $v_i, v_i \in V$ για κάθε k = 1, ..., m
 - Η ακμή θεωρείται μη διατεταγμένη (δηλαδή η ακμή $[v_i, v_i]$ είναι ίδια με την ακμή $[v_i, v_i]$), δεν υπάρχει κατεύθυνση).







Ορισμός: Ένα Κατευθυνόμενο Γράφημα G είναι μία διατεταγμένη δυάδα (V, E) όπου:

- V είναι το σύνολο των κορυφών (ή κόμβων): $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$
- Ε είναι το σύνολο των ακμών (ή πλευρών ή τόξων): $E = \{e_1, e_2, ..., e_m\}$
 - Κάθε ακμή συνδέει δύο κορυφές, δηλαδή $e_k = (v_i, v_j)$ ή $e_k = < v_i, v_j > \mu \epsilon \ v_i, v_j \in V$ για κάθε $k = 1, \dots, m$
 - Η ακμή θεωρείται διατεταγμένη (δηλαδή η ακμή (v_i, v_i) είναι διαφορετική από την ακμή (v_i, v_i) , υπάρχει κατεύθυνση). Η κορυφή v_i καλείται αρχή τη ακμής και η κορυφή v_i λέγεται πέρας της ακμής.

Παράδειγμα:
$$G = (V, E)$$
 όπου: $V = \{v_1, v_2, v_3\}$ $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_3, v_2)\}$







Ορισμός:

Μονοπάτι P μήκους n από μία κορυφή v_0 σε μία κορυφή v_n είναι

- μια ακολουθία η ακμών (ακολουθώντας τις τυχόν κατευθύνσεις τους)
- (άρα n+1 κορυφών)

που ξεκινά από την κορυφή v_0 και καταλήγει στην v_n

Απλό μονοπάτι είναι ένα μονοπάτι χωρίς επαναλαμβανόμενες κορυφές (λέγεται και μονοκονδυλιά)


Παράδειγμα:

Μονοπάτι (που δεν είναι απλό):

$$v_1 - v_4 - v_5 - v_6 - v_4 - v_3$$

Μονοπάτι (που είναι απλό):

$$v_1 - v_7 - v_4 - v_5 - v_6$$



Ορισμός:

Κύκλος είναι ένα μονοπάτι χωρίς επαναλαμβανόμενες ακμές που αρχίζει και τελειώνει στην ίδια κορυφή

- Επιτρέπεται να περάσουμε από την ίδια κορυφή.
- Δεν επιτρέπεται να περάσουμε από την ίδια ακμή.

Απλός Κύκλος είναι ένας κύκλος χωρίς επαναλαμβανόμενες κορυφές

- Δεν επιτρέπεται να περάσουμε από την ίδια κορυφή
- Δεν επιτρέπεται να περάσουμε από την ίδια ακμή


Παράδειγμα:

Κύκλος (που δεν είναι απλός):

$$v_1 - v_7 - v_4 - v_5 - v_6 - v_4 - v_1$$

Κύκλος (που είναι απλός):

$$v_1 - v_7 - v_4 - v_1$$





Ορισμός: Πλήρες γράφημα ή κλίκα η κορυφών (συμβολισμός K_n)

Είναι απλό γράφημα G=(V,E) με η κορυφές που περιέχει όλες τις δυνατές ακμές.


Τυπικά:


Για κάθε $v_i, v_i \in V$ με $i \neq j$ η ακμή $[v_i, v_i] \in E$


Σημαντικό:

Η κλίκα η κορυφών έχει n(n-1)/2 ακμές. (Είναι οι συνδυασμοί των η κορυφών ανά 2)

Οι 5 πρώτες κλίκες είναι οι εξής:









Ορισμός: Συνδεόμενο (ή συνδεδεμένο ή συνεκτικό) θα καλείται ένα Μ.Κ.Γ. που

Οποιεσδήποτε δύο διαφορετικές κορυφές συνδέονται με τουλάχιστον ένα μονοπάτι.

Τυπικά:

Για κάθε $v_i, v_i \in V$ με $i \neq j$ υπάρχει μονοπάτι από την v_i στην v_i

Ορισμός: Αν ένα γράφημα είναι μη συνδεόμενο:


Κάθε μεγιστοτικό (ως προς τις κορυφές) συνδεόμενο υπογράφημά του λέγεται συνεκτική συνιστώσα ή ασύνδετο τμήμα

Πρακτικά, συνεκτική συνιστώσα είναι ένα «κομμάτι» του γραφήματος που μπορούμε να μεταβούμε (μέσω μονοπατιού) από κάθε κορυφή σε κάθε άλλη.


Γενικά ένα γράφημα θα είναι:


- Είτε συνδεόμενο, οπότε θα αποτελείται από 1 συνεκτική συνιστώσα.
- Είτε μη συνδεόμενο (οπότε θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 συνεκτικές συνιστώσες)


Αν σε μια εκφώνηση συναντήσουμε μη συνδεόμενο γράφημα στο θα πρέπει να οραματιζόμαστε τουλάχιστον 2 συνεκτικές συνιστώσες που η κάθε μία είναι ένα συνδεόμενο υπογράφημα του αρχικού γραφήματος:



Παραδείγματα μη συνδεόμενων γραφημάτων:









Έστω συνδεόμενο γράφημα:

Ορισμός: Κάθε κορυφή, που αν αφαιρεθεί (μαζί με τις ακμές της) κάνει το γράφημα μη συνδεόμενο λέγεται σημείο κοπής ή σημείο άρθρωσης

Ορισμός: Κάθε ακμή, που αν αφαιρεθεί κάνει το γράφημα μη συνδεόμενο λέγεται <u>γέφυρα</u> ή <u>ακμή</u> τομής


Παράδειγμα:

Σημεία Κοπής:

 v_3, v_5

Γέφυρα:

 $[v_3 - v_5]$





Ορισμός: Έστω ένα απλό γράφημα G = (V, E). Συμπλήρωμα του G, καλείτει το γράφημα $\overline{G} = (\overline{V}, \overline{E})$. που

- Έχει τις ίδιες κορυφές με το G
- Έχει ως ακμές αυτές που δεν περιέχονται στο G.


Τυπικά:

Ισχύει $\overline{V} = V$ και $e \in \overline{E}$ αν και μόνο αν $e \notin E$

Σημαντικό:

 $|\mathbf{E}| + |\overline{\mathbf{E}}| = n(n-1)/2$

Παράδειγμα:





- **Ορισμός:** Έστω ένα γράφημα G = (V, E). Υπογράφημα του G, καλείτει το γράφημα G' = (V', E'). που
- Περιέχει κάποιες κορυφές του G (1...όλες)
- Περιέχει κάποιες ακμές του G που συνδέεουν αυτές τις κορυφές

Τυπικά:

- Ισχύει $V'\subseteq V$ και $E'\subseteq E$ και για κάθε $[v_i,v_i]\in E'$ ισχύει ότι $v_i,v_i\in V'$
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται στο υπογράφημα να έχουμε ακμή που δεν ανήκει στο αρχικό γράφημα
- **Ορισμός:** Έστω ένα γράφημα G = (V, E). **Επαγόμενο Υπογράφημα** του G, καλείτει το γράφημα G' = (V', E'):
- Περιέχει κάποιες κορυφές του G (1...όλες)
- Περιέχει ΟΛΕΣ τις ακμές του G που συνδέεουν αυτές τις κορυφές

Τυπικά:

- Ισχύει $V'\subseteq V$ και $E'\subseteq E$ και για κάθε $[v_i,v_j]\in E$ με $v_i,v_j\in V'$ ισχύει $[v_i,v_j]\in E'$
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται στο επαγόμενο υπογράφημα να μην έχουμε όλες τις ακμές των κορυφών που έχουμε επιλέξει

