ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ

ANAΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ www.psounis.gr



Παράδειγμα: Υπολογίστε ασυμπτωτικά άνω και κάτω φραγματα του αθροίσματος:

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n} \log i$$

Υπολογισμός Άνω Φράγματος: Εκτιμούμε από ποια ποσότητα είναι πάντα μικρότερος ο όρος του αθροίσματος

Άνω Φράγμα: (αφού ισχύει ότι $\log i \le \log n$ για κάθε i = 1, ..., n)

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n} \log i \le \sum_{i=1}^{n} \log n = \log n \sum_{i=1}^{n} 1 = \log n (n - 1 + 1) = n \log n = \Theta(n \log n)$$

Συνεπώς $T(n) = O(n \log n)$

Υπολογισμός Κάτω Φράγματος: Εκτιμούμε από ποια ποσότητα είναι πάντα μεγαλύτερος ο όρος του αθροίσματος. Στην άσκηση αυτή έχουμε και μία αρκετά έξυπνη ιδέα!

Κάτω Φράγμα:

$$\begin{split} T(n) &= \sum_{i=1}^n \log i \geq \sum_{i=\frac{n}{2}}^n \log i \geq \sum_{i=\frac{n}{2}}^n \log \frac{n}{2} = \log \frac{n}{2} \sum_{i=\frac{n}{2}}^n 1 = \log \frac{n}{2} \sum_{i=\frac{n}{2}}^n 1 = (\log n - \log 2) \left(n - \frac{n}{2} + 1\right) = (\log n - 1) \left(\frac{n}{2} + 1\right) = \\ &= \frac{n}{2} \log n - \frac{n}{2} + \log n - 1 = \Theta(n \log n) \end{split}$$

Συνεπώς $T(n) = \Omega(n \log n)$

Αν το άνω και το κάτω φράγμα είναι ίδια τότε ισχύει και το Θ(.) του κοινού φράγματος. Αλλιώς ισχύουν τα φράγματα της συνάρτησης πολυπλοκότητας που έχουμε υπολογίσει

Συνεπώς αφού $T(n) = O(n\log n)$ και $T(n) = \Omega(n\log n)$ ισχύει ότι: $T(n) = \Theta(n\log n)$