

# Analysis I, Blatt 4

Gruppe 11

Lorenz Bung (Matr.-Nr. 5113060)

lorenz.bung@students.uni-freiburg.de

Charlotte Rothhaar (Matr.-Nr. 4315016)

charlotte.rothhaar97@gmail.com

2. Dezember 2020

## Aufgabe 13

(i) **Ansatz:**  $a_n = \frac{f_{n+1}}{f_n} \Rightarrow f_{n+1} = f_n \cdot a_n$  und  $a_{n-1} = \frac{f_n}{f_{n-1}} \Rightarrow f_n = f_{n-1} \cdot a_{n-1}$

Damit erhalten wir

$$a_{n+1} = \frac{f_{n+2}}{f_{n+1}} = \frac{a_{n+1} \cdot f_{n+1}}{a_n \cdot a_{n-1} \cdot f_{n-1}} = \frac{f_{n+2}}{a_n \cdot a_{n-1} \cdot \dots \cdot a_0}$$

(ii) Wir führen einen Beweis durch vollständige Induktion.

**Induktionsbehauptung:**  $1 \leq a_n \leq 2 \forall n \in \mathbb{N}$ .

**Induktionsanfang** ( $n = 0$ ):  $1 \leq a_0 = \frac{f_1}{f_0} = \frac{1}{1} = 1 \leq 2$ .

**Induktionsschritt** ( $n \Rightarrow n+1$ ):

$$\begin{aligned}
 1 &\leq a_n = \frac{f_{n+1}}{f_n} \leq 2 \\
 \Rightarrow 1 &\geq \frac{f_n}{f_{n+1}} \geq \frac{1}{2} \\
 \Rightarrow 2 &\geq 1 + \frac{f_n}{f_{n+1}} \geq \frac{3}{2} \\
 \Rightarrow 2 &\geq \frac{f_{n+1}}{f_{n+1}} + \frac{f_n}{f_{n+1}} = \frac{f_{n+1} + f_n}{f_{n+1}} \geq \frac{3}{2} \\
 \stackrel{(\text{Def. von } f_n)}{\Rightarrow} 2 &\geq \frac{f_{n+2}}{f_{n+1}} = \frac{f_{n+1+1}}{f_{n+1}} \geq \frac{3}{2} \\
 \Rightarrow 2 &\geq a_{n+1} \geq \frac{3}{2} > 1.
 \end{aligned}$$

Damit ist  $1 \leq a_n \leq 2 \forall n \in \mathbb{N}$ .

□

(iii) **Behauptung:**  $(a_{2n})_{n \in \mathbb{N}} := \frac{f_{2n+1}}{f_{2n}}$  ist monoton wachsend.

**Beweis:** zu zeigen:  $a_{2(n+1)} \geq a_{2n}$ .

Aus der Definition unserer Folge  $(a_n)_n$  ergibt sich

$$\begin{aligned}
 a_{2(n+1)} &= a_{2n+2} \geq a_{2n} \\
 \frac{f_{2n+3}}{f_{2n+2}} &= \frac{f_{2n+2} + f_{2n+1}}{f_{2n+1} + f_{2n}} \geq \frac{f_{2n+1}}{f_{2n}} = \frac{2f_{2n+1}}{f_{2n} + f_{2n+1}} \\
 \frac{f_{2n+2} - f_{2n+1}}{f_{2n+1} + f_{2n}} &\geq 0.
 \end{aligned}$$

Wegen  $f_{2n+2} \geq f_{2n+1}$  ist der Nenner dieses Bruches immer positiv, und damit  $\frac{f_{2n+2} - f_{2n+1}}{f_{2n+1} + f_{2n}} \geq 0$ .

Somit ist  $(a_{2n})_n$  monoton wachsend.

□

(iv) **Behauptung:** Ja,  $(a_n)_n$  konvergiert mit Grenzwert  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ .

**Beweis:** Nach der Formel von Moivre-Binet ist

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\Phi^n - \bar{\Phi}^n), \quad \Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \bar{\Phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Daher ist

$$\begin{aligned}
 a_n = \frac{f_{n+1}}{f_n} &= \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} (\Phi^{n+1} - \overline{\Phi}^{n+1})}{\frac{1}{\sqrt{5}} (\Phi^n - \overline{\Phi}^n)} \\
 &= \frac{\Phi^{n+1} - \overline{\Phi}^{n+1}}{\Phi^n - \overline{\Phi}^n} = \frac{\Phi^n \left( \Phi - \frac{\overline{\Phi}^{n+1}}{\Phi^n} \right)}{\Phi^n \left( 1 - \frac{\overline{\Phi}^n}{\Phi^n} \right)} \\
 &= \frac{\Phi - \frac{\overline{\Phi}^{n+1}}{\Phi^n}}{1 - \frac{\overline{\Phi}^n}{\Phi^n}}
 \end{aligned}$$

und damit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Phi - \frac{\overline{\Phi}^{n+1}}{\Phi^n}}{1 - \frac{\overline{\Phi}^n}{\Phi^n}} = \frac{\Phi}{1} = \Phi.$$

□

## Aufgabe 14

- (i) Aufgrund der Eigenschaft  $i^2 = -1$  ergeben sich vier Lösungen, die sich in Abhängigkeit von  $n$  wiederholen:

$$i^n = \begin{cases} 1 & n = 0 \pmod{4} \\ i & n = 1 \pmod{4} \\ -1 & n = 2 \pmod{4} \\ -i & n = 3 \pmod{4} \end{cases}, \quad n \in \mathbb{N}$$

- (ii) Durch Erweitern des Bruches mit  $\overline{3+2i} = 3-2i$  erhält man

$$\frac{1+i}{3+2i} = \frac{(1+i)(3-2i)}{(3+2i)(3-2i)} = \frac{3+2-2i+3i}{9+4-6i+6i} = \frac{5+i}{13} = \frac{5}{13} + \frac{1}{13}i$$

und damit die Werte  $\frac{5}{13}$  für  $a$  und  $\frac{1}{13}$  für  $b$ .

- (iii) Die quadratische Gleichung  $x^2 + px + q = 0$ ,  $p, q \in \mathbb{R}$  hat höchstens zwei reelle Lösungen.

**1. Fall:** Diskriminante  $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q > 0 \Rightarrow 2$  reelle Lösungen

**2. Fall:** Diskriminante  $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = 0 \Rightarrow 1$  reelle Lösung

**3. Fall:** Diskriminante  $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q < 0 \Rightarrow$  keine reelle Lösung.

Im 3. Fall existieren zwei komplexe Lösungen für die Gleichung.

(iv) Gleichungen vom Grad 3 haben in  $\mathbb{C}$  3 Lösungen.

**1. Lösung:**  $x^3 = e^{0 \cdot i} \Rightarrow x = e^{\frac{1}{3} \cdot 0 \cdot i} = 1$

**2. Lösung:**  $x^3 = e^{2\pi i} \Rightarrow x = e^{\frac{2}{3}\pi i}$  ( $\frac{2}{3}\pi$  im Bogenmaß entspricht  $120^\circ$ )

**3. Lösung:**  $x^3 = e^{4\pi i} \Rightarrow x = e^{\frac{4}{3}\pi i}$  ( $\frac{4}{3}\pi$  im Bogenmaß entspricht  $240^\circ$ )




Abbildung 1

(v) Ähnlich zu Aufgabenteil (i) wiederholen sich die Lösungen in Abhängigkeit von  $n$ :

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n = \begin{cases} 0 & n = 0 \mod 8 \\ \frac{1+i}{\sqrt{2}} & n = 1 \mod 8 \\ i & n = 2 \mod 8 \\ \frac{i-1}{\sqrt{2}} & n = 3 \mod 8 \\ -1 & n = 4 \mod 8 \\ \frac{-1-i}{\sqrt{2}} & n = 5 \mod 8 \\ -i & n = 6 \mod 8 \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & n = 7 \mod 8 \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

Diese lassen sich in einem Koordinatensystem im  $\mathbb{R}^2$  darstellen, wobei die x-Achse den Realteil repräsentiert und die y-Achse den Imaginärteil:




Abbildung 2

## Aufgabe 15

- (i) zu zeigen:  $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k-1})$  ist konvergent  $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)_n$  existiert in  $\mathbb{R}$ .

**Beweis:** " $\Leftarrow$ "

Sei  $(a_n)_n$  eine reelle Folge, die konvergiert. Dann ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a$  und ferner  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0$ .

Daraus folgt für die Reihe, dass  $(a_k - a_{k-1}) \rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$ . Wenn die Summanden der Reihe gegen 0 gehen, konvergiert die Reihe gegen einen Grenzwert  $a$  mit

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) &= (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= (a_{n-1} - a_{n-2}) + (a_n - a_{n-1}) \\ &= (a_n - a_0) \\ \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k-1}) &= a - a_0. \end{aligned}$$

- (ii) Mithilfe von Partialbruchzerlegung ergibt sich

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1+k-k}{k(k+1)} = \frac{1+k}{k(k+1)} - \frac{k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

und damit  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ .

Aus Teilaufgabe (i) wissen wir, dass  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k - a_{k+1} = a_n - a_0$  und damit

analog  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a}$ .

Wegen  $\frac{1}{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$  ist somit

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - 0 = 1.$$

$\frac{2}{k^2-1}$  hat Nullstellen bei  $k_1 = 1$  und  $k_2 = -1$ . Auch hier kann man den Bruch nun mithilfe der Partialbruchzerlegung aufteilen in

$$\frac{2}{k^2-1} = \frac{2}{(k+1)(k-1)} = \frac{\alpha}{k+1} + \frac{\beta}{k-1}.$$

Es ergibt sich

$$\frac{\alpha(k-1) + \beta(k+1)}{(k+1)(k-1)} \Rightarrow 2 = \alpha(k-1) + \beta(k+1)$$

und somit  $\beta = 1$  für  $k = 1$  bzw.  $\alpha = -1$  für  $k = -1$ .

Insgesamt haben wir also

$$\frac{2}{k^2-1} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}$$

und damit

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2}{k^2-1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}.$$

Wegen  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$  folgt  $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2}{k^2-1} = 1 - 0 = 1$ .

□

(iii)

## Aufgabe 16

- (i) Da sich die Länge der Intervalle in jedem Schritt um  $\frac{1}{3}$  verringert, lässt sich  $s_n$  darstellen als

$$\begin{aligned} (s_n)_n &= \sum_{i=0}^n M_i = M_0 + M_1 + M_2 + \cdots + M_n \\ &= 1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^n = \sum_{i=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^i. \end{aligned}$$

$(s_n)_n$  ist eine geometrische Reihe, da sie der Form  $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$  entspricht.

Aus  $|q| = \left|\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3} < 1$  folgt, dass der Grenzwert die Form  $\frac{q^m}{1-q}$  hat.

Daher ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^0}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$ . Somit konvergiert die Reihe  $(s_n)_n$  gegen den Grenzwert 3.

□

- (ii) (a) Da das mittlere Drittel der Dreiecksseite bei jedem Schritt durch ein doppelt so langes Stück ersetzt wird, wächst die Seitenlänge des Dreiecks pro Schritt um  $\frac{4}{3}$ .

Für den  $n$ -ten Schritt ergibt sich so ein Umfang von  $l_n = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n$ .

Es ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{l_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ , da es sich um eine geometrische Folge handelt und damit  $\lim_{n \rightarrow \infty} l_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{l_n}} = \infty$ .

- (b) Zu Beginn hat das Dreieck einen Flächeninhalt von  $A_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}$ , da es sich um ein gleichseitiges Dreieck handelt. Dieser Flächeninhalt wird nun im ersten Schritt um drei Dreiecke erweitert, im zweiten Schritt um  $3 \cdot 4 = 12$  Dreiecke und im  $n$ -ten Schritt um  $3 \cdot 4^n$  Dreiecke.

Der Flächeninhalt der hinzugefügten Dreiecke beträgt dabei im ersten Schritt jeweils  $\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^2$ , im zweiten Schritt dann nur noch  $\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right)^2$  und im  $n$ -ten Schritt noch  $\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{9}\right)^n$ .

Damit ergibt sich pro Schritt ein Flächeninhalt von

$$A_n - A_{n-1} = 3 \cdot 4^n \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{9}\right)^n = 3 \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{4}{9}\right)^n.$$

Der gesamte Flächeninhalt lässt sich nun also darstellen als

$$A_n = A_0 + \sum_{i=1}^n A_i - A_{i-1} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \sum_{i=1}^n 3 \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{4}{9}\right)^i.$$

Dieser Flächeninhalt konvergiert für  $n \rightarrow \infty$ , denn

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} A_n &= \frac{\sqrt{3}}{4} + \sum_{i=1}^{\infty} 3 \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{4}{9}\right)^i \\ &= -2 \frac{\sqrt{3}}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^i 3 \frac{\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

und das ist bereits eine geometrische Reihe, welche konvergiert. Somit konvergiert auch die gesamte Summe.

□