

0.1 Torsione

Introduciamo ora un concetto fondamentale nello studio degli R -moduli.

Definizione

Sia R un anello e sia M un R -modulo sinistro. Un elemento $m \in M$ si dice elemento di torsione se esiste almeno un $r \in R \setminus \{0_R\}$ tale che $r \cdot m = 0_M$. Un R -modulo sinistro si dice modulo di torsione se ogni suo elemento è di torsione.

Denotiamo con $\text{tor}_R(M)$ l'insieme degli elementi di torsione di M . Allora, è evidente che $m \in M$ è di torsione se e solo se $m \in \text{tor}(M)$, e M è di torsione se e solo se $M = \text{tor}(M)$.

Esempio. Aggiungere esempio con \mathbb{Z} e \mathbb{Q} dall'esame di settembre.

Proposizione 3.2.1

Sia R un dominio di integrità e sia M un R -modulo sinistro. Allora, $\text{tor}(M)$ è un R -sottomodulo di M .

Dimostrazione. Siano $m, n \in \text{tor}(M)$ e sia $r \in R$. Allora, esistono $s_m, s_n \in R \setminus \{0_R\}$ tali che $s_m \cdot m = 0_M$ e $s_n \cdot n = 0_M$. Poiché R è un dominio di integrità, $s_m \cdot s_n \neq 0_R$. Dunque, $s_m \cdot s_n \cdot (m + n) = s_n \cdot (s_m \cdot m) + s_m \cdot (s_n \cdot n) = 0_M$ per la distributività destra, da cui $m + n \in \text{tor}(M)$. Inoltre, $s_m \cdot (r \cdot m) = r \cdot (s_m \cdot m) = r \cdot 0_M = 0_M$, dunque $r \cdot m \in \text{tor}(M)$. ■

Definizione

Sia R un dominio di integrità, M un R -modulo sinistro e sia $A \subseteq M$ un R -sottomodulo di M . Definiamo saturazione di A in M l'insieme $\text{sat}_M(A)$ degli elementi $m \in M$ tali che esiste $r \in R \setminus \{0_R\}$ con $r \cdot m \in A$.

Proposizione 3.2.2

Sia R un dominio di integrità, M un R -modulo sinistro e sia $A \subseteq M$ un R -sottomodulo di M . Allora,

- (a) $\text{sat}_M(A) \subseteq M$ è un R -sottomodulo di M ;
- (b) $\text{tor}(M) = \text{sat}_M(\{0_R\})$;
- (c) $\text{tor}(M/A) = \text{sat}_M(A)/A$.

Dimostrazione. (a) Siano $m, n \in \text{sat}_M(A)$ e sia $r \in R$. Allora, esistono $s_m, s_n \in R \setminus \{0_R\}$ tali che $s_m \cdot m \in A$ e $s_n \cdot n \in A$. Poiché R è un dominio di integrità, $s_m \cdot s_n \neq 0_R$. Dunque, $s_m \cdot s_n \cdot (m + n) = s_n \cdot (s_m \cdot m) + s_m \cdot (s_n \cdot n) \in A$ poiché somma di elementi di A , da cui $m + n \in \text{sat}_M(A)$. Inoltre, $s_m \cdot (r \cdot m) = r \cdot (s_m \cdot m) \in A$ essendo $s_m \cdot m \in A$.

(b) Ovvio per definizione

(c) Per definizione, $\text{tor}(M/A) = \{m + A : \exists r \in R \setminus \{0_R\} : r \cdot (m + A) = 0_{M/A}\}$. Poiché $r \cdot (m + A) = r \cdot m + A = 0_{M/A} = A$ se e solo se $r \cdot m \in A$, si ha $\text{tor}(M/A) = \{m + A : \exists r \in R \setminus \{0_R\} : r \cdot m \in A\} = \{m + A : m \in \text{sat}_M(A)\} = \text{sat}_M(A)/A$. ■

Definizione

Sia R un anello, M un R -modulo sinistro e sia $m \in M$. Allora, si dice annullatore di m in R l'insieme $\text{Ann}_R(m) = \{r \in R : r \cdot m = 0_M\}$.

Osserviamo che m è di torsione se e solo se $\text{Ann}_R(m) \neq \{0_R\}$. Chiaramente, si intende che

$$\text{Ann}_R(M) = \{r \in R : r \cdot m = 0_M \ \forall m \in M\} = \bigcap_{m \in M} \text{Ann}_R(m)$$

e tale insieme si dice annullatore globale di M in R . Si osservi che $\text{Ann}_R(M) \subseteq \text{Ann}_R(m)$ per ogni $m \in M$ e che $\text{Ann}_R(M) \triangleleft R$ (andrebbe dimostrato).

Aggiungere esempi, aggiungere dimostrazione del $\text{sat}(\text{sat}(A))$ usata più avanti, commenti.

Proposizione 3.2.3

Sia A uno \mathbb{Z} -modulo finitamente generato. Allora, sono equivalenti:

- (i) A è di torsione;
- (ii) $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(A) \neq \{0\}$;
- (iii) $|A| < \infty$.

Dimostrazione. Poiché A è finitamente generato, siano $a_1, \dots, a_n \in A$ tali che $A = \sum_{i=1}^n \mathbb{Z} \cdot a_i$.

(i) \Rightarrow (ii) Essendo A di torsione, in particolare anche $a_1, \dots, a_n \in \text{tor}_{\mathbb{Z}}(A)$, quindi esistono $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tali che $k_i \cdot a_i = 0_A$. Sia $m = \text{mcm}(k_1, \dots, k_n) \neq 0$ e sia $a \in A$. Allora, esistono $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{Z}$ tali che $a = \sum_{i=1}^n z_i \cdot a_i$, e

$$m \cdot a = \sum_{i=1}^n m z_i \cdot a_i = \sum_{i=1}^n z_i \cdot (m \cdot a_i) = 0_A$$

perché $m \cdot a_i = 0_A$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Dunque $m \in \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a)$, e per l'arbitrarietà di a si ha che $m \in \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(A)$, cioè $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(A) \neq \{0\}$.

(ii) \Rightarrow (iii) Sia $\phi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$ la mappa definita come $\phi(z_1, \dots, z_n) = \sum_{i=1}^n z_i \cdot a_i$. Poiché ϕ è un omomorfismo suriettivo,¹ per il *Primo teorema d'isomorfismo* si ha che $\mathbb{Z}^n / \ker(\phi) \simeq A$. D'altra parte, $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_1) \times \dots \times \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_n) \subseteq \ker(\phi)$, dunque

$$|A| = |\mathbb{Z}^n / \ker(\phi)| \leq \left| \mathbb{Z}^n / \bigoplus_{i=1}^n \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_i) \right| = \left| \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_i) \right|. ²$$

Poiché $\{0\} \neq \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(A) \subseteq \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_i) \triangleleft \mathbb{Z}$, siano $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ con $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_i) = k_i \mathbb{Z}$.³ Allora,

$$|A| \leq \left| \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_i) \right| = k_1 \cdot \dots \cdot k_n < \infty.$$

(iii) \Rightarrow (i) Sia $a \in A$ e sia $\phi_a: \mathbb{Z} \rightarrow A$ la mappa definita come $\phi_a(z) = z \cdot a$. Poiché ϕ_a è un omomorfismo di \mathbb{Z} -moduli e $\mathbb{Z} / \ker(\phi_a) \simeq A$ per il *Primo teorema d'isomorfismo*, essendo $|\mathbb{Z}| = \infty$ e $|A| < \infty$, per il *Principio dei cassettei* deve essere $\ker(\phi_a) \neq \{0\}$. Dunque $\ker(\phi_a) = \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a) \neq \{0\}$, cioè a è un elemento di torsione, e per l'arbitrarietà di a concludiamo che $\text{tor}_{\mathbb{Z}}(A) = A$, da cui A è di torsione. ■

Aggiungere da qualche parte la dimostrazione dell'isomorfismo citato nel punto 2. A questo punto però tanto vale usare la stessa strategia della proposizione seguente, cioè definire $\phi: \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / k_i \mathbb{Z} \rightarrow A$ la mappa $\phi(z_1 + k_1 \mathbb{Z}, \dots, z_n + k_n \mathbb{Z}) = \sum_{i=1}^n z_i \cdot a_i$ e ragionando come sotto

mostrare che è ben posto, suriettivo, e quindi $|A| \leq \left| \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / k_i \mathbb{Z} \right| = k_1 \cdot \dots \cdot k_n < \infty$.

¹Che ϕ sia un omomorfismo è evidente; la suriettività segue dal fatto che A è generato da a_1, \dots, a_n , quindi per ogni $a \in A$ esistono $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{Z}$ tali che $a = \sum_{i=1}^n z_i \cdot a_i$.

²La disuguaglianza segue dal fatto che $|\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_1) \times \dots \times \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(a_n)| \leq |\ker(\phi)|$, e l'uguaglianza perché tali anelli sono isomorfi. Andrebbe spiegato meglio, di fatto dice che ad esempio $\mathbb{Z}^2 / \langle (2, 3) \rangle \simeq \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / 3\mathbb{Z}$.

³Infatti, essendo \mathbb{Z} un PID, i suoi ideali sono tutti e soli quelli della forma $k\mathbb{Z}$ al variare di $k \in \mathbb{Z}$.

Vale una proposizione simile alla precedente anche nel caso dei $\mathbb{K}[x]$ -moduli.

Proposizione 3.2.4

Sia \mathbb{K} un campo e sia M un $\mathbb{K}[x]$ -modulo sinistro finitamente generato. Allora, sono equivalenti:

- (i) M è di torsione;
- (ii) $\text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(M) \neq \{0_{\mathbb{K}}\}$;
- (iii) $\dim_{\mathbb{K}}(M) < \infty$.

Dimostrazione. Per ipotesi, esistono $m_1, \dots, m_n \in M$ tali che $M = \sum_{i=1}^n \mathbb{K}[x] \cdot m_i$.

(i) \Rightarrow (ii) Essendo M di torsione, anche $m_1, \dots, m_n \in \text{tor}_{\mathbb{K}[x]}(M)$, quindi esistono polinomi $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$ tali che $f_i \cdot m_i = 0_M$. Sia $g = \text{mcm}(f_1, \dots, f_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$ e sia $m \in M$.

Allora, esistono $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{K}[x]$ tali che $m = \sum_{i=1}^n q_i \cdot m_i$, e

$$g \cdot m = \sum_{i=1}^n (g \cdot q_i) \cdot m_i = \sum_{i=1}^n q_i \cdot (g \cdot m_i) = 0_M$$

perché $g \cdot m_i = 0_M$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Dunque $g \in \text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(m)$, e per l'arbitrarietà di m si ha che $g \in \text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(M)$, cioè $\text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(M) \neq \{0_{\mathbb{K}}\}$.

(ii) \Rightarrow (iii) Poiché $\{0_{\mathbb{K}}\} \neq \text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(M) \subseteq \text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(m_i) \triangleleft \mathbb{K}[x]$, sappiamo che esistono dei polinomi $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$ tali che $\text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(m_i) = \langle f_i \rangle$.⁴ Sia $\phi: \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{K}[x]/\langle f_i \rangle \rightarrow M$ la

mappa definita come $\phi(q_1 + \langle f_1 \rangle, \dots, q_n + \langle f_n \rangle) = \sum_{i=1}^n q_i \cdot m_i$. Poiché ϕ è un omomorfismo di $\mathbb{K}[x]$ -moduli suriettivo,⁵ essendo $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}[x]/\langle f_i \rangle) = \deg^*(f_i)$ concludiamo che

$$\dim_{\mathbb{K}}(M) \leq \dim_{\mathbb{K}}\left(\bigoplus_{i=1}^n \mathbb{K}[x]/\langle f_i \rangle\right) = \prod_{i=1}^n \deg^*(f_i) < \infty.$$

(iii) \Rightarrow (i) Sia $m \in M$ e sia $\phi_m: \mathbb{K}[x] \rightarrow M$ la mappa definita come $\phi_m(f) = f \cdot m$. Poiché ϕ_m è un omomorfismo di $\mathbb{K}[x]$ -moduli e per il *Primo teorema d'isomorfismo* vale $\mathbb{K}[x]/\ker(\phi_m) \simeq M$, essendo $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}[x]) = \infty$ e $\dim_{\mathbb{K}}(M) < \infty$, deve essere $\ker(\phi_m) \neq \{0_{\mathbb{K}}\}$. Dunque $\ker(\phi_m) = \text{Ann}_{\mathbb{K}[x]}(m) \neq \{0_{\mathbb{K}}\}$, cioè m è un elemento di torsione, e per l'arbitrarietà di m concludiamo che $\text{tor}_{\mathbb{K}[x]}(M) = M$, da cui M è di torsione. ■

Aggiungere qualche commento e spostare l'osservazione finale (vedi foto) nel capitolo sugli endomorfismi. Qualche esempio pratico? Se mi viene in mente lo aggiungo.

⁴ Infatti, essendo $\mathbb{K}[x]$ un PID, i suoi ideali sono tutti e soli quelli della forma $\langle f \rangle$ al variare di $f \in \mathbb{K}[x]$.

⁵ Andrebbe dimostrato che ϕ è ben posto, il che segue dall'aver scelto come f_i i generatori degli annullatori e ragionando componente per componente: se $q_i + \langle f_i \rangle = r_i + \langle f_i \rangle$, allora $q_i = r_i + h f_i$ per un certo $h \in \mathbb{K}[x]$, e la restrizione di ϕ alla i -esima componente è $\phi_i(q_i) = (r_i + h f_i) \cdot m_i = r_i \cdot m_i + h f_i \cdot m_i = r_i \cdot m_i = \phi_i(r_i)$. La suriettività invece risulta evidente dalla definizione.