

# Análisis Funcional

## Examen VII

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Análisis Funcional

## Examen VII

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Granada, 2025

**Asignatura** Análisis Funcional.

**Curso Académico** Desconocido.

**Grado** Grado en Matemáticas.

**Descripción** Parcial 2.

**Ejercicio 1** (3 puntos). a) Enuncia el teorema de la proyección ortogonal.

b) Enuncia el Teorema de Riesz-Fréchet.

c) Enuncia la caracterización de las bases ortonormales en un espacio de Hilbert.

**Ejercicio 2** (3.5 puntos). Sea  $X = L_2([0, 1])$ :

a) [0.5 puntos] Prueba que  $M = \left\{ x \in X : \int_0^{1/2} x(t) dt = 0 \right\}$  es un subespacio vectorial cerrado de  $X$ .

b) [1 punto] Describe  $M^\perp$ .

c) [1.5 puntos] Calcula  $P_M$  y  $P_M^\perp$ .

d) [0.5 puntos] Calcula la mínima distancia de la función  $x_0(t) = t$  al subespacio  $M$ .

**Ejercicio 3** (3. puntos). Sea

$$M = \left\{ x \in l_2 : x(1) = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(2n)}{n} = 0 \right\}$$

a) [0.5 puntos] Prueba que  $M$  es un subespacio cerrado de  $l_2$ .

b) [1 punto] Describe  $M^\perp$ .

c) [1.5 puntos] Calcula  $P_M$  y  $P_M^\perp$ .

d) [0.5 puntos] Calcula la mínima distancia en  $l_2$  de  $e_1 + e_3$  a  $M$ .