

# Análisis Funcional

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Análisis Funcional

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025



# Índice general

<b>1. El Espacio Dual</b>	<b>5</b>
1.1. Repaso . . . . .	5
1.1.1. Ejemplos . . . . .	6
1.2. Espacios de Lebesgue . . . . .	8
1.2.1. Desigualdades importantes . . . . .	8
1.2.2. Definición de los espacios de Lebesgue . . . . .	11
1.2.3. Más ejemplos de espacios de Banach . . . . .	11
1.3. Espacio dual . . . . .	13
1.3.1. Espacio dual de un espacio de Hilbert . . . . .	20
1.4. Teorema de Hahn Banach . . . . .	23
1.4.1. Versiones geométricas del Teorema . . . . .	30
1.5. Espacio bidual . . . . .	38
1.6. Dual de $l_p$ , para $1 \leq p < \infty$ . . . . .	39
<b>2. Principio de acotación uniforme y <math>T^a</math> de la gráfica cerrada</b>	<b>43</b>
2.1. Principio de acotación uniforme . . . . .	43
2.2. Otra demostración del Principio de acotación uniforme . . . . .	48
2.3. Teorema de la aplicación abierta . . . . .	51
2.4. Teorema de la gráfica cerrada . . . . .	55
<b>3. Relaciones de Ejercicios</b>	<b>57</b>
3.1. El Espacio Dual . . . . .	57
3.2. Principio de acotación uniforme y $T^a$ de la gráfica cerrada . . . . .	72

Se recomienda encarecidamente acompañar la asignatura de la lectura del libro “Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations”, de Haim Brezis, que puede encontrarse en la bibliografía de la asignatura.

# 1. El Espacio Dual

El objetivo de este capítulo es definir el concepto de espacio dual de un espacio normado, así como sus principales propiedades, que nos dotan de muchos ejemplos de espacios de Banach. Para ello, será necesario primero repasar conceptos básicos vistos ya en asignaturas anteriores de Análisis Matemático.

## 1.1. Repaso

**Definición 1.1** (Espacio métrico). Un espacio métrico es una tupla  $(E, d)$  donde  $E$  es un conjunto no vacío y  $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  es una aplicación que verifica:

- **Desigualdad triangular.**  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \forall x, y, z \in E$
- **Simetría.**  $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in E$
- **No degeneración.**  $d(x, y) = 0 \iff x = y$

**Definición 1.2** (Espacio normado). Un espacio normado es una tupla  $(E, \|\cdot\|)$  donde  $E$  es un espacio vectorial y  $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$  es una aplicación que verifica:

- **Desigualdad triangular.**  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in E$
- **Homogeneidad por homotecia.**  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E$
- **No degeneración.**  $\|x\| = 0 \implies x = 0$

A partir de estas propiedades pueden deducirse muchas otras, entre las cuales destacamos:

**Proposición 1.1.** Si  $(E, \|\cdot\|)$  es un espacio normado, entonces:

- $\|0\| = 0$ .
- $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in E$ .

*Demostración.* Veamos cada propiedad:

- Para la primera:  $\|0\| = \|0 \cdot 1\| = 0 \|1\| = 0$ .
- Para la segunda, basta observar que si  $x \in E$ , entonces:

$$0 = \|0\| = \|x + (-x)\| \leq 2\|x\| \implies \|x\| \geq 0$$

□

**Proposición 1.2.** Si  $(E, \|\cdot\|)$  es un espacio normado y definimos la aplicación  $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$d(x, y) = \|y - x\| \quad \forall x, y \in E$$

Se verifica que  $(E, d)$  es un espacio métrico.

**Definición 1.3** (Espacio métrico completo). Sea  $(E, d)$  un espacio métrico, decimos que es completo (o que la distancia  $d$  es completa) si toda sucesión de Cauchy para la distancia  $d$  es también convergente a un elemento de  $E$  para la distancia  $d$ .

Hemos visto ya que cualquier espacio normado puede dotarse de estructura de espacio métrico, así como la definición de espacio métrico completo, ambos conceptos tratados ya en asignaturas previas.

**Definición 1.4** (Espacio de Banach). Sea  $(E, \|\cdot\|)$  un espacio normado, decimos que es de Banach si el espacio métrico  $(E, d)$  obtenido de la forma usual a partir de la norma  $\|\cdot\|$  es un espacio métrico completo.

**Definición 1.5** (Espacio prehilbertiano). Un espacio prehilbertiano es una tupla  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  donde  $E$  es un espacio vectorial y  $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  es una aplicación que verifica:

- **Bilinealidad.** La aplicación  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es lineal en ambas variables.
- **Simetría.**  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \quad \forall x, y \in E$
- **Definida positiva.**  $\langle x, x \rangle > 0 \quad \forall x \in E \setminus \{0\}$

**Proposición 1.3.** Si  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  es un espacio prehilbertiano y definimos la aplicación  $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad \forall x \in E$$

Se verifica que  $(E, \|\cdot\|)$  es un espacio normado.

**Definición 1.6** (Espacio de Hilbert). Sea  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espacio prehilbertiano, decimos que es de Hilbert si el espacio normado  $(E, \|\cdot\|)$  obtenido de la forma usual a partir del producto escalar  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es un espacio métrico de Banach.

### 1.1.1. Ejemplos

- Sea  $N \in \mathbb{N}$ , en  $\mathbb{R}^N$  podemos definir para cada  $p \geq 1$  la aplicación  $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^N |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^N$$

Que hace que  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_p)$  sea un espacio normado, que de hecho es de Banach (hágase).



- En el caso anterior, si tomamos  $p = 2$  se verifica que además si definimos  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^N x_i y_i \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N$$

Obtenemos que  $(\mathbb{R}^N, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  es un espacio prehilbertiano (compruébese) cuyo espacio normado canónico coincide con  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_2)$ , por lo que es un espacio de Hilbert.

- Como otro ejemplo de espacio normado sobre  $\mathbb{R}^N$ , podemos definir  $\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  dado por:

$$\|x\|_\infty = \sup\{|x_i| : i \in \{0, \dots, N\}\}$$

Se cumple igualmente que  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_\infty)$  es un espacio normado que además es de Banach (compruébese).

- Como primer ejemplo de espacio normado que no se construye sobre los vectores de un espacio de la forma  $\mathbb{R}^N$ , si tomamos un conjunto  $A \subset \mathbb{R}^N$ , y definimos<sup>1</sup>:

$$\mathcal{C}_b(A) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es continua y } f \text{ es acotada en } A\}$$

Junto con la aplicación  $\|\cdot\| : \mathcal{C}_b(A) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\|f\| = \sup\{\|f(x)\| : x \in A\}$$

Se verifica que  $(\mathcal{C}_b(A), \|\cdot\|)$  es un espacio normado que de hecho es de Banach (compruébese).

- Sea ahora  $K \subset \mathbb{R}^N$  un compacto, si definimos:

$$\mathcal{C}(K) = \{f : K \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es continua}\}$$

resulta que podemos definir una aplicación  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{C}(K) \times \mathcal{C}(K) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\langle f, g \rangle = \int_K f(x)g(x) \, dx$$


que hace que  $(\mathcal{C}(K), \langle \cdot, \cdot \rangle)$  sea un espacio prehilbertiano, que nos induce un espacio normado donde la norma es:

$$\|f\|_2 = \left( \int_K f(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad \forall f \in \mathcal{C}(K)$$

Sin embargo, este espacio prehilbertiano **no es de Hilbert**:

Por ejemplo, si tomamos  $K = [0, 2] \subset \mathbb{R}$ , si tomamos  $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$  de forma que la gráfica de  $f_n$  sea algo parecido a la de la Figura 1.1

<sup>1</sup>El subíndice “b” de  $\mathcal{C}_b(A)$  viene de la palabra inglesa “bounded”.

Figura 1.1: Gráfica de la función  $f_n$ .

Si definimos  $f = \chi_{[1,2]}$  la función característica del intervalo  $[1, 2]$  (que no pertenece a  $\mathcal{C}(K)$ ), tenemos que:

$$\|f - f_n\|_2^2 = \int_0^2 (f(x) - f_n(x))^2 dx = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$$

Por lo que  $f_n$  es una sucesión de Cauchy pero cuyo límite no está en el espacio que consideramos, por lo que no es convergente, luego  $\mathcal{C}(K)$  no es un espacio completo.

## 1.2. Espacios de Lebesgue

Un ejemplo interesante de espacios de Banach son los espacios de Lebesgue, que ya se trabajaron un poco en la asignatura de Análisis Matemático II. En este documento volveremos a definir dicho espacio, puesto que la construcción es importante tenerla clara. En un primer lugar, hemos de repasar ciertas desigualdades para poder construir la estructura de espacio normado.

### 1.2.1. Desigualdades importantes

Para la primera desigualdad, es conveniente la siguiente motivación, que nos dará una breve justificación del origen de la desigualdad: sean  $a, b \in \mathbb{R}_0^+$  dos números reales no negativos, es bien conocido que:

$$0 \geq (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \implies ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$$

**Definición 1.7.** Sea  $p \geq 1$  un número real, definimos su “exponente conjugado” por:

$$p' = \begin{cases} \frac{p}{p-1} & \text{si } p \neq 1 \\ \infty & \text{si } p = 1 \end{cases}$$

De esta forma (admitiendo el convenio de que  $0 = 1/\infty$  de la recta real extendida), tenemos que:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Usaremos en esta sección la notación  $p'$  para denotar al exponente conjugado de  $p$ .

**Proposición 1.4** (Desigualdad de Young). Sean  $a, b \in \mathbb{R}_0^+$  y  $p \in \mathbb{R}$  con  $p > 1$ , se verifica que:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}$$

*Demostración.* La concavidad<sup>2</sup> del logaritmo nos dice:

$$\log\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}\right) \geq \frac{1}{p} \log(a^p) + \frac{1}{p'} \log(b^{p'}) = \log(a) + \log(b) = \log(ab)$$

Y si ahora aplicamos la función exponencial y usamos que es creciente obtenemos:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}$$

□

Recordemos que en Análisis Matemático I definíamos para cualquier conjunto  $\Omega \subset \mathbb{R}$  medible el conjunto de las funciones integrables sobre  $\Omega$ :

$$\mathcal{L}(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_{\Omega} f < \infty \right\}$$

Pues bien, dado  $p \geq 1$ , podemos definir ahora:

$$\mathcal{L}_p(\Omega) = \left\{ f \in \mathcal{L}(\Omega) : \int_{\Omega} |f|^p < \infty \right\}$$

**Teorema 1.5** (Desigualdad de Hölder). Sea  $p > 1$ , si  $f \in \mathcal{L}_p(\Omega)$  y  $g \in \mathcal{L}_{p'}(\Omega)$ , entonces  $fg \in \mathcal{L}(\Omega)$  y además:

$$\int_{\Omega} |fg| \leq \left( \int_{\Omega} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_{\Omega} |g|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}$$

*Demostración.* Si notamos por comodidad:

$$\alpha = \left( \int_{\Omega} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \beta = \left( \int_{\Omega} |g|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}$$

Si  $\alpha = 0$ , entonces  $f^p = 0$  casi por doquier, de donde  $|fg| = 0$  casi por doquier, luego:

$$\int_{\Omega} |fg| = 0$$

Si  $\beta = 0$  la situación es simétrica. Suponiendo ahora que  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ , la desigualdad de Young nos dice que:

$$\frac{|f(x)|}{\alpha} \frac{|g(x)|}{\beta} \leq \frac{|f(x)|^p}{p\alpha^p} + \frac{|g(x)|^{p'}}{p'\beta^{p'}} \quad \forall x \in \Omega$$

<sup>2</sup>Recordamos que si  $f$  era una función cóncava, entonces  $f(tx + (1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y)$ , para cualquier  $t \in [0, 1]$ ,  $x, y$  en el dominio de definición de  $f$ .

Si ahora aplicamos la integral de Lebesgue a ambos lados usando el crecimiento de dicho funcional, obtenemos que (usando la definición de  $\alpha$  y  $\beta$ ):

$$\frac{1}{\alpha\beta} \int_{\Omega} |fg| \leq \frac{1}{p\alpha^p} \int_{\Omega} |f|^p + \frac{1}{p'\beta^{p'}} \int_{\Omega} |g|^{p'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

de donde  $fg \in \mathcal{L}(\Omega)$  y despejando de la desigualdad:

$$\frac{1}{\alpha\beta} \int_{\Omega} |fg| \leq 1$$

Obtenemos la desigualdad buscada.  $\square$

La desigualdad de Hölder nos proporcionará la desigualdad de Cauchy-Schwartz de la norma del futuro espacio normado, y nos permitirá probar la desigualdad de Minkowski.

**Teorema 1.6** (Desigualdad de Minkowski). *Para  $p \in \mathbb{R}$  con  $p \geq 1$  y  $f, g \in \mathcal{L}_p(\Omega)$ , se cumple que:*

$$\left( \int_{\Omega} |f + g|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_{\Omega} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_{\Omega} |g|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

*Demostración.* Si notamos por comodidad:

$$\alpha = \left( \int_{\Omega} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \beta = \left( \int_{\Omega} |g|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}, \quad \gamma = \left( \int_{\Omega} |f + g|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Si  $p = 1$ , entonces la desigualdad triangular nos dice que  $|f + g| \leq |f| + |g|$ , donde aplicamos el crecimiento de la integral y ya tenemos el Teorema demostrado. Sabemos por el resultado anterior que  $\gamma < \infty$ , puesto que  $\mathcal{L}_p(\Omega) \subset \mathcal{L}(\Omega)$ , y la desigualdad buscada es obvia si  $\gamma = 0$ . Supuesto ahora que  $p > 1$  y  $\gamma > 0$ , si tomamos:

$$h = |f + g|^{p-1}$$

tenemos entonces que:

$$h^{p'} = |f + g|^{(p-1)p'} = |f + g|^p$$

luego:

$$\int_{\Omega} h^{p'} = \gamma^p < \infty$$

Por lo que  $h \in \mathcal{L}_p(\Omega)$ . Tenemos:

$$|f + g|^p = |f + g|h \leq |f|h + |g|h$$

Y por la desigualdad de Hölder:

$$\gamma^p \leq \int_{\Omega} |f|h + \int_{\Omega} |g|h \leq (\alpha + \beta) \left( \int_{\Omega} h^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}} = (\alpha + \beta) \gamma^{\frac{p}{p'}}$$

Y si dividimos por  $\gamma^{\frac{p}{p'}}$  tenemos la desigualdad buscada.  $\square$

### 1.2.2. Definición de los espacios de Lebesgue

Fijado  $p \geq 1$ , podemos tratar de dotar a  $\mathcal{L}_p(\Omega)$  de una norma. Pensamos en un principio en la aplicación  $\varphi_p : \mathcal{L}_p(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\varphi_p(f) = \left( \int_{\Omega} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \forall f \in \mathcal{L}_p(\Omega)$$

Que:

- Verifica la desigualdad triangular gracias a la desigualdad de Minkowski.
- Verifica la homegeneidad por homotecias, ya que:

$$\varphi_p(\alpha f) = |\alpha| \varphi_p(f) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

- $\varphi_p(f) = 0 \iff f = 0$  casi por doquier.

Por lo que dicha función **no es una norma** en  $\mathcal{L}_p(\Omega)$  al no verificar la no degeneración de la norma, puesto que la integral “es ciega” a la hora de diferenciar la función constantemente igual a 0 de otras funciones con integral cero.

Para solucionar el problema con el que nos acabamos de topar (el problema de no poder definir una norma de dicha forma), podemos construir una relación de equivalencia  $\sim$  en  $\mathcal{L}_p(\Omega)$  que identifique a las funciones que son iguales casi por doquier, pudiendo considerar el espacio cociente:

$$L_p(\Omega) = \frac{\mathcal{L}_p(\Omega)}{\sim}$$

Donde ya  $(L_p(\Omega), \varphi_p)$  sí que es un espacio normado, donde denotaremos normalmente  $\varphi_p = \|\cdot\|_p$ .

**Teorema 1.7** (Riesz-Fischer). *Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  un conjunto medible y  $p \geq 1$ , se cumple que  $(L_p(\Omega), \|\cdot\|_p)$  es un espacio de Banach.*

### 1.2.3. Más ejemplos de espacios de Banach

- Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}$  un conjunto medible, si definimos:

$$\sup_{\Omega} |f| = \inf \{ M \geq 0 : |f(x)| \leq M \text{ casi para todo } x \in \Omega \}$$

El conjunto:

$$\mathcal{L}^{\infty}(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible y } \sup_{\Omega} |f| < \infty \right\}$$

junto con la norma:

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{\Omega} |f|$$

es un espacio de Banach, donde la desigualdad de Hölder se cumple considerando que  $p = \infty$  y  $p' = 1$ :

Si  $f \in \mathcal{L}^{\infty}(\Omega)$  y  $g \in \mathcal{L}(\Omega)$ , entonces  $fg \in \mathcal{L}(\Omega)$ , con:

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_{\infty} \|g\|_1$$

- Para  $1 \leq p < \infty$  podemos considerar otro tipo de espacios:

$$l^p = \left\{ x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty \right\}$$

que junto con la aplicación:

$$\|x\|_p = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \forall x \in l^p$$

forman un espacio de Banach (compruébese).

En dichos espacios, se tiene que si  $x \in l^p$  y  $y \in l^{p'}$ , entonces  $xy \in l$ , con:

$$\|xy\| \leq \|x\|_p \|y\|_{p'}$$

- En el caso anterior, si  $p = 2$ , podemos definir la aplicación:

$$\langle x, y \rangle_2 = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \quad \forall x, y \in l^2$$

Con lo que  $(l^2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$  es un espacio de Hilbert.

- Al igual que sucedía con las normas  $p$ -ésimas en  $\mathbb{R}^N$ , podemos considerar:

$$l^\infty = \{x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : x \text{ acotada}\}$$

junto con la aplicación  $\|\cdot\| : l^\infty \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\|x\|_\infty = \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\}$$

y obtenemos un espacio de Banach.

- $C = \{x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : x \text{ es convergente}\}$  es un subespacio de  $l^\infty$ .
- $C_0 = \{x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : x \text{ converge a } 0\}$  es un subespacio de  $C$ .

**Proposición 1.8.** *El espacio  $l^p$  para  $1 \leq p \leq \infty$  es de Banach.*

*Demostración.* **Para  $p = \infty$ .** Recordamos que trabajamos en el espacio:

$$l^\infty = \{x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : x \text{ acotada}\}, \quad \|x\|_\infty = \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\}$$

Sea  $\{x_m\}$  una sucesión de Cauchy de elementos de  $l^\infty$ , queremos probar que  $\{x_m\}$  es convergente en  $l^\infty$ . Para ello, primero vemos que fijado  $n \in \mathbb{N}$  tenemos que la sucesión de números reales  $\{x_m(n)\}$  es de Cauchy, pues dado  $\varepsilon > 0$  podemos encontrar  $m_0 \in \mathbb{N}$  (gracias a que  $\{x_m\}$  es de Cauchy) de forma que:

$$|x_p(n) - x_q(n)| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_p(k) - x_q(k)| = \|x_p - x_q\| < \varepsilon \quad \forall p, q \geq m_0$$

Como  $\mathbb{R}$  es completo, tenemos que la sucesión  $\{x_m(n)\}$  es convergente, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , lo que nos permite definir

$$\begin{aligned} x : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto \lim\{x_m(n)\} \end{aligned}$$

□

### 1.3. Espacio dual

Para introducir la noción de espacio dual, nos será necesario primero destacar unos resultados:

**Proposición 1.9.** *Si  $H$  es un espacio prehilbertiano, entonces:*

1. *Se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwartz:*

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \quad \forall u, v \in H$$

2. *Se cumple la identidad del paralelogramo:*

$$\left\| \frac{u+v}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{u-v}{2} \right\|^2 = \frac{1}{2}(\|u\|^2 + \|v\|^2) \quad \forall u, v \in H$$

**Teorema 1.10** (de la Proyección). *Sea  $H$  un espacio de Hilbert, sea  $\emptyset \neq K \subset H$  un conjunto convexo y cerrado, entonces  $\forall f \in H \exists_1 u \in K$  de forma que:*

$$\|f - u\| = d(f, K) = \inf\{d(f, v) : v \in K\}$$

Además, dicho elemento  $u$  está caracterizado por:

- $u \in K$ .
- $\langle f - u, v - u \rangle \leq 0 \quad \forall v \in K$ .

Por tanto, a dicho único elemento  $u$  lo notaremos por  $P_K f$ .

*Demostración.* Como  $0 \leq d(f, v) \quad \forall v \in K$ , tenemos entonces que dicho ínfimo existe. Tenemos por tanto que existe  $\{v_n\}$  una sucesión de elementos de  $K$  de forma que  $\{d(f, v_n)\} \rightarrow d(f, K)$ . Sean  $n, m \in \mathbb{N}$  y usando la identidad del paralelogramo con  $f - v_n$  y  $f - v_m$ , tenemos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{f - v_n + f - v_m}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{f - v_n - (f - v_m)}{2} \right\|^2 &= \frac{1}{2} (\|f - v_n\|^2 + \|f - v_m\|^2) \\ \left\| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{v_m - v_n}{2} \right\|^2 &= \frac{1}{2} (\|f - v_n\|^2 + \|f - v_m\|^2) \\ \frac{\|v_m - v_n\|^2}{4} &= \frac{1}{2} (\|f - v_n\|^2 + \|f - v_m\|^2) - \left\| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right\|^2 \\ \|v_m - v_n\|^2 &= 2 (\|f - v_n\|^2 + \|f - v_m\|^2) - 4 \left\| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right\|^2 \end{aligned}$$

Como  $K$  es convexo, tenemos que  $\frac{v_n + v_m}{2} \in K$ , por lo que:

$$\left\| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right\| \geq d(f, K)$$

Por lo que:

$$0 \leq \|v_m - v_n\|^2 \leq 2(\|f - v_n\|^2 + \|f - v_m\|^2) - 4d(f, K)^2$$

Como  $\{\|f - v_n\|^2\} \rightarrow d(f, K)^2$  y  $\{\|f - v_m\|^2\} \rightarrow d(f, K)^2$ , tenemos por el Lema del Sandwich que  $\{\|v_n - v_m\|^2\} \rightarrow 0$ , por lo que  $\{v_n\}$  es de Cauchy. Como  $H$  es completo, existe  $u \in H$  de forma que  $\{v_n\} \rightarrow u$ , pero por ser  $K$  cerrado tendremos que  $u \in K$ .

Como  $\{v_n\} \rightarrow u$ , tenemos entonces que  $\{d(f, v_n)\} \rightarrow d(f, u)$ , pero  $\{d(f, v_n)\}$  convergía también a  $d(f, K)$ . No queda más salida que  $d(f, u) = d(f, K)$ .

Una vez probada la existencia de  $u$ , veamos que:

$$u \in K \text{ con } \|f - u\| = d(f, K) \iff u \in K \text{ y } \langle f - u, v - u \rangle \leq 0 \quad \forall v \in K$$

$\implies$ ) Supongamos que  $u \in K$  y sabemos que  $\|f - u\| \leq \|f - v\|$  para todo  $v \in K$ . Tomamos ahora  $w \in K$  y consideramos el segmento que une  $u$  con  $w$ . Entonces  $\forall w \in K$  y  $\forall t \in [0, 1]$ , al ser  $K$  convexo tendremos que

$$(1 - t)u + tw \in K \quad \text{y} \quad \|f - u\|^2 \leq \|f - (1 - t)u - tw\|^2$$

Aplicando la bilinealidad podemos reescribir esta última expresión como

$$\begin{aligned} \|f - (1 - t)u - tw\|^2 &= \langle f - (1 - t)u - tw, f - (1 - t)u - tw \rangle = \\ &= \|f - u\|^2 + t^2\|w - u\|^2 - 2t\langle f - u, w - u \rangle \end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión que teníamos anteriormente nos queda que:

$$0 \leq t^2\|w - u\|^2 - 2t\langle f - u, w - u \rangle \quad \forall t \in (0, 1]$$

Al dividir entre  $t$  nos queda

$$0 \leq t\|w - u\|^2 - 2\langle f - u, w - u \rangle \quad \forall t \in (0, 1]$$

y tomando ahora el límite cuando  $t$  tiende a 0 por la derecha queda que

$$0 \leq -2\langle f - u, w - u \rangle \Rightarrow \langle f - u, w - u \rangle \leq 0 \quad \forall w \in K$$

$\Longleftarrow$ )

$$\|f - v\|^2 = \|f - u + u - v\|^2 = \|f - u\|^2 + 2\langle f - u, u - v \rangle + \|u - v\|^2 \quad \forall v \in K$$

De donde:

$$0 \geq 2\langle f - u, v - u \rangle - \|u - v\|^2 = \|f - u\|^2 - \|f - v\|^2$$

Luego:

$$\|f - u\|^2 \leq \|f - v\|^2 \quad \forall v \in K$$

Para probar finalmente la unicidad, supongamos que existen  $u, w \in K$  de forma que:

$$\langle f - u, v - u \rangle, \langle f - w, v - w \rangle \leq 0 \quad \forall v \in K$$

Entonces:

$$\langle f - u, w - u \rangle, \langle f - w, u - w \rangle = \langle u - f, w - u \rangle \leq 0$$

Por lo que:

$$\langle f - u, w - u \rangle + \langle w - f, w - u \rangle = \langle w - u, w - u \rangle \leq 0$$

de donde  $\langle w - u, w - u \rangle = 0$ , por lo que  $\|w - u\|^2 = d(w, u)^2 = 0$ , luego  $w = u$ .  $\square$



**Proposición 1.11.** *Dado  $\emptyset \neq K \subset H$  un conjunto convexo y cerrado, tenemos que la aplicación*

$$\begin{aligned} P_K : H &\longrightarrow H \\ f &\longmapsto P_K f \end{aligned}$$

*es lipschitziana. De hecho:*

$$\|P_K f_1 - P_K f_2\| \leq \|f_1 - f_2\| \quad \forall f_1, f_2 \in H$$

*Demostración.* Sean  $f_1, f_2 \in H$ ,  $u_1 = P_K f_1$ ,  $u_2 = P_K f_2$ , estos verifican:

$$\langle f_1 - u_1, v - u_1 \rangle, \langle f_2 - u_2, v - u_2 \rangle \leq 0 \quad \forall v \in K$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} \langle f_1 - u_1, u_2 - u_1 \rangle &\leq 0 \\ \langle f_2 - u_2, u_1 - u_2 \rangle &\leq 0 \implies \langle f_2 - u_2, u_2 - u_1 \rangle \geq 0 \end{aligned}$$

De donde  $\langle f_1 - u_2 - f_2 + u_2, u_2 - u_1 \rangle \leq 0$ , por lo que:

$$\langle f_1 - f_2 + (u_2 - u_1), (u_2 - u_1) \rangle = \langle f_1 - f_2, u_2 - u_1 \rangle + \langle u_2 - u_1, u_2 - u_1 \rangle$$

Luego:

$$\|u_2 - u_1\|^2 = \langle u_2 - u_1, u_2 - u_1 \rangle \leq -\langle f_1 - f_2, u_2 - u_1 \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwartz}}{\leq} \|f_1 - f_2\| \|u_2 - u_1\|$$

Por lo que:

$$\|u_2 - u_1\| \leq \|f_1 - f_2\|$$

Si  $\|u_2 - u_1\| \neq 0$ , cierto también si  $\|u_2 - u_1\| = 0$ . □

Pensemos ahora en un ejemplo de conjuntos convexos con propiedades interesantes, como lo son los espacios vectoriales:

**Corolario 1.11.1** (Proyección Ortogonal). *Sea  $M \subset H$  un subespacio vectorial cerrado de  $H$ , un espacio de Hilbert, entonces:*

$$\forall f \in H \exists_1 u \in M \text{ tal que } \|f - u\| = d(f, M)$$

*Además, la caracterización de  $u$  puede mejorarse por:*

$$u \in M \quad y \quad \langle f - u, w \rangle = 0 \quad \forall w \in M$$

*Demostración.* Bajo las hipótesis de que  $M$  es un subespacio vectorial cerrado de un espacio de Hilbert  $H$ , basta probar:

$$u \in M \wedge \langle f - u, v - u \rangle \leq 0 \quad \forall v \in M \iff u \in M \wedge \langle f - u, w \rangle = 0 \quad \forall w \in M$$

$\Leftarrow$ ) Si  $v \in M$ , tenemos por ser  $M$  un espacio vectorial que  $v - u \in M$ , de donde  $\langle f - u, v - u \rangle = 0$ , por lo que en particular es menor o igual que 0.

$\implies$ ) Si tomamos  $v \in M$  y  $t \in \mathbb{R}^*$ , como  $M$  es un espacio vectorial tendremos que  $v/t \in M$ , por lo que:

$$\left\langle f - u, \frac{v}{t} - u \right\rangle \leq 0 \quad \forall v \in M, \forall t \in \mathbb{R}^*$$

- Si  $t > 0$ , entonces  $\langle f - u, v - tu \rangle \leq 0 \quad \forall v \in M$ , de donde tomando límite cuando  $t \rightarrow 0$ , tenemos que  $\langle f - u, v \rangle \leq 0 \quad \forall v \in M$ .
- Si  $t < 0$ , entonces  $\langle f - u, v - tu \rangle \geq 0 \quad \forall v \in M$ , de donde tomando límite cuando  $t \rightarrow 0$ , tenemos que  $\langle f - u, v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in M$ .

En consecuencia, tenemos que  $\langle f - u, v \rangle = 0 \quad \forall v \in M$ .

□

**Proposición 1.12.** Sea  $M \subset H$  un subespacio vectorial cerrado de  $H$ , un espacio de Hilbert, la aplicación

$$\begin{aligned} P_M : H &\longrightarrow H \\ f &\longmapsto P_M f \end{aligned}$$

es lineal.

*Demostración.* Sean  $f_1, f_2 \in H$ ,  $u_1 = P_M f_1$ ,  $u_2 = P_M f_2$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} \langle \lambda f_1 + f_2 - (\lambda u_1 + u_2), w \rangle &= \langle \lambda f_1 - \lambda u_1 + f_2 - u_2, w \rangle \\ &= \lambda \langle f_1 - u_1, w \rangle + \langle f_2 - u_2, w \rangle = 0 \quad \forall w \in M \end{aligned}$$

Por lo que por el Corolario anterior, tenemos que:

$$P_M(\lambda f_1 + f_2) = \lambda u_1 + u_2 = \lambda P_M(f_1) + P_M(f_2)$$

de donde  $P_M$  es lineal.

□

**Definición 1.8.** Sea  $(E, \|\cdot\|)$  un espacio normado, definimos el espacio dual topológico de  $E$  por:

$$E^* = \{f : E \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es lineal y continua}\}$$

Nos será necesaria la siguiente Proposición para comprender mejor las propiedades de las aplicaciones lineales. Más concretamente, la relación existente entre la acotación y la continuidad de una aplicación lineal.

**Proposición 1.13.** Sea  $T : E \rightarrow F$  una aplicación lineal entre dos espacios normados  $E$  y  $F$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1)  $\exists M \in \mathbb{R}^+$  de forma que  $\|T(x)\| \leq M\|x\| \quad \forall x \in E$ .
- (2)  $T$  es lipschitziana.
- (3)  $T$  es continua.
- (4)  $T$  es continua en 0.
- (5)  $T$  es acotada (es decir, si  $A \subset E$  es acotado, entonces  $T(A)$  es acotado).

(6)  $T(\overline{B}(0, 1))$  es acotado.

(7)  $T(B(0, 1))$  es acotado.

*Demostración.* Veamos la equivalencia entre todas ellas:

(1)  $\iff$  (2) Por doble implicación:

$\implies$ ) Sean  $x, y \in E$ , entonces  $x - y \in E$ , de donde:

$$\|T(x) - T(y)\| = \|T(x - y)\| \leq M\|x - y\|$$

Por lo que  $T$  es lipschitziana con constante de Lipschitz menor o igual que  $M$ .

$\impliedby$ ) Sea  $x \in E$ , si  $M$  es mayor o igual que la constante de Lipschitz de  $T$ , entonces:

$$\|T(x)\| = \|T(2x - x)\| = \|T(2x) - T(x)\| \leq M\|2x - x\| = M\|x\|$$

(2)  $\implies$  (3) Es conocida de Cálculo II.

(3)  $\implies$  (4) Si  $T$  es continua, en particular lo es en 0.

(4)  $\implies$  (1) Supuesto que  $T$  es continua en 0, es decir, que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|T(x)\| < \varepsilon \quad \forall x \in B(0, \delta)$$

Tomando  $\varepsilon = 1$ , la continuidad nos da un  $\delta$  cumpliendo la afirmación anterior. Sea  $x \in E$  arbitrario, tenemos:

$$\|T(x)\| = \left\| T\left(\frac{x}{\|x\|} \frac{\delta}{2} 2\|x\|\right) \right\| = \frac{2\|x\|}{\delta} \left\| T\left(\frac{x}{\|x\|} \frac{\delta}{2}\right) \right\| < \frac{2}{\delta} \|x\|$$

Ya que  $\frac{x\delta}{2\|x\|} \in B(0, \delta)$ , por lo que tomando  $M = \frac{2}{\delta}$  tenemos la implicación.

(5)  $\implies$  (6) Como  $\overline{B}(0, 1)$  es acotado,  $T(\overline{B}(0, 1))$  será acotado por ser  $T$  acotada.

(6)  $\implies$  (7) Como  $B(0, 1) \subset \overline{B}(0, 1)$ , entonces  $T(B(0, 1)) \subset T(\overline{B}(0, 1))$ .

(7)  $\implies$  (4) Si  $\exists R \in \mathbb{R}^+$  de forma que  $\|T(x)\| \leq R$  para todo  $x \in B(0, 1)$ , dado  $\varepsilon > 0$ , si tomamos  $\delta = \frac{\varepsilon}{2R}$ , si  $x \in B(0, \delta)$ , entonces:

$$\|T(x)\| = \left\| T\left(\frac{x}{2\|x\|} 2\|x\|\right) \right\| = 2\|x\| \left\| T\left(\frac{x}{2\|x\|}\right) \right\| \leq 2\|x\| R < 2\delta R = \varepsilon$$

(1)  $\implies$  (5) Sea  $A \subset E$  acotado, entonces  $\exists r \in \mathbb{R}^+$  de forma que  $A \subset B(0, r)$ , por lo que:

$$\|T(x)\| \leq M\|x\| \leq Mr \quad \forall x \in A$$

De donde  $T(A) \subset B(0, Mr)$ , por lo que es un conjunto acotado.

□

**Proposición 1.14.** Sea  $E$  un espacio normado, observemos que  $E^*$  es un espacio vectorial, sobre el que definimos la aplicación  $\|\cdot\| : E^* \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \quad \forall f \in E^*$$

Se verifica que:

1.  $(E^*, \|\cdot\|)$  es un espacio normado.
2.  $(E^*, \|\cdot\|)$  es un espacio de Banach.
3. Sea  $f \in E^*$ , entonces:

$$\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

4. Sea  $f \in E^*$ , entonces:

$$\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\| = \inf\{M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in E\}$$

*Demostración.* Veamos cada una de las propiedades:

1. Para la primera, hemos de probar:

- **No degeneración.** Sea  $f \in E^*$  de forma que  $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\| = 0$ , entonces:

$$0 \leq \|f(x)\| \leq 0 \quad \forall x \in \overline{B}(0, 1) \implies f(x) = 0 \quad \forall x \in \overline{B}(0, 1)$$

de donde:

$$f(x) = f\left(\frac{x}{\|x\|}\|x\|\right) = \|x\|f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = 0 \quad \forall x \in E$$

Por lo que  $f = 0$ .

- **Homogeneidad por homotecias.** Sea  $f \in E^*$  y  $\lambda \in \mathbb{R}A$  :

$$\|\lambda f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\lambda f(x)| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\lambda| |f(x)| = |\lambda| \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = |\lambda| \|f\|$$

- **Desigualdad triangular.** Sean  $f, g \in E^*$ :

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x) + g(x)| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| + \sup_{\|x\| \leq 1} |g(x)| = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

2. Sea  $\{f_n\}$  una sucesión de Cauchy de elementos de  $E^*$ , sean  $\varepsilon, r > 0$ , la condición de Cauchy para  $\varepsilon/r$  nos da  $m \in \mathbb{N}$  de forma que si  $p, q \geq m$ , entonces:

$$\sup_{\|x\| \leq 1} |f_p(x) - f_q(x)| = \|f_p - f_q\| < \frac{\varepsilon}{r}$$

de donde:

$$|f_p(x) - f_q(x)| < \frac{\varepsilon}{r} \quad \forall x \in \overline{B}(0, 1)$$

pero entonces:

$$|f_p(rx) - f_q(rx)| = r|f_p(x) - f_q(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in \overline{B}(0, 1)$$

lo que equivale a que:

$$|f_p(x) - f_q(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in \overline{B}(0, r)$$

Por tanto, la sucesión  $\{f_n(x)\}$  es de Cauchy para todo  $x \in \overline{B}(0, r)$ , pero como  $r$  era arbitrario, dicha condición se cumple para todo  $r \in \mathbb{R}^+$ , tenemos que  $\{f_n(x)\}$  es de Cauchy para todo  $x \in E$ . Como  $\mathbb{R}$  es completo, la sucesión  $\{f_n(x)\}$  es convergente para todo  $x \in E$ , lo que nos permite definir  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$f(x) = \lim\{f_n(x)\} \quad \forall x \in E$$

Se verifica que  $f$  es lineal, ya que:

$$\begin{aligned} f(\lambda x + y) &= \lim\{f_n(\lambda x + y)\} = \lim\{\lambda f_n(x) + f_n(y)\} \\ &= \lambda \lim\{f_n(x)\} + \lim\{f_n(y)\} = \lambda f(x) + f(y) \\ &\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E \end{aligned}$$

Ahora, como  $\{f_n\}$  era de Cauchy, tenemos que fijado  $r \in \mathbb{R}^+$  y dado  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists m \in \mathbb{N}$  de forma que para  $p, q \geq m$  se tiene:

$$|f_p(x) - f_q(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in \overline{B}(0, r)$$

Fijado ahora dicho  $p$ , tenemos:

$$|f_p(x) - f(x)| = \lim_{q \rightarrow \infty} |f_p(x) - f_q(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Por lo que  $\{f_n\}$  converge uniformemente a  $f$  en  $B(0, r)$ , para todo  $r \in \mathbb{R}^+$ . En particular,  $\{f_n\}$  converge uniformemente a  $f$  en cada conjunto acotado de  $E$ . Como  $\{f_n\}$  es continua  $\forall n \in \mathbb{N}$  y para cada  $x \in E$  tenemos que  $\{f_n\}$  converge uniformemente a  $f$  en  $B(x, 1)$ , entonces tenemos que  $f$  es continua en  $x$ , de donde  $f$  es continua en  $E$ . En consecuencia,  $f \in E^*$ .

Por último, para ver que  $\{f_n\}$  converge a  $f$ , dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $m \in \mathbb{N}$  de forma que si  $n \geq m$ , entonces:

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in \overline{B}(0, 1)$$

de donde:

$$\|f_n - f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Por lo que  $\{f_n\} \rightarrow f$ .

3. La desigualdad  $\geq$  es obvia. Para la otra, sea  $x \in B(0, 1)$ :

$$|f(x)| = \left| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right| \|x\| \leq \sup_{\|x\|=1} |f(x)| \|x\| \leq \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

4. Buscamos probar que:

$$\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \inf\{M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in E\}$$

$\geq$ ) Para ver que el supremo es mayor o igual que el ínfimo, veamos que el supremo pertenece al conjunto de la derecha:

$$|f(x)| = \|x\| \left| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right| \leq \|x\| \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

Por tanto,  $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \in \{M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in E\}$ .

$\leq$ ) Para ver el el ínfimo es mayor o igual que el supremo, veamos que el ínfimo es un mayorante del conjunto de la izquierda, si tomamos:

$$M_0 = \inf\{M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in E\}$$

entonces:

$$|f(x)| \leq M_0\|x\| \leq M \quad \forall x \in \overline{B}(0, 1)$$

Por lo que  $M_0$  es un mayorante de  $\{|f(x)| : \|x\| \leq 1\}$ , por lo que es mayor o igual que su supremo.

□

### 1.3.1. Espacio dual de un espacio de Hilbert

**Proposición 1.15.** *Se verifica que si  $v \in H$ , entonces la aplicación*

$$\begin{aligned} \varphi_v : H &\longrightarrow \mathbb{R} \\ u &\longmapsto \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

*verifica que  $\varphi_v \in H^*$  y en cuyo caso,  $\|\varphi_v\| = \|v\|$ .*

*Más aún, podemos definir*

$$\begin{aligned} \Phi : H &\longrightarrow H^* \\ v &\longmapsto \varphi_v \end{aligned}$$

*que es una aplicación lineal e inyectiva.*

*Demostración.* Como el producto escalar es bilineal es evidente que  $\varphi_v$  es lineal. Vemos que:

$$|\varphi_v(u) - \varphi_v(w)| = |\langle u, v \rangle - \langle w, v \rangle| = |\langle u - w, v \rangle| \leq \|u - w\| \|v\| \quad \forall u, w \in E$$

Por lo que  $\varphi_v$  es lipschitziana, y por la última Proposición tenemos que  $\|\varphi_v\| \leq \|v\|$ . Si  $v = 0$  tenemos la igualdad de forma obvia y si  $v \neq 0$ , entonces:

$$\|v\| = \frac{\|v\|}{\|v\|^2} = \frac{\langle v, v \rangle}{\|v\|} = \left\langle \frac{v}{\|v\|}, v \right\rangle = \varphi_v \left( \frac{v}{\|v\|} \right)$$

luego:

$$\|v\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|\varphi_v\|$$

Para ver que  $\Phi$  es lineal, sean  $\lambda \in \mathbb{R}$  y  $u, v \in H$ :

$$\Phi(\lambda u + v) = \varphi_{\lambda u + v} \stackrel{?}{=} \lambda \varphi_u + \varphi_v = \lambda \Phi(u) + \Phi(v)$$

donde la igualdad puede demostrarse por:

$$\varphi_{\lambda u + v}(w) = \langle w, \lambda u + v \rangle = \langle w, \lambda u \rangle + \langle w, v \rangle = \lambda \langle w, u \rangle + \langle w, v \rangle = \lambda \varphi_u(w) + \varphi_v(w)$$

Como  $\|\varphi_v\| = \|v\|$ , obtenemos de forma inmediata la continuidad de  $\Phi$ , por ser una isometría.

Para ver que  $\Phi$  es inyectiva, supongamos que  $u, v \in H$  con  $\Phi(u) = \Phi(v)$ , de donde:

$$\langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle \quad \forall w \in H$$

Luego:

$$\langle u, w \rangle - \langle v, w \rangle = \langle u - v, w \rangle = 0 \quad \forall w \in H$$

En particular, tomando  $w = u - v$ , tenemos que:

$$\|u - v\|^2 = \langle u - v, u - v \rangle = 0$$

Por lo que  $u = v$ , de donde  $\Phi$  es inyectiva. □

**Teorema 1.16** (de Riesz-Fréchet, Representación del dual de un Hilbert).

Sea  $H$  un espacio de Hilbert,  $\forall \varphi \in H^* \exists ! v \in H$  de forma que:

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle \quad \forall u \in H$$

y además:

$$\|\varphi\| = \|v\|$$

*Demostración.* Si conseguimos probar la primera parte del Teorema, la segunda la tendremos ya probada gracias a la Proposición anterior. Sea por tanto  $f \in H^*$ , si  $f = 0$  tomando  $v = 0$  se tiene la tesis. Suponemos por tanto que  $f \neq 0$ , por lo que  $M = f^{-1}(\{0\}) \subsetneq H$  es un espacio vectorial de  $H$  distinto del trivial. Como  $f$  es continua, tenemos además que  $M$  es un conjunto cerrado.

Como  $M \subsetneq H$ , podemos tomar  $z_0 \in H \setminus M$ . Por el Teorema de la Proyección Ortogonal, tomamos  $z_1 = P_M z_0 \in M$ , que verifica:

$$\langle z_0 - z_1, v \rangle = 0 \quad \forall v \in M$$

Como  $z_0 \in H \setminus M$  y  $z_1 \in M$ , tenemos que  $z_0 \neq z_1$ , lo que nos permite definir:

$$z = \frac{z_0 - z_1}{\|z_0 - z_1\|}$$

Con esta definición, es claro que  $\|z\| = 1$ , así como que:

$$\langle z, v \rangle = \frac{1}{\|z_0 - z_1\|} \langle z_0 - z_1, v \rangle = 0 \quad \forall v \in M$$

Como  $z_0 \notin M$  la situación  $z \in M$  es imposible, por lo que  $z \notin M$ , luego  $f(z) \neq 0$ . Veamos ahora que:

$$x - \frac{f(x)}{f(z)}z \in M \quad \forall x \in H$$

ya que:

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(z)}z\right) = f(x) - \frac{f(x)}{f(z)}f(z) = 0$$

Por lo que tenemos que:

$$\left\langle z, x - \frac{f(x)}{f(z)}z \right\rangle = 0$$

Pero tenemos:

$$0 = \left\langle z, x - \frac{f(x)}{f(z)}z \right\rangle = \langle z, x \rangle - \frac{f(x)}{f(z)}\langle z, z \rangle = \langle z, x \rangle - \frac{f(x)}{f(z)}\|z\|^2$$

Por lo que podemos despejar  $f(x)$ , obteniendo:

$$f(x) = f(z)\langle z, x \rangle = \langle x, zf(z) \rangle \quad \forall x \in H$$

En consecuencia, tomando  $v = zf(z)$  tenemos la existencia probada.

Para la unicidad, supongamos que  $\exists v, w \in H$  de forma que:

$$\langle x, v \rangle = f(x) = \langle x, w \rangle \quad \forall x \in H$$

En consecuencia:

$$\langle x, v - w \rangle = 0 \quad \forall x \in H$$

Luego si tomamos  $x = v - w$ :

$$\|v - w\|^2 = \langle v - w, v - w \rangle = 0$$

Por lo que  $v = w$ . □

A partir del Teorema anterior tenemos que  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_2)$ ,  $l^2$  y  $L^2(\Omega)$  son todos isomorfos a sus duales.

**Ejercicio 1.3.1.** Calcular el dual de  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_p)$ , para  $p > 1$ ,  $p \neq 2$ .

**Ejercicio 1.3.2.** Encontrar una relación entre los duales de  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_1)$  y  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_\infty)$ .

**Ejercicio 1.3.3.** Calcular el dual de  $l^p$ , para  $p > 1$ ,  $p \neq 2$ .



## 1.4. Teorema de Hahn Banach

El siguiente Teorema tiene la utilidad de probar que  $E^* \neq \{0\}$  para  $E$  un espacio normado. Si tenemos un espacio normado  $E$  de dimensión finita, es fácil pensar una aplicación lineal y continua  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ , pero en dimensión infinita el problema se complica. Uno de los muchos usos del Teorema de Hahn Banach, que estudiaremos a continuación, es el de justificar que  $E^* \neq \{0\}$ ; sin embargo, el Teorema tiene muchas más utilidades. Con el fin de explorar más utilidades del Teorema de Hahn Banach, formularemos la pregunta de  $E^* \neq \{0\}$  de la siguiente forma:

### Problema

Sea  $E$  un espacio de Banach,  $G \subset E$  un subespacio suyo y  $g : G \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y continua, ¿podemos garantizar entonces que existe  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y continua tal que  $f|_G = g$ ?

Como ya vimos en la Proposición 1.13, que  $g$  sea continua significa que  $\exists k \in \mathbb{R}^+$  de forma que  $|g(x)| \leq k\|x\| \quad \forall x \in G$ . Para resolver el problema, necesitamos encontrar una aplicación  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y  $k' \in \mathbb{R}^+$  de forma que:

$$|f(x)| \leq k'\|x\| \quad \forall x \in E$$

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $p : (E, \|\cdot\|) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$p(x) = k\|x\| \quad \forall x \in E$$

Demostrar que la función  $p$  verifica:

- $p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E$ .
- $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \forall x \in E$ .

*Demostración.* Sean  $x, y \in E$  y  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ :

$$\begin{aligned} p(x + y) &= k\|x + y\| \leq k(\|x\| + \|y\|) = k\|x\| + k\|y\| = p(x) + p(y) \\ p(\lambda x) &= k\|\lambda x\| = \lambda k\|x\| = \lambda p(x) \end{aligned}$$

□

Aunque no lo demostraremos, el Teorema de Hahn Banach resulta ser equivalente al axioma de elección. Para realizar la demostración del Teorema de Hahn Banach es necesario usar el Lema de Zorn, por lo que conviene realizar un breve repaso del mismo.

### Lema de Zorn

**Definición 1.9.** Sea  $\emptyset \neq P$  un conjunto con una relación  $\leq$  de orden, es decir, una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva, decimos que:

- Un subconjunto  $Q \subset P$  es totalmente ordenado si:

$$\forall a, b \in Q \implies a \leq b \vee b \leq a$$

- Si  $Q \subset P$  y  $x \in P$ , decimos que  $x$  es una cota superior de  $Q$  si y solo si:

$$a \leq x \quad \forall a \in Q$$

- Si  $m \in P$ , decimos que  $m$  es un elemento maximal de  $P$  si y solo si:

$$\{x \in P : m \leq x\} = \{m\}$$

- Diremos que  $P$  es inductivo si todo subconjunto  $Q \subset P$  que sea totalmente ordenado posee una cota superior.

**Lema 1.17** (de Zorn). *Si  $P$  es un conjunto no vacío con una relación de orden  $\leq$  y  $P$  es inductivo, entonces  $P$  tiene un elemento maximal.*

**Teorema 1.18** (de Hahn-Banach, versión analítica). *Sea  $E$  un espacio vectorial, sea  $p : E \rightarrow \mathbb{R}$  una aplicación verificando:*

- $p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E.$
- $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \quad \forall x \in E.$

*Sea  $G \subset E$  un subespacio vectorial y  $g : G \rightarrow \mathbb{R}$  una aplicación lineal tal que*

$$g(x) \leq p(x) \quad \forall x \in G$$

*Entonces,  $\exists f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal de forma que:*

1.  $f(x) \leq p(x) \quad \forall x \in E.$
2.  $f|_G = g.$

*Demostración.* Nos definimos el conjunto  $P$  de todas aquellas aplicaciones lineales  $h$  que tienen por dominios subespacios vectoriales de  $E$  que contienen a  $G$  de forma que  $h|_G = g$  y que cumplen la desigualdad  $h(x) \leq p(x) \quad \forall x \in D(h)$  (donde  $D(h)$  denota el dominio de  $h$ ); es decir:

$$P = \left\{ h : D(h) \rightarrow \mathbb{R} : \begin{array}{l} G \subset D(h) \text{ subespacio vectorial de } E \\ h \text{ lineal y } h(x) \leq p(x) \quad \forall x \in D(h) \\ h(x) = g(x) \quad \forall x \in G \end{array} \right\}$$

Tendremos entonces en  $P$  todas aquellas aplicaciones lineales que son extensiones de  $g$  y que cumplen la condición de ser menores o iguales que  $p$ . Buscamos aplicar el Lema de Zorn sobre  $P$ , obteniendo un elemento maximal que luego probaremos que ha de tener como dominio  $E$ .

Hemos pues de definir una relación de orden en  $P$  que nos permita conseguir lo que queremos. Para ello, definiremos la relación  $\leq$  de la siguiente forma:

$$h_1 \leq h_2 \iff \begin{cases} D(h_1) \subset D(h_2) \\ h_2|_{D(h_1)} = h_1 \end{cases} \quad \forall h_1, h_2 \in P$$

es decir,  $h_1 \leq h_2$  si  $h_2$  es una extensión de  $h_1$ . Podemos comprobar que esta efectivamente es una relación de orden en  $P$ :

- **Reflexiva.** Si  $h \in P$ , trivialmente tenemos que  $D(h) \subset D(h)$  y  $h|_{D(h)} = h$ , lo que nos dice que  $h \leq h$ .
- **Antisimétrica.** Sean  $h_1, h_2 \in P$  de forma que  $h_1 \leq h_2$  y  $h_2 \leq h_1$ , entonces:

$$D(h_1) \subset D(h_2) \wedge D(h_2) \subset D(h_1) \implies D(h_1) = D(h_2)$$

Y de esta condición junto con  $h_2 = h_2|_{D(h_2)} = h_2|_{D(h_1)} = h_1$  concluimos que  $h_2 = h_1$ .

- **Transitiva.** Si  $h_1, h_2, h_3 \in P$  con  $h_1 \leq h_2$  y  $h_2 \leq h_3$ , tenemos entonces que  $D(h_1) \subset D(h_2)$  y que  $D(h_2) \subset D(h_3)$ . La transitividad de  $\subset$  nos dice que  $D(h_1) \subset D(h_3)$ . Ahora, si tenemos que  $h_3|_{D(h_2)} = h_2$  y que  $h_2|_{D(h_1)} = h_1$ , obtenemos que:

$$h_3|_{D(h_1)} = h_2|_{D(h_1)} = h_1$$

De donde  $h_1 \leq h_3$ .

Tratemos ahora de probar que  $P$  es inductivo. Para ello, sea  $Q \subset P$  un subconjunto totalmente ordenado, para buscar una cota superior consideraremos:

$$V_0 = \bigcup_{h \in Q} D(h)$$

Vemos que  $V_0$  es un subespacio vectorial de  $E$ , ya que si  $\alpha \in \mathbb{R}$  y  $u, v \in V_0$ , tenemos entonces que  $\exists h, h' \in Q$  de forma que  $u \in D(h), v \in D(h')$ . Como  $Q$  es totalmente ordenado, tendremos entonces que  $h \leq h'$  o que  $h' \leq h$ . Supondremos sin pérdida de generalidad que  $h \leq h'$ , lo que nos dice que  $D(h) \subset D(h')$ , por lo que  $u \in D(h')$  y como  $D(h')$  es un subespacio vectorial de  $E$ , tenemos entonces que:

$$\alpha u + v \in D(h') \subset V_0$$

Una vez salvada esta cuestión, definimos  $h_0 : V_0 \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$h_0(x) = h(x) \quad \text{si } x \in D(h)$$

que está bien definida, ya que si  $x \in D(h_1) \cap D(h_2)$ , sucederá bien  $h_1 \leq h_2$  bien  $h_2 \leq h_1$ , luego suponiendo que  $h_1 \leq h_2$ , tendremos que  $h_2|_{D(h_1)} = h_1$ , luego se cumplirá  $h_1(x) = h_2(x)$ . Además  $h_0$  es lineal, ya que si  $x, y \in V_0$ , por ser  $V_0$  espacio vectorial tendremos que  $x + y \in V_0$ , de donde  $\exists h, h', h'' \in Q$  de forma que  $x \in D(h)$ ,  $y \in D(h')$ ,  $x + y \in D(h'')$ , con lo que:

$$h_0(x + y) = h''(x + y) = h''(x) + h''(y) = h(x) + h'(y) = h_0(x) + h_0(y)$$

Y finalmente es claro que  $h_0(x) \leq p(x) \quad \forall x \in V_0$ , puesto que si  $x \in V_0$ , entonces  $\exists h \in Q$  de forma que  $x \in D(h)$ , con lo que:

$$h_0(x) = h(x) \leq p(x)$$

En definitiva, tenemos que  $h_0$  es una aplicación lineal extensión de  $g$  que cumple  $h_0(x) \leq p(x)$  para todo  $x \in V_0$  y con  $V_0$  un subespacio vectorial de  $E$  que contiene

a  $G$ , con lo que  $h_0 \in P$  y además tenemos que  $h \leq h_0 \forall h \in Q$ , por lo que  $h_0$  es una cota superior de  $Q$ , de donde tenemos que  $P$  es inductivo. Por el Lema de Zorn, existe  $f \in P$  elemento maximal de  $P$ .

Para concluir la demostración del Teorema, nos falta probar que si  $f$  es un elemento maximal de  $P$  entonces  $D(f) = E$ . Para ello, supongamos por reducción al absurdo que fuese  $D(f) \subsetneq E$ , luego existe  $x_0 \in E \setminus D(f)$ . Si consideramos<sup>3</sup>:

$$D(f) \oplus \mathbb{R}x_0$$

Tenemos que si  $v \in D(f) \oplus \mathbb{R}x_0$ , entonces  $v$  se escribe como  $v = x + tx_0$ , con  $x \in D(f)$  y  $t \in \mathbb{R}$ , lo que nos permite definir  $\hat{f} : D(f) \oplus \mathbb{R}x_0 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\hat{f}(x + tx_0) = f(x) + t\alpha$$

Siendo  $\alpha$  un número real que por ahora no concretaremos (puesto que necesitamos buscar luego una condición sobre  $\alpha$  para garantizar que  $\hat{f} \in P$ ). Veamos que  $\hat{f} \in P$ :

- Es automático que  $\hat{f}|_{D(f)} = f$ .
- $D(f) \oplus \mathbb{R}x_0$  es un subespacio vectorial de  $E$  que contiene a  $G$ .
- Es fácil ver que  $\hat{f}$  es lineal, ya que si  $x, y \in D(f)$  y  $t, t' \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} \hat{f}(x + tx_0 + y + t'x_0) &= \hat{f}((x + y) + (t + t')x_0) = f(x + y) + (t + t')\alpha \\ &= f(x) + f(y) + t\alpha + t'\alpha = \hat{f}(x + tx_0) + \hat{f}(y + t'x_0) \end{aligned}$$

- Tenemos que ver finalmente que

$$\hat{f}(x + tx_0) \leq p(x + tx_0) \quad \forall x \in D(f), \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (1.1)$$

que sucede si y solo si:

$$t\hat{f}(z + x_0) = \hat{f}(tz + tx_0) \leq p(tz + tx_0) = p(t(z + x_0)) \quad \forall z \in D(f), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

- En el caso  $t = 0$  la desigualdad es obvia.
- Si  $t > 0$ , tenemos que:

$$t(\hat{f}(z) + \alpha) = t\hat{f}(z + x_0) \leq p(t(z + x_0)) = tp(z + x_0) \quad \forall z \in D(f)$$

que es equivalente a

$$\alpha \leq -f(z) + p(z + x_0) \quad \forall z \in D(f)$$

- Si  $t < 0$ , tenemos:

$$\begin{aligned} -t(-f(z) - \alpha) &= -t\hat{f}(-z - x_0) = t\hat{f}(z + x_0) \leq p(t(z + x_0)) = -tp(-z - x_0) \\ &\quad \forall z \in D(f) \end{aligned}$$

que es equivalente a

$$-f(z) - p(-z - x_0) \leq \alpha \quad \forall z \in D(f)$$

---

<sup>3</sup>Aquí hemos usado  $\mathbb{R}x_0 := \{x_0 r : r \in \mathbb{R}\}$ , que es un subespacio vectorial de  $E$  de dimensión 1.

En definitiva, ver (1.1) es equivalente a ver que:

$$\sup\{f(-z) - p(-z - x_0) : z \in D(f)\} \leq \alpha \leq \inf\{-f(z) + p(z + x_0) : z \in D(f)\}$$

que a su vez equivale a:

$$\sup\{f(w) - p(w - x_0) : w \in D(f)\} \leq \alpha \leq \inf\{-f(z) + p(z + x_0) : z \in D(f)\}$$

Por tanto, si probamos que el supremo de la izquierda es menor o igual que el ínfimo de la derecha, eligiendo  $\alpha$  cualquier valor real comprendido entre ambos (o incluso igual al supremo o al ínfimo) habremos construido una aplicación  $\hat{f}$  que cumple con los tres puntos anteriores y con la condición (1.1), que es la condición que veníamos buscando.

Para demostrar la desigualdad entre supremo e ínfimo, basta observar que para  $z, w \in D(f)$  se verifica:

$$f(z) + f(w) = f(z + w) \leq p(z + w) = p(z + x_0 - x_0 + w) \leq p(z + x_0) + p(w - x_0)$$

y despejando llegamos a que:

$$f(w) - p(w - x_0) \leq -f(z) + p(z + x_0) \quad \forall z, w \in D(f)$$

Lo que demuestra que:

$$\sup\{f(-z) - p(-z - x_0) : z \in D(f)\} \leq \inf\{-f(z) + p(z + x_0) : z \in D(f)\}$$

Como hemos comentado anteriormente, tomando por ejemplo:

$$\alpha = \sup\{f(-z) - p(-z - x_0) : z \in D(f)\} \in \mathbb{R}$$

en la definición de  $\hat{f}$  nos garantiza la condición (1.1), que junto con las otras condiciones nos dice que  $\hat{f} \in P$ . Además, por la definición de  $\hat{f}$  es claro que  $f \leq \hat{f}$ , donde  $f$  era un elemento maximal de  $P$ . Hemos llegado a una contradicción, que venía de suponer que  $D(f) \subsetneq E$ , por lo que  $D(f)$  ha de ser igual a  $E$ , luego hemos encontrado la aplicación que el Teorema enunciaba, lo que concluye la demostración. □

Volviendo al caso que nos interesaba, tenemos ya respuesta al Teorema anteriormente planteado:

**Corolario 1.18.1.** *Sea  $E$  un espacio vectorial,  $G \subset E$  un subespacio vectorial suyo y  $g : G \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y continua, existe entonces  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y continua de forma que  $f|_G = g$ . Además:*

$$\|f\| = \|g\|$$

*Demostración.* Como  $g$  es una aplicación lineal y continua, si recordamos que:

$$\|g\| = \inf\{M > 0 : |g(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in G\}$$

Si definimos  $p : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $p(x) = \|g\|\|x\|$  para  $x \in E$ , vimos en el Ejercicio 1.4.1 que  $p$  verificaba:

- $p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E$
- $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \forall x \in E$

y la condición que hemos expresado arriba nos dice que  $g(x) \leq p(x)$  para todo  $x \in G$ . Aplicando el Teorema de Hahn Banach, tenemos que existe una aplicación  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal que verifica:

- $f|_G = g$
- $f(x) \leq p(x) \quad \forall x \in E$

falta ver que  $f$  es continua para acabar la demostración. Para ello, observemos que la condición  $f(x) \leq p(x) \quad \forall x \in E$  implica:

$$-f(x) = f(-x) \leq p(-x) = \|g\| \|x\| - x = \|g\| \|x\| = p(x) \quad \forall x \in E$$

Por lo que tenemos que  $|f(x)| \leq \|g\| \|x\| \quad \forall x \in E$ , y vimos en la Proposición 1.13 que esta condición para una aplicación lineal era equivalente a que la aplicación sea continua. Además, la desigualdad superior implica que  $\|f\| \leq \|g\|$ . Si notamos ahora que:

$$|g(x)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\| \quad \forall x \in G$$

Deducimos entonces que  $\|g\| \leq \|f\|$ , por lo que  $\|f\| = \|g\|$ . □

**Corolario 1.18.2.** Sea  $E$  un espacio vectorial,  $\forall x_0 \in E \exists f_0 \in E^*$  de forma que:

$$\|f_0\| = \|x_0\| \quad y \quad f_0(x_0) = \|x_0\|^2$$

*Demostración.* Si  $x_0 = 0$ , tomando  $f_0 = 0$  se tiene. Suponemos por tanto que  $x_0 \neq 0$ . Sea  $G = \mathbb{R}x_0$ , defino  $g : G \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$g(tx_0) = t\|x_0\|^2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

es fácil ver que  $g$  es lineal. Definimos  $p : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$p(y) = \|y\| \|x_0\| \quad \forall y \in E$$

Veamos que cumple las propiedades de la  $p$  del Teorema:

- Si  $\lambda > 0$ , entonces:

$$p(\lambda y) = \|\lambda y\| \|x_0\| = \lambda \|y\| \|x_0\| = \lambda p(y) \quad \forall y \in E$$

- Ahora:

$$p(y_1 + y_2) = \|y_1 + y_2\| \|x_0\| \leq \|y_1\| \|x_0\| + \|y_2\| \|x_0\| = p(y_1) + p(y_2) \\ \forall y_1, y_2 \in E$$

Vemos ahora que  $p$  domina a  $g$ :

- Si  $t \geq 0$ , entonces  $g(tx_0) = t\|x_0\|^2 = p(tx_0)$ .

- Si  $t < 0$ , entonces  $g(tx_0) = t\|x_0\|^2 < 0 \leq p(tx_0)$ .

Es decir,  $g(tx_0) \leq p(tx_0) \forall t \in \mathbb{R}$ . Aplicando el Teorema de Hahn Banach vemos que  $\exists f : E \rightarrow \mathbb{R}$  de forma que  $f|_G = g$  y  $f(y) \leq p(y) \quad \forall y \in E$ .

Vemos fácilmente que  $f$  es continua, por estar dominada por la función  $p$ , luego  $f \in E^*$ .

- $f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|^2$ .
- Como  $f(y) \leq \|x_0\|\|y\| \quad \forall y \in E$ , cambiando  $y$  por  $-y$  conseguimos:

$$|f(y)| \leq \|x_0\|\|y\|$$

De donde  $\|f\| \leq \|x_0\|$ . Si ahora vemos:

$$f(x_0) = \|x_0\|^2 = \|x_0\|\|x_0\|$$

deducimos que  $\|f\| = \|x_0\|$ .

□

**Corolario 1.18.3.** *Para todo  $x \in E$  se tiene que:*

$$\|x\| = \sup\{|f(x)| : f \in E^*, \|f\| \leq 1\} = \max\{|f(x)| : f \in E^*, \|f\| \leq 1\}$$

*Demostración.* Si  $x = 0$ , cualquier aplicación lineal cumple  $f(0) = 0$ , luego es obvio el resultado. Supuesto que  $x_0 \in E \setminus \{0\}$ , dada  $f \in E^*$  con  $\|f\| \leq 1$ , tenemos entonces que:

$$|f(x_0)| \leq \|f\|\|x_0\| \leq \|x_0\| \implies \|x_0\| \geq \sup\{|f(x_0)| : f \in E^*, \|f\| \leq 1\}$$

Por el Corolario anterior, para  $x$  sabemos que  $\exists f_0 \in E^*$  de forma que:

$$\|f_0\| = \|x_0\|, \quad f_0(x_0) = \|x_0\|^2$$

Si tomamos  $f = f_0/\|x_0\|$ , tenemos entonces que:

$$\|f\| = \left\| \frac{f_0}{\|x_0\|} \right\| = \frac{\|f_0\|}{\|x_0\|} = 1$$

Y además:

$$f(x_0) = \frac{f_0(x_0)}{\|x_0\|} = \frac{\|x_0\|^2}{\|x_0\|} = \|x_0\|$$

Por lo que el supremo se alcanza, luego es un máximo.

□

### 1.4.1. Versiones geométricas del Teorema

Aunque no lo demostremos, las sucesivas versiones geométricas del teorema de Hahn Banach son equivalentes a la ya vista. Para realizar la formulación del Teorema será necesario tener claros ciertos conceptos:

**Definición 1.10** (Hiperplano afín). Sea  $E$  un espacio vectorial, un hiperplano afín de  $E$  es un subconjunto  $H \subset E$  de la forma:

$$H = \{x \in E : f(x) = \alpha\} = f^{-1}(\{\alpha\})$$

donde  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  es una aplicación lineal no nula y  $\alpha \in \mathbb{R}$ . En dicho caso, escribiremos  $H = [f = \alpha]$ .

*Observación.* Cuando trabajábamos en asignaturas anteriores en espacios vectoriales de dimensión finita (digamos  $n$ ), para nosotros un hiperplano era un subespacio vectorial de dimensión  $n - 1$ . Ahora, si nos encontramos en un espacio vectorial  $E$  genérico (no necesariamente de dimensión finita), el primer Teorema de Isomorfía de aplicaciones lineales aplicado a  $f$  nos da el isomorfismo lineal

$$E / \ker f \cong \text{Im } f$$

Como  $f$  era lineal, ha de ser obligatoriamente  $\dim \text{Im } f = 1$ . Observemos que en el caso  $H = [f = 0] = \ker f$ , tenemos que  $\dim(E/H) = 1$ , de donde si  $E$  es de dimensión finita, tenemos  $\dim H = \dim E - 1$ . Si consideramos ahora  $H = [f = \alpha]$  con  $\alpha \neq 0$ , tenemos que:

$$H = \{x \in E : f(x) = \alpha\} = \{x + v : x \in E, v \in \ker f, f(x) = \alpha\}$$

Por lo que podemos ver  $H$  como un trasladado de  $\ker f$ , como un hiperplano afín.

*Observación.* Notemos además que si  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  es una aplicación lineal y continua, entonces el hiperplano  $H = [f = \alpha]$  para cierto  $\alpha \in \mathbb{R}$  es un hiperplano cerrado.

La condición que nos va a interesar es buscar bajo qué condiciones cuando nos dan dos subconjuntos de un espacio normado vamos a poder separarlos mediante un hiperplano afín. Para ello, es necesario formalizar la idea de “separar dos subconjuntos de un espacio”.

**Definición 1.11.** Sea  $E$  un espacio vectorial,  $A, B \subset E$ , diremos que el hiperplano  $H = [f = \alpha]$  separa  $A$  y  $B$  si:

$$f(x) \leq \alpha \leq f(y) \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in B$$

Además, diremos que la separación es estricta (o que  $H$  separa estrictamente  $A$  y  $B$ ) si  $\exists \varepsilon > 0$  de forma que:

$$f(x) \leq \alpha - \varepsilon < \alpha + \varepsilon \leq f(y) \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in B$$

**Teorema 1.19** (Hahn Banach, primera versión geométrica). Sea  $E$  un espacio normado,  $\emptyset \neq A, B \subset E$  con  $A \cap B = \emptyset$ , ambos convexos y  $A$  abierto, entonces existe un hiperplano cerrado<sup>4</sup>  $H = [f = \alpha]$  que separa  $A$  y  $B$ .

<sup>4</sup>Luego habrá una aplicación lineal y continua  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ , por lo que  $E^* \neq \{0\}$ .



*Demostración.* El Teorema se demuestra en dos pasos:

**Paso 1.** Supongamos en una versión más débil que  $B$  se reduce a un punto, es decir, existe  $x_0 \in E$  de forma que  $B = \{x_0\}$  y que  $A \subset E$  es un conjunto abierto y convexo de forma que  $x_0 \notin A$ .

Elegimos  $z_0 \in A$  y definimos  $C = A - z_0$ , que:

- Contiene al 0, ya que como  $z_0 \in A$ , entonces  $0 = z_0 - z_0 \in C$ .
- Es abierto, ya que si consideramos la traslación según el vector  $z_0$ :

$$\begin{aligned} t_{z_0} : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x + z_0 \end{aligned}$$

tenemos que  $t_{z_0}$  es una aplicación continua, con inversa  $t_{z_0}^{-1} = t_{-z_0}$ . Como  $C = t_{-z_0}(A) = t_{z_0}^{-1}(A)$  y tenemos que  $A$  era abierto y  $t_{z_0}$  una aplicación continua, concluimos que  $C$  es abierto.

- Es convexo, ya que si  $x, y \in C = A - z_0$  tenemos entonces que existen  $u, v \in A$  de forma que:

$$x = u - z_0, \quad y = v - z_0$$

Si tomamos  $t \in [0, 1]$ , entonces:

$$tx + (1 - t)y = t(u - z_0) + (1 - t)(v - z_0) = \underbrace{tu + (1 - t)v}_{\in A} - z_0 \in C$$

El punto  $y_0 = x_0 - z_0 \notin C$ , de donde  $y_0 \neq 0$ . Por lo que  $\mathbb{R}y_0$  es un subespacio vectorial de  $E$  de dimensión 1. Definimos  $G = \mathbb{R}y_0$  y tomamos

$$\begin{aligned} g : G &\longrightarrow \mathbb{R} \\ ty_0 &\longmapsto t \end{aligned}$$

que es una aplicación lineal (compruébese) y verificando  $g(y_0) = 1$ . La función  $g$  nos permitirá “separar el corte de  $C$  con  $G$  y el punto  $y_0$ ”. En este punto conviene estudiar el funcional de Minkoski del conjunto  $C$ , que se define en la Definición 1.12 y cuyas propiedades se aclaran en la Proposición 1.20. Sea  $p$  el funcional de Minkoski de  $C$ , veamos que  $p$  domina a  $g$ :

- Si  $t \geq 0$ , como  $y_0 \notin C$  entonces<sup>5</sup>  $p(y_0) \geq 1$ , de donde:

$$g(ty_0) = t \leq tp(y_0) \stackrel{(1)}{=} p(ty_0)$$

- Si  $t < 0$ , tenemos que:

$$g(ty_0) = t < 0 \leq p(ty_0)$$

---

<sup>5</sup>Usando la propiedad 3 del funcional.

En cualquier caso,  $g(ty_0) \leq p(ty_0) \forall t \in \mathbb{R}$ . Nos encontramos en las hipótesis del Teorema de Hahn-Banach, por lo que podemos encontrar  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal de forma que:

$$f|_G = g \quad \text{y} \quad f(y) \leq p(y) \quad \forall y \in E$$

La propiedad 2 del funcional nos dice que  $\exists M > 0$  de forma que:

$$f(y) \leq p(y) \leq M\|y\| \quad \forall y \in E$$

Si aplicamos esta propiedad para  $-y$ :

$$-f(y) = f(-y) \leq M\|-y\| = M\|y\|$$

De donde:

$$|f(y)| \leq M\|y\| \quad \forall y \in E$$

Como  $f$  es lineal, la Proposición 1.13 nos dice que  $f$  es continua.

Si ahora usamos la propiedad 3 del funcional de Minkoski, observamos que:

$$f(x) \leq p(x) < 1 = f(y_0) \quad \forall x \in C$$

por lo que el hiperplano cerrado  $H' = [f = 1]$  separa  $C$  y  $B' = \{y_0\}$ .

Si volvemos al problema de separar  $A$  y  $B = \{x_0\}$ , observamos que:

$$f(x) = f(y + z_0) = f(y) + f(z_0) \leq 1 + f(z_0) = f(y_0 + z_0) = f(x_0) \quad \forall x \in A$$

Por lo que el hiperplano cerrado  $H = [f = f(x_0)]$  separa  $A$  y  $B = \{x_0\}$ , como queríamos probar en este primer paso.

**Paso 2.** Volviendo al caso que nos plantea el Teorema siendo  $B$  un conjunto convexo y disjunto de  $A$ , tomamos:

$$A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}$$

Observemos que:

- $0 \notin A - B$ , ya que  $A \cap B = \emptyset$ .
- $A - B$  es abierto, ya que podemos escribir:

$$A - B = \bigcup_{b \in B} (A - b)$$

y en la demostración del paso anterior ya probamos que la traslación de un conjunto abierto sigue siendo abierto.

- $A - B$  es convexo, ya que si  $\alpha, \beta \in A - B$ , existen  $a, a' \in A$ ,  $b, b' \in B$  de forma que:

$$\alpha = a - b, \quad \beta = a' - b'$$

Por lo que:

$$t\alpha + (1-t)\beta = t(a-b) + (1-t)(a'-b') = \underbrace{ta + (1-t)b}_{\in A} - \underbrace{[tb + (1-t)b']}_{\in B} \in C$$

donde hemos usado que tanto  $A$  como  $B$  son convexos.

Estamos en las condiciones del paso anterior, por lo que existen  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y continua y  $\alpha \in \mathbb{R}$  de forma que el hiperplano cerrado  $H = [f = \alpha]$  separa  $A - B$  del conjunto  $\{0\}$ , es decir:

$$f(a) - f(b) = f(a - b) \leq \alpha \leq f(0) = 0 \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B$$

de donde:

$$f(a) \leq \alpha - f(b) \leq f(b) \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B$$

Por lo que el hiperplano cerrado  $H' = [f = \alpha - f(b)]$  separa los conjuntos  $A$  y  $B$ .

□


### Funcional de Minkowski de un conjunto

En este subapartado definiremos el funcional de Minkowski de un conjunto, una cierta aplicación con propiedades interesantes que nos permite realizar la demostración de la primera versión geométrica del Teorema de Hahn Banach y que además tiene cierto interés fuera de esta demostración, como luego se pondrá de manifiesto en los ejercicios a realizar.

**Definición 1.12** (Funcional de Minkowski). Sea  $E$  un espacio normado y  $C \subset E$  un conjunto convexo, abierto y con  $0 \in C$ , definimos el funcional de Minkowski de  $C$  como la aplicación  $p : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$p(x) = \inf \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^+ : \frac{x}{\alpha} \in C \right\} \quad \forall x \in E$$

*Observación.* Bajo las hipótesis de la definición del funcional de Minkowski, observamos que lo que estamos haciendo es, fijado un punto  $x \in E \setminus \{0\}$ , tomar la recta de origen 0 que pasa por  $x$ , y si multiplicamos  $x$  por un escalar positivo, nos movemos por dicha recta. En particular, si multiplicamos  $x$  por el inverso de un escalar positivo, si aumentamos dicho escalar, nos estaremos acercando a 0, y si decremos dicho escalar, nos alejaremos de 0. Notemos que lo que estamos haciendo por la definición del funcional de Minkowski es tomar aquel valor más “pequeño” para el cual si multiplicamos  $x$  por el inverso de un escalar que se queda por encima suya no nos saldremos del conjunto  $C$ .



Observemos que  $p(0) = 0$ . Además, el funcional de Minkowski tiene ciertas propiedades resaltables.

**Proposición 1.20.** Sea  $E$  un espacio normado y  $C \subset E$  un conjunto convexo, abierto y con  $0 \in C$ , el funcional de Minkowski verifica:

1.  $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad \forall x \in E, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^+$
2.  $\exists M > 0$  tal que  $0 \leq p(x) \leq M\|x\| \quad \forall x \in E$
3.  $C = \{x \in E : p(x) < 1\}$
4.  $p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E$

*Demostración.* Demostramos cada una de las propiedades:

1. Para la primera, basta usar que  $\lambda > 0$  y observar:

$$\begin{aligned} p(\lambda x) &= \inf \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^+ : \frac{x}{\alpha/\lambda} = \frac{\lambda x}{\alpha} \in C \right\} = \inf \left\{ \lambda \alpha \in \mathbb{R}^+ : \frac{x}{\alpha} \in C \right\} \\ &= \lambda \inf \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^+ : \frac{x}{\alpha} \in C \right\} = \lambda p(x) \quad \forall x \in E \end{aligned}$$

2. Dado  $x \in E$ , como  $0 \in C$  es abierto  $\exists r > 0$  de forma que  $B(0, r) \subset C$ . Si tomamos:

$$\alpha > \frac{\|x\|}{r} \implies \left\| \frac{x}{\alpha} \right\| < r \implies \frac{x}{\alpha} \in B(0, r) \subset C$$

Por tanto:

$$\left] \frac{\|x\|}{r}, +\infty \right[ \subset \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^+ : \frac{x}{\alpha} \in C \right\}$$

de donde el ínfimo de la derecha será menor o igual que el ínfimo de la izquierda:

$$p(x) \leq \frac{\|x\|}{r}$$

Tomamos  $M = \frac{1}{r}$ .

3. Queremos ver que  $C = \{x \in E : p(x) < 1\}$ :

⊃) Sea  $x \in E$  con  $p(x) < 1$ , el ínfimo nos garantiza la existencia de  $\alpha_0 \in \mathbb{R}^+$  de forma que  $\alpha_0 < 1$  y  $\frac{x}{\alpha_0} \in C$ . Como  $C$  es convexo y  $0 \in C$ , tenemos entonces que:

$$x = \alpha_0 \frac{x}{\alpha_0} + (1 - \alpha_0) \cdot 0 \in C$$

⊂) Sea  $x \in C$ , por ser  $C$  abierto  $\exists r > 0$  de forma que  $B(x, r) \subset C$ . Ahora, si tomamos  $\varepsilon > 0$  de forma que:

$$\frac{\|x\|}{r} < \frac{1}{\varepsilon}$$

tendremos entonces que:

$$\|(1 + \varepsilon)x - x\| = \|\varepsilon x\| = \varepsilon \|x\| < r \implies (1 + \varepsilon)x \in B(x, r)$$

En dicho caso, tendremos que:

$$p(x) \leq \frac{1}{1 + \varepsilon} < 1$$

4. Dados  $x, y \in E$ , sabemos que el conjunto:

$$\left\{ \alpha > 0 : \frac{x}{\alpha} \in C \right\}$$

es un intervalo no acotado superiormente y acotado inferiormente por  $p(x)$ , pero no sabemos si el intervalo contiene a  $p(x)$  (en cuyo caso se trataría de un mínimo) o si no. Sin embargo, lo que sí sabemos es que:

$$\frac{x}{p(x) + \varepsilon}, \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C \quad \forall \varepsilon > 0$$

Si usamos el apartado 3, tenemos que:

$$p\left(\frac{x}{p(x) + \varepsilon}\right) < 1$$

Como  $C$  es convexo, si tomamos:

$$t = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \leq 1$$

tenemos entonces que:

$$\frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} = t \frac{x}{p(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C \quad \forall x, y \in E$$

Usando de nuevo la propiedad 3:

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y) + 2\varepsilon \quad \forall x, y \in E, \quad \forall \varepsilon > 0$$

De donde deducimos la propiedad buscada. □

*Observación.* Notemos que si  $C = B(0, 1)$ , tenemos entonces que:

$$p(x) = \inf \left\{ \alpha > 0 : \frac{x}{\alpha} \in C \right\} = \|x\| \quad \forall x \in E$$

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $E$  un espacio vectorial y  $C$  un conjunto abierto, convexo y que contiene al 0, parece qer que  $p$  tiene propiedades deseables para ser una norma en  $E$  de forma que:

$$B_p(0, 1) = C$$

es decir, el funcional de Minkoski de alguna forma resuelve el problema de dado un conjunto que quiero que sea la bola unidad, ¿qué norma considero?.

Se pide razonar las propiedades que ha de cumplir un conjunto  $C \subset E$  abierto, convexo y que contiene al 0 para garantizar que el funcional de Minkowski de  $C$  sea una norma.

**Teorema 1.21** (Hahn Banach, segunda versión geométrica). *Sea  $E$  un espacio normado,  $\emptyset \neq A, B \subset E$  con  $A \cap B = \emptyset$  ambos convexos,  $A$  cerrado y  $B$  compacto, entonces existe un hiperplano que separa estrictamente  $A$  y  $B$ . Es decir, existen  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y continua,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\varepsilon > 0$  de forma que:*

$$f(a) \leq \alpha - \varepsilon < \alpha < \alpha + \varepsilon \leq f(b) \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B$$

*Demostración.* Sea  $C = A - B$ , tenemos que:

- $0 \notin C$ , ya que  $A \cap B = \emptyset$ .
- $C$  es convexo, ya que  $A$  y  $B$  son convexos (se hizo en la prueba del Teorema anterior).
- $C$  es cerrado, ya que  $A$  es cerrado y  $B$  es compacto: sea  $\{x_n\} \rightarrow x \in E$  con  $x_n \in C \quad \forall n \in \mathbb{N}$ , entonces existen  $\{a_n\}$  sucesión de puntos de  $A$  y  $\{b_n\}$  sucesión de puntos de  $B$  con:

$$x_n = a_n - b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Como  $B$  es compacto, existe una parcial  $\{b_{\sigma(n)}\}$  convergente a  $b \in B$ . Si vemos que:

$$x_{\sigma(n)} = a_{\sigma(n)} - b_{\sigma(n)} \implies a_{\sigma(n)} = x_{\sigma(n)} + b_{\sigma(n)} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tenemos entonces que  $\{a_{\sigma(n)}\} \rightarrow x+b$  y como  $A$  es cerrado, ha de ser  $x+b \in A$ . En definitiva:

$$x = x + b - b$$

Con  $x+b \in A$  y  $b \in B$ , por lo que  $x \in C$ , lo que demuestra que  $C$  es cerrado.

Como  $C$  es cerrado y  $0 \notin C$ , tenemos entonces que  $E \setminus C$  es abierto y  $0 \in E \setminus C$ , de donde  $\exists r > 0$  con que  $B(0, r) \cap C = \emptyset$ . Si usamos la primera versión geométrica del Teorema de Hahn-Banach para los conjuntos  $B(0, r)$  y  $C$ , obtenemos un hiperplano cerrado  $H = [f = \alpha]$  de forma que:

$$f(x) \leq \alpha \leq f(y) \quad \forall x \in C, \quad \forall y \in B(0, r)$$

es decir:

$$f(a - b) \leq \alpha \leq f(-rz) = -rf(z) \leq -r\|f\| \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B, \quad \forall z \in B(0, 1)$$

Si tomamos  $\varepsilon = \frac{1}{2}r\|f\|$ , tenemos entonces que:

$$f(a) + \varepsilon \leq f(b) - \varepsilon \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B$$

Tomando  $\beta = \min\{f(b) : b \in B\} + \varepsilon$ , tenemos entonces que:

$$f(a) \leq \beta - \varepsilon < \beta + \varepsilon \leq f(b) \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B$$

Es decir, el hiperplano cerrado  $H = [f = \beta]$  separa estrictamente  $A$  y  $B$ . □

Parece ser a priori un Teorema más potente que la primera versión geométrica del Teorema de Hahn-Banach, pero en dimensión infinita apenas hay conjuntos compactos.

**Corolario 1.21.1.** Sea  $E$  un espacio vectorial,  $F \subset E$  un subespacio vectorial de forma que  $\overline{F} \neq E$ , entonces existe  $f \in E^*$ ,  $f \neq 0$  de forma que:

$$f(x) = 0 \quad \forall x \in F$$

*Demostración.* Como  $\overline{F} \neq E$ , tomamos  $x_0 \in E \setminus \overline{F}$  y tenemos que  $\{x_0\}$  es compacto, así como que  $\{x_0\} \cap \overline{F} = \emptyset$ , con  $\overline{F}$  cerrado. Además, como  $F$  es un subespacio vectorial, tenemos que  $\overline{F}$  es un subespacio vectorial, luego convexo. Si aplicamos la segunda versión geométrica del Teorema de Hahn-Banach, obtenemos  $H = [f = \alpha]$  hiperplano cerrado que separa estrictamente  $\overline{F}$  y  $\{x_0\}$ . Es decir,  $\exists \varepsilon > 0$  de forma que:

$$f(x) \leq \alpha - \varepsilon < \alpha + \varepsilon \leq f(x_0) \quad \forall x \in \overline{F}$$

Tenemos que  $f \in E^*$  así como que  $f \neq 0$  (ya que tenemos una separación estricta de  $f(x_0)$ ). Finalmente:

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad \forall x \in \overline{F}$$

Fijaremos  $\lambda \in \mathbb{R}^*$ , tenemos que:

$$\lambda f(x) = f(\lambda x) < \alpha \quad \forall x \in \overline{F}$$

- Si  $\lambda > 0$ , tenemos entonces que:

$$f(x) < \frac{\alpha}{\lambda} \quad \forall \lambda > 0$$

luego  $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in F$ .

- Si  $\lambda < 0$ , tenemos que:

$$f(x) > \frac{\alpha}{\lambda} \quad \forall \lambda < 0$$

de la misma forma,  $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in F$ .

□

*Observación.* Notemos que el enunciado de este teorema es equivalente a:

Sea  $E$  un espacio vectorial,  $G \subset E$  un subespacio vectorial cerrado de  $E$  con  $G \neq E$ , entonces existe  $f \in E^*$ ,  $f \neq 0$  de forma que:

$$f(x) = 0 \quad \forall x \in G$$

Aunque esta forma de enunciarlo parezca más sencilla, preferimos enunciarlo de la primera forma, ya que lo que nos va a interesar del enunciado es su contrarrecíproco:

Sea  $E$  un espacio vectorial y  $F \subset E$  un subespacio vectorial, si  $\forall f \in E^*$ ,  $f \neq 0$ ,  $\exists x \in F$  con  $f(x) \neq 0$ , entonces  $F$  es denso en  $E$ .

Enunciado de otra forma más sencilla:

Si  $f \in E^* \setminus \{0\}$ , si la condición  $f|_F = 0$  implica  $f = 0$ , entonces  $F$  es denso en  $E$ .

Acabamos de encontrar una condición suficiente que nos permite probar que ciertos subespacios vectoriales de un espacio vectorial son densos, mediante una idea muy ingeniosa.

## 1.5. Espacio bidual

Sea  $E$  un espacio de banach y  $(E^*, \|\cdot\|_{E^*})$  su espacio dual con:

$$\|f\|_{E^*} := \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle f, x \rangle|$$

tenemos que  $(E^*, \|\cdot\|_{E^*})$  es completo (aunque  $E$  no lo fuera. Podemos entonces definir:

$$E^{**} = (E^*)^*$$

A cuyos elementos solemos denotar por legras griegas, si  $\chi : E^* \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} \chi : E^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \langle \chi, f \rangle \end{aligned}$$

y en dicho espacio consideramos:

$$\|\chi\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\langle \chi, f \rangle|$$

**Ejemplo.** Sea  $x \in E$ , le hacemos corresponder  $\chi_x$ , con:

$$\begin{aligned} \chi : E^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \langle f, x \rangle \end{aligned}$$

Que es lineal:

$$\chi_x(\lambda f + g) = \langle \lambda f + g, x \rangle = \lambda \langle f, x \rangle + \langle g, x \rangle = \chi_x(\lambda f) + \chi_x(g)$$

Y continua:

$$\|\chi_x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\chi_x(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\langle f, x \rangle| \stackrel{(*)}{=} \|x\|$$

donde en  $(*)$  usamos un Corolario de Hahn-Banach. En definitiva, tenemos una aplicación:

$$\begin{aligned} J : E &\longrightarrow E^{**} \\ x &\longmapsto J(x) \end{aligned}$$

Lineal, inyectiva y que conserva la norma, por lo que si restringimos  $J$  en codominio a  $J(E)$ , tenemos entonces que  $E$  y  $J(E)$  son isométricos, por lo que podemos ver que  $E$  como subespacio vectorial de  $E^{**}$ .

Decimos que un espacio  $E$  es reflexivo si  $J$  es sobreyectiva.



## 1.6. Dual de $l_p$ , para $1 \leq p < \infty$

Consideramos:

$$\mathbb{R}^{(\mathbb{N})} = \mathcal{L}(\{e_i : i \in \mathbb{N}\})$$

Supondremos siempre que:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1, \quad p^* = \infty \text{ si } p = 1$$

Y trataremos de probar siempre que  $(l_p)^* \cong l_{p^*}$ .

Veamos en primer lugar que

$$\overline{\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}} = l_p \quad \text{si } 1 \leq p < \infty$$

*Demostración.* Sea  $x \in l_p$ , definimos para cada  $n \in \mathbb{N}$ :

$$s_n = \sum_{k=1}^n x(k)e_k$$

$$\begin{aligned} s_1 &= (x(1), 0, \dots) \\ s_2 &= (x(1), x(2), 0, \dots) \end{aligned}$$

Vemos primero que  $s_n \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Además, observamos que  $s_n(k) = x(k)$  siempre que  $k \leq n$ , lo que nos dice que:

$$(\|x - s_n\|_p)^p = \sum_{k=n+1}^{\infty} (|x(k)|)^p \rightarrow 0$$

por lo que  $\{s_n\} \rightarrow x$  en  $l_p$ . □

Recordemos que si  $y \in \mathbb{R}^n$ , todos los funcionales lineales y continuos tienen la pinta de un producto escalar:

$$\sum_{k=1}^n x(k)y(k)$$

Ahora, tomaremos  $y \in l_{p^*}$  y definiremos  $\Phi_y : l_p \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\Phi_y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \quad \forall x \in l_p$$

que está bien definida (la serie) es convergente, puesto que:

$$x \in l_p, y \in l_{p^*} \implies xy \in l_1 \quad \text{y} \quad \|xy\|_1 \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*}$$

Hay que comprobar que  $\Phi_y$  es lineal, continua y preserva la norma.

- Es fácil ver que es lineal.

- Para ver que  $\Phi_y$  es continua, veamos que:

$$|\Phi_y(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)||y(n)| \stackrel{(*)}{\leq} \|y\|_{p^*} \|x\|_p$$

donde en  $(*)$  usamos la desigualdad de Hölder, con lo que  $\Phi_y$  es continua. Además,  $\|\Phi_y\| \leq \|y\|_{p^*}$ .

- Para la otra desigualdad, distinguimos dos casos:

- Para  $p = 1$ , tenemos que:

$$|y(n)| = |\Phi_y(e_n)| \leq \|\Phi_y\| \|e_n\|_1 = \|\Phi_y\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

de donde:

$$\|y\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |y(n)| \leq \|\Phi_y\|$$

- Para  $1 < p < \infty$ , tomamos:

$$x(n) = (|y(n)|)^{p^*-2} y(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

y razonando como en el caso de dimensión finita se ve la desigualdad:

$$\|y\|_{p^*} \leq \|\Phi_y\|$$

Tenemos pues que

$$\begin{array}{ccc} \Phi : & l_{p^*} & \longrightarrow & (l_p)^* \\ & y & \longmapsto & \Phi_y \end{array}$$

es lineal continua, y preserva la norma, es decir, es una isometría.

**Proposición 1.22.** Si  $1 \leq p < \infty$ , entonces  $\Phi$  es sobreyectiva.

*Demostración.* Fijado  $f \in l_p$ , definimos:

$$y(n) = f(e_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Si  $p = 1$ , escribimos:

$$|y(k)| = \alpha_k y(k), \quad \alpha_k = \begin{cases} 1 & \text{si } y(k) \geq 0 \\ -1 & \text{si } y(k) < 0 \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$|y(n)| = |f(e_n)| \leq \|f\| \|e_n\| = \|f\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por lo que la sucesión  $y$  está acotada, es decir,  $y \in l_{\infty}$ .

- Si  $p > 1$ , fijado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (|y(k)|)^{p^*} &= \sum_{k=1}^n (\alpha_k y(k))^{p^*-1} = \sum_{k=1}^n \alpha_k (|y(k)|)^{p^*-1} f(e_k) = f \left( \sum_{k=1}^n \alpha_k (|y(k)|)^{p^*-1} e_k \right) \\ &\leq \|f\| \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k (|y(k)|)^{p^*-1} e_k \right\|_p = \|f\| \left( \sum_{k=1}^n (|y(k)|)^{(p^*-1)p} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|f\| \left( \sum_{k=1}^n (|y(k)|)^{p^*} \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

Es decir:

$$\left( \sum_{k=1}^n |y(k)| \right)^{p^*} \leq \|f\| \left( \left( \sum_{k=1}^n |y(k)| \right)^{p^*} \right)^{\frac{1}{p}}$$

de donde:

$$\|f\| \geq \left( \sum_{k=1}^n |y(k)|^{p^*} \right)^{\frac{1}{p^*}} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

por lo que  $y \in l_{p^*}$ . Tenemos que:

$$\Phi_y(e_n) = y(n) = f(e_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

de donde  $f(x) = \Phi_y(x) \forall x \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ . Como es un conjunto denso, han de coincidir por continuidad en todo el espacio, con lo que:

$$f(x) = \Phi_y(x) \quad \forall x \in l_p$$

de donde  $\Phi_y = f$

□



## 2. Principio de acotación uniforme y $T^a$ de la gráfica cerrada

**Definición 2.1.** Sean  $E, F$  espacios normados, definimos:

$$L(E, F) = \{f : E \rightarrow F : f \text{ lineal y continua}\}$$

y notaremos normalmente  $L(E) := L(E, E)$ .

**Proposición 2.1.** *Al igual que como sucedía con aplicaciones lineales y continuas de un espacio normado  $E$  en  $\mathbb{R}$ , si  $E, F$  son espacios normados y  $T \in L(E, F)$  tenemos<sup>1</sup>:*

$$1. \ T \text{ es continua} \iff T \text{ es continua en } 0 \iff \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| < \infty$$

2. Si definimos:

$$\|T\| := \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \quad \forall T \in L(E, F)$$

Tenemos que  $\|\cdot\|$  es una norma en  $L(E, F)$ .

3. Se verifica que:

$$\|T\| = \inf\{M > 0 : \|Tx\| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in E\}$$

### 2.1. Principio de acotación uniforme

Con vistas a demostrar el Principio de acotación uniforme, demostramos el siguiente Lema:

**Lema 2.2.** *Sean  $E, F$  espacios normados y  $T \in L(E, F)$ , entonces:*

$$\sup_{\|x-x_0\| \leq r} \|Tx\| \geq r\|T\| \quad \forall x_0 \in E, \quad \forall r > 0$$

*Demostración.* Fijado  $r \in \mathbb{R}^+$ , sean  $x_0, y \in E$  con  $\|y\| \leq r$ :

$$\begin{aligned} \|Ty\| &= \left\| T \left( \frac{1}{2} [x_0 + y - (x_0 - y)] \right) \right\| = \frac{1}{2} \|T(x_0 + y - (x_0 - y))\| \\ &\leq \frac{1}{2} (\|T(x_0 + y)\| + \|T(x_0 - y)\|) \leq \max\{\|T(x_0 + y)\|, \|T(x_0 - y)\|\} \\ &\leq \sup_{\|y\| \leq r} \max\{\|T(x_0 + y)\|, \|T(x_0 - y)\|\} \leq \sup_{\|z-x_0\| \leq r} \|Tz\| \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup>Resultados análogos que se realizan con las mismas pruebas.

Si ahora observamos que:

$$\sup_{\|y\| \leq r} \|Ty\| = r \sup_{\|z\| \leq 1} \|Tz\| = r\|T\|$$

Acabamos de probar que  $\sup_{\|x-x_0\| \leq r} \|Tx\| \geq r\|T\|$ . □

**Teorema 2.3** (Principio de acotación uniforme). *Sea  $E$  un espacio de Banach,  $F$  un espacio normado y  $\mathcal{F}$  un subconjunto de  $L(E, F)$ , entonces:*

$$\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| < +\infty \quad \forall x \in E \quad \implies \quad \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| < +\infty$$

*Demostración.* Demostraremos el contrarrecíproco:

$$\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| = \infty \quad \implies \quad \sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| = \infty$$

Supongamos pues que  $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| = \infty$ , por lo que existe una sucesión de elementos de  $\mathcal{F}$ , llamémosla  $\{T_n\}$ , de forma que:

$$\|T_n\| \geq 4^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Definimos por inducción una sucesión de puntos de  $E$ :

- $x_0 = 0 \in E$ .
- Tomando  $r = 1/3$ , el Lema 2.2 nos dice:

$$\sup_{\|x-x_0\| < \frac{1}{3}} \|T_1x\| \geq \frac{1}{3}\|T_1\| > \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\|T_1\|$$

Como  $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \|T_1\|$  es estrictamente menor que el supremo de la izquierda, tenemos que no puede ser una cota superior de  $\|T_1x\|$  para  $x \in B(x_0, 1/3)$ , con lo que  $\exists x_1 \in B(x_0, 1/3)$  de forma que:

$$\|T_1x_1\| > \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\|T_1\|$$

- Supuesto que hemos construido hasta  $x_{n-1}$ , veamos cómo construir  $x_n$ :

Tomando  $r = 1/3^n$ , el Lema 2.2 nos dice que:

$$\sup_{\|x-x_{n-1}\| < \frac{1}{3^n}} \|T_nx\| \geq \frac{1}{3^n}\|T_n\| > \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^n}\|T_n\|$$

Y por el mismo razonamiento de antes podemos encontrar  $x_n \in B(x_{n-1}, 1/3^n)$  de forma que:

$$\|T_nx_n\| > \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^n}\|T_n\|$$

Veamos ahora que  $\{x_n\}$  es de Cauchy. Para ello, buscamos acotar  $\|x_m - x_n\|$  para  $n, m$  índices bastante avanzados. Supondremos sin pérdida de generalidad que  $n, m \in \mathbb{N}$  con  $m > n$ , donde tendremos:

$$\begin{aligned} \|x_m - x_n\| &= \|x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \dots + x_{n+1} - x_n\| \\ &\leq \|x_m - x_{m-1}\| + \|x_{m-1} - x_{m-2}\| + \dots + \|x_{n+1} - x_n\| \\ &\leq \frac{1}{3^m} + \frac{1}{3^{m-1}} + \dots + \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3^n} \left[ \frac{1}{3^{m-n}} + \dots + \frac{1}{3} \right] \\ &\leq \frac{1}{3^n} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{3^j} = \frac{1}{3^n} \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

En definitiva, tenemos que:

$$\|x_m - x_n\| = \|x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \dots + x_{n+1} - x_n\| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^n}$$

Por lo que  $\{x_n\}$  es de Cauchy en  $E$ , que era de Banach, por lo que  $\{x_n\}$  converge a cierto  $x \in E$ . Observemos que:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^n} \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \|x_m - x_n\| \stackrel{(*)}{=} \left\| \lim_{m \rightarrow \infty} (x_m - x_n) \right\| = \|x - x_n\|$$

donde en  $(*)$  hemos usado la continuidad de  $\|\cdot\|$ . Calculamos ahora:

$$\begin{aligned} \|T_n x\| &= \|T_n(x - x_n + x_n)\| \geq \|T_n x_n\| - \|T_n(x - x_n)\| \geq \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^n} \|T_n\| - \|T_n\| \|x - x_n\| \\ &\geq \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^n} \|T_n\| - \|T_n\| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^n} = \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{3^n} \|T_n\| = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3^n} \|T_n\| \geq \frac{1}{6} \left( \frac{4}{3} \right)^n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| = \infty$$

Como queríamos probar. □

Introducimos ahora una serie de Corolarios que nos da el Principio de acotación uniforme:

**Corolario 2.3.1.** Sean  $E, F$  dos espacios de Banach, sea  $\{T_n\}$  una sucesión de elementos de  $L(E, F)$  de forma que  $\{T_n(x)\} \rightarrow T(x)$  para todo  $x \in E$ . Entonces:

$$(a) \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty.$$

$$(b) T \in L(E, F).$$

$$(c) \|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|.$$

*Demostración.* Demostramos cada apartado:

(a) Dado  $x \in E$ , como  $\{T_n(x)\} \rightarrow T(x)$ , tenemos que  $\exists m \in \mathbb{N}$  de forma que:

$$T_n(x) \in B(T(x), 1) \quad \forall n \geq m$$

Por lo que  $\{T_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$  es un conjunto acotado, puesto que podemos verlo como la unión de un conjunto acotado y uno finito:

$$\{T_n(x) : n \in \mathbb{N}\} = \{T_n(x) : n \geq m\} \cup \{T_n(x) : n < m\}$$

En definitiva, tenemos que  $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n(x)\| < \infty$  para todo  $x \in E$ , de donde aplicando el Principio de acotación uniforme tenemos que  $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty$ .

(b) Veamos que  $T : E \rightarrow F$  es lineal y continua:

- Es fácil ver que  $T$  es lineal:

$$\begin{aligned} T(\lambda x + y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda T_n(x) + T_n(y)) \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(y) = \lambda T(x) + T(y) \quad \forall x, y \in E \end{aligned}$$

- Para ver que  $T$  es continua podemos usar el apartado (a):

$$\|T_n(x)\| \leq \|T_n\| \|x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| \|x\| \quad \forall x \in E$$

Y como  $\{\|T_n(x)\|\} \rightarrow \|T(x)\|$ , tenemos que:

$$\|T(x)\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| \|x\| \quad \forall x \in E$$

lo que nos dice que  $T$  es continua.

(c) Para ver que  $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$ , notemos que:

$$\begin{aligned} \|T(x)\| &= \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n(x)\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n(x)\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (\|T_n\| \|x\|) \\ &= \sup_{k \in \mathbb{N}} \inf_{n \geq k} (\|T_n\| \|x\|) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \inf_{n \geq k} \|T_n\| \cdot \|x\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \cdot \|x\| \quad \forall x \in E \end{aligned}$$

De donde  $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$ .

□

**Corolario 2.3.2.** Sea  $G$  un espacio de Banach y  $B \subset G$ , si para toda  $f \in G^*$  el conjunto  $f(B)$  está acotado (en  $\mathbb{R}$ ), entonces  $B$  está acotado.

*Demostración.* Comenzamos la demostración pensando a lo que queremos llegar, pues así nos será más fácil comenzar la demostración. Queremos probar que  $B$  está acotado, es decir, que existe  $M > 0$  de forma que:

$$\|b\| \leq M \quad \forall b \in B$$

Si recordamos que el Corolario 1.18.3 nos dice que:

$$\|b\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(b)|$$



observemos que lo queremos es buscar una cota superior de  $|f(b)|$ , donde  $b$  está fija y  $f$  se mueve. Para ello, podemos pensar en definir ciertos funcionales  $T_b(f)$  de forma que tras aplicar el Principio de Acotación Uniforme obtengamos para  $\|f\| \leq 1$ :

$$|f(b)| = |T_b(f)| \leq \|T_b\| \|f\| \leq \|T_b\| \leq \sup_{b \in B} \|T_b\| < \infty$$

Con lo que nuestra constante  $M$  la tomaremos como  $\sup_{b \in B} \|T_b\|$ . Comenzando ahora con la demostración, fijado  $b \in B$ , definimos la aplicación  $T_b : G^* \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$T_b(f) = f(b) \quad \forall f \in G^*$$

Con lo que  $T_b \in L(G^*, \mathbb{R})$ :

- Es claro que  $T_b$  es lineal.
- $T_b$  es continua, ya que  $|T_b(f)| = |f(b)| \leq \|b\| \|f\| \quad \forall f \in G^*$ .

Como  $f(B)$  es acotado para toda  $f \in G^*$ , tenemos entonces que:

$$\sup_{b \in B} |T_b(f)| = \sup_{b \in B} |f(b)| < \infty \quad \forall f \in G^*$$

Con lo que aplicando el Principio de acotación uniforme tenemos:

$$\sup_{b \in B} \|T_b\| < \infty$$

Ahora, si tomamos  $f \in G^*$  con  $\|f\| \leq 1$ , buscamos usar que  $\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|$ :

$$|f(b)| = |T_b(f)| \leq \|T_b\| \|f\| \leq \sup_{b \in B} \|T_b\| \|f\| \leq \sup_{b \in B} \|T_b\|$$

Por lo que  $\|b\| \leq \sup_{b \in B} \|T_b\| < \infty \quad \forall b \in B$ , lo que nos dice que  $B$  está acotado.  $\square$

Este último corolario nos dice que si  $B \subset G^*$  es un conjunto cualquiera, una forma de estudiar si  $B$  es un conjunto acotado, una posibilidad es tratar de calcular su imagen bajo cualquier función  $f \in G^*$ , que es un subconjunto de  $\mathbb{R}$ .

Recordemos que en  $\mathbb{R}^n$  un conjunto era acotado si y solo si cada una de sus proyecciones es un conjunto acotado. Este Corolario hace ese papel en espacios de dimensión infinita, que junto con el siguiente son muy utilizados.

**Corolario 2.3.3.** Sea  $G$  un espacio de Banach y sea  $B^* \subset G^*$ , si el conjunto:

$$B^*(x) = \{f(x) : f \in B^*\}$$

está acotado para todo  $x \in G$ , entonces  $B^*$  está acotado.

*Demostración.* Al igual que antes empezamos por el final, pues así nos será más fácil comenzar la demostración. Queremos concluir que  $B^*$  está acotado, es decir, que:

$$\|f\| \leq M \quad \forall f \in B^*$$

para cierta constante  $M > 0$ . Para ello, si recordamos la definición de  $\|f\|$ , vemos que:

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

donde  $f$  está fija y movemos la  $x$ , con lo que trataremos de definir funcionales  $T_f(x)$  de forma que para  $\|x\| \leq 1$ :

$$|f(x)| = |T_f(x)| \leq \|T_f\| \|x\| \leq \|T_f\| \leq \sup_{f \in B^*} \|T_f\|$$

Comenzando ahora con la demostración, para cada  $f \in B^*$  definimos la aplicación  $T_f : G \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$T_f(x) = f(x) \quad \forall x \in G$$

con lo que  $T_f \in G^*$  para todo  $f \in B^*$ :

- Es fácil ver que  $T_f$  es lineal para cualquier  $f \in B^*$ .
- No es difícil ver que  $T_f$  es continua para  $f \in B^*$ , ya que:

$$|T_f(x)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\| \quad \forall x \in G$$

Como el conjunto  $B^*(x)$  está acotado para todo  $x \in G$ , tenemos que:

$$\sup_{f \in B^*} \|T_f(x)\| = \sup_{f \in B^*} |f(x)| < \infty$$

nos encontramos en las hipótesis del Principio de acotación uniforme, que nos dice que entonces:

$$\sup_{f \in B^*} \|T_f\| < \infty$$

en cuyo caso, si  $\|x\| \leq 1$ , entonces:

$$|f(x)| = |T_f(x)| \leq \|T_f\| \|x\| \leq \|T_f\| \leq \sup_{f \in B^*} \|T_f\| \quad \forall f \in B^*$$

con lo que:

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \leq \sup_{f \in B^*} \|T_f\| \quad \forall f \in B^*$$

de donde deducimos que  $B^*$  está acotado. □

## 2.2. Otra demostración del Principio de acotación uniforme

Repetiremos ahora la demostración del Principio de acotación uniforme de otra forma, usando el Lema de Baire, un resultado clásico que nos da de forma no muy complicada la demostración del Principio.

**Lema 2.4** (de Baire). *Sea  $X$  un espacio métrico completo, sea  $\{X_n\}$  una sucesión de subconjuntos de  $X$  todos ellos cerrados y con interior vacío, entonces:*

$$\text{Int} \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right) = \emptyset$$

*Demostración.* Tomaremos  $O_n = X \setminus X_n$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ , con lo que  $O_n$  es abierto y denso para cada  $n \in \mathbb{N}$ , ya que:

$$\overline{O_n} = \overline{X \setminus X_n} = X \setminus \text{Int } X_n = X \setminus \emptyset = X \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Y la prueba terminará probando que  $G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n$  es denso, ya que en dicho caso tendremos:

$$X = \overline{G} = \overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n} = \overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X \setminus X_n} = \overline{X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n} = X \setminus \text{Int} \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right)$$

de donde podremos deducir que  $\text{Int} \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right) = \emptyset$ . Para probar que  $G$  es denso, sea  $\omega$  un abierto no vacío de  $X$ , tenemos que probar que  $\omega \cap G \neq \emptyset$ . Como  $\omega$  es abierto, dado  $x_0 \in \omega$  podemos encontrar  $r_0 > 0$  de forma que:

$$\overline{B(x_0, r_0)} \subset \omega$$

Tras esto, como  $O_1$  es abierto y denso, podremos elegir  $x_1 \in B(x_0, r_0) \cap O_1$  y  $r_1 > 0$  de forma que:

$$\overline{B(x_1, r_1)} \subset B(x_0, r_0) \cap O_1 \quad \text{y} \quad 0 < r_1 < \frac{r_0}{2}$$

De forma inductiva, como cada  $O_n$  es abierto y denso, seremos capaces de encontrar dos sucesiones:  $\{x_n\}$  de puntos de  $X$  y  $\{r_n\}$  de reales positivos de forma que se cumpla:

$$\overline{B(x_{n+1}, r_{n+1})} \subset B(x_n, r_n) \cap O_{n+1} \quad \text{y} \quad 0 < r_{n+1} < \frac{r_n}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Veamos que  $\{x_n\}$  es de Cauchy. Para ello, sean  $n, m \in \mathbb{N}$  con  $m \geq n$ , tendremos que:

$$x_m \in B(x_{m-1}, r_{m-1}) \subset \dots \subset B(x_n, r_n) \\ r_n < \frac{r_{n-1}}{2} < \frac{r_{n-2}}{2^2} < \dots < \frac{r_0}{2^n}$$

Por lo que:

$$\|x_m - x_n\| < r_n < \frac{r_0}{2^n}$$

de donde deducimos que  $\{x_n\}$  es de Cauchy en  $X$ , y como  $X$  era completo, existe  $l \in X$  de forma que  $\{x_n\} \rightarrow l$ . Finalmente, como  $x_{n+p} \in B(x_n, r_n)$  para  $n, p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , tomando límite cuando  $p \rightarrow \infty$  obtenemos que:

$$l \in \overline{B(x_n, r_n)} \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

En particular,  $l \in \omega \cap G$ , por lo que  $G$  es denso, lo que concluye la demostración.  $\square$

Cabe destacar que una de las formas en las que más se utiliza el Lema de Baire es mediante su contrarrecíproco:

Sea  $X$  un espacio métrico completo, sea  $\{X_n\}$  una sucesión de subconjuntos de  $X$  todos ellos cerrados, entonces:

$$\text{Int} \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right) \neq \emptyset \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \text{Int}(X_{n_0}) \neq \emptyset$$

Ahora, volveremos a demostrar el Principio de acotación uniforme usando el Lema de Baire.

**Teorema 2.5** (Principio de acotación uniforme). *Sea  $E$  un espacio de Banach,  $F$  un espacio normado y  $\mathcal{F}$  un subconjunto de  $L(E, F)$ , entonces:*

$$\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| < +\infty \quad \forall x \in E \implies \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| < +\infty$$

*Demostración.* Suponiendo que indexamos nuestra familia mediante un conjunto  $I$ :  $\mathcal{F} = \{T_i\}_{i \in I}$ , definimos para cada  $n \in \mathbb{N}$ :

$$X_n = \{x \in E : \|T_i x\| \leq n, \quad \forall i \in I\}$$

que verifica:

- $X_n$  es cerrado para cada  $n \in \mathbb{N}$ , ya que si tomamos  $\{x_m\}$  una sucesión de puntos de  $X_n$  convergente a  $x \in E$ , tenemos entonces que  $\|T_i x_m\| \leq n$  para cada  $m \in \mathbb{N}$ . Usando que  $\|\cdot\|$  y que  $T_i$  son las dos funciones continuas obtenemos que:

$$\|T_i x\| \leq n$$

con lo que  $x \in X_n$ .

- Usando que  $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$ , sabemos entonces que existe  $M \in \mathbb{N}$  de forma que  $\|Tx\| \leq M$  para todo  $x \in E$  y  $T \in \mathcal{F}$ , con lo que  $X_M = E$ , luego:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n = E$$

Como  $E$  es abierto y es un espacio vectorial, tenemos que  $\text{Int } E = E \neq \emptyset$ . Por el Lema de Baire tenemos que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  de forma que  $\text{Int}(X_{n_0}) \neq \emptyset$ , lo que nos permite tomar  $x_0 \in E$  y  $r > 0$  de forma que  $B(x_0, r) \subset X_{n_0}$ , lo que nos dice por la definición de  $X_{n_0}$  que:

$$\|T_i(x_0 + rz)\| \leq n_0 \quad \forall i \in I, \quad \forall z \in B(0, 1)$$

como:

$$n_0 \geq \|T_i(x_0 + rz)\| \geq \|T_i(rz)\| - \|T_i(x_0)\| \implies r\|T_i(z)\| \leq n_0 + \|T_i(x_0)\|$$

$$\forall i \in I, \quad \forall z \in B(0, 1)$$

tendremos:

$$r\|T_i\| \leq n_0 + \|T_i(x_0)\| \leq n_0 + \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x_0)\| < \infty \quad \forall i \in I, \quad \forall z \in B(0, 1)$$

de donde concluimos que  $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| < \infty$  □

### 2.3. Teorema de la aplicación abierta

**Ejercicio 2.3.1.** Sean  $X, Y$  dos espacios de Banach,  $T \in L(X, Y)$ , definimos para cada  $n \in \mathbb{N}$  y para cada  $y \in Y$ :

$$\|y\|_n := \inf\{\|u\| + n\|v\| : u \in X, v \in Y \text{ con } y = T(u) + v\}$$

Probar que  $\|\cdot\|_n$  es una norma en  $Y$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , que verifica:

$$\|y\|_n \leq n\|y\| \quad \forall y \in Y$$

Además, si  $y = T(x)$  con  $x \in X$ , entonces:

$$\|y\|_n \leq \|x\|$$

Veamos en primer lugar que  $\|\cdot\|_n$  es una norma en  $Y$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Para ello, fijaremos  $n \in \mathbb{N}$  y veremos las propiedades de una norma:

- Para la no degeneración, supongamos que  $y \in Y$  con  $\|y\|_n = 0$ . Por definición del ínfimo, existen sucesiones  $\{u_m\}$  de puntos de  $X$  y  $\{v_m\}$  de puntos de  $Y$  de forma que:

$$\{\|u_m\| + n\|v_m\|\} \rightarrow 0 \quad y = T(u_m) + v_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

como  $\|u_m\|, \|v_m\| \geq 0$  para todo  $m \in \mathbb{N}$ , tenemos entonces que:

$$\{\|u_m\|\}, \{\|v_m\|\} \rightarrow 0 \implies \{u_m\}, \{v_m\} \rightarrow 0$$

usando ahora que  $y = T(u_m) + v_m$  para todo  $m \in \mathbb{N}$ , observemos que:

$$\{T(u_m) + v_m\} \rightarrow 0$$

donde hemos usado que  $T$  y la suma son continuas, con lo que  $y = 0$ .

- Para la homogeneidad por homotecias, sean  $\lambda \in \mathbb{R}$  y  $y \in Y$ :

$$\begin{aligned} |\lambda|\|y\|_n &= \inf\{|\lambda|(\|u\| + n\|v\|) : u \in X, v \in Y \text{ con } y = T(u) + v\} \\ &= \inf\{\|\lambda u\| + n\|\lambda v\| : u \in X, v \in Y \text{ con } y = T(u) + v\} \\ &= \inf\left\{\|u\| + n\|v\| : u \in X, v \in Y \text{ con } y = T\left(\frac{u}{\lambda}\right) + \frac{v}{\lambda}\right\} \\ &= \inf\{\|u\| + n\|v\| : u \in X, v \in Y \text{ con } \lambda y = T(u) + v\} = \|\lambda y\|_n \end{aligned}$$

- Finalmente, para la desigualdad triangular, sean  $y_1, y_2 \in Y$ , para todo  $\varepsilon > 0$  tenemos por la caracterización del ínfimo que existen  $u_1, u_2 \in X$ ,  $v_1, v_2 \in Y$  de forma que:

$$y_i = T(u_i) + v_i \quad y \quad \|u_i\| + n\|v_i\| \leq \|y_i\| + \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall i \in \{1, 2\}$$

de donde  $y_1 + y_2 = T(u_1) + v_1 + T(u_2) + v_2 = T(u_1 + u_2) + v_1 + v_2$ , por lo que:

$$\begin{aligned} \|y_1 + y_2\| &\leq \|u_1 + u_2\| + n\|v_1 + v_2\| \leq \|u_1\| + n\|v_1\| + \|u_2\| + n\|v_2\| \\ &\leq \|y_1\| + \|y_2\| + \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \end{aligned}$$

En definitiva, hemos probado que  $\|y_1 + y_2\| \leq \|y_1\| + \|y_2\|$ .

Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , sea ahora  $y \in Y$ , tomando  $u = 0 \in X$  y  $v = y \in Y$ , tenemos que:

$$y = 0 + y = T(u) + v$$

por lo que:

$$\|y\|_n \leq \|u\| + n\|v\| = n\|y\|$$

Si tenemos ahora que  $y = T(x)$  para  $x \in X$ , podemos tomar  $u = x \in X$  y  $v = 0 \in Y$  con lo que:

$$y = y + 0 = T(x) + v$$

por lo que:

$$\|y\|_n \leq \|u\| + n\|v\| = \|x\|$$

**Ejercicio 2.3.2.** Si  $T : X \rightarrow Y$  es una aplicación lineal entre dos espacios normados:

$$T \text{ es abierta} \iff \exists \delta > 0 : B(0, \delta) \subset T(B(0, 1))$$

**Teorema 2.6** (de la aplicación abierta).

Sean  $X, Y$  espacios de Banach, sea  $T \in L(X, Y)$  sobreyectiva, entonces  $T$  es una aplicación abierta.

*Demostración.* La demostración se completa en dos pasos:

**Paso 1.** Veamos que  $\exists r > 0$  de forma que  $B(0, r) \subset \overline{T(B(0, 1))}$ :

Consideramos en  $Y$  la norma:

$$\|y\|_n = \inf\{\|u\| + n\|v\| : y = T(u) + v, u \in X, v \in Y\} \quad \forall y \in Y, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Que abreviaremos por:

$$\|y\|_n = \inf_{y=T(u)+v} \{\|u\| + n\|v\|\}$$

Cuyas propiedades fueron vistas en el Ejercicio 2.3.1. Consideramos ahora  $Z$  como el espacio de todas aquellas sucesiones casi nulas<sup>2</sup>  $\{z_n\}$  de puntos de  $Y$ . Consideraremos en dicho espacio:

$$\|\{z_n\}\|_\infty = \max_{n \in \mathbb{N}} \|z_n\|_n \quad \forall \{z_n\} \in Z$$

Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , definimos la aplicación

$$\begin{aligned} T_n : Y &\longrightarrow Z \\ y &\longmapsto T_n(y) \end{aligned}$$

dada por:

$$T_n(y) = \{\delta_{n,k} \cdot y\}_{k \in \mathbb{N}}$$

donde usamos la  $\delta$  de Dirichlet:

$$\delta_{n,k} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Veamos que  $T_n \in L(Y, Z)$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Para ello, dado  $n \in \mathbb{N}$ ; vemos que:

---

<sup>2</sup>Es decir, con un número finito de términos no nulos.

- Es lineal, ya que si  $y_1, y_2 \in Y$ :

$$\begin{aligned} T_n(y_1 + y_2) &= \{\delta_{n,k} \cdot (y_1 + y_2)\}_{k \in \mathbb{N}} = \{\delta_{n,k} \cdot y_1 + \delta_{n,k} \cdot y_2\}_{k \in \mathbb{N}} \\ &= \{\delta_{n,k} \cdot y_1\}_{k \in \mathbb{N}} + \{\delta_{n,k} \cdot y_2\}_{k \in \mathbb{N}} = T_n(y_1) + T_n(y_2) \end{aligned}$$

- Para ver que  $T_n : (Y, \|\cdot\|) \rightarrow (Z, \|\cdot\|_\infty)$  es continua:

$$\begin{aligned} \|T_n(y)\|_\infty &= \|\{\delta_{n,k} \cdot y\}_{k \in \mathbb{N}}\|_\infty = \max_{n \in \mathbb{N}} \|\delta_{n,k} \cdot y\|_n \\ &= \max_{k \in \mathbb{N}} (\delta_{n,k} \cdot \|y\|_n) = \|y\|_n \stackrel{(*)}{\leq} n\|y\| \quad \forall y \in Y \end{aligned}$$

donde en  $(*)$  hemos usado el Ejercicio 2.3.1.

Veamos ahora que para cada  $y \in Y$ , la sucesión  $\{T_n(y)\}$  está acotada. Para ello, sea  $y \in Y$ , como  $T$  es sobreyectiva  $\exists x \in X$  de forma que  $T(x) = y$ , con lo que:

$$\|T_n(y)\|_\infty = \|y\|_n \stackrel{(*)}{\leq} \|x\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

donde en  $(*)$  hemos vuelto a usar el Ejercicio 2.3.1. Aplicando el Principio de acotación uniforme, tenemos que  $\{\|T_n\|\}$  está acotada, es decir, existe  $M > 0$  de forma que:

$$\|T_n\| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

con lo que:

$$\|y\|_n = \|T_n(y)\|_\infty \leq M\|y\| \quad \forall y \in Y$$

Sea  $y \in B(0, 1/M)$ , queremos deducir que  $y \in \overline{T(B(0, 1))}$ :

$$\|y\|_n = \inf_{y=T(u)+v} \{\|u\| + n\|v\|\} \leq M\|y\| < \frac{M}{M} = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Como el ínfimo de dicho conjunto es menor que 1, han de existir sucesiones  $\{u_m\}$  en  $X$  y  $\{v_m\}$  en  $Y$  de forma que:

$$y = T(u_m) + nv_m \quad \|u_m\| + n\|v_m\| < 1 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos entonces que:

$$\|u_m\|, n\|v_m\| < 1 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

luego  $\|v_m\| < 1/n$  para todo  $m \in \mathbb{N}$ . Ahora:

$$T(u_n) = T(u_n) + v_n - v_n = y - v_n \stackrel{(*)}{\rightarrow} y$$

donde en  $(*)$  usamos que  $\|v_m\| < 1/n$ . Observamos ahora que  $u_n \in B(0, 1)$  y que  $v_n \rightarrow 0$ , por lo que ha de ser  $y \in \overline{T(B(0, 1))}$ . Tomando  $r = 1/M$  tenemos el paso 1.

**Paso 2.** Veamos ahora que  $B(0, \frac{r}{2}) \subset T(B(0, 1))$ .

Sabemos del paso 1 que  $\exists r > 0$  de forma que  $B(0, r) \subset \overline{T(B(0, 1))}$ , con lo que:

$$B\left(0, \frac{r}{2^n}\right) = \frac{1}{2^n} B(0, r) \subset \frac{1}{2^n} \overline{T(B(0, 1))} = \overline{T\left(B\left(0, \frac{1}{2^n}\right)\right)} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Para  $n = 1$  tenemos:

$$B\left(0, \frac{r}{2}\right) \subset \overline{T\left(B\left(0, \frac{1}{2}\right)\right)}$$

por lo que si  $y \in B\left(0, \frac{r}{2}\right)$ , tenemos entonces que existe  $x_1 \in B\left(0, \frac{1}{2}\right)$  tal que<sup>3</sup>  $\|y - T(x_1)\| < \frac{r}{2^2}$ , de donde  $y - T(x_1) \in B\left(0, \frac{r}{2^2}\right)$

- Para  $n = 2$ :

$$B\left(0, \frac{r}{2^2}\right) \subset \overline{T\left(B\left(0, \frac{1}{2^2}\right)\right)}$$

Como  $y - T(x_1) \in B\left(0, \frac{r}{2^2}\right)$ , podemos encontrar  $x_2 \in B\left(0, \frac{1}{2^2}\right)$  tal que  $\|y - T(x_1) - T(x_2)\| < \frac{r}{2^3}$ , de donde  $y - T(x_1) - T(x_2) \in B\left(0, \frac{r}{2^3}\right)$ .

- En definitiva, hemos obtenido  $x_n \in B\left(0, \frac{1}{2^n}\right)$  tal que:

$$\left\|y - \sum_{k=1}^n T(x_k)\right\| < \frac{r}{2^{n+1}} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (2.1)$$

Con lo que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty$$

Por lo que la serie  $\sum_{n \geq 1} x_n$  es convergente en norma, y como  $X$  es de Banach, tenemos que  $\sum_{n \geq 1} x_n$  es convergente, a cierto  $x \in X$ . Ahora:

$$\|x\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

De la ecuación (2.1) obtenemos que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} T(x_k) = y$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} T(x) &= T\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_k\right) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k\right) \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} T\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n T(x_k) = \sum_{n=1}^{\infty} T(x_k) = y \end{aligned}$$

donde en  $(*)$  usamos que  $T$  es continua. En definitiva, hemos probado que  $y \in T(B(0, 1))$ , ya que  $\|x\| < 1$ .

□

---

<sup>3</sup>Esta distancia podemos acotarla tanto como queramos.



**Corolario 2.6.1.** Sean  $E$  y  $F$  dos espacios de Banach y sea  $T \in L(E, F)$  biyectiva, entonces  $T^{-1}$  es también continua.

*Demostración.* Por el Teorema de la aplicación abierta tenemos que  $T$  es abierta

**Opción 1.** Deducimos que  $T$  es un homeomorfismo, luego  $T^{-1}$  es continua.

**Opción 2.** Sea  $U \subset E$  abierto, observamos que:

$$(T^{-1})^{-1}(U) = T(U)$$

y como  $T$  es abierta concluimos que  $T(U)$  es abierto, con lo que  $T^{-1}$  es continua. □

**Corolario 2.6.2.** Sea  $E$  un espacio vectorial con normas  $\|\cdot\|_1$  y  $\|\cdot\|_2$ . Supongamos que  $E$  es de Banach para ambas normas y que existe una constante  $C \geq 0$  de forma que:

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad \forall x \in E$$

Entonces, las dos normas son equivalentes, es decir, existe una constante  $c > 0$  de forma que:

$$\|x\|_1 \leq c\|x\|_2 \quad \forall x \in E$$

*Demostración.* Sea  $T : (E, \|\cdot\|_1) \rightarrow (E, \|\cdot\|_2)$  dada por  $T(x) = x$ , tenemos claramente que  $T$  es lineal, así como que:

$$\|T(x)\|_2 = \|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad \forall x \in E$$

por lo que  $T$  es continua. Es claro que también  $T \in L(E, E)$  es biyectiva, con lo que por el Ejercicio anterior tenemos que  $T^{-1}$  es también continua. Es obvio que  $T^{-1} : (E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1)$  viene dada por  $T^{-1}(x) = x$ . Es claro que se verifica la igualdad:

$$\|x\|_1 = \|T^{-1}(x)\|_1 \leq \|T^{-1}\|\|x\|_2 \quad \forall x \in E$$

Por lo que tomando  $c = \|T^{-1}\|$  se tiene el resultado. □

Por tanto, si tenemos dos normas completas, es suficiente comprobar una desigualdad para obtener la otra que nos demuestra que las dos normas son equivalentes.

## 2.4. Teorema de la gráfica cerrada

Sea  $T : E \rightarrow F$  una aplicación continua con  $E, F$  espacios de Banach, sabemos entonces que  $Gr(T)$  es cerrado en  $E \times F$ .

*Demostración.* Sea  $\{(x_n, T(x_n))\}$  una sucesión de elementos de  $Gr(T)$  convergente a un elemento  $(x, y)$  de  $E \times F$ , tenemos entonces que  $\{x_n\} \rightarrow x$  y como  $T$  es continua, deducimos que:

$$y \leftarrow \{T(x_n)\} \rightarrow T(x)$$

Por lo que  $y = T(x)$ , de donde  $(x, y) \in Gr(T)$ , por lo que  $Gr(T)$  es cerrado. □

**Teorema 2.7** (de la Gráfica Cerrada). Sean  $E, F$  dos espacios de Banach y  $T : E \rightarrow F$  una aplicación lineal. Si  $Gr(T)$  es cerrado, entonces  $T$  es continua.

*Demostración.* Definimos una nueva norma en  $E$ , que depende del funcional  $T$ :

$$\|x\|_T = \|x\|_E + \|Tx\|_F \quad \forall x \in E$$

Que es una norma:

- Sea  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $x \in E$ , usando que  $T$  es lineal:

$$\|\lambda x\|_T = \|\lambda x\|_E + \|T(\lambda x)\|_F = |\lambda|(\|x\|_E + \|T(x)\|_F) = |\lambda|\|x\|_T$$

- Tenemos que:

$$\|x\|_T = 0 \iff \|x\|_E + \|Tx\|_F \iff \begin{cases} \|x\|_E = 0 \\ \|Tx\|_F = 0 \end{cases} \iff x = 0$$

- Si  $x_1, x_2 \in E$ :

$$\begin{aligned} \|x_1 + x_2\|_T &= \|x_1 + x_2\|_E + \|T(x_1 + x_2)\|_F \leq \|x_1\|_E + \|x_2\|_E + \|Tx_1\|_F + \|Tx_2\|_F \\ &= \|x_1\|_T + \|x_2\|_T \end{aligned}$$

Además,  $(E, \|\cdot\|_T)$  es completo. Para ello, si  $\{x_n\}$  es una sucesión de puntos de  $E$  de Cauchy para  $\|\cdot\|_T$ , entonces:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n, m \geq n_0 \implies \|x_n - x_m\|_T < \varepsilon$$

Como:

$$\|x_n - x_m\|_T = \|x_n - x_m\|_E + \|T(x_n - x_m)\|_F \implies \begin{cases} \|x_n - x_m\|_E \\ \|T(x_n - x_m)\|_F \end{cases}$$

Por lo que  $\{x_n\}$  es de Cauchy para  $\|\cdot\|_E$  en  $E$  y  $\{T(x_n)\}$  es de Cauchy en  $F$ . Como ambos son espacios de Banach, existe  $x \in E$  y  $y \in F$  de forma que:

$$\|x_n - x\|_E \rightarrow 0 \quad \|T(x_n) - y\|_F \rightarrow 0$$

Como  $(x_n, Tx_n) \in Gr(T)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos entonces que  $\{(x_n, Tx_n)\}$  es una sucesión de puntos de  $Gr(T)$  convergente a  $(x, y)$ . Como por hipótesis  $Gr(T)$  es cerrado, tenemos entonces que  $(x, y) \in Gr(T)$ , por lo que  $y = T(x)$ .

Tenemos por tanto que  $\|x_n - x\|_E, \|Tx_n - Tx\|_F \rightarrow 0$ , de donde:

$$\|x_n - x\|_T = \|x_n - x\|_E + \|Tx_n - Tx\|_F \rightarrow 0$$

Por lo que  $\{x_n\}$  es convergente para  $\|\cdot\|_T$  a  $x$ , de donde  $(E, \|\cdot\|_T)$  es completo.

Observemos ahora que  $\|x\|_E \leq \|x\|_T$  para todo  $x \in E$ . Como las dos normales son completas, tenemos por el Corolario 2.6.2 que son equivalentes. Tenemos entonces que existe  $k \geq 0$  de forma que:

$$\|x\|_T = \|x\|_E + \|Tx\|_F \leq k\|x\|_E \quad \forall x \in E$$

de donde  $k \geq 1$ , con lo que:

$$\|Tx\|_F \leq (k - 1)\|x\|_E \quad \forall x \in E$$

Por lo que  $T$  es continua en  $E$ . □

## 3. Relaciones de Ejercicios

Las siguientes relaciones de ejercicios corresponden a los ejercicios que uno puede encontrar en el libro “Functional Analysis”, de Haim Brezis. Concretamente, se encuentran los primeros ejercicios de los Capítulos 1 y 2.

### 3.1. El Espacio Dual

**Ejercicio 3.1.1.** Sea  $E$  un espacio normado, definimos  $\forall x \in E$ :

$$F(x) = \{f \in E^* : \|f\| = \|x\| \quad \text{y} \quad f(x) = \|x\|^2\}$$

Se pide:

a) Probar que

$$F(x) = \{f \in E^* : \|f\| \leq \|x\| \quad \text{y} \quad f(x) = \|x\|^2\}$$

y deducir que  $F(x)$  es no vacío, cerrado y convexo.

c) Es evidente.

d) Si  $x = 0$  la igualdad es evidente. Supuesto que  $x \neq 0$ , denotamos por  $\tilde{F}(x)$  al conjunto de la derecha y tenemos que si  $f \in \tilde{F}(x)$ , entonces:

$$\|x\|^2 = |f(x)| = f(x) \leq \|f\|\|x\| \implies \|f\| \geq \|x\|$$

Por lo que  $\|f\| = \|x\|$ , de donde  $\tilde{F}(x) = F(x)$ .

- Por el Corolario 1.18.2 sabemos que  $F(x) \neq \emptyset$ .
- Sea  $\{f_n\} \rightarrow f \in E^*$  con  $f_n \in F(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ , entonces:

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\|^2 = \|x\|^2 \\ \|f\| &= \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\| = \|x\| \end{aligned}$$

Por lo que  $f \in F(x)$ , de donde  $F(x)$  es cerrado.

- Sean  $f, g \in F(x)$ , si tomamos  $t \in [0, 1]$ , definimos:

$$h = tf + (1 - t)g$$

$h$  es lineal y continua, y además:

$$\begin{aligned} h(x) &= tf(x) + (1 - t)g(x) = t\|x\|^2 + (1 - t)\|x\|^2 = \|x\|^2 \\ \|h\| &= \|tf + (1 - t)g\| \leq t\|f\| + (1 - t)\|g\| = t\|x\| + (1 - t)\|x\| = \|x\| \end{aligned}$$

Por lo que  $h \in \{f \in E^* : \|f\| \leq \|x\| \quad \text{y} \quad f(x) = \|x\|^2\} = F(x)$ , lo que demuestra que  $F(x)$  es convexo.

b) Probar que si  $E^*$  es estrictamente convexo, entonces  $F(x)$  se reduce a un punto.

Que  $E^*$  sea estrictamente convexo significa que si tomamos  $f, g \in E^*$  con  $f \neq g$  y  $\|f\| = 1 = \|g\|$ , entonces:

$$\|tf + (1-t)g\| < 1 \quad \forall t \in ]0, 1[$$

Si  $x = 0$  entonces  $F(x)$  es unitario. Si  $x \neq 0$ , supongamos que existen dos funciones  $g_1, g_2 \in F(x)$  con  $g_1 \neq g_2$ . En cuyo caso, podemos tomar:

$$f_1 = \frac{g_1}{\|x\|}, \quad f_2 = \frac{g_2}{\|x\|}$$

que verifican  $f_1 \neq f_2$  y  $\|f_1\| = 1 = \|f_2\|$ . Por la convexidad estricta de  $E^*$  tenemos que:

$$\|tf_1 + (1-t)f_2\| < 1 \quad \forall t \in ]0, 1[$$

Sin embargo, fijado  $t \in ]0, 1[$ , vemos que:

$$\|x\| = t\|x\| + (1-t)\|x\| = (tf_1 + (1-t)f_2)(x) \leq \|tf_1 + (1-t)f_2\|\|x\|$$

de donde deducimos que  $\|tf_1 + (1-t)f_2\| \geq 1$ , contradicción, que viene de suponer que  $F(x)$  contiene dos elementos distintos.

c) Probar que:

$$F(x) = \left\{ f \in E^* : \frac{1}{2}\|y\|^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2 \geq f(y-x) \quad \forall y \in E \right\}$$

⊂) Si  $f \in F(x)$ , entonces:

$$f(y) \leq \|f\|\|y\| \leq \frac{1}{2}\|f\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 = \frac{1}{2}\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 \quad \forall y \in E$$

De donde si restamos  $f(x) = \|x\|^2$  a ambos lados:

$$f(y-x) = f(y) - f(x) \leq \frac{1}{2}\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 - \|x\|^2 = \frac{1}{2}\|y\|^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2 \quad \forall y \in E$$

⊃) Supongamos que tenemos  $f \in E^*$ ,  $x \in E$  fijo de forma que se cumple:

$$f(y-x) \leq \frac{1}{2}\|y\|^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2 \quad \forall y \in E$$

Para probar primero que  $f(x) = \|x\|^2$ , tomaremos  $y = \lambda x$ , con  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ :

$$(\lambda-1)f(x) = f(\lambda x - x) \leq \frac{1}{2}\|\lambda x\|^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2 = \frac{1}{2}\|x\|^2(\lambda^2 - 1) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^+$$

Distinguimos casos (notemos que si  $\lambda = 1$  la desigualdad sigue siendo cierta):

■ Si  $\lambda > 1$ , entonces:

$$f(x) \leq \frac{1}{2}\|x\|^2 \left( \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda - 1} \right) \quad \forall \lambda > 1$$

■ Si  $\lambda < 1$ , entonces:

$$f(x) \geq \frac{1}{2}\|x\|^2 \left( \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda - 1} \right) \quad \forall \lambda \in ]0, 1[$$

Como tenemos que:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 1} \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda - 1} = \lim_{\lambda \rightarrow 1} \frac{(\lambda + 1)(\lambda - 1)}{\lambda - 1} = \lim_{\lambda \rightarrow 1} (\lambda + 1) = 2$$

Del primer punto deducimos que  $f(x) \leq \|x\|^2$ , y del segundo punto que  $f(x) \geq \|x\|^2$ . Por tanto, tenemos que  $f(x) = \|x\|^2$ .

Para ver que  $\|f\| \leq \|x\|$ , tomamos  $y \in E$  con  $\|y\| = \delta > 0$ , con lo que:

$$f(y) - f(x) = f(y - x) \leq \frac{1}{2}\delta^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2$$

de donde:

$$f(y) \leq \frac{1}{2}\delta^2 + \frac{1}{2}\|x\|^2$$

Si ahora observamos que:

$$\delta\|f\| = \delta \sup_{\|x\|=1} |f(x)| = \sup_{\|x\|=1} |f(\delta x)| = \sup_{\|x\|=\delta} |f(x)| \leq \frac{1}{2}\delta^2 + \frac{1}{2}\|x\|^2$$

Si tomamos  $\delta = \|x\|$ , tenemos que:

$$\|x\|\|f\| \leq \|x\|^2 \implies \|f\| \leq \|x\|$$

d) Deducir que:

$$(f - g)(x - y) \geq 0 \quad \forall x, y \in E, \quad \forall f \in F(x), \quad \forall g \in F(y)$$

de hecho:

$$(f - g)(x - y) \geq (\|x\| - \|y\|)^2 \quad \forall x, y \in E, \quad \forall f \in F(x), \quad \forall g \in F(y)$$

Para probar la primera desigualdad, sean  $x, y \in E$ , si tomamos  $f \in F(x)$ ,  $g \in F(y)$ , entonces por el apartado anterior tenemos que:

$$\begin{aligned} f(z - x) &\leq \frac{1}{2}\|z\|^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2 & \forall z \in E \\ g(z - y) &\leq \frac{1}{2}\|z\|^2 - \frac{1}{2}\|y\|^2 & \forall z \in E \end{aligned}$$

Tomando en la primera desigualdad  $z = y$ ,  $z = x$  en la segunda y sumando ambas obtenemos:

$$f(y - x) + g(x - y) \leq 0$$

De donde:

$$(f - g)(x - y) = f(x - y) - g(x - y) = -(f(y - x) + g(x - y)) \geq 0$$

Para probar que bajo las mismas hipótesis tenemos  $(f-g)(x-y) \geq (\|x\| - \|y\|)^2$ :

$$(f-g)(x-y) = f(x) - f(y) - g(x) + g(y) = \|x\|^2 - f(y) - g(x) + \|y\|^2$$

Ahora, observamos que:

$$f(y) + g(x) \leq \|f\|\|y\| + \|g\|\|x\| = 2\|x\|\|y\| \implies -2\|x\|\|y\| \leq -f(y) - g(x)$$

de donde:

$$(f-g)(x-y) = \|x\|^2 - f(y) - g(x) + \|y\|^2 \geq \|x\|^2 - 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| - \|y\|)^2$$

e) Sea  $E^*$  un espacio estrictamente convexo con  $x, y \in E$  de forma que:

$$(f-g)(x-y) = 0 \quad \forall x, y \in E, \quad \forall f \in F(x), \quad \forall g \in F(y)$$

Probar que  $F(x) = F(y)$ .

Sean  $x, y \in E$ ,  $f \in F(x)$ ,  $g \in F(y)$ , si aplicamos la desigualdad del apartado anterior junto con la propiedad que nos dan ahora:

$$0 = (f-g)(x-y) \geq (\|x\| - \|y\|)^2 \geq 0 \implies \|x\| = \|y\|$$

Del apartado c) obtenemos que (usando además que  $\|x\| = \|y\|$ ):

$$f(y) - \|x\|^2 = f(y-x) \leq \frac{1}{2}\|y\|^2 - \frac{1}{2}\|x\|^2 = 0 \implies f(y) \leq \|x\|^2$$

$$g(x) - \|y\|^2 = g(x-y) \leq \frac{1}{2}\|x\|^2 - \frac{1}{2}\|y\|^2 = 0 \implies g(x) \leq \|y\|^2 = \|x\|^2$$

Además, tenemos que:

$$0 = (f-g)(x-y) = f(x) - f(y) - g(x) + g(y) = \|x\|^2 - f(y) - g(x) + \|y\|^2$$

luego:

$$f(y) + g(x) = \|x\|^2 + \|y\|^2 = 2\|x\|^2$$

Sin embargo, como  $f(y), g(x) \leq \|x\|^2$ , concluimos que ha de ser:

$$g(x) = \|x\|^2 = \|y\|^2 = f(y)$$

Finalmente, como  $E^*$  es un espacio estrictamente convexo, tenemos por el apartado b) que tanto  $F(x)$  como  $F(y)$  se reducen a un punto:

$$\{f\} = F(x) = \{f \in E^* : \|f\| = \|x\| \text{ y } f(x) = \|x\|^2\}$$

Sin embargo, tenemos que  $\|g\| = \|x\|$  y que  $g(x) = \|x\|^2$ , lo que nos dice que  $g \in F(x) = \{f\}$ , por lo que  $f = g$  y tenemos  $F(x) = F(y)$ .

**Ejercicio 3.1.2.** Sea  $E$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  y sea  $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$  una base de  $E$ , dado  $x \in E$  escribimos  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  con  $x_i \in \mathbb{R}$ . Dado  $f \in E^*$ , definimos  $f_i = f(e_i)$ .

a) Considerar en  $E$  la norma:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

a) Calcular explícitamente, en términos de  $f_i$ , la norma  $\|f\|$  para  $f \in E^*$ .

Hemos visto que  $\|f\| = \sup_{\|x\|_1=1} |f(x)|$ , por lo que si tomamos  $x \in E$  con  $\|x\|_1 = 1$ , tenemos entonces que  $\sum_{i=1}^n |x_i| = 1$ , de donde:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| f \left( \sum_{i=1}^n x_i e_i \right) \right| = \left| \sum_{i=1}^n x_i f_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |f_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \max_{1 \leq i \leq n} |f_i| \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} |f_i| \sum_{i=1}^n |x_i| = \max_{1 \leq i \leq n} |f_i| \end{aligned}$$

Luego  $\|f\| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |f_i|$ . Sin embargo, si tenemos que  $p \in \{1, \dots, n\}$  es el índice en el cual se maximiza  $|f_i|$ , es decir,  $|f_p| = \max_{1 \leq i \leq n} |f_i|$ , si tomamos:

$$x = e_j$$

Tenemos que  $\|x\|_1 = 1$ , así como que:

$$|f(x)| = |f(e_j)| = |f_j| = \max_{1 \leq i \leq n} |f_i|$$

Por lo que el supremo se alcanza, luego:

$$\|f\| = \max_{1 \leq i \leq n} |f_i|$$

b) Determinar explícitamente el conjunto  $F(x)$ , para todo  $x \in E$ .

Veamos que:

$$f \in F(x) = \{f \in E^* : \|f\| = \|x\|_1 \text{ y } f(x) = \|x\|_1^2\}$$

si y solo si

$$f_i = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x_i) \|x\|_1 & \text{si } x_i \neq 0 \\ \text{cualquier valor en } [-\|x\|_1, \|x\|_1] & \text{si } x_i = 0 \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$\Leftarrow$ ) Notemos que:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i = \sum_{i=1}^n x_i \operatorname{sgn}(x_i) \|x\|_1 = \|x\|_1 \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1 \|x\|_1 = \|x\|_1^2$$

y que:

$$\|f\| = \max_{1 \leq i \leq n} |f_i| = \max \left\{ \max_{x_i \neq 0} |\operatorname{sgn}(x_i) \|x\|_1|, \max_{x_i = 0} \{f_i\} \right\} \stackrel{(*)}{=} \max_{x_i \neq 0} |\|x\|_1| = \|x\|_1$$

donde en  $(*)$  hemos usado que si  $x_i = 0$ , entonces el valor de  $f_i$  está en el intervalo  $[-\|x\|_1, \|x\|_1]$ .

$\implies$ ) Sea  $f \in E^*$  con  $\|f\| = \|x\|_1$  y  $f(x) = \|x\|_1^2$ , entonces:

$$\sum_{i=1}^n x_i f_i = f(x) = \|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^n |x_i| \|x\|_1$$

Ahora, como  $\max_{1 \leq i \leq n} |f_i| = \|f\| = \|x\|_1$ , tenemos que:

$$|f_i| \leq \|x\|_1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Por lo que tenemos:

$$x_i f_i \leq |x_i| |f_i| \leq |x_i| \|x\|_1 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n x_i f_i = \sum_{i=1}^n |x_i| \|x\|_1$$

Luego ha de ser:

$$x_i f_i = |x_i| \|x\|_1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

De donde (si  $x_i \neq 0$ ):

$$f_i = \frac{|x_i| \|x\|_1}{x_i} = \text{sgn}(x_i) \|x\|_1$$

y para el resto de valores podemos tomar cualquier valor que no se salga del intervalo  $[-\|x\|_1, \|x\|_1]$ , para no alterar el valor de  $\|f\|$ .

b) Las mismas preguntas pero para la norma:

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Sea  $x \in E$  con  $\|x\|_\infty = 1$ , tenemos entonces que  $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = 1$ , de donde:

$$|f(x)| = \left| f \left( \sum_{i=1}^n x_i e_i \right) \right| = \left| \sum_{i=1}^n x_i f_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |f_i| \leq \sum_{i=1}^n |f_i|$$

por lo que  $\|f\| \leq \sum_{i=1}^n |f_i|$ , pero si tomamos:

$$x = (\text{sgn}(f_1), \text{sgn}(f_2), \dots, \text{sgn}(f_n))$$

tenemos entonces que  $\|x\|_\infty = 1$ , con:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i = \sum_{i=1}^n \text{sgn}(f_i) f_i = \sum_{i=1}^n |f_i|$$

Tenemos que el supremo se alcanza, por lo que:

$$\|f\| = \sum_{i=1}^n |f_i|$$

Si pensamos ahora en el conjunto  $F(x)$ , si definimos:

$$I = \{i \in \{1, \dots, n\} : |x_i| = \|x\|_\infty\}$$



veamos que:

$$f \in F(x) = \{f \in E^* : \|f\| = \|x\|_\infty \text{ y } f(x) = \|x\|_\infty^2\}$$

si y solo si

$$\begin{cases} f_i = 0 & \forall i \notin I \\ x_i f_i \geq 0 & \forall i \in I \end{cases} \text{ y } \sum_{i \in I} |f_i| = \|x\|_\infty$$

$\Leftarrow$ ) Si las  $f_i$  cumplen lo enunciado, entonces:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i = \sum_{i \in I} x_i f_i = \sum_{i \in I} |x_i| |f_i| = \|x\|_\infty \sum_{i \in I} |f_i| = \|x\|_\infty \|x\|_\infty = \|x\|_\infty^2$$

y también:

$$\|f\| = \sum_{i=1}^n |f_i| = \sum_{i \in I} |f_i| = \|x\|_\infty$$

$\Rightarrow$ ) Sea  $f \in E^*$  con  $\|f\| = \|x\|_\infty$  y  $f(x) = \|x\|_\infty^2$ , entonces:

■ Si  $f_i = 0 \quad \forall i \notin I$ , entonces:

$$\|x\|_\infty = \|f\| = \sum_{i=1}^n |f_i| = \sum_{i \in I} |f_i|$$

Además:

$$\sum_{i \in I} x_i f_i = \sum_{i=1}^n x_i f_i = f(x) = \|x\|_\infty^2 = \sum_{i=1}^n |f_i| \|x\|_\infty = \sum_{i \in I} |f_i| \|x\|_\infty$$

y tenemos las desigualdades:

$$x_i \leq |x_i| \leq \|x\|, \quad f_i \leq |f_i| \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

lo que nos permite igualar término a término en la suma anterior, obteniendo:

$$x_i f_i = |f_i| \|x\|_\infty = |f_i| \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\} \Rightarrow x_i f_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

y se tienen las dos condiciones buscadas.

■ Si suponemos ahora que existe  $f_j \neq 0$  para  $j \notin I$ , tendremos entonces que  $|x_j| < \|x\|$ . Si observamos que:

$$\sum_{i=1}^n x_i f_i = f(x) = \|x\|_\infty^2 = \sum_{i=1}^n |f_i| \|x\|$$

y las desigualdades:

$$x_i \leq |x_i| \leq \|x\|, \quad f_i \leq |f_i| \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

deducimos entonces que:

$$x_i f_i = |f_i| \|x\| \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Sin embargo, tendríamos entonces que (para  $i = j$  tenemos  $f_j \neq 0$ ):

$$x_j = \frac{|f_j| \|x\|}{f_j} = \operatorname{sgn}(f_j) \|x\|$$

de donde deducimos que  $|x_j| = \|x\|$ , contradicción, por lo que este caso es imposible.

c) Las mismas preguntas pero para la norma:

$$\|x\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

y más generalmente para la norma:

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in ]1, +\infty[$$

Sea  $x \in E$  con  $\|x\|_p = 1$ , tenemos entonces que  $(\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{\frac{1}{p}} = 1$ , de donde:

$$|f(x)| = \left| \sum_{i=1}^n x_i f_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |f_i| \stackrel{(*)}{\leq} \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n |f_i|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}} = \left( \sum_{i=1}^n |f_i|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}$$

donde en  $(*)$  he usado la desigualdad de Hölder. Deducimos por tanto que:

$$\|f\| \leq \left( \sum_{i=1}^n |f_i|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}$$

**Ejercicio 3.1.3.** Sea  $E = \{u \in C([0, 1], \mathbb{R}) : u(0) = 0\}$  con la norma:

$$\|u\| = \max_{t \in [0, 1]} |u(t)|$$

considera el funcional lineal  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  dado por:

$$f(u) = \int_0^1 u(t) dt$$

a) Demuestra que  $f \in E^*$  y calcula  $\|f\|$ .

Hemos de probar que  $f$  es lineal y continua:

■ Por la forma de definir  $f$  es claro que es lineal:

$$f(\lambda u + v) = \int_0^1 \lambda u(t) + v(t) dt = \lambda \int_0^1 u(t) dt + \int_0^1 v(t) dt = \lambda f(u) + f(v)$$

$\forall u, v \in E, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

- $f$  es continua, ya que:

$$|f(u)| = \left| \int_0^1 u(t) dt \right| \leq \left| \int_0^1 \|u\| dt \right| = \|u\| \quad \forall u \in E$$

En consecuencia,  $f \in E^*$ . En este último punto hemos probado además que  $\|f\| \leq 1$ . Para probar la otra desigualdad:

**Opción 1.** si para cada  $\alpha > 0$  definimos  $u_\alpha \in E$  dada por:

$$u_\alpha(t) = t^\alpha \quad \forall t \in [0, 1]$$

tenemos entonces que:

$$f(u_\alpha) = \int_0^1 t^\alpha dt = \left[ \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_0^1 = \frac{1}{1+\alpha} \quad \forall \alpha > 0$$

de donde:

$$|f(u_\alpha)| \leq \|f\| \leq 1$$

con  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} |f(u_\alpha)| = 1$ , por lo que  $\|f\| = 1$ .

**Opción 2.** Definimos para cada  $n \in \mathbb{N}$   $u_n \in E$  dada por:

$$u_n(t) = \begin{cases} nt & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 1 & \text{si } \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Tenemos que:

$$f(u_n) = \int_0^{\frac{1}{n}} nt dt + \int_{\frac{1}{n}}^1 1 dt = \frac{nt}{2} \int_0^{\frac{1}{n}} 1 + t dt = 1 - \frac{1}{2n}$$

por lo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) = 1$$

luego  $\|f\| = 1$ .

- b) ¿Puede encontrarse  $u \in E$  con  $\|u\| = 1$  y  $f(u) = \|f\|$ ?

**Opción 1.** No, ya que la única función  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continua con integral 1 en  $[0, 1]$  y con máximo 1 es la constantemente igual a 1, que no pertenece a  $E$  (por no valer 0 en 0):

Supongamos que tenemos una función  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continua con integral 1 en  $[0, 1]$  y con máximo 1 distinta de la constantemente igual a 1. En dicho caso, ha de existir  $x_0 \in [0, 1]$  de forma que  $f(x_0) < 1$ . Por continuidad de  $f$  podemos encontrar  $\varepsilon, \delta > 0$  de forma que:

$$f(x) \leq 1 - \varepsilon \quad \forall x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \cap [0, 1]$$

En cuyo caso, llamando  $I = ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \cap [0, 1]$ :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_{[0,1] \setminus I} f(x) dx + \int_I f(x) dx \leq \int_{[0,1] \setminus I} 1 dx + \int_I (1 - \varepsilon) dx \\ &= (1 - l(I)) + l(I)(1 - \varepsilon) = 1 - \varepsilon < 1 \end{aligned}$$

Por lo que  $f$  no tiene integral 1 en  $[0, 1]$ , contradicción, que viene de suponer que  $f$  no es constantemente igual a 1.

Tras este resultado, como la pertenencia al conjunto  $E$  obliga a que la función  $u$  no sea constantemente igual a 1, tenemos pues que no puede existir una tal función.

**Opción 2.** Supongamos que existe  $u \in E$  de forma que  $\|u\| = 1$  con  $f(u) = 1$ , esto es equivalente a que:

$$f(u) = \int_0^1 u(t) dt = 1 \iff \int_0^1 u(t) - 1 dt = 0$$

Tomando  $g(t) = u(t) - 1$ , como  $\|u\| = 1$  tenemos entonces que  $u(t) \leq 1$  para todo  $t \in [0, 1]$ , con lo que  $g(t) \leq 0$  para  $t \in [0, 1]$ , y como su integral en  $[0, 1]$  vale 0 concluimos que  $g(t) = 0$  para todo  $t \in [0, 1]$ , con lo que:

$$u(t) = 1 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Pero teníamos que  $u \in E$ , luego  $0 = u(0) = 1$ , contradicción.

**Ejercicio 3.1.4.** Considera el espacio  $E = C_0$  de sucesiones de números reales que convergen a cero con la norma

$$\|x\| = \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} \quad \forall x \in E$$

Para cada elemento  $u \in E$  definimos:

$$f(u) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} u(n)$$

a) Comprueba que  $f \in E^*$  y calcula  $\|f\|$ .

■ Para ver que  $f$  es lineal:

$$f(\lambda u + v) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda u(n) + v(n)}{2^n} = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u(n)}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v(n)}{2^n} = \lambda f(u) + f(v)$$

$\forall u, v \in E, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

■ Para ver que  $f$  es continuo:

$$\begin{aligned} |f(u) - f(v)| &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u(n)}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v(n)}{2^n} \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u(n) - v(n)}{2^n} \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|u - v\|}{2^n} \right| \\ &= \|u - v\| \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \right| = \|u - v\| \end{aligned}$$

Por lo que  $f \in E^*$ . En este último punto hemos visto también que  $\|f\| \leq 1$ .

b) ¿Puede encontrarse  $u \in E$  con  $\|u\| = 1$  y  $f(u) = \|f\|$ ?

**Ejercicio 3.1.5.** Sea  $E$  un espacio normado de dimensión infinita:

- a) Demuestra (usando el Lema de Zorn) que existe una base algebraica  $\{e_i\}_{i \in I}$  en  $E$  de forma que  $\|e_i\| = 1 \quad \forall i \in I$ .

Recordamos que una base algebraica (o de Hamel) es un subconjunto  $\{e_i\}_{i \in I}$  de  $E$  de forma que todo  $x \in E$  puede ser escrito de forma única como:

$$x = \sum_{i \in J} x_i e_i, \quad \text{con} \quad J \subset I, \quad J \text{ finito}$$

Consideramos (que es no vacío puesto que  $\{x\} \in P$  para todo  $x \in E$ ):

$$P = \{C \subset E : \text{los elementos de } C \text{ son linealmente independientes}\}$$

Y buscamos aplicar el Lema de Zorn a  $P$ . Para ello, definimos:

$$C \leq D \iff C \subset D \quad \forall C, D \in P$$

Ahora, hemos de probar primero que  $P$  es inductivo. Para ello, sea  $Q \subset P$  un subconjunto totalmente ordenado, tratemos de probar que  $\cup Q$  es una cota superior de  $Q$ . Es claro que  $C \subset \cup Q$  para todo  $C \in Q$ , por lo que basta probar que  $\cup Q \in P$ . Si tomamos  $x, y \in \cup Q$ , tendremos entonces que existen  $C, D \in Q$  de forma que  $x \in C$  y  $y \in D$ . Como  $Q$  es totalmente ordenado, tendremos bien  $C \subset D$  bien  $D \subset C$ . Aprovechando la simetría de la situación, supondremos que  $C \subset D$ , con lo que también tenemos  $x \in D \in Q \subset P$ , de donde  $x$  e  $y$  son linealmente independientes, como queríamos probar, lo que nos dice que  $\cup Q \in P$ .

Aplicando el Lema de Zorn, tenemos que  $P$  tiene un elemento maximal, es decir, existe  $\mathcal{B} \in P$  de forma que si  $C \subset E$  es un conjunto tal que todos sus elementos son linealmente independientes entonces  $C \subset \mathcal{B}$ . Probaremos ahora que  $\mathcal{B}$  es una base de  $E$ . Para ello, sea  $x \in E$ , si  $x$  es linealmente independiente de los elementos de  $\mathcal{B}$ , entonces consideramos  $B = \mathcal{B} \cup \{x\}$ , que es un elemento de  $P$  mayor que el elemento maximal de  $P$ , contradicción, por lo que  $x$  ha de ser linealmente dependiente de los elementos de  $\mathcal{B}$ , es decir, existe una cantidad finita de ellos determinada por  $J \subset I$  finito y unos escalares  $a_i$  de forma que:

$$x + \sum_{j \in J} a_j x_j = 0, \quad x_j \in \mathcal{B}, \quad a_j \in \mathbb{R}, \quad \forall j \in J$$

Dicho de otra forma, si tomamos  $x_j = -a_j \quad \forall j \in J$ :

$$x = \sum_{j \in J} a_j x_j$$

Como la normalización de los vectores no modifica su independiencia lineal, podemos normalizar todos los elementos del conjunto  $\mathcal{B}$  y este seguirá cumpliendo lo enunciado.

- b) Construye un funcional lineal  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  que no sea continuo.

**Ejemplo particular.** Si consideramos  $E = \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$  el espacio de sucesiones casi nulas, una base del mismo es:

$$\mathcal{B} = \{e_n \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} : e_n(n) = 1, e_n(m) = 0, m \neq n\}$$

Si consideramos la norma:

$$\|x\|_\infty = \max_{n \in \mathbb{N}} |x(n)| \quad \forall x \in E$$

Veamos que la aplicación lineal dada por la base:

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} \\ e_n &\longmapsto 2^n \end{aligned}$$

Veamos que el funcional no es continuo en 0, pues para  $\varepsilon = 1$ , para todo  $\delta > 0$  existe  $n \in \mathbb{N}$  con  $\frac{1}{2^n} < \delta$  de forma que  $\|\delta e_n\| \leq \delta$ :

$$|f(\delta e_n)| = \delta |f(e_n)| > \frac{1}{2^n} 2^n = 1$$

**En general.** Sea  $E$  un espacio normado de dimensión infinita, sabemos que existe una base unitaria  $\mathcal{B}$  de  $E$ . Consideramos  $\overline{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}$  un subconjunto infinito numerable, por lo que podemos enumerar sus elementos, definimos la aplicación  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\begin{aligned} f(e_n) &= 2^n & \forall e_n \in \overline{\mathcal{B}} \\ f(e) &= 0 & \forall e \in \mathcal{B} \setminus \overline{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Al igual que antes,  $f$  no es continua en 0, pues para  $\varepsilon = 1$ ,  $\forall \delta > 0$  existe  $n \in \mathbb{N}$  de forma que  $\frac{1}{2^n} < \delta$  con  $\|\delta e_n\| = \delta$  y:

$$|f(\delta e_n)| = 1$$

- c) Suponiendo que además  $E$  es un espacio de Banach, prueba que  $I$  no es numerable (**Pista:** usar “el Teorema de categoría de Baire”).

Sea  $E$  un espacio de Banach de dimensión infinita, suponemos que existe  $\mathcal{B}$  una base numerable del mismo. Definimos para cada  $n \in \mathbb{N}$ :

$$A_n = \left\{ x \in E : x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\}$$

Veamos que  $A_n$  es cerrado y que  $\text{Int}(A_n) = \emptyset$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

- Sea  $\{x_m\} \rightarrow x \in E$  con  $x_m \in A_n \forall m \in \mathbb{N}$ , como  $A_n$  es un subespacio vectorial de  $E$  de dimensión finita, entonces  $A_n \cong \mathbb{R}^n$ , luego  $A_n$  es completo y como  $\{x_m\}$  es de Cauchy, ha de ser convergente en  $A_n$ , de donde  $x \in A_n$ .

- Sea  $x \in A_n$ , consideramos para cierto  $\varepsilon > 0$  la bola  $B(x, \varepsilon)$ , y vemos que:

$$\begin{aligned} x + \frac{\varepsilon}{2} e_{n+1} &\in B(x, \varepsilon) \\ x + \frac{\varepsilon}{2} &\notin A_n \end{aligned}$$

De donde  $B(x, \varepsilon) \not\subset A_n$

Si consideramos  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = E$ , el Lema de Baire nos dice que  $\text{Int } E = \emptyset$ , contradicción, puesto que  $\text{Int } E = E$ , que viene de suponer que la base  $\mathcal{B}$  es numerable.

**Ejercicio 3.1.6.** Sea  $E$  un espacio normado y  $H \subset E$  un hiperplano. Sea  $V \subset E$  un subespacio afín que contiene a  $H$ .

- a) Probar que  $V = H$  o  $V = E$ .

Recordamos que un hiperplano es, dada  $0 \neq f : E \rightarrow \mathbb{R}$  lineal y  $\alpha \in \mathbb{R}$ :

$$H = \{x \in E : f(x) = \alpha\} = f^{-1}(\{\alpha\})$$

- b) Deducir que  $H$  es cerrado o denso en  $E$ .

Supuesto que  $H$  no es cerrado, tenemos que  $\overline{H} \neq H$ , y además  $\overline{H}$  es un espacio afín conteniendo  $H$ , por lo que por el apartado anterior ha de ser  $\overline{H} = E$ , es decir,  $H$  es denso en  $E$ .

**Ejercicio 3.1.7.** Sea  $E$  un espacio normado y  $C \subset E$  un subconjunto convexo.

- a) Prueba que  $\overline{C}$  y  $\text{Int } C$  son convexos.

- Para  $\overline{C}$ , sean  $x, y \in \overline{C}$ , entonces existen sucesiones de puntos de  $C$   $\{x_n\}, \{y_n\}$  con  $\{x_n\} \rightarrow x$  y  $\{y_n\} \rightarrow y$ , de donde si tomamos  $t \in [0, 1]$ , tenemos que:

$$\{(1-t)x_n + ty_n\} \rightarrow (1-t)x + ty$$

Por lo que  $(1-t)x + ty \in \overline{C}$  para todo  $t \in [0, 1]$ .

- Para  $\text{Int } C$ , sean  $x, y \in \text{Int } C$ , entonces existe  $r > 0$  de forma que  $B(x, r), B(y, r) \subset C$ . En dicho caso, como  $C$  es convexo, tenemos que:

$$tB(x, r) + (1-t)B(y, r) \subset C \quad \forall t \in [0, 1]$$

Pero como:

$$tB(x, r) + (1-t)B(y, r) = B(tx + (1-t)y, r)$$

tenemos entonces que  $tx + (1-t)y \in B(tx + (1-t)y, r) \subset C \quad \forall t \in [0, 1]$ , con lo que  $\text{Int } C$  es convexo. La igualdad entre conjuntos que hemos usado se debe principalmente a:

$$B(x, r) = x + rB(0, 1) \quad \forall x \in E, \quad \forall r \in \mathbb{R}^+$$

$\supseteq$ ) Si  $z \in B(0, 1)$  entonces  $\|z\| < 1$ , de donde  $\|rz\| < r$ , por lo que  $\|x - x + rz\| < r$ , luego  $x + rz \in B(x, r)$ .

$\subseteq$ ) Si  $z \in B(x, r)$ , entonces  $\|x - z\| < r$ , por lo que:

$$z = x + r \left( \frac{z - x}{r} \right) \quad \text{con} \quad \left\| \frac{z - x}{r} \right\| < 1$$

Para ver:

$$tB(x, r) + (1 - t)B(y, r) = B(tx + (1 - t)y, r)$$

$\subseteq$ ) Si tomamos  $z \in tB(x, r) + (1 - t)B(y, r)$ , tenemos entonces que existen  $\alpha \in B(x, r)$  y  $\beta \in B(y, r)$  de forma que:

$$z = t(x + r\alpha) + (1 - t)(y + r\beta) = tx + (1 - t)y + r(t\alpha + (1 - t)\beta)$$

y como  $t\alpha + (1 - t)\beta \in B(0, 1)$  por ser convexa, hemos probado que  $z \in B(tx + (1 - t)y, r)$ .

$\supseteq$ ) Si tomamos ahora  $z \in B(tx + (1 - t)y, r)$ , tenemos que existe un elemento  $\alpha \in B(0, 1)$  de forma que:

$$\begin{aligned} z &= tx + (1 - t)y + r\alpha = tx + (1 - t)y + tr\alpha + (1 - t)r\alpha \\ &= t(x + r\alpha) + (1 - t)(y + r\alpha) \in tB(x, r) + (1 - t)B(y, r) \end{aligned}$$

b) Dado  $x \in C$  y  $y \in \text{Int } C$ , prueba que  $tx + (1 - t)y \in \text{Int } C \quad \forall t \in ]0, 1[$ .

Sea  $r > 0$  de forma que  $B(y, r) \subset C$ , como  $C$  es convexo tenemos que:

$$tx + (1 - t)B(y, r) \subset C \quad \forall t \in [0, 1]$$

lo que nos dice que:

$$C \ni tx + (1 - t)(y + r\alpha) = tx + (1 - t)y + (1 - t)r\alpha \quad \forall \alpha \in B(0, 1), \quad \forall t \in [0, 1]$$

por tanto, tendremos que  $B(tx + (1 - t)y, (1 - t)r) \subset C$  para todo  $t \in [0, 1]$ , de donde  $tx + (1 - t)y \in \text{Int } C$ , para todo  $t \in [0, 1]$ .

c) Deduce que  $\overline{C} = \overline{\text{Int } C}$  siempre que  $\text{Int } C \neq \emptyset$ .

Como  $\text{Int } C \subset C$ , tenemos que  $\overline{\text{Int } C} \subset \overline{C}$ . Sea ahora  $x \in \overline{C}$ , tenemos que existe una sucesión  $\{x_n\}$  de puntos de  $C$  con  $\{x_n\} \rightarrow x$ . Como  $\text{Int } C \neq \emptyset$ , podemos tomar  $y \in \text{Int } C$ . Sea  $\{t_n\}$  una sucesión de puntos de  $[0, 1]$  convergente a 1 (por ejemplo,  $t_n = 1 - 1/n$ ), tenemos entonces que:

$$\{t_n x_n + (1 - t_n)y\} \rightarrow x$$

con  $t_n x_n + (1 - t_n)y \in \text{Int } C$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  (por el apartado b)), de donde concluimos que  $x \in \overline{\text{Int } C}$ .

**Ejercicio 3.1.8.** Sea  $E$  un espacio normado con norma  $\|\cdot\|$ . Sea  $C \subset E$  un abierto convexo de forma que  $0 \in C$ . Si  $p$  denota el funcional de Minkowski de  $C$ :



- a) Suponiendo que  $C$  es simétrico (es decir, que  $-C = C$ ) y que es acotado, prueba que  $p$  es una norma equivalente a  $\|\cdot\|$ .
- b) Sea  $E = C([0, 1], \mathbb{R})$  con la norma:

$$\|u\| = \max_{t \in [0, 1]} |u(t)|$$

sea:

$$C = \left\{ u \in E : \int_0^1 |u(t)|^2 dt < 1 \right\}$$

Comprueba que  $C$  es convexo, simétrico y que  $0 \in C$ . ¿Está  $C$  acotado en  $E$ ?  
Calcula el funcional de Minkowski  $p$  de  $C$  y prueba que  $p$  es una norma en  $E$ .  
¿Es  $p$  equivalente a  $\|\cdot\|$ ?

**Ejercicio 3.1.9.** Sea  $E$  un espacio normado de dimensión finita, sea  $C \subset E$  un conjunto no vacío convexo con  $0 \notin C$ . Siempre hay un hiperplano que separa  $C$  y  $\{0\}$  (Notemos que todo hiperplano es cerrado (¿por qué?). El mayor punto de este ejercicio es que no hace falta exigir nada más sobre  $C$ ).

- a) Sea  $\{x_n\}$  una sucesión de puntos de  $C$  que es densa en  $C$  (¿por qué existe?). Para cada  $n$  definimos:

$$C_n = \text{conv}\{x_1, \dots, x_n\} = \left\{ x = \sum_{i=1}^n t_i x_i : t_i \geq 0 \quad \forall i \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n t_i = 1 \right\}$$

Comprueba que  $C_n$  es compacto y que  $\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$  es denso en  $C$ .

- b) Prueba que existe un  $f_n \in E^*$  de forma que:

$$\|f_n\| = 1 \quad \text{y} \quad f_n(x) \geq 0 \quad \forall x \in C_n$$

- c) Deduce que existe  $f \in E^*$  de forma que:

$$\|f\| = 1 \quad \text{y} \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x \in C$$

- d) Sean  $A, B \subset E$  conjuntos no vacíos disjuntos y convexos. Prueba que existe algún hiperplano  $H$  que separa  $A$  y  $B$ .

**Ejercicio 3.1.10.** Sea  $E$  un espacio normado y sea  $I$  cualquier conjunto de índices, fijado un subconjunto  $\{x_i\}_{i \in I}$  en  $E$  y otro  $\{\alpha_i\}_{i \in I}$  en  $\mathbb{R}$ . Demuestra que las siguientes propiedades son equivalentes:

1. Existe  $f \in E^*$  de forma que  $f(x_i) = \alpha_i \quad \forall i \in I$ .
2. Existe una constante  $M \geq 0$  de forma que para cada conjunto finito  $J \subset I$  y para cada elección de números reales  $\{b_i\}_{i \in J}$  tenemos:

$$\left| \sum_{i \in J} \beta_i \alpha_i \right| \leq M \left\| \sum_{i \in J} \beta_i x_i \right\|$$

Notemos que en la prueba  $2 \implies 1$  uno puede encontrar alguna  $f \in E^*$  con  $\|f\| \leq M$ . (**Pista:** intenta primero definir  $f$  en el espacio lineal generado por  $\{x_i\}_{i \in I}$ ).

## 3.2. Principio de acotación uniforme y $T^a$ de la gráfica cerrada

### Ejercicio 3.2.1.

**Ejercicio 3.2.2.** Sea  $E$  un espacio vectorial y sea  $p : E \rightarrow \mathbb{R}$  una función que cumple las siguientes propiedades:

1.  $p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E$ .
2. Para cada  $x \in E$  fijo la función  $\lambda \mapsto p(\lambda x)$  es continua.
3. Siempre que una sucesión de puntos de  $E$   $\{y_n\}$  verifique que  $\{p(y_n)\} \rightarrow 0$ , entonces  $\{p(\lambda y_n)\} \rightarrow 0$  para cada  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Supongamos que  $\{x_n\}$  es una sucesión de puntos de  $E$  de forma que  $\{p(x_n)\} \rightarrow 0$  y  $\{\alpha_n\}$  es una sucesión de números reales acotada. Probar que  $p(0) = 0$  y que  $\{p(\alpha_n x_n)\} \rightarrow 0$ .

(**Pista:** Dado  $\varepsilon > 0$ , considera los conjuntos:

$$F_n = \{\lambda \in \mathbb{R} : |p(\lambda x_k)| \leq \varepsilon \quad \forall k \geq n\}$$

Deduce que si  $\{x_n\}$  es una sucesión de  $E$  de forma que  $\{p(x_n - x)\} \rightarrow 0$  para algún  $x \in E$  y  $\{\alpha_n\}$  es una sucesión de forma que  $\{\alpha_n\} \rightarrow \alpha$ , entonces  $\{p(\alpha_n x_n)\} \rightarrow p(\alpha x)$ .

Usando que  $\{x_n\}$  y 3 con  $\lambda = 0$  obtenemos que:

$$\{p(0 \cdot x_n)\} = \{p(0)\} \rightarrow 0$$

de donde  $p(0) = 0$ . Siguiendo la pista, dado  $\varepsilon > 0$  definimos:

$$F_n = \{\lambda \in \mathbb{R} : |p(\lambda x_k)| \leq \varepsilon \quad \forall k \geq n\}$$

Por reducción al absurdo, supongamos que  $\{p(\alpha_n x_n)\} \not\rightarrow 0$ , de donde existe una parcial con  $|p(\alpha_{\sigma(n)} x_{\sigma(n)})| \geq \varepsilon$ , para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Como  $\{\alpha_n\}$  está acotada, el Teorema de Weierstrass nos permite encontrar una parcial convergente. Supongamos que la parcial  $\sigma$  verifica esto, con lo que  $\{\alpha_{\sigma(n)}\} \rightarrow \alpha$ . Observemos que:

- $F_n$  es cerrado para cada  $n \in \mathbb{N}$ , ya que:

$$F_n = \bigcap_{k \geq n} \{\lambda \in \mathbb{R} : |p(\lambda x_k)| \leq \varepsilon\}$$

Como (2) nos dice que  $\lambda \mapsto p(\lambda x_k)$  es continua, tenemos que cada uno de dichos conjuntos son cerrados, como preimagen de un conjunto cerrado por una función continua.

- Veamos que  $\bigcup_{n \geq 1} F_n = \mathbb{R}$ . Para ello, tomamos  $\lambda \in \mathbb{R}$  y como por hipótesis  $\{p(\lambda x_n)\} \rightarrow 0$ , con lo que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  de forma que:

$$|p(\lambda x_n)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Luego  $\lambda \in F_{n_0}$

Por el contrarrecíproco del Lema de Baire, existe  $F_n^\circ$  con  $F_n^\circ \neq \emptyset$ , por lo que existen  $\lambda_0 \in \mathbb{R}$  y  $\delta > 0$  de forma que

$$B(\lambda_0, \delta) \subset F_n^\circ$$

En otras palabras:

$$(|p((\lambda_0 + t)x_{\sigma(k)})| \leq \varepsilon \quad \forall k \geq n_0) \quad \forall t \in ]-\delta, \delta[$$

Ahora:

$$p(\alpha_{\sigma(k)}x_{\sigma(k)}) \leq p((\lambda_0 + \alpha_{\sigma(k)} - \alpha)x_{\sigma(k)}) + p((\alpha - \lambda_0)x_{\sigma(k)})$$

con  $\{p((\alpha - \lambda_0)x_{\sigma(k)})\} \rightarrow 0$  y podemos acotar el primer sumando en valor absoluto:

$$|p((\lambda_0 + \alpha_{\sigma(k)} - \alpha)x_{\sigma(k)})| \leq \varepsilon$$

Luego:

$$p((\lambda_0 + \alpha_{\sigma(k)} - \alpha)x_{\sigma(k)}) \leq p((\lambda_0 - \alpha)x_{\sigma(k)}) + p(\alpha_{\sigma(k)}x_{\sigma(k)})$$

de donde:

$$p(x_{\sigma(k)}x_{\sigma(k)}) \geq p((\lambda_0 + \alpha_{\sigma(k)} - \alpha)x_{\sigma(k)}) - p((\lambda_0 - \alpha)x_{\sigma(k)})$$

de forma que el segundo sumando tiende a 0 y el primero está acotado en valor absoluto por  $\varepsilon$ , de donde deducimos:

$$p(\alpha_{\sigma(k)}x_{\sigma(k)}) \leq 2\varepsilon$$

**Ejercicio 3.2.3.** Sean  $E$  y  $F$  dos espacios de Banach y  $\{T_n\}$  una sucesión en  $L(E, F)$ . Supongamos que para todo  $x \in E$  se tiene que  $\{T_n x\}$  converge a un cierto límite  $Tx$ . Probar que si  $\{x_n\} \rightarrow x$  en  $E$ , entonces  $\{T_n(x_n)\} \rightarrow Tx$  en  $F$ .

Dado  $x \in E$ , como  $\{T_n x\}$  es convergente a  $Tx$ , entonces  $\{\|T_n x\|\} \rightarrow \|Tx\|$ , luego:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| < \infty$$

Por el Principio de acotación uniforme, tenemos que  $C = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty$ , de donde:

$$\begin{aligned} \|T_n x_n - Tx\| &= \|T_n x_n - T_n x + T_n x - Tx\| \leq \|T_n x_n - T_n x\| + \|T_n x - Tx\| \\ &= \|T_n(x_n - x)\| + \|T_n x - Tx\| \leq C\|x_n - x\| + \|T_n x - Tx\| \end{aligned}$$

Como  $\|x_n - x\|, \|T_n x - Tx\| \rightarrow 0$ , tenemos pues que  $\|T_n x_n - Tx\| \rightarrow 0$ , de donde  $\{T_n(x_n)\} \rightarrow Tx$ .

**Ejercicio 3.2.4.** Sean  $E, F$  dos espacios de Banach y sea  $a : E \times F \rightarrow \mathbb{R}$  una forma bilineal que verifica:

1. Para cada  $x \in E$ , la aplicación  $f_x : y \mapsto a(x, y)$  es continua.
2. Para cada  $y \in F$ , la aplicación  $f_y : x \mapsto a(x, y)$  es continua.

Probar que existe una constante  $C \geq 0$  de forma que:

$$|a(x, y)| \leq C\|x\|\|y\| \quad \forall x \in E, \quad \forall y \in F$$

(**Pista:** Introduce un operador lineal  $T : E \rightarrow F^*$  y prueba que  $T$  está acotada con ayuda del Corolario 2.3.3).

**Opción 1.** Es claro que  $f_x$  es lineal, con lo que  $f_x \in F^*$ .

$$\begin{aligned} T : E &\longrightarrow F^* \\ x &\longmapsto f_x \end{aligned}$$

Queremos ver que si  $B \subset E$  es acotada entonces  $T(B)$  es acotada. Para ello:

$$\langle T(B), y \rangle = \{ \langle f_x, y \rangle : f_x \in T(B) \} = \{ a(x, y) : x \in B \} = \{ f_y(x) : x \in B \}$$

de donde:

$$|f_y(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in E$$

Luego por el Corolario 2.3.3 tenemos que  $T(B)$  está acotado, así como  $T$  es continua, por lo que existe  $C \geq 0$  tal que  $\|T(x)\| \leq C\|x\| \quad \forall x \in E$ . Luego:

$$\|f_x\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |f_x(y)| \leq C\|x\|$$

de donde:

$$\left| a\left(x, \frac{y}{\|y\|}\right) \right| \leq C\|x\| \implies a(x, y) \leq C\|x\|\|y\|$$

**Opción 2.** Definimos:

$$\begin{aligned} T : E &\longrightarrow F^* \\ x &\longmapsto f_x \end{aligned}$$

Es claro que  $T$  es lineal por ser  $a$  bilineal. Lo que haremos será probar que  $T$  es continua tratando de usar el Teorema de la Gráfica cerrada. Recordamos que:

$$Gr(T) = \{(x, Tx) : x \in E\}$$

Para ver que  $Gr(T)$  es cerrado, tomamos una sucesión de puntos de  $Gr(T)$ :  $\{(x_n, Tx_n)\}$  que suponemos convergente a un punto  $(x, w) \in Gr(T)$ . Tenemos entonces que:

$$\|x_n - x\|, \|Tx_n - w\| \rightarrow 0$$

De la segunda podemos deducir que  $\langle Tx_n - w, y \rangle \rightarrow 0 \quad \forall y \in F$ :

$$\langle Tx_n - w, y \rangle = \langle Tx_n, y \rangle - \langle w, y \rangle = a(x_n, y) - \langle w, y \rangle$$

Por lo que  $\{a(x_n, y)\} \rightarrow \langle w, y \rangle$ , pero por la propiedad 2 se tiene que  $\{a(x_n, y)\} \rightarrow a(x, y)$ , de donde deducimos que  $\langle Tx, y \rangle = a(x, y) = \langle w, y \rangle \quad \forall y \in F$ , de donde deducimos que  $w = Tx$ , con lo que  $(x, w) \in Gr(T)$ , luego  $Gr(T)$  es cerrada y por el Teorema de la gráfica cerrada concluimos que  $T$  es continua.

**Ejercicio 3.2.5.** Sea  $E$  un espacio de Banach y sea  $\{\varepsilon_n\}$  una sucesión de reales positivos de forma que  $\{\varepsilon_n\} \rightarrow 0$ . Además, sea  $\{f_n\}$  una sucesión de elementos de  $E^*$  que cumple la propiedad:

$$\exists r > 0 \quad \forall x \in E \text{ con } \|x\| < r, \exists C(x) \in \mathbb{R} \text{ de forma que} \\ \langle f_n, x \rangle \leq \varepsilon_n \|f_n\| + C(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Prueba que la sucesión  $\{f_n\}$  está acotada.

(**Pista:** Introduce  $g_n = \frac{f_n}{(1+\varepsilon_n\|f_n\|)}$ ).

**Ejercicio 3.2.6.** (Operadores no lineales monótonos y localmente acotados)

Sea  $E$  un espacio de Banach y sea  $D(A)$  cualquier subconjunto de  $E$ . Una aplicación (no lineal)  $A : D(A) \subseteq E \rightarrow E^*$  se dice “monótona” si verifica

$$\langle Ax - Ay, x - y \rangle \geq 0 \quad \forall x, y \in D(A)$$

1. Sea  $x_0 \in \text{Int } D(A)$ . Prueba que existen dos constantes  $R > 0$  y  $C$  de forma que

$$\|Ax\| \leq C \quad \forall x \in D(A) \quad \text{con} \quad \|x - x_0\| < R$$

(**Pista:** Razona por reducción al absurdo y construye una sucesión  $\{x_n\}$  de puntos de  $D(A)$  de forma que  $\{x_n\} \rightarrow x_0$  y  $\{\|Ax_n\|\} \rightarrow \infty$ . Elige  $r > 0$  de forma que  $B(x_0, r) \subset D(A)$ . Usa la monotonía de  $A$  en  $x_n$  y en  $(x_0 + r)$  con  $\|x\| < r$ . Aplica el Ejercicio 3.2.5).

2. Prueba la misma conclusión para un punto  $x_0 \in \text{Int}(\text{conv } D(A))$ .
3. Extiende la conclusión de la pregunta 1 al caso de que  $A$  sea multivaluada, es decir, para cada  $x \in D(A)$ ,  $Ax$  es un conjunto no vacío de  $E^*$ , en este caso la monotonía se define como sigue:

$$\langle f - g, x - y \rangle \geq 0 \quad \forall x, y \in D(A), \quad \forall f \in Ax, \quad \forall g \in Ay$$

**Solución.**

1. Sea  $x_0 \in \text{Int } D(A)$ . Prueba que existen dos constantes  $R > 0$  y  $C$  de forma que

$$\|Ax\| \leq C \quad \forall x \in D(A) \quad \text{con} \quad \|x - x_0\| < R$$

Por reducción al absurdo, supongamos que:

$$\forall R, C \geq 0 \quad \exists x \in D(A) \quad \text{con} \quad \|x - x_0\| < R \quad \text{y} \quad \|Ax\| > C$$

Por tanto, para cada  $n \in \mathbb{N}$

$$\exists x_n \in D(A) \quad \text{con} \quad \|x_n - x_0\| < \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad \|Ax_n\| > C$$

Por lo que  $\{x_n\} \rightarrow x_0$  y  $\{\|Ax_n\|\} \rightarrow \infty$ . Como  $x_0 \in \text{Int } D(A)$ , sea  $r > 0$  de forma que  $B(x_0, r) \subset D(A)$ , si tomamos  $x \in E$  con  $\|x\| < r$  tendremos entonces que:

$$\|x_0 + x - x_0\| = \|x\| < r \implies x_0 + x \in B(x_0, r) \subset D(A)$$

Como  $A$  es monótona, tenemos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle Ax_n - A(x_0 + x), x_n - x_0 - x \rangle \\ &= \langle Ax_n, x \rangle + \langle Ax_n, x_n - x_0 \rangle + \langle A(x_0 + x), x \rangle + \langle A(x_0 + x), x_0 - x_n \rangle \end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned} \langle Ax_n, x \rangle &\leq \|Ax_n\| \|x_n - x_0\| + \|A(x_0 + x)\| \|x\| + \|A(x_0 + x)\| \|x_0 - x_n\| \\ &= \|Ax_n\| \|x_n - x_0\| + \|A(x_0 + x)\| (\|x\| + \|x_0 - x_n\|) \\ &\stackrel{(*)}{\leq} \|Ax_n\| \underbrace{\|x_n - x_0\|}_{\varepsilon_n} + \underbrace{\|A(x_0 + x)\| (\|x\| + 1)}_{C(x)} \end{aligned}$$

Donde en  $(*)$  hemos usado que  $\|x_n - x_0\| < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ . Aplicando el Ejercicio 3.2.5, tenemos que  $\{Ax_n\}$  está acotada, contradicción con que  $\{\|Ax_n\|\} \rightarrow \infty$ , por lo que tenemos el primer apartado.

2. Prueba la misma conclusión para un punto  $x_0 \in \text{Int}(\text{conv } D(A))$ .

Tenemos que  $\text{conv } D(A)$  es el cierre convexo de  $D(A)$ :

$$\text{conv } D(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k : v_k \in D(A), \text{ con } \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1 \right\}$$

Repetiremos la misma prueba que en el apartado 1, cambiando un poco el final. Por Reducción al absurdo, de la misma forma podemos encontrar  $\{x_n\} \rightarrow x_0$  con  $\|x_n - x_0\| \leq 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  y  $\{\|Ax_n\|\} \rightarrow \infty$ . Como  $x_0 \in \text{Int}(\text{conv } D(A))$ , sea  $r > 0$  de forma que  $B(x_0, r) \subset \text{conv } D(A)$ , si tomamos  $x \in E$  con  $\|x\| < r$  tendremos que  $x_0 + x \in \text{conv } D(A)$ , por lo que existen  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ ,  $v_1, \dots, v_n \in D(A)$  con:

$$x_0 + x = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k \quad \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$$

Fijado  $k \in \{1, \dots, n\}$ , podemos usar la monotonía de  $A$ :

$$0 \leq \langle Ax_n - Av_k, x_n - v_k \rangle \implies \langle Ax_n, x_n - v_k \rangle \geq \langle Av_k, x_n - v_k \rangle$$

Por lo que:

$$\lambda_k \langle Ax_n, x_n - v_k \rangle \geq \lambda_k \langle Av_k, x_n - v_k \rangle \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

de donde:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \langle Ax_n, x_n - v_k \rangle \geq \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle Av_k, x_n - v_k \rangle$$

Vemos que:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle Ax_n, x_n - v_k \rangle &= \left\langle Ax_n, \sum_{k=1}^n (\lambda_k x_n - \lambda_k v_k) \right\rangle = \left\langle Ax_n, x_n - \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k \right\rangle \\ &= \langle Ax_n, x_n - x_0 - x \rangle = \langle Ax_n, x_n - x_0 \rangle - \langle Ax_n, x \rangle \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}\langle Ax_n, x \rangle &\leq \langle Ax_n, x_n - x_0 \rangle + \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle Av_k, v_k - x_n \rangle \\ &\leq \|Ax_n\| \|x_n - x_0\| + \sum_{k=1}^n \lambda_k \|Av_k\| \|v_k - x_n\|\end{aligned}$$

Pero:

$$\|v_k - x_n\| \leq \|v_k - x_0\| + \|x_0 - x_n\| \leq \|v_k - x_0\| + 1$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}\langle Ax_n, x \rangle &\leq \langle Ax_n, x_n - x_0 \rangle + \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle Av_k, v_k - x_n \rangle \\ &\leq \|Ax_n\| \|x_n - x_0\| + \sum_{k=1}^n \lambda_k \|Av_k\| \|v_k - x_n\| \\ &\leq \|Ax_n\| \underbrace{\|x_n - x_0\|}_{\varepsilon_n} + \underbrace{\sum_{k=1}^n \lambda_k \|Av_k\| (\|v_k - x_0\| + 1)}_{C(x)}\end{aligned}$$

Lo que nuevamente lleva a contradicción.

3. Extiende la conclusión de la pregunta 1 al caso de que  $A$  sea multivaluada.

En este caso, queremos probar que existen  $R > 0, C \geq 0$  de forma que:

$$\text{Si } x \in D(A) \text{ con } \|x - x_0\| < R \implies \|f\| \leq C \quad \forall f \in Ax$$

Por reducción al absurdo, suponemos que

$$\forall R, C \geq 0 \quad \exists x \in D(A) \text{ con } \|x - x_0\| < R \text{ y } f \in Ax \text{ con } \|f\| > C$$

Por lo que para cada  $n \in \mathbb{N}$  podemos tomar un elemento  $x_n \in D(A)$  con  $\|x_n - x_0\| < \frac{1}{n}$ , y  $f_n \in Ax_n$  con  $\|f_n\| > C$ . En definitiva, tenemos  $\{x_n\} \rightarrow x_0$  y  $\{\|f_n\|\} \rightarrow \infty$ . Sea ahora  $r > 0$  de forma que  $B(x_0, r) \subset D(A)$ , entonces si  $x \in E$  con  $\|x\| < r$  tendremos que  $x_0 + x \in D(A)$ . Si tomamos  $g \in A(x_0 + x)$  y usamos la monotonía de  $A$ :

$$\langle f_n - g, x_n - x_0 - x \rangle \geq 0$$

luego:

$$\begin{aligned}\langle f_n, x \rangle &\leq \langle f_n, x_n - x_0 \rangle + \langle g, x + x_0 - x_n \rangle \leq \|f_n\| \|x_n - x_0\| + \|g\| \|x + x_0 - x_n\| \\ &\leq \|f_n\| \|x_n - x_0\| + \|g\| (\|x\| + \|x_0 - x_n\|) \leq \|f_n\| \underbrace{\|x_n - x_0\|}_{\varepsilon_n} + \underbrace{\|g\| (\|x\| + 1)}_{C(x)}\end{aligned}$$

Lo que nos lleva a contradicción.

**Ejercicio 3.2.7.** Sea  $\alpha = \{\alpha_n\}$  una sucesión de números reales y sea  $1 \leq p \leq \infty$ . Supongamos que  $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| |x_n| < \infty$  para cada elemento  $x = \{x_n\}$  de  $l_p$ . Prueba que  $\alpha \in l_{p'}$ .

**Ejercicio 3.2.8.** Sea  $E$  un espacio de Banach y sea  $T : E \rightarrow E^*$  un operador lineal verificando que

$$\langle Tx, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in E$$

Prueba que  $T$  es acotado.

(Se pueden aplicar dos métodos, bien usar el Ejercicio 3.2.6, bien aplicar el Teorema de la Gráfica Cerrada.)

**Usando el Ejercicio 3.2.6.** Es fácil ver que  $T$  es monótona, ya que:

$$\langle Tx - Ty, x - y \rangle = \langle T(x - y), x - y \rangle \geq 0 \quad \forall x, y \in E$$

En dicho caso, por el Ejercicio 3.2.6 tenemos que para todo  $x \in E$  existen  $R > 0$ ,  $C \geq 0$  de forma que:

$$y \in E \quad \text{con} \quad \|y - x\| < R \implies \|Ty\| \leq C$$

Es decir, si  $y \in B(x, R)$  tenemos entonces que  $\|Ty\| \leq C$ . Sea ahora  $z \in B(0, 1)$ , tenemos que:

$$\|Tz\| = \frac{\|T(Rz)\|}{R} \leq \frac{C}{R}$$

Por lo que  $T(B(0, 1))$  es un conjunto acotado, y por una proposición vista en teoría concluimos que  $T$  es acotada.

**Usando el Teorema de la Gráfica Cerrada.**

**Ejercicio 3.2.9.** Sea  $E$  un espacio de Banach y sea  $T : E \rightarrow E^*$  un operador lineal verificando

$$\langle Tx, y \rangle = \langle Ty, x \rangle \quad \forall x, y \in E$$

Prueba que  $T$  es acotado.

**Ejercicio 3.2.10.** Sean  $E$  y  $F$  dos espacios de Banach y sea  $T \in L(E, F)$  una aplicación sobreyectiva.

1. Sea  $M \subset E$ . Prueba que  $T(M)$  es cerrado en  $F$  si y solo si  $M + N(T)$  es cerrado en  $E$ .

Donde  $N(T)$  es el núcleo de  $T$ , por doble inclusión tenemos que:

$\Leftarrow$ ) Si  $M + N(T)$  es cerrado, entonces  $E \setminus (M + N(T))$  es abierto, y como:

$$T(E \setminus (M + N(T))) = T(E) \setminus T(M + N(T)) = F \setminus T(M)$$

donde hemos usado que  $T$  es sobreyectiva, usamos además el Teorema de la Aplicación Abierta, obteniendo que  $F \setminus T(M)$  es abierto, por lo que  $T(M)$  es cerrado.



$\implies$ ) Si  $T(M)$  es cerrado, por ser  $T$  continua tenemos que  $T^{-1}(T(M))$  es cerrado, y:

$$T^{-1}(T(M)) = M + N(T)$$

$\subseteq$ ) Si  $x + n \in M + N(T)$ , entonces:

$$T(x + n) = T(x) + T(n) = T(x) \in T(M)$$

Por lo que  $x + n \in T^{-1}(T(x))$ .

$\supseteq$ ) Si  $x \in T^{-1}(T(M))$ , entonces:

$$T(x) \in T(M) \implies \exists m \in M \text{ con } T(x) = T(m)$$

de donde  $T(x - m) = T(x) - T(m) = 0$ . En conclusión, tenemos que:

$$x = m + x - m$$

con  $m \in M$ ,  $x - m \in N(T)$ .

2. Deduce que si  $M$  es un espacio vectorial cerrado de  $E$  y si  $\dim N(T) < \infty$ , entonces  $T(M)$  es cerrado.

Si  $\dim N(T) < \infty$  tenemos entonces que  $N(T)$  es un espacio vectorial de dimensión finita, luego es un conjunto cerrado. Como Además,  $M$  es un espacio vectorial cerrado, tendremos que  $M + N(T)$  es cerrado, luego  $T(M)$  será cerrado por el primer apartado.