

Topología II

Examen VI

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II

Examen VI

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2024/25.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Grupo Único.

Descripción Examen extraordinario.

Fecha 10 de febrero de 2025.

Duración 2 horas y media.

Responda la pregunta 1 y elija tres preguntas entre la 2, 3, 4 y 5.

Ejercicio 1. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Dadas las circunferencias

$$C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 = 1\}, \quad C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x + 1)^2 + y^2 = 1\}$$

no existe una aplicación recubridora desde $X = C_1 \cup C_2$ en \mathbb{S}^1 .

b) Si $p : X \rightarrow Y$ es una aplicación recubridora con X compacto, entonces $p^{-1}(y)$ es finito para todo $y \in Y$.

c) Toda aplicación continua $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ es homotópicamente nula.

Ejercicio 2. Consideremos el cilindro vertical $C = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$ y las rectas horizontales

$$R_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = -1\}, \quad R_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = 1\}$$

Calcula el grupo fundamental de

$$X = C \cup R_1 \cup R_2$$

Ejercicio 3. Sea $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ una aplicación continua cumpliendo que $f|_{Fr(\overline{\mathbb{D}})} : Fr(\overline{\mathbb{D}}) \rightarrow Fr(\overline{\mathbb{D}})$ es un homeomorfismo. Demuestra que f es sobreyectiva.

Ejercicio 4. Sea $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^1$ una aplicación continua. Demuestra que f es homotópicamente nula si $n \geq 2$.

Ejercicio 5. Determina la superficie compacta S dada por la presentación poligonal

$$\langle a, b, c, d, e, f, g, h, i; a f c^{-1}, d e b^{-1}, h i a^{-1}, d b c, e h g^{-1}, g f i^{-1} \rangle$$

Solución.

Ejercicio 1. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Dadas las circunferencias

$$C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 = 1\}, \quad C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x + 1)^2 + y^2 = 1\}$$

no existe una aplicación recubridora desde $X = C_1 \cup C_2$ en \mathbb{S}^1 .

b) Si $p : X \rightarrow Y$ es una aplicación recubridora con X compacto, entonces $p^{-1}(y)$ es finito para todo $y \in Y$.

Si Y es T1 es cierta, pues para todo $y \in Y$ tendremos que $\{y\}$ es cerrado por ser Y T1, por lo que $p^{-1}(\{y\}) \subseteq X$ es un conjunto cerrado. Como X es compacto, tenemos que $p^{-1}(\{y\})$ también será compacto. Como p es una aplicación recubridora, para y existirá O_y un abierto de Y regularmente recubierto, por lo que:

$$p^{-1}(O_y) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

con A_i abierto y $p|_{A_i} : A_i \rightarrow O_y$ homeomorfismo, para cada $i \in I$. Tenemos un recubrimiento por abiertos de $p^{-1}(\{y\}) \subseteq p^{-1}(O_y)$, por lo que por ser $p^{-1}(\{y\})$ compacto existirá $J \subseteq I$ finito de forma que:


$$p^{-1}(\{y\}) \subseteq \bigsqcup_{i \in J} A_i$$

Como los conjuntos A_i son disjuntos tenemos entonces que solo puede haber una cantidad finita de preimágenes de y .

c) Toda aplicación continua $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ es homotópicamente nula.

Verdadera: Si consideramos el conjunto:

$$Y = \mathbb{R} \times]0, 1[$$



Tenemos que Y recubre a $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, ya que para cada circunferencia de centro $(0, 0)$ de X podemos considerar la aplicación recubridora estándar desde \mathbb{R} cuyo dominio se encuentra a cierta altura en el conjunto Y . Podemos repetir esta idea haciendo corresponder a cada altura del conjunto Y un radio en el conjunto X , de forma que los radios tiendan a 0 cuando la altura tienda a 0 y que los radios diverjan cuando la altura se acerque a 1.



Usando esta idea, si consideramos la aplicación $p : Y \rightarrow X$ dada por:

$$p(x, y) = tg\left(\frac{\pi}{2}y\right) p_0(x)$$

donde $p_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ es la aplicación recubridora estándar, es sencillo probar que p es una aplicación recubridora. Así, estamos en la situación:

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ & \downarrow p & \\ \mathbb{D} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \end{array}$$

Si observamos ahora que \mathbb{D} es simplemente conexo tenemos entonces que f se puede levantar, con lo que fijado $x_0 \in \mathbb{D}$ y tomando $r_0 \in p^{-1}(\{f(x_0)\})$ tenemos que existe un levantamiento $\hat{f} : \mathbb{D} \rightarrow Y$. Como tenemos ahora que Y es contráctil tenemos que \hat{f} es homotópicamente nula, y razonando como en el Ejercicio 4 llegamos a que f es homotópicamente nula.


Ejercicio 2. Consideremos el cilindro vertical $C = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$ y las rectas horizontales

$$R_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = -1\}, \quad R_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = 1\}$$


Calcula el grupo fundamental de

$$X = C \cup R_1 \cup R_2$$


Tenemos el conjunto:




Que tiene por retracto de deformación el conjunto:



Si tomamos como U :



Y como V :



Puede probarse que $U \cap V$ es simplemente conexo, que U tiene grupo fundamental \mathbb{Z} y V tiene $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$, de donde:

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Ejercicio 3. Sea $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ una aplicación continua cumpliendo que $f|_{Fr(\overline{\mathbb{D}})} : Fr(\overline{\mathbb{D}}) \rightarrow Fr(\overline{\mathbb{D}})$ es un homeomorfismo. Demuestra que f es sobreyectiva.

Por reducción al absurdo suponemos que f no es sobreyectiva, es decir, que existe $y \in \overline{\mathbb{D}} \setminus f(\overline{\mathbb{D}})$ (notemos que $y \in \mathbb{D}$, ya que si no esto contradeciría la existencia del homeomorfismo enunciado). De esta forma, podemos considerar la restricción en codominio $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\}$. Ahora, el conjunto $\overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\}$ tiene por retracto de deformación al conjunto \mathbb{S}^1 . En definitiva, podemos considerar la siguiente cadena de composiciones de aplicaciones continuas:

$$\overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{f} \overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\} \xrightarrow{r} \mathbb{S}^1 \xrightarrow{f^{-1}} \mathbb{S}^1$$

donde usamos que $Fr(\overline{\mathbb{D}}) = \mathbb{S}^1$, obteniendo así una aplicación continua de $\overline{\mathbb{D}}$ en \mathbb{S}^1 que mantiene fijos los puntos de \mathbb{S}^1 , contradicción.

Ejercicio 4. Sea $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^1$ una aplicación continua. Demuestra que f es homotópicamente nula si $n \geq 2$.

Si consideramos el recubridor (\mathbb{R}, p) de \mathbb{S}^1 con p la aplicación recubridora estándar:

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{R} & \\ & \downarrow p & \\ \mathbb{S}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Como $\pi_1(\mathbb{S}^n, x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$ para $n \geq 2$ tenemos entonces que:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^n, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0))$$

para $r_0 \in p^{-1}(\{f(x_0)\})$, por lo que existe una aplicación $\hat{f} : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}$ levantamiento de f con $\hat{f}(x_0) = r_0$. Como \hat{f} llega a \mathbb{R} que es contráctil tenemos que \hat{f} es homotópicamente nula, es decir, existe $z_0 \in \mathbb{R}$ y una homotopía $H : \mathbb{S}^n \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de forma que:

$$H(x, 0) = \hat{f}(x), \quad H(x, 1) = z_0 \quad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

Si consideramos ahora la homotopía $p \circ H : \mathbb{S}^n \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1$ tenemos que:

$$(p \circ H)(x, 0) = p(\hat{f}(x)) = f(x), \quad (p \circ H)(x, 1) = p(z_0) \quad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

Por lo que f es homotópica a la aplicación constantemente igual a $p(z_0)$, como queríamos probar.

Ejercicio 5. Determina la superficie compacta S dada por la presentación poligonal

$$\langle a, b, c, d, e, f, g, h, i; a f c^{-1}, d e b^{-1}, h i a^{-1}, d b c, e h g^{-1}, g f i^{-1} \rangle$$