

# Topología II

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Topología II

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Granada, 2025



# Índice general

<b>1. Relaciones de Ejercicios</b>	<b>5</b>
1.1. Conexión por arcos . . . . .	5
1.2. El grupo fundamental . . . . .	12
1.3. Espacios recubridores . . . . .	43
1.4. Superficies compactas . . . . .	56



# 1. Relaciones de Ejercicios

## 1.1. Conexión por arcos

**Ejercicio 1.1.1.** Muestra que cualquier esfera de  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 2$  es arcoconexa con la topología usual.

Es decir, queremos ver que  $\mathbb{S}^n$  es arcoconexa para  $n \geq 1$ .  
(notemos que  $\mathbb{S}^0 = \{x \in \mathbb{R} : \|x\| = 1\} = \{-1, 1\}$  no es un conjunto arcoconexo).

Para ello, sea  $n \geq 2$ , sabemos que  $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$  (con  $p \in \mathbb{S}^n$ ) es homeomorfa a  $\mathbb{R}^{n-1}$ , que es un conjunto arcoconexo por ser convexo (es un espacio vectorial). Como la arcoconexión es una propiedad topológica, esta se conserva por homeomorfismo, luego  $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$  es un conjunto arcoconexo,  $\forall p \in \mathbb{S}^n$ .

Tomando  $N = (0, \dots, 0, 1)$ ,  $S = (0, \dots, 0, -1) \in \mathbb{S}^n$ , podemos ver  $\mathbb{S}^n$  como unión de dos conjuntos arcoconexos:

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

no disjuntos:

$$(\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cap (\mathbb{S}^n \setminus \{S\}) = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$$

Por lo que  $\mathbb{S}^n$  es un conjunto arcoconexo,  $\forall n \geq 2$ .

**Ejercicio 1.1.2.** Demuestra que si  $\{A_i\}_{i \in I}$  es una familia de arcoconexos de  $X$  tales que todos intersecan a uno de ellos, es decir,

$$A_i \cap A_{i_0} \neq \emptyset, \quad \forall i \in I,$$

entonces  $\bigcup_{i \in I} A_i$  es arcoconexo.

Sean  $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$ , entonces existen  $i, j \in I$  de forma que  $x \in A_i$  y  $y \in A_j$ . Como  $A_i \cap A_{i_0}, A_j \cap A_{i_0} \neq \emptyset$ , podemos tomar  $a \in A_i \cap A_{i_0}$  y  $b \in A_j \cap A_{i_0}$ .

- $A_i$  es un conjunto arcoconexo con  $x, a \in A_i$ , por lo que existe un camino,  $\alpha$ , que une  $x$  con  $a$ .
- $A_j$  también es un conjunto arcoconexo con  $y, b \in A_j$ , por lo que existe un camino,  $\beta$ , que une  $y$  con  $b$ .
- Además,  $A_{i_0}$  es un conjunto arcoconexo con  $a, b \in A_{i_0}$ , por lo que existe un tercer camino,  $\gamma$ , que une  $a$  con  $b$ .

De esta forma, podemos tomar:

$$\sigma = \alpha * (\gamma * \tilde{\beta})$$

Que es un camino que une  $x$  con  $y$ . Como  $x$  e  $y$  eran arbitrarios, podemos unir cualesquiera dos puntos de  $\bigcup_{i \in I} A_i$ , por lo que dicho conjunto es arcoconexo.




Figura 1.1: Forma de unir dos puntos cualesquiera.

**Ejercicio 1.1.3.** Sea  $X$  un conjunto,  $x_0 \in X$ , y consideramos la topología (del punto incluido) dada por

$$T = \{U \subset X : x_0 \in U\} \cup \{\emptyset\}$$

¿Es  $(X, T)$  arcoconexo?

Sí: sea  $x \in X$ , veamos que la aplicación  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  dada por

$$\alpha(t) = \begin{cases} x & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ x_0 & \text{si } t \in ]1/2, 1] \end{cases} \quad \forall t \in [0, 1]$$

es continua. Sea  $U \in T$ :

- Si  $U = \emptyset$ , entonces  $\alpha^{-1}(U) = \emptyset \in \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$ .
- Si  $x_0 \in U$  y  $x \notin U$ , entonces  $\alpha^{-1}(U) = ]1/2, 1] \in \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$ .
- Si  $x_0, x \in U$ , entonces  $\alpha^{-1}(U) = [0, 1] \in \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$ .

Como la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta, tenemos que  $\alpha$  es continua, luego es un arco que une  $x$  con  $x_0$ .

Ahora, si  $x, y \in X$ , tenemos que existen  $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$  de forma que  $\alpha$  une  $x$  con  $x_0$  y  $\beta$  une  $y$  con  $x_0$ ; por lo que  $\alpha * \tilde{\beta}$  es un arco que une  $x$  con  $y$ . Como  $x$  e  $y$  eran arbitrarios, concluimos que  $X$  es arcoconexo.



**Ejercicio 1.1.4.** Demuestra que en  $\mathbb{R}^n$  con la topología usual, todo abierto conexo es arcoconexo. ¿Es cierto que todo cerrado conexo de  $\mathbb{R}^n$  es arcoconexo?

En teoría vimos que:

$$\text{Un conjunto es arcoconexo} \iff \begin{cases} \text{Es conexo} \\ \text{Todo punto admite un entorno arcoconexo} \end{cases}$$

Sea  $U$  un abierto conexo de  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ , falta ver que todo punto suyo admite un entorno arcoconexo en la topología inducida en  $U$  para ver que  $U$  es arcoconexo. Para ello, sea  $x \in U$ , como  $U$  es abierto existe  $r \in \mathbb{R}^+$  de forma que  $B(x, r) \subset U$ .  $B(x, r)$  es un conjunto arcoconexo por ser convexo, luego es un entorno arcoconexo de  $x$  en  $U$ . Como  $x$  era un punto arbitrario de  $U$ , todo punto suyo admite un entorno arcoconexo, y como  $U$  era conexo, tenemos que  $U$  es arcoconexo.

Ahora, no es cierto que todo cerrado conexo de  $\mathbb{R}^n$  es arcoconexo, ya que si consideramos  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Tenemos que

$$C = \overline{Gr(f)} = \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^+\}} = Gr(f) \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

es un conjunto cerrado y conexo (se vio en Topología I) pero que no es arcoconexo, puede probarse por un razonamiento similar a un ejemplo visto en teoría.




Figura 1.2: Dibujo de la adherencia de la gráfica de  $f(x)$ .

**Ejercicio 1.1.5.** Prueba que la componente arcoconexa de un punto  $x_0$  está contenida en la componente conexa de  $x_0$ .

Sea  $(X, T)$  un espacio topológico,  $x_0 \in X$  y  $C$  la componente arcoconexa de  $x_0$  en  $X$ , en particular tenemos que  $C$  es un conjunto arcoconexo, luego es conexo, por lo que está contenida en la componente conexa de  $x$ , al ser esta el mayor conjunto conexo que contiene a  $x$ .

**Ejercicio 1.1.6.** En  $\mathbb{R}$  con la topología de Sorgenfrey, esto es, la topología que tiene como base

$$\mathcal{B}_S = \{[a, b) \subset \mathbb{R} : a < b\},$$

determina sus componentes arcoconexas.

En Topología I vimos que las componentes conexas de la topología de Sorgenfrey eran los conjuntos de puntos unitarios  $\{x\}$ , ya que si tenemos un conjunto  $A \subset \mathbb{R}$  con al menos dos puntos distintos  $x$  e  $y$  (suponemos  $x < y$ ), entonces en la topología inducida en  $A$  podemos considerar los abiertos:

$$U = [-\infty, y) \cap A, \quad V = [y, +\infty) \cap A$$

de forma que  $U, V \neq \emptyset$ ,  $U \cup V = A$  y  $U \cap V = \emptyset$ , por lo que  $A$  (cualquier conjunto con al menos dos puntos distintos) es desconexo, luego las componentes conexas han de ser los conjuntos unitarios, ya que los conjuntos unitarios son conexos en cualquier topología.

Como las componentes arcoconexas se encuentran contenidas en las componentes conexas, no queda más salida que las componentes arcoconexas de la topología de Sorgenfrey sean los conjuntos unitarios.

**Ejercicio 1.1.7.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  un homeomorfismo entre espacios topológicos. Demuestra que  $A \subset X$  es una componente arcoconexa de  $X$  si y solo si  $f(A)$  es una componente arcoconexa de  $Y$ . Deduce que el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Sea  $A \subset X$  una componente arcoconexa de  $X$ , veamos que  $f(A)$  es una componente arcoconexa de  $Y$ . Para ello, por reducción al absurdo, si  $f(A)$  no fuera una componente arcoconexa de  $Y$  podría ser por dos razones:

- $f(A)$  no es un conjunto arcoconexo, algo que llevaría a una contradicción, ya que se vio que la imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo era arcoconexa.
- Porque existe  $B \subset Y$  un conjunto arcoconexo distinto de  $f(A)$  de forma que  $f(A) \subset B \subset Y$ . En dicho caso, si aplicamos  $f^{-1}$  en la anterior inclusión tenemos que:

$$f^{-1}(f(A)) = A \subset f^{-1}(B) \subset X$$

Por lo que tenemos  $f^{-1}(B)$ , un conjunto arcoconexo<sup>1</sup> distinto de  $A$  que contiene a  $A$ , luego  $A$  no era una componentes arcoconexa de  $X$ , contradicción.

En definitiva, si  $A \subset X$  es una componente arcoconexa entonces  $f(A)$  también lo es de  $Y$ . Ahora, si  $f(A)$  es una componente arcoconexa de  $Y$ , basta aplicar que  $f^{-1}$  también es un homeomorfismo para concluir que  $f^{-1}(f(A)) = A$  es una componente arcoconexa de  $X$ .

Sea  $Z$  un espacio topológico, notaremos en este ejercicio:

$$\Gamma_Z = \{U \subset Z : U \text{ es una componente arcoconexa de } Z\}$$

---

<sup>1</sup>por ser imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo.

Recuperando el homeomorfismo  $f : X \rightarrow Y$ , definimos

$$\begin{aligned} \Phi : \Gamma_X &\longrightarrow \Gamma_Y \\ U &\longmapsto f(U) \end{aligned}$$

- $\Phi$  está bien definida (es decir,  $f(U) \in \Gamma_Y$  para  $U \in \Gamma_X$ ), ya que hemos visto que la imagen de una componente arcoconexa de  $X$  es una componente arcoconexa de  $Y$ .
- $\Phi$  es inyectiva, ya que si  $U, V \in \Gamma_X$  con  $f(U) = f(V)$ , entonces por ser  $f$  inyectiva tenemos que  $U = V$ .
- $\Phi$  es sobreyectiva, ya que si  $W \in \Gamma_Y$ , entonces  $f^{-1}(W) \in \Gamma_X$ , con:

$$\Phi(f^{-1}(W)) = f(f^{-1}(W)) = W$$

Por ser  $\Phi$  biyectiva concluimos que  $|\Gamma_X| = |\Gamma_Y|$ ; es decir, el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

**Ejercicio 1.1.8.** En  $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$  se considera la topología que tiene por base

$$\mathcal{B} = \{]a, b[ \times \{0, 1\} : a < b\}.$$

Demuestra que  $X$  es arcoconexo. ¿Es  $X$  homeomorfo a  $\mathbb{R}$  con la topología usual?

Sean  $\alpha = (x, a), \beta = (y, b) \in X$ , vamos a tratar de crear un arco que una  $\alpha$  con  $\beta$ :

- Si  $a = b$ , entonces  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$  dada por:

$$\gamma(t) = ((1-t)x + ty, a) \quad \forall t \in [0, 1]$$

Es una aplicación continua, ya que si tomamos  $B = ]a, b[ \times \{0, 1\} \in \mathcal{B}$ , tenemos:

$$\gamma^{-1}(B) = \gamma^{-1}(]a, b[ \times \{0\}) \text{ abierto de } [0, 1]$$

Ya que el conjunto  $]a, b[ \times \{0\}$  es un abierto para la topología usual y  $\alpha$  es una aplicación continua para la topología usual.

- Si  $\alpha = (0, 0)$  y  $\beta = (0, 1)$ , entonces si tomamos  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$  dada por:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \alpha & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta & \text{si } 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

tenemos que  $\gamma$  es continua, ya que si  $B = ]a, b[ \times \{0, 1\} \in \mathcal{B}$ , tenemos que:

$$\gamma^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } 0 \notin ]a, b[ \\ [0, 1] & \text{si } 0 \in ]a, b[ \end{cases}$$

- Una vez discutidos dichos casos, suponemos ahora que  $\alpha = (x, 0)$  y  $\beta = (y, 1)$  (en caso contrario, sustituimos los papeles de  $\alpha$  y  $\beta$ ), en cuyo caso:
  - Sabemos de la existencia de un arco  $\gamma$  que une  $\alpha$  con  $(0, 0)$ .

- Sabemos de la existencia de un arco  $\tau$  que une  $(0, 0)$  con  $(0, 1)$ .
- Sabemos de la existencia de un arco  $\pi$  que une  $\beta$  con  $(0, 1)$ .

Si consideramos el arco  $\gamma * (\tau * \tilde{\pi})$  obtenemos un arco que une  $\alpha$  con  $\beta$ .

Por tanto,  $X$  es arcoconexo, ya que somos capaces de unir cualesquiera dos puntos distintos de  $X$  por un arco.

Ahora, para responder a la pregunta de si  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$  es homeomorfo a  $X$ , la respuesta es que no, y tenemos dos formas de justificar la respuesta:

**Opción 1.** Sabemos que  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$  es  $T_2$  por ser un espacio topológico metrizable, mientras que podemos probar que  $X$  no es  $T_2$ , ya que no existen ningún par de abiertos disjuntos uno conteniendo a  $(0, 0)$  y otro conteniendo a  $(0, 1)$ , puesto que si  $U$  es un abierto de  $X$  que contiene a  $(0, 0)$ , entonces como  $\mathcal{B}$  es una base, existen  $a, b \in \mathbb{R}$  de forma que:

$$(0, 0) \in ]a, b[ \times \{0, 1\} \subset U$$

Sin embargo, tendríamos entonces que  $(0, 1) \in ]a, b[ \times \{0, 1\}$ , de donde  $(0, 1) \in U$ , por lo que  $X$  no es  $T_2$  y como ser  $T_2$  es una propiedad topológica, dichos espacios no pueden ser homeomorfos.

**Opción 2.** Otra forma sería suponer que son homeomorfos, con lo que existe un homeomorfismo  $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ . Sea  $p \in \mathbb{R}$ , resulta entonces que  $\mathbb{R} \setminus \{p\}$  es homeomorfo a  $X \setminus \{(p, 0)\}$ , pero:

- $\mathbb{R} \setminus \{p\}$  no es arcoconexo.
- $X \setminus \{(p, 0)\}$  sí es arcoconexo, ya que podemos hacer que cualquier curva “salte” a  $(p, 1)$  sin perder su continuidad, con lo que podemos seguir conectando dos puntos cualesquiera.

**Ejercicio 1.1.9.** En  $\mathbb{R}^3$  con la topología usual, calcula las componentes arcoconexas de

$$X = \{x, y, z\} \in \mathbb{R}^3 : xyz = 1\}$$

Notemos que como  $xyz = 1$ , ninguno de ellos puede ser igual a 0, por lo que:

$$X = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \frac{1}{xy}, \quad xy \neq 0 \right\}$$

Si tomamos:

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\} = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$$

y definimos  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$f(x, y) = \frac{1}{xy} \quad \forall (x, y) \in \Gamma$$

Tenemos que  $X = Gr(f)$ . Por tanto, definiendo  $h : \Gamma \rightarrow X$  por:

$$h(x, y) = (x, y, f(x, y)) \quad \forall (x, y) \in \Gamma$$

Obtenemos (como vimos en Topología I) un homeomorfismo entre  $\Gamma$  y  $X$ . Como  $\Gamma$  tiene 4 componentes arcoconexas:

$$\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+, \quad \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-, \quad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-, \quad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^+$$

y las componentes arcoconexas se convierten por homeomorfismos tal y como acabamos de ver en el ejercicio 7, tenemos que:

$$h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+), \quad h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-), \quad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-), \quad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^+)$$

son las componentes arcoconexas de  $X$ .

**Ejercicio 1.1.10.** En  $\mathbb{R}^2$  con la topología usual consideremos las rectas horizontales  $A_n = \mathbb{R} \times \{1/n\}$ ,  $B_n = \mathbb{R} \times \{-1/n\}$  y el eje de ordenadas menos el origen, esto es,  $C = \{0\} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ . Calcula las componentes conexas y arcoconexas de

$$X = \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cup \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) \cup C \cup \{(1, 0)\}.$$

## 1.2. El grupo fundamental

**Ejercicio 1.2.1.** Prueba que en un espacio topológico simplemente conexo  $X$ , dos arcos cualesquiera  $\alpha, \beta \in \Omega(X, x, y)$  son homotópicos por arcos.

Sean  $\alpha, \beta \in \Omega(X, x, y)$ , tenemos que  $\alpha * \tilde{\beta}$  es un lazo basado en  $x$ , y por ser  $X$  simplemente conexo tenemos que  $[\alpha * \tilde{\beta}] = [\varepsilon_x]$ , de donde:

$$[\alpha] * [\tilde{\beta}] = [\alpha * \tilde{\beta}] = [\varepsilon_x] \implies [\alpha] = [\beta]$$

**Ejercicio 1.2.2.** Sean  $X$  un subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  y  $f : X \rightarrow Y$  una aplicación. Demuestra que si  $f$  se puede extender a una aplicación continua  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow Y$ , entonces  $f_*$  es el homomorfismo trivial, es decir, el homomorfismo que lleva todo elemento en el neutro.

Como  $F$  es una extensión de  $f$ , tenemos que  $F \circ i = f$ , es decir:

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{i} & \mathbb{R}^n \xrightarrow{F} Y \\ & \searrow f & \nearrow \end{array}$$

Y como cada una de ellas es continua ( $f$  es continua por ser  $f = F|_X$ ), podemos inducir el diagrama a grupos fundamentales, obteniendo para cada  $x_0 \in X$ :

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(X, x_0) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(\mathbb{R}^n, x_0) & \xrightarrow{F_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & \searrow f_* & & \nearrow & \end{array}$$

de donde:

$$f_*([\alpha]_X) = F_*(i_*([\alpha]_X)) = F_*([\alpha]_{\mathbb{R}^n}) \stackrel{(*)}{=} F_*([\varepsilon_{x_0}]_{\mathbb{R}^n}) = [\varepsilon_{f(x_0)}]_Y \quad \forall [\alpha]_X \in \pi_1(X, x_0)$$

donde en  $(*)$  hemos usado que  $\mathbb{R}^n$  es simplemente conexo.

**Ejercicio 1.2.3.** Se dice que un grupo  $G$  con operación  $\cdot$  es un grupo topológico si  $G$  tiene una topología de forma que las aplicaciones producto e inversión

$$\begin{aligned} \cdot : G \times G &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto x \cdot y \\ \text{e} : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto x^{-1} \end{aligned}$$

son continuas. Sea  $e$  el elemento neutro en  $G$ :

- a) Dados  $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$ , se define  $\alpha \cdot \beta : [0, 1] \rightarrow G$  como  $(\alpha \cdot \beta)(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t)$ . Demuestra que  $\alpha \cdot \beta \in \Omega(G, e)$ .

Hemos de probar que  $\alpha \cdot \beta$  es un lazo basado en  $e$ . Para ello:

- $\alpha \cdot \beta$  es continua, puesto que si consideramos:

$$\begin{aligned} \Phi : G \times G &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto x \cdot y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Psi : [0, 1] &\longrightarrow G \times G \\ t &\longmapsto (\alpha(t), \beta(t)) \end{aligned}$$

Tenemos que  $\alpha \cdot \beta = \Phi \circ \Psi$ :

$$(\alpha \cdot \beta)(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t) = \Phi(\alpha(t), \beta(t)) = \Phi(\Psi(t)) \quad \forall t \in [0, 1]$$

con  $\Phi$  continua por hipótesis y  $\Psi$  continua por ser  $\Psi = (\alpha, \beta)$ , con sus dos componentes funciones continuas, por ser arcos.

- Observemos que:

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta)(0) &= \alpha(0) \cdot \beta(0) = e \cdot e = e \\ (\alpha \cdot \beta)(1) &= \alpha(1) \cdot \beta(1) = e \cdot e = e \end{aligned}$$

Con lo que  $\alpha \cdot \beta \in \Omega(G, e)$ .

- b) Comprueba que  $(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta) = \alpha * \beta$  para cualesquiera  $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$ .

Sean  $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} ((\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta))(t) &= (\alpha * \varepsilon_e)(t) \cdot (\varepsilon_e * \beta)(t) \\ &= \begin{cases} \alpha(2t) \cdot \varepsilon_e(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \varepsilon_e(2t-1) \cdot \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \alpha(2t) \cdot e & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ e \cdot \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \\ &= (\alpha * \beta)(t) \quad \forall t \in [0, 1] \end{aligned}$$

- c) Sean  $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$ . Prueba que la operación  $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha \cdot \beta]$  está bien definida.

Sean  $\alpha, \alpha', \gamma, \gamma' \in \Omega(G, e)$  de forma que:

$$[\alpha] = [\alpha'], \quad [\gamma] = [\gamma'] \quad (1.1)$$

hemos de probar que  $[\alpha \cdot \gamma] = [\alpha' \cdot \gamma']$ . De las igualdades (1.1) sabemos que existen  $H_1, H_2 : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow G$  aplicaciones continuas con:

$$\begin{aligned} H_1(s, 0) &= \alpha(s), & H_1(s, 1) &= \alpha'(s), & H_1(0, t) &= e = H_1(1, t) \\ H_2(s, 0) &= \gamma(s), & H_2(s, 1) &= \gamma'(s), & H_2(0, t) &= e = H_2(1, t) \end{aligned}$$

Si definimos  $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow G$  dada por:

$$H(s, t) = H_1(s, t) \cdot H_2(s, t) \quad \forall (s, t) \in [0, 1] \times [0, 1]$$

tenemos que  $H$  es continua, ya que podemos verla como  $H = \Phi \circ (H_1, H_2)$ , al igual que hicimos en el apartado a), así como que:

$$H(s, 0) = H_1(s, 0) \cdot H_2(s, 0) = \alpha(s) \cdot \gamma(s) = (\alpha \cdot \gamma)(s)$$

$$H(s, 1) = H_1(s, 1) \cdot H_2(s, 1) = \alpha'(s) \cdot \gamma'(s) = (\alpha' \cdot \gamma')(s)$$

$$H(0, t) = H_1(0, t) \cdot H_2(0, t) = e \cdot e = e = e \cdot e = H_1(1, t) \cdot H_2(1, t) = H(1, t)$$

Con lo que  $H$  es una homotopía, lo que nos dice que  $[\alpha \cdot \gamma] = [\alpha' \cdot \gamma']$ , luego la operación está bien definida.

d) Muestra que  $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha] * [\beta]$ , para cada  $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$ .

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \varepsilon_e] \cdot [\varepsilon_e * \beta] = [(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta)] \stackrel{b)}{=} [\alpha * \beta] = [\alpha] * [\beta]$$


e) Demuestra que  $\pi_1(G, e)$  es abeliano.

Sean  $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} [\alpha] * [\beta] &= [\alpha * \beta] = [(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta)] = [\alpha * \varepsilon_e] \cdot [\varepsilon_e * \beta] = [\varepsilon_e * \alpha] \cdot [\beta * \varepsilon_e] \\ &= \left[ \begin{cases} e \cdot \beta(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \alpha(2t - 1) \cdot e & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \right] = [\beta * \alpha] = [\beta] * [\alpha] \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.4.** Sean  $X$  un espacio topológico y  $f, g : X \rightarrow \mathbb{S}^n$  aplicaciones continuas con  $g(x) \neq -f(x)$  para cada  $x \in X$ . Prueba que  $f$  y  $g$  son homotópicas. Deduce que si  $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  es continua y carece de puntos fijos, entonces  $f$  es homotópica a  $-Id_{\mathbb{S}^n}$ .

La idea que hay en la prueba es para cada  $x \in X$ , tratar de “llevar” de forma continua el punto  $f(x)$  hasta el punto  $g(x)$  sin salirnos de  $\mathbb{S}^n$ :



Para ello, definimos  $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$  dada por:

$$H(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + tg(x)}{\|(1-t)f(x) + tg(x)\|_2} \quad \forall (x, t) \in X \times [0, 1]$$

- $H$  está bien definida (es decir, el denominador no se anula), ya que si tenemos  $x \in X$  y  $t \in [0, 1]$  de forma que  $(1-t)f(x) + tg(x) = 0$ , entonces:

$$(1-t)f(x) = -tg(x)$$

de donde:

$$1-t = (1-t)\|f(x)\|_2 = \|(1-t)f(x)\|_2 = \|-tg(x)\|_2 = t\|g(x)\|_2 = t$$

por lo que ha de ser  $t = 1/2$ . Sin embargo, la condición  $g(x) \neq -f(x)$  implica que  $f(x) \neq -1/2g(x)$ , por lo que es imposible que el denominador se anule.



- $H$  es continua.
- Observamos que:

$$H(x, 0) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|_2} = f(x) \quad H(x, 1) = \frac{g(x)}{\|g(x)\|_2} = g(x)$$

con lo que  $H$  es una homotopía entre  $f$  y  $g$ .

Sea ahora  $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  una aplicación sin puntos fijos, entonces:

$$f(x) \neq x = -(-x) = -(-Id_{\mathbb{S}^n})(x) \quad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

y si aplicamos la parte del ejercicio que acabamos de probar, obtenemos que  $f$  es homotópica a  $-Id_{\mathbb{S}^n}$ .

**Ejercicio 1.2.5.** Sea  $p : R \rightarrow B$  una aplicación recubridora y  $b \in B$ . Demuestra que el subespacio topológico  $p^{-1}(\{b\}) \subset R$  tiene la topología discreta.

Sea  $X = p^{-1}(\{b\})$ , como  $p$  es una aplicación recubridora, podemos tomar un abierto  $O_b$  que contiene a  $b$  y está regularmente recubierto, con lo que existen  $\{A_i\}_{i \in I}$  conjuntos abiertos de  $R$  de forma que:

$$p^{-1}(O_b) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

Sea  $r \in X \subseteq p^{-1}(O_b)$ , tenemos entonces que existe un índice  $j \in I$  de forma que  $r \in A_j$ . Veamos que  $A_j$  no puede contener dos elementos distintos de  $X$ , pues si  $r, r' \in A_j \cap X$ , tenemos que:

$$p|_{A_j}(r) = b = p|_{A_j}(r')$$

y como  $p|_{A_j} : A_j \rightarrow O_b$  es un homeomorfismo por ser  $p$  una aplicación recubridora, tenemos en particular que es inyectiva, luego  $r = r'$ . En definitiva, hemos probado que si  $r \in X$ , entonces existe un índice  $j \in I$  de forma que  $\{r\} = X \cap A_j$ , con  $A_j$  un abierto de  $R$ , por lo que  $\{r\}$  es un abierto de  $X$ ,  $\forall r \in X$ , con lo que  $X$  tiene la topología discreta.

**Ejercicio 1.2.6.** Demuestra que toda aplicación recubridora es una aplicación abierta.

Sea  $p : R \rightarrow B$  una aplicación recubridora y  $U$  un abierto de  $R$ , queremos probar que  $p(U)$  es un abierto de  $B$ . Para ello, sea  $y \in p(U)$ , existirá  $x \in R$  de forma que  $p(x) = y$ . Como  $p$  es una aplicación recubridora, existirá  $O_y$  abierto de  $B$  con  $y \in O_y$  y de forma que  $O_y$  está regularmente recubierto, es decir, existe una familia  $\{A_i\}_{i \in I}$  de abiertos disjuntos de  $R$  de forma que:

$$x \in p^{-1}(O_y) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

con lo que tenemos un cierto índice  $j \in I$  de modo que  $x \in A_j$ , luego  $x \in U \cap A_j$ , siendo  $U \cap A_j$  un conjunto abierto, como intersección de conjuntos abiertos. Como  $p|_{A_j} : A_j \rightarrow O_y$  es un homeomorfismo por ser  $p$  una aplicación recubridora, en particular  $p|_{A_j}$  es abierta, luego  $p|_{A_j}(U \cap A_j)$  es un abierto contenido en  $p(U) \cap O_y$ , que contiene a  $y$ . Como este procedimiento podemos repetirlo para todo  $y \in p(U)$ , concluimos que  $p(U)$  es un abierto de  $B$ .

**Ejercicio 1.2.7.** Sea  $p : R \rightarrow B$  una aplicación recubridora, con  $B$  conexo. Demuestra que si  $p^{-1}(b_0)$  tiene  $k$  elementos para algún  $b_0 \in B$ , entonces  $p^{-1}(b)$  tiene  $k$  elementos para todo  $b \in B$ . En tal caso, se dice que  $R$  es un recubridor de  $k$  hojas de  $B$ .

Sea:

$$A = \{x \in B : p^{-1}(x) \text{ tiene } k \text{ elementos}\}$$

Como  $b_0 \in A$ , tenemos que  $A \neq \emptyset$ . Veamos que  $A$  es abierto y cerrado:

- Si  $a \in A$ , existe un abierto regularmente recubierto  $O_a$  de  $B$  que contiene a  $a$ , con lo que existe una familia de abiertos  $\{A_i\}_{i \in I}$  de  $R$  de forma que:

$$p^{-1}(O_a) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

y tal que  $p|_{A_i} : A_i \rightarrow O_a$  es un homeomorfismo,  $\forall i \in I$ . Para cada  $x \in O_a$  podemos construir la aplicación  $\Phi_x : I \rightarrow p^{-1}(x)$  de forma que a cada índice  $i$  le hace corresponder aquel elemento de  $A_i$  cuya imagen por  $p$  es  $x$ .

- La aplicación  $\Phi_x$  está bien definida, pues si  $i \in I$ , como la aplicación  $p|_{A_i} : A_i \rightarrow O_a$  es un homeomorfismo, ha de existir un único elemento  $y \in A_i$  tal que  $p(y) = x$ .
- $\Phi_x$  es inyectiva, pues si  $i, j \in I$  con  $\Phi_x(i) = \Phi_x(j)$ , entonces tenemos  $y \in A_i \cap A_j$  de forma que  $p(y) = x$ . Como la familia  $\{A_i\}_{i \in I}$  es disjunta, ha de ser  $i = j$ .
- $\Phi_x$  es sobreyectiva, pues si:

$$y \in p^{-1}(x) \subseteq p^{-1}(O_a) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

entonces ha de existir  $y \in A_i$  para cierto índice  $i$  de forma que  $p(y) = x$ , con lo que  $\Phi_x(i) = y$ .

En definitiva,  $\Phi_x$  es biyectiva para cada  $x \in O_a$ . Como en particular  $p^{-1}(a)$  tiene  $k$  elementos, tendremos entonces que  $I$  tiene  $k$  elementos, de donde  $p^{-1}(x)$  tiene  $k$  elementos,  $\forall x \in O_a$ , con lo que  $O_a \subseteq A$ . De donde deducimos que  $A$  es abierto.

- Sea  $x \in \overline{A}$ , como  $p$  es recubridora, existe un abierto regularmente recubierto  $O_x$  de  $B$  que contiene a  $x$ . Como  $x \in \overline{A}$ , se verifica que  $\exists a \in O_x \cap A$ . Como

$O_x$  está regularmente recubierto, existe una familia de abiertos  $\{A_i\}_{i \in I}$  de  $R$  de forma que:

$$p^{-1}(O_x) = \bigcup_{i \in I} A_i$$

tal que  $p|_{A_i} : A_i \rightarrow O_x$  es un homeomorfismo  $\forall i \in I$ . Al igual que antes, para cada  $y \in O_x$  podemos construir la aplicación  $\Phi_y : I \rightarrow p^{-1}(y)$  de forma que a cada índice  $i$  le hace corresponder aquel elemento de  $A_i$  cuya imagen por  $x$  es  $y$ , obteniendo una aplicación biyectiva. Como  $a \in O_x \cap A$ , tenemos que  $p^{-1}(a)$  tiene  $k$  elementos, por lo que  $I$  ha de tener  $k$  elementos, de donde deducimos que  $p^{-1}(y)$  tiene  $k$  elementos, para todo  $y \in O_x$ . En particular,  $x \in O_x$ , de donde  $p^{-1}(x)$  tiene  $k$  elementos, es decir,  $x \in A$ .

**Ejercicio 1.2.8.** Sean  $p_1 : X \rightarrow Y$  y  $p_2 : Y \rightarrow Z$  dos aplicaciones recubridoras. Prueba que si  $p_2^{-1}(z)$  es finito para todo  $z \in Z$ , entonces  $p_2 \circ p_1 : X \rightarrow Z$  es una aplicación recubridora.

**Ejercicio 1.2.9.** Consideremos una aplicación recubridora  $p : R \rightarrow B$  y la relación de equivalencia  $\mathcal{R}_p$  en  $R$  dada por

$$r_1 \mathcal{R}_p r_2 \iff p(r_1) = p(r_2)$$

Demuestra que  $R/\mathcal{R}_p$  es homeomorfo a  $B$ .

Sabemos que  $p$  es continua y sobreyectiva. Además, el Ejercicio 1.2.6 nos dice que  $p$  es abierta, por lo que  $p$  es una identificación, de donde si consideramos la aplicación

$$\begin{aligned} \hat{p} : R/\mathcal{R}_p &\longrightarrow B \\ [r] &\longmapsto p(r) \end{aligned}$$

tenemos, por la teoría desarrollada en Topología I, que  $\hat{p}$  está bien definida y es un homeomorfismo, con lo que  $R/\mathcal{R}_p$  es homeomorfo a  $B$ .

**Ejercicio 1.2.10.** Sea  $p : R \rightarrow B$  una aplicación recubridora, con  $R$  arcoconexo y  $B$  simplemente conexo. Prueba que  $p$  es un homeomorfismo.

Sabemos ya que  $p$  es continua, sobreyectiva y (por el Ejercicio 1.2.6) abierta, con lo que bastará probar que  $p$  es inyectiva:

**Opción 1.** Fijado cualquier  $b \in B$ , consideramos la correspondencia del levantamiento  $\phi : \pi_1(B, b) \rightarrow p^{-1}(b)$ . Como  $R$  es arcoconexo se ha visto en teoría que esta aplicación debe ser sobreyectiva, pero como  $B$  es simplemente conexo tenemos entonces que  $\pi_1(B, b) = \{1\}$ , por lo que  $p^{-1}(b)$  solo puede contener un elemento, para todo  $b \in B$ , lo que implica que  $p$  es inyectiva.

**Opción 2.** Sean  $x, y \in R$  con  $p(x) = z = p(y)$ , como  $R$  es arcoconexo existirá un arco  $\alpha : [0, 1] \rightarrow R$  que une  $x$  con  $y$ , con lo que  $p \circ \alpha$  es un arco uniendo  $p(x)$  con  $p(y)$ , es decir, un lazo basado en  $z$ . Como  $B$  es simplemente conexo, ha de ser  $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$ .

Sea ahora  $\beta : [0, 1] \rightarrow R$  un levantamiento de  $\varepsilon_z$ , es decir,  $p \circ \beta = \varepsilon_z$ , queremos ver que  $\beta$  es un lazo trivial. Para ello, si existiera  $t \in [0, 1]$  de forma que  $\beta(t) \notin p^{-1}(z)$ , entonces  $p(\beta(t)) \neq z = \varepsilon_z(t)$ , con lo que  $\beta$  no sería un levantamiento de  $\varepsilon_z$ , por lo que ha de ser  $\beta([0, 1]) \subseteq p^{-1}(z)$ . Queremos ver ahora que  $\beta$  es constante:

**Opción 1.**  $\beta$  es una aplicación de un conjunto conexo en  $p^{-1}(z)$ , que en el Ejercicio 1.2.5 vimos que tiene la topología discreta, con lo que  $\beta$  ha de ser constante.

**Opción 2.** Como  $p$  es una aplicación recubridora,  $z$  estará contenida en cierto abierto  $O_z$  de  $B$  regularmente recubierto, con lo que existe una familia de abiertos  $\{A_i\}_{i \in I}$  de forma que:

$$p^{-1}(z) \cap p^{-1}(O_z) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

con  $p|_{A_i} : A_i \rightarrow O_z$  homeomorfismo  $\forall i \in I$ . Supongamos ahora que  $\exists s, t \in [0, 1]$  de forma que  $\beta(s) \neq \beta(t)$ . Como  $\beta(s) \in p^{-1}(z)$ , supongamos que  $\beta(s) \in A_i$ , con lo que tomando:

$$U = A_i \cap \beta([0, 1]), \quad V = \bigsqcup_{j \in I \setminus \{i\}} (A_j \cap \beta([0, 1]))$$

Tenemos que  $U \cap V = \emptyset$ ,  $U \cup V = \beta([0, 1])$  y que  $U$  y  $V$  son abiertos de  $\beta([0, 1])$ , por lo que  $\beta([0, 1])$  no es conexo, lo que contradice que  $\beta$  es continua y  $[0, 1]$  es conexo, contradicción que viene de suponer que existen  $s, t \in [0, 1]$  con  $\beta(s) \neq \beta(t)$ . En consecuencia,  $\beta$  es constante.

Ahora, si fijamos  $x$  como preimagen de  $z$ , sabemos que existen respectivamente únicos levantamientos de  $p \circ \alpha$  y de  $\varepsilon_z$  que empiezan en  $x$ . Como  $\alpha(0) = x$  y  $\alpha$  es un levantamiento de  $p \circ \alpha$ ,  $\alpha$  es el levantamiento que buscamos para  $p \circ \alpha$ . Si ahora tomamos  $\beta$  aquel levantamiento de  $\varepsilon_z$  con  $\beta(0) = x$ , hemos probado anteriormente que  $\beta$  ha de ser constante, es decir,  $\beta = \varepsilon_x$ . Como además teníamos (por un resultado visto en teoría) que  $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$ , tendremos pues que  $[\alpha] = [\varepsilon_x]$ , de donde resulta que  $\alpha$  ha de ser un lazo basado en  $x$ , por lo que  $y = x$ , de donde  $p$  es inyectiva, por lo que podemos concluir que  $p$  es un homeomorfismo.

**Ejercicio 1.2.11.** Dado un espacio topológico  $Y$ , prueba que estas afirmaciones son equivalentes:

- $Y$  es contráctil.
- Para cualesquiera  $f, g : X \rightarrow Y$  continuas se tiene que  $f$  y  $g$  son homotópicas.
- Cada aplicación continua  $f : X \rightarrow Y$  es nulhomótopa.
- La identidad  $Id_Y$  es nulhomótopa.
- Cada conjunto  $\{y_0\}$  con  $y_0 \in Y$  es un retracto de deformación de  $Y$ .

Probamos las implicaciones:

$a) \implies b)$  Si  $Y$  es contráctil, entonces existen  $y_0 \in Y$  y una aplicación continua  $H : Y \times [0, 1] \rightarrow Y$  de forma que:

$$H(y, 0) = y, \quad H(y, 1) = y_0 \quad \forall y \in Y$$

Sean  $f, g : X \rightarrow Y$  dos aplicaciones continuas, definimos  $H' : X \times [0, 1] \rightarrow Y$  dada por:

$$H'(x, t) = \begin{cases} H(f(x), 2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ H(g(x), 2(1-t)) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Y tenemos que:

- $H'$  está bien definida en  $1/2$ , ya que:

$$H\left(f(x), 2 \cdot \frac{1}{2}\right) = H(f(x), 1) = y_0 = H(g(x), 1) = H\left(g(x), 2\left(1 - \frac{1}{2}\right)\right)$$

- $H'$  es continua en  $X \times [0, 1/2]$  y en  $X \times [1/2, 1]$ , como composición de funciones continuas. Como ambos son conjuntos cerrados, podemos aplicar el Lema del Pegado, para obtener que  $H'$  es continua.
- $H'$  es una homotopía entre  $f$  y  $g$ , puesto que:

$$H'(x, 0) = H(f(x), 0) = f(x), \quad H'(x, 1) = H(g(x), 0) = g(x) \quad \forall x \in X$$

$b) \implies c)$  Para ver que cada aplicación continua  $f : X \rightarrow Y$  es nulhomótota (es decir, que es homotópica a una aplicación constante), como cualquier aplicación constante es continua tendremos que es homotópica a  $f$ .

$c) \implies d)$   $Id_Y$  es continua, luego nulhomótota.

$d) \implies a)$  Como  $Id_Y$  es nulhomótota, existen  $y_0 \in Y$  y  $H : Y \times [0, 1] \rightarrow Y$  de forma que:

$$H(y, 0) = Id_Y(y) = y, \quad H(y, 1) = y_0, \quad \forall y \in Y$$

Por lo que  $\{y_0\}$  es un retracto de deformación de  $Y$ , luego  $Y$  es contráctil.

Una vez tenemos que  $a)$ ,  $b)$ ,  $c)$  y  $d)$  son equivalentes:

$b) \implies e)$  Dado  $y_0 \in Y$ , consideramos  $Id_Y : Y \rightarrow Y$  y la aplicación  $f_0 : Y \rightarrow Y$  constantemente igual a  $y_0$ , ambas continuas, luego son homotópicas, es decir, existe  $H : Y \times [0, 1] \rightarrow Y$  de forma que:

$$H(y, 0) = Id_Y(y) = y, \quad H(y, 1) = f_0(y) = y_0 \quad \forall y \in Y$$

En otras palabras, tenemos que  $\{y_0\}$  es retracto de deformación de  $Y$ .

$e) \implies a)$  Trivial.

**Ejercicio 1.2.12.** Prueba que  $X = ([0, 1] \times \{0\}) \cup ((K \cup \{0\}) \times [0, 1]) \subset \mathbb{R}^2$  es contráctil, donde  $K = \{\frac{1}{m} : m \in \mathbb{N}\}$ .

Tenemos el conjunto de la Figura 1.3




Figura 1.3: Conjunto  $X$ .

Si consideramos la aplicación  $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$  dada por:

$$H((x, y), t) = \begin{cases} (x, (1 - 2t)y) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ (2(1 - t)x, 0) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Tenemos que:

- $H$  está bien definida, pues:

$$\left(x, \left(1 - \frac{1/2}{2}\right)y\right) = (x, (1 - 1)y) = (x, 0) = \left(2\left(1 - \frac{1}{2}\right)x, 0\right)$$

- $H$  es claramente continua en  $X \times [0, 1/2]$  y en  $X \times [1/2, 1]$ , por lo que por el Lema del Pegado obtenemos que  $H$  es continua.
- $H$  cumple que:

$$H((x, y), 0) = (x, y), \quad H((x, y), 1) = (0, 0) \quad \forall (x, y) \in X$$

Por lo que hemos probado que  $\{(0, 0)\}$  es retracto de deformación de  $X$ , luego  $X$  es contráctil.

**Ejercicio 1.2.13.** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  una función continua. Definimos el conjunto:

$$S_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (f(z))^2\}$$

- a) Estudia el conjunto  $S_f \cap \{z = z_0\}$  con  $z_0 \in \mathbb{R}$ .

Fijado  $z_0 \in \mathbb{R}$ , tenemos que:

$$S_f \cap \{z = z_0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (f(z_0))^2\}$$

que se trata de una circunferencia de centro  $(0, 0, z_0)$  y de radio  $f(z_0)$ . Podemos interpretar  $S_f$  como el sólido de revolución obtenido a partir de la gráfica de  $f$ .

b) Demuestra que cualesquiera dos conjuntos  $S_f$  son homeomorfos entre sí.

Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  una función continua, consideramos  $\Phi : S_f \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$  dada por:

$$\Phi(x, y, z) = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z \right)$$

Así como la aplicación  $\Psi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \rightarrow S_f$  dada por:

$$\Psi(x, y, z) = (f(z)x, f(z)y, z)$$

Es claro que  $\Phi$  y  $\Psi$  son continuas, así como que:

$$\begin{aligned} \Phi(\Psi(x, y, z)) &= \Phi(f(z)x, f(z)y, z) = \\ &= \left( \frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z)x)^2 + (f(z)y)^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z)x)^2 + (f(z)y)^2}}, z \right) \\ &= \left( \frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z))^2(x^2 + y^2)}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z))^2(x^2 + y^2)}}, z \right) = \left( \frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z))^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z))^2}}, z \right) \\ &= \left( \frac{f(z)x}{f(z)}, \frac{f(z)y}{f(z)}, z \right) = (x, y, z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ \Psi(\Phi(x, y, z)) &= \Psi \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z \right) = \left( \frac{f(z)x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z \right) \\ &= \left( \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \cdot x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z \right) = (x, y, z) \quad \forall (x, y, z) \in S_f \end{aligned}$$

Por lo que  $\Phi$  es un homeomorfismo.

c) Calcula el grupo fundamental de  $S_f$ .

Dado  $(x, y, z) \in S_f$ , el homeomorfismo  $\Phi$  anterior induce un isomorfismo:

$$\Phi_* : \pi_1(S_f, (x, y, z)) \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, \Phi(x, y, z))$$

Y como  $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, \Phi(x, y, z)) \cong \mathbb{Z}$ , tenemos que  $\pi_1(S_f, (x, y, z)) \cong \mathbb{Z}$ .

**Ejercicio 1.2.14.** Prueba que  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$  no es homeomorfo a  $\mathbb{R}^2$ . ¿Son del mismo tipo de homotopía?

Por reducción al absurdo, si  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$  fuera homeomorfo a  $\mathbb{R}^2$ , existiría un homeomorfismo  $f : \mathbb{R} \times [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}^2$ , por lo que la restricción de  $f$   $f|_{(\mathbb{R} \times [0, +\infty[) \setminus \{(0,0)\}} : (\mathbb{R} \times [0, +\infty[) \setminus \{(0,0)\}} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{f(0,0)\}$  seguiría siendo un homeomorfismo, que induciría un isomorfismo entre sus grupos fundamentales.

Sin embargo,  $(\mathbb{R} \times [0, +\infty[) \setminus \{(0,0)\}$  es un conjunto estrellado, luego es simplemente conexo y  $\mathbb{R}^2 \setminus \{f(0,0)\}$  es homeomorfo a  $\mathbb{S}^1$ , que tiene  $\mathbb{Z}$  como grupo fundamental, por lo que no pueden ser homeomorfos, contradicción que viene de suponer la que  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$  y  $\mathbb{R}^2$  son homeomorfos.

Sí son del mismo tipo de homotopía. Para verlo, veamos que  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$  es un retracts de deformación de  $\mathbb{R}^2$ , ya que definiendo  $H : \mathbb{R}^2 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por:

$$H((x, y), t) = \begin{cases} (x, y) & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[ \\ (x, (1-t)y) & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R} \times ]-\infty, 0] \end{cases}$$

Tenemos que:

- $H$  está bien definida, puesto que:

$$(x, 0) = (x, (1-t)0), \quad \forall t \in [0, 1]$$

- $H$  es continua, puesto que es continua en los cerrados  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[ \times [0, 1]$ ,  $\mathbb{R} \times ]-\infty, 0] \times [0, 1]$ , luego podemos aplicar el Lema del Pegado.
- Se verifica que:

$$H((x, y), 0) = (x, y), \quad H((x, y), 1) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[, \quad H((a, b), 1) = (a, b) \\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[$$

Por lo que  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$  es retracts de deformación de  $\mathbb{R}^2$  para  $r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \times [0, +\infty[$  dada por  $r(x, y) = H((x, y), 1)$ , que induce un isomorfismo entre grupos fundamentales  $r_* : \pi_1(\mathbb{R}^2, (x, y)) \rightarrow \pi_1(\mathbb{R} \times [0, +\infty[, r(x, y)) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , luego  $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$  y  $\mathbb{R}^2$  son del mismo tipo de homotopía.


**Ejercicio 1.2.15.** Sea  $S$  un subespacio afín de  $\mathbb{R}^n$  de dimensión  $k \leq n - 2$ . Calcula  $\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S)$ .

Estudiemos ejemplos particulares para obtener intuición:

- Para  $n = 2$ , si  $S$  es un subespacio afín de  $\mathbb{R}^2$  de dimensión 0 ( $S$  se reduce a un punto), entonces:

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus S) \cong \mathbb{Z}$$

Ya que  $\mathbb{R}^2 \setminus S \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  y este último tiene por retracts de deformación a  $\mathbb{S}^1$ .



- Para  $n = 3$ , si  $S$  es un subespacio afín de  $\mathbb{R}^3$  de dimensión:

- $\dim S = 0$ , entonces:

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus S) = \{1\}$$

Ya que  $\mathbb{R}^3 \setminus S \cong \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$  y este último tiene por retracts de deformación a  $\mathbb{S}^2$ .



- $\dim S = 1$ , entonces:

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus S) \cong \mathbb{Z}$$

Ya que  $\mathbb{R}^3 \setminus S$  tiene por retracto de deformación un conjunto homeomorfo a  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ .

Comenzando ahora la prueba formal, sea  $S$  un subespacio afín de  $\mathbb{R}^n$  de dimensión  $k \leq n - 2$ , tenemos entonces que  $S$  es homeomorfo al subespacio afín  $\mathcal{S}$ , dado por las ecuaciones<sup>2</sup>:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-k} = 0 \end{cases}$$

De esta forma, tenemos que:

$$\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S} = (\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}) \times \mathbb{R}^k$$

Por lo que:

$$\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S) = \pi_1(\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S}) = \pi_1(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}) \times \pi_1(\mathbb{R}^k) \cong \pi_1(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\})$$

Y tenemos que:

$$\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S) \cong \pi_1(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0, \dots, 0)\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } n - k = 2 \\ \{1\} & \text{si } n - k > 2 \end{cases}$$

**Ejercicio 1.2.16.** Prueba que si  $X$  es de Hausdorff y  $A \subseteq X$  es un retracto de  $X$ , entonces  $A$  es cerrado en  $X$ . Deduce que una bola abierta en  $\mathbb{R}^n$  no es un retracto de  $\mathbb{R}^n$ . ¿Lo es una bola cerrada?

Para probar que  $A$  es cerrado, veamos que  $X \setminus A$  es abierto. Para ello, sea  $x \in X \setminus A$ , tendremos entonces que  $a = r(x) \neq x$ . Como  $X$  es de Hausdorff, podemos encontrar abiertos  $U_x, U_a$  con:

$$x \in U_x, \quad a \in U_a, \quad U_x \cap U_a = \emptyset$$

Si consideramos  $W = U_x \cap r^{-1}(U_a)$ , tenemos que  $W$  es abierto como intersección de dos abiertos, así como que  $x \in W$ . Si existiera  $b \in W \cap A$ , tendríamos entonces que  $b \in U_x \cap r^{-1}(U_a) \cap A$ , por lo que:

$$U_x \ni b = r(b) \in U_a \implies b \in U_x \cap U_a$$

contradicción que viene de suponer que  $W \cap A \neq \emptyset$ , luego  $x \in W \subseteq X \setminus A$ , de donde  $X \setminus A$  es abierto.

Sea  $B(x, r) \subseteq \mathbb{R}^n$  una bola abierta para ciertos puntos  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $r \in \mathbb{R}^+$ , esta no puede ser un retracto de  $\mathbb{R}^n$  puesto que no es cerrada, ya que si tomamos como  $t_n$  una sucesión de puntos del intervalo  $[0, r[$  convergente a  $r$  (por ejemplo  $r - \frac{1}{n}$ ), tenemos entonces que  $\left\{x + \frac{x}{\|x\|} t_n\right\}$  es una sucesión de puntos de  $B(x, r)$ :

$$\left\|x + \frac{x}{\|x\|} t_n - x\right\| = \frac{t_n \|x\|}{\|x\|} = t_n < r$$

<sup>2</sup>Como es de dimensión  $k$  en  $\mathbb{R}^n$  ha de tener  $n - k$  ecuaciones.

convergente a  $x + r \frac{x}{\|x\|}$ , con:

$$\left\| x + r \frac{x}{\|x\|} - x \right\| = \frac{r\|x\|}{\|x\|} = r \implies x + r \frac{x}{\|x\|} \notin B(x, r)$$

Sea ahora  $\overline{B}(x, r) \subseteq \mathbb{R}^n$  una bola cerrada para ciertos puntos  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $r \in \mathbb{R}^+$ , podemos construir la aplicación  $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{B}(x, r)$  dada por:

$$r(y) = \begin{cases} y & \text{si } y \in \overline{B}(x, r) \\ c(y) & \text{si } y \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{B}(x, r) \end{cases}$$

donde  $c(y)$  es la aplicación que a cada punto  $y$  le hace corresponder aquel punto de la semirrecta con origen en  $x$  y que pasa por  $y$  con módulo  $r$ . En teoría vimos en un ejemplo parecido que la aplicación  $c$  era continua, por lo que aplicando el Lema del Pegado vemos que  $r$  es continua, así como que:

$$r(y) = y \quad \forall y \in \overline{B}(x, r)$$

por lo que  $\overline{B}(x, r)$  es un retracto de  $\mathbb{R}^n$ .

**Ejercicio 1.2.17.** En este ejercicio demostraremos que *un abierto de  $\mathbb{R}^2$  no puede ser homeomorfo a un abierto de  $\mathbb{R}^n$  si  $n \geq 3$* . Supongamos que  $f : U \rightarrow V$  es un homeomorfismo entre abiertos no vacíos  $U \subset \mathbb{R}^n$  y  $V \subset \mathbb{R}^2$  con  $n \geq 3$ .

- Prueba que existen bolas abiertas  $B_1 \subset U$  y  $B_2, B'_2 \subset V$  (estas últimas con el mismo centro  $y_0 \in \mathbb{R}^2$ ) tales que  $\overline{B'_2} \subset f(\overline{B_1}) \subset \overline{B_2}$ .
- Si  $i : \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \rightarrow \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$  es la inclusión, deduce de a) que el homomorfismo inducido en cualquier punto  $i_*$  es trivial.
- Prueba que  $\overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$  es un retracto de deformación de  $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ . Concluye que  $i_*$  es un isomorfismo no trivial, lo que contradice b).

**Solución.**


- Prueba que existen bolas abiertas  $B_1 \subset U$  y  $B_2, B'_2 \subset V$  (estas últimas con el mismo centro  $y_0 \in \mathbb{R}^2$ ) tales que  $\overline{B'_2} \subset f(\overline{B_1}) \subset \overline{B_2}$ .

Fijado cualquier  $y_0 \in V$ , como  $V$  es abierto ha de existir una bola abierta  $B_2$  centrada en  $y_0$  y contenida en  $V$ . Si consideramos  $x_0 = f^{-1}(y_0)$ , como  $f$  es continua el conjunto  $f^{-1}(B_2)$  será también abierto, con  $x_0 \in f^{-1}(B_2)$ , por lo que ha de existir una bola abierta  $B_1$  centrada en  $x_0$  y contenida en  $f^{-1}(B_2)$ . Como  $f$  es continua, ha de cumplirse que:

$$f(\overline{B_1}) \subseteq \overline{f(B_1)} \subseteq \overline{B_2}$$

Si consideramos ahora  $f(B_1)$ , como  $B_1$  estaba centrada en  $x_0$  tenemos que  $y_0 \in f(B_1)$  y como  $f$  es una aplicación abierta por ser un homeomorfismo,  $f(B_1)$  será también un conjunto abierto, por lo que podemos encontrar una bola abierta  $B'_2$  centrada en  $y_0$  y de modo que:

$$\overline{B'_2} \subseteq f(B_1) \subseteq f(\overline{B_1})$$



- b) Si  $i : \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \rightarrow \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$  es la inclusión, deduce de a) que el homomorfismo inducido en cualquier punto  $i_*$  es trivial.

**Opción 1.** Fijado  $z_0 \in \overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$ , consideramos un lazo  $\alpha \in \Omega(\overline{B'_2} \setminus \{y_0\})$  y consideramos el lazo  $f^{-1} \circ \alpha$ , que está basado en  $f^{-1}(z_0)$  y cumple que:

$$\text{Im}(f^{-1} \circ \alpha) \subseteq f^{-1}(\overline{B'_2} \setminus \{y_0\}) \subseteq \overline{B_1} \setminus \{x_0\}$$

Como  $\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, f^{-1}(z_0))$  es trivial (por tener  $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$  un retracts de deformación homeomorfo a  $\mathbb{S}^n$ ) tenemos entonces que  $[f^{-1} \circ \alpha] = [\varepsilon_{f^{-1}(z_0)}]$ , por lo que existe una homotopía por arcos  $H$  de forma que:

$$H(t, 0) = f^{-1}(z_0), \quad H(t, 1) = (f^{-1} \circ \alpha)(t) \quad \forall t \in [0, 1]$$

Finalmente, observamos que  $f \circ f^{-1} \circ \alpha = \alpha$  y que  $f \circ H$  es una homotopía que cumple:

$$(f \circ H)(t, 0) = z_0, \quad (f \circ H)(t, 1) = \alpha(t) \quad \forall t \in [0, 1]$$

Con:

$$\text{Im}(f \circ H) \subseteq f(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}) \subseteq \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$$

Por lo que  $i_*([\alpha]) = [\alpha]_{\overline{B_2} \setminus \{y_0\}} = [\varepsilon_{z_0}]$ .

**Opción 2.** Como  $\overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \subseteq f(\overline{B_1} \setminus \{x_0\})$ , podemos considerar:

$$\begin{aligned} \varphi : \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} &\longrightarrow \overline{B_1} \setminus \{x_0\} \\ x &\longmapsto f^{-1}(x) \end{aligned}$$

que será una aplicación continua, como restricción de  $f^{-1} : V \rightarrow U$  en dominio y codominio. Análogamente, como  $f(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}) \subseteq \overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$ , podemos considerar:

$$\begin{aligned} \phi : \overline{B_1} \setminus \{x_0\} &\longrightarrow \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \\ y &\longmapsto f(y) \end{aligned}$$

que también será una aplicación continua, como restricción de  $f$  en dominio y codominio. Observamos que de esta forma tenemos:

$$\phi(\varphi(x)) = \phi(f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(x)) = x = i(x) \quad \forall x \in \overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$$

Por lo que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} & \xrightarrow{\varphi} & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} & \xrightarrow{\phi} & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & i & & \end{array}$$

Si inducimos ahora el diagrama a grupos fundamentales para un punto  $z_0 \in \overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$  arbitrario, obtenemos el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(\overline{B'_2} \setminus \{y_0\}, z_0) & \xrightarrow{\varphi_*} & \pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, \varphi(z_0)) & \xrightarrow{\phi_*} & \pi_1(\overline{B_2} \setminus \{y_0\}, z_0) \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & i_* & & \end{array}$$

Y como  $\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, \varphi(z_0))$  es trivial por tener  $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$  un retracts de deformación homeomorfo a  $\mathbb{S}^n$ , obtenemos por tanto que  $i_*$  es trivial.

- c) Prueba que  $\overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$  es un retracts de deformación de  $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ . Concluye que  $i_*$  es un isomorfismo no trivial, lo que contradice b).

Supuesto que  $\overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$  es una bola cerrada punteada<sup>3</sup> de radio  $r \in \mathbb{R}^+$ , podemos definir la aplicación  $H : (\overline{B_2} \setminus \{y_0\}) \times [0, 1] \rightarrow \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$  dada por:

$$H(x, t) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \\ (1-t)x + tr \cdot \frac{x}{\|x\|_2} & \text{si } x \notin \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \end{cases}$$

Que es continua y verifica:

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= x, & H(x, 1) &\in \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} & \forall x \in \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ H(y, 1) &= y & & \forall x \in \overline{B'_2} \setminus \{y_0\} \end{aligned}$$

Por tanto, el grupo fundamental de  $\overline{B'_2} \setminus \{y_0\}$  coincide (en cualquier punto  $z_0$ ) con el grupo fundamental de  $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ , lo que contradice que  $i_*$  sea trivial.

**Ejercicio 1.2.18.** Demuestra que el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - \arctg(x^2 - y^3) = 2 \\ \cos(x) + \sin(xy^3) + e^x + e^{y^2} + \frac{1}{y} = -5 \end{cases}$$

tiene al menos una solución en  $\mathbb{R}^2$ .

Si llamamos a dicho sistema de ecuaciones por (\*), vemos que este es equivalente al siguiente sistema de ecuaciones (al que llamamos (\*\*)) cuando  $y \neq 0$ :

$$\begin{cases} x = 2 + \arctg(x^2 - y^3) \\ y = \frac{-1}{5 + \cos(x) + \sin(xy^3) + e^x + e^{y^2}} \end{cases}$$

<sup>3</sup>Es decir, a la que hemos quitado el centro

Definimos  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por:

$$F(x, y) = \left( 2 + \arctan(x^2 - y^3), \frac{-1}{5 + \cos(x) + \sin(xy^3) + e^x + e^{y^2}} \right)$$

Observemos que el denominador de la segunda componente no se anula, ya que  $e^x, e^{y^2} > 0$  para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  así como que  $5 + \cos(x) + \sin(xy^3) > 0$  para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , por ser  $|\cos(x)|, |\sin(xy^3)| \leq 1$ . Por tanto, tenemos que  $F$  es continua, ya que cada una de sus componentes es una función continua.

Ahora, fijado  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , si escribimos  $F = (F_1, F_2)$ , tenemos que  $|F_1(x, y)| \leq 2 + \frac{\pi}{2}$ , así como que  $|F_2(x, y)| < 1/3$ , por lo que deducimos que  $F$  está acotada, es decir, existe  $R \in \mathbb{R}^+$  de forma que:

$$\|F(x, y)\|_2 \leq R \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Por lo que podemos considerar la aplicación restringida  $\tilde{F} : \overline{B}(0, R) \rightarrow \overline{B}(0, R)$  dada por  $\tilde{F}(x) = F(x)$ . Si aplicamos el Teorema del Punto fijo de Brouwer, obtenemos que existe  $(x_0, y_0) \in \overline{B}(0, R)$  de forma que:

$$\tilde{F}(x_0, y_0) = (x_0, y_0)$$


Por lo que hemos encontrado una solución al sistema (\*\*). Más aún, observemos que como  $F_2(x_0, y_0) < 0$  debe ser  $y_0 < 0$ , en particular  $y_0 \neq 0$ , por lo que  $(x_0, y_0)$  también es solución del sistema (\*).

**Ejercicio 1.2.19.** Sean  $M$  una matriz cuadrada real de orden 3 por 3 cuyas entradas son números reales positivos y  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la aplicación lineal  $f(v) = Mv$ . Demuéstrese que:

- a) El conjunto  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : x, y, z \geq 0\}$  es homeomorfo al disco cerrado  $\overline{\mathbb{D}}$ .

Es decir, queremos probar que la parte de la esfera  $\mathbb{S}^2$  que se encuentra en el primer octante es homeomorfo a  $\overline{\mathbb{D}}$ . Para ello, lo que haremos primero será considerar el conjunto:

$$C = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : \|(x, y, 0)\|_2 \leq 1 \wedge x, y \geq 0\}$$



Y vemos que si consideramos la función que a cada punto de  $C$  le asigna la altura de la esfera en la parte superior:

$$\begin{aligned} F : \quad C &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{aligned}$$

Tenemos que  $A = Gr(F)$ , con  $F$  una función continua, por lo que  $A$  y  $C$  son homeomorfos. Finalmente tenemos que probar que  $C$  y  $\mathbb{D}$  son homeomorfos. Para ello, es sencillo dar primero un homeomorfismo  $h : \delta C \rightarrow \mathbb{S}^1$  (hágase). Ahora, fijado  $p_0 \in C^\circ$  cada punto  $c \in C$  puede expresarse como:

$$c = (1 - t)p_0 + tx$$

para cierto  $t \in [0, 1]$  y  $x \in \delta C$ . Podemos hacer corresponder dicho punto mediante una aplicación  $p : C \rightarrow \mathbb{D}$  a:

$$c = (1 - t)p_0 + tx \mapsto (1 - t) \cdot 0 + th(x) = th(x)$$

es claro que  $p$  es continua y biyectiva, y como va de un conjunto cerrado a un Hausdorff será también una aplicación cerrada, por lo que  $p$  es un homeomorfismo.

- b) La aplicación  $g : A \rightarrow \mathbb{S}^2$  dada por  $g(v) = \frac{f(v)}{|f(v)|}$  está bien definida y  $g(A) \subset A$ .

Recordamos que según el enunciado tenemos que  $f(v) = Mv$  con  $M = (m_{i,j})_{i,j}$  de forma que  $m_{i,j} > 0$  para  $i, j \in \{1, 2, 3\}$ . Dado  $v \in A$ , tendremos que  $v = (v_1, v_2, v_3)$  con  $v_1, v_2, v_3 \geq 0$ . De esta forma, podemos obtener  $f(v)$  calculando:

$$f(v) = Mv = \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{1,1}v_1 + m_{1,2}v_2 + m_{1,3}v_3 \\ m_{2,1}v_1 + m_{2,2}v_2 + m_{2,3}v_3 \\ m_{3,1}v_1 + m_{3,2}v_2 + m_{3,3}v_3 \end{pmatrix}$$

Observamos que para obtener  $f(v) = 0$  tendríamos que tener (como  $m_{i,j} > 0$  y  $v_1, v_2, v_3 \geq 0$ ) que  $v_1 = v_2 = v_3 = 0$ , pero como  $v \in A \subseteq \mathbb{S}^2$  dicha situación es imposible, por lo que el denominador de la función  $g$  nunca se anula. Más aún,  $|g(v)| = 1$  para todo  $v \in A$ , por lo que  $g$  está bien definida.

Finalmente, similar a lo que hemos comentado ya, como  $m_{i,j} > 0$  para todo  $i, j \in \{1, 2, 3\}$  y  $v_1, v_2, v_3 \geq 0$  tendremos por tanto (observando las cuentas que hacemos para calcular  $f(v)$ ) que  $f(v) \in A$ .

- c)  $f$  tiene un valor propio real y positivo.

Usando el apartado b) tenemos que podemos restringir  $g$  en codominio, obteniendo una aplicación continua  $g : A \rightarrow A$ . Si usamos el apartado a), existe  $h : \mathbb{D} \rightarrow A$  homeomorfismo, con lo que la aplicación  $h^{-1} \circ g \circ h : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  es continua. Por el Teorema del punto fijo de Brouwer, existe  $x_0 \in \mathbb{D}$  de forma que:

$$(h^{-1} \circ g \circ h)(x_0) = x_0 \implies g(h(x_0)) = h(x_0)$$

Por lo que tomando  $z_0 = h(x_0) \in A$  obtenemos que:

$$\frac{f(z_0)}{|f(z_0)|} = g(z_0) = z_0 \implies f(z_0) = |f(z_0)| \cdot z_0$$

De esta forma, hemos probado que  $|f(z_0)|$  es un valor propio real y positivo de  $f$ .

**Ejercicio 1.2.20.** Teorema de Lusternik-Schnirelmann. Demuestra que si  $\mathbb{S}^2$  es la unión de tres subconjuntos cerrados  $C_1, C_2, C_3$ , entonces alguno de ellos contiene dos puntos antípodas. Para ello prueba que la función  $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por

$$f(x) = (\text{dist}(x, C_1), \text{dist}(x, C_2))$$

tiene un punto  $x_0 \in \mathbb{S}^2$  tal que  $f(x_0) = f(-x_0)$ , donde  $\text{dist}(\cdot, \cdot)$  denota la función distancia en  $\mathbb{R}^3$ .

Sean  $C_1, C_2, C_3$  tres subconjuntos cerrados de  $\mathbb{S}^2$  tales que:

$$C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \mathbb{S}^2$$

definimos la aplicación  $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por:

$$f(x) = (\text{dist}(x, C_1), \text{dist}(x, C_2)) \quad \forall x \in \mathbb{S}^2$$

donde<sup>4</sup>:

$$\text{dist}(x, C_i) = \min\{d(x, c) : c \in C_i\} \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

como cada aplicación  $x \mapsto \text{dist}(x, C_i)$  es continua, tenemos que la aplicación  $f$  es continua, y si aplicamos el Teorema de Borsuk-Ulam tenemos que  $\exists x_0 \in \mathbb{S}^2$  de forma que:

$$(\text{dist}(x_0, C_1), \text{dist}(x_0, C_2)) = f(x_0) = f(-x_0) = (\text{dist}(-x_0, C_1), \text{dist}(-x_0, C_2))$$

de donde:

$$\text{dist}(x_0, C_1) = \text{dist}(-x_0, C_1), \quad \text{dist}(x_0, C_2) = \text{dist}(-x_0, C_2)$$


distinguimos casos:

- Si  $\text{dist}(x_0, C_1), \text{dist}(x_0, C_2) > 0$ , tenemos entonces que tanto  $x_0$  como  $-x_0$  están en  $C_3$ .
- Si  $\text{dist}(x_0, C_1) = 0$ , tenemos que  $x_0, -x_0 \in C_1$ .
- Si  $\text{dist}(x_0, C_2) = 0$ , tenemos que  $x_0, -x_0 \in C_2$ .

**Ejercicio 1.2.21.** Calcula  $\pi_1(X)$  en los siguientes casos:

- a)  $X = \mathbb{S}^2 \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$ .

Tenemos el conjunto de la Figura:



<sup>4</sup>Observemos que cada  $C_i$  es compacto en  $\mathbb{R}^3$ .

Si tomamos los conjuntos:

$$U = X \setminus \{(0, 0, 1)\}, \quad V = X \setminus \{(0, 0, -1)\}$$

Tenemos que:

- Claramente  $X = U \cup V$ .
- $U$  y  $V$  son abiertos, ya que como estamos trabajando en un espacio métrico, los conjuntos unitarios son cerrados.
- Es claro que  $U$  es homeomorfo a  $V$  (basta considerar una rotación), y tenemos que  $U$  es la unión de  $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ , que es homeomorfo a  $\mathbb{R}^2$  luego arcoconexo, con  $\mathbb{D} \times \{0\}$ , que claramente es arcoconexo, y estos dos conjuntos se cortan en al menos un punto (como por ejemplo el  $(1, 0, 0)$ ), por lo que  $U$  es arcoconexo y  $V$  también por ser homeomorfo a  $U$ .
- $U \cap V$  es arcoconexo, ya que puede verse como la unión de los conjuntos:

$$(\mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_0^+)) \cup \mathbb{D} \times \{0\}, \quad (\mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_0^-)) \cup \mathbb{D} \times \{0\}$$


Ambos homeomorfos a  $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ , que es arcoconexo, por lo que los dos conjuntos son arcoconexos y su unión también lo es, pues su intersección es  $\mathbb{D} \times \{0\}$ , que es arcoconexo.

Ahora, vemos que:

- Los grupos fundamentales de  $U$  y de  $V$  coinciden, pues ambos son homeomorfos.
- $U$  tiene como retracts de deformación el conjunto:

$$U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z \leq 0\} \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$$

Que es homeomorfo a  $\mathbb{S}^2$ :




Por lo que:

$$\pi_1(V) = \pi_1(U) = \pi_1(U_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) \cong \{1\}$$

- Finalmente (aunque ya tenemos suficiente para aplicar el Teorema), tenemos que  $U \cap V$  tiene como retracts de deformación a  $\mathbb{D} \times \{0\}$ :





que es simplemente conexo, por lo que:


$$\pi_1(U \cap V) = \{1\}$$

En consecuencia, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, llegamos a que:

$$\pi_1(X) = \{1\}$$



b)  $X = (\mathbb{S}^1 \times [-1, 1]) \cup (\mathbb{D} \times \{-1, 1\})$ .

Tenemos el conjunto:



Si consideramos los conjuntos:

$$U = X \setminus (\mathbb{D} \times \{1\}), \quad V = X \setminus (\mathbb{D} \times \{-1\})$$



Tenemos que:

- Claramente  $X = U \cup V$ .
- $U$  y  $V$  son abiertos, pues  $(\mathbb{D} \times \{p\})$  es siempre un conjunto cerrado, como producto de cerrados.
- $U$ ,  $V$  y  $U \cap V$  son claramente<sup>5</sup> arcoconexos.

<sup>5</sup>Habría que justificarlo mejor en un examen.

- $U$  tiene a  $\mathbb{D} \times \{-1\}$  como retracto de deformación, por lo que  $\pi_1(U) = \{1\}$ .
- $V$  tiene a  $\mathbb{D} \times \{1\}$  como retracto de deformación, por lo que  $\pi_1(V) = \{1\}$ .


Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, como  $\pi_1(U) = \{1\} = \pi_1(V)$ , obtenemos que  $\pi_1(X) = \{1\}$ .

c)  $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (z + 1)^2, -1 \leq z \leq 0\} \cup (\mathbb{S}^2 \cap \{z \geq 0\})$ .

Tratamos de averiguar primero qué conjunto  $X$  nos están dando:

- Está claro que la segunda parte de la unión es la “cáscara” superior de la esfera de  $\mathbb{R}^3$ .
- Para el primer conjunto de la unión, vemos que a altura  $z$  tenemos la circunferencia de centro 0 y radio  $|z + 1|$ , por lo que podemos pensar en que este conjunto es un cono. Observamos que  $|z + 1| = 0 \iff z = -1$ , con lo que este primer conjunto es el cono desplazado una unidad hacia los valores negativos de  $z$ .

En definitiva, la figura dada es similar a:



Si tomamos ahora:

$$U = X \setminus \{(0, 0, 1)\}, \quad V = X \setminus \{(0, 0, -1)\}$$


Tenemos que:

- Claramente  $X = U \cup V$  y  $U, V$  son abiertos.
- $U, V$  y  $U \cap V$  son claramente arcoconexos.
- $U$  tiene a  $\{(0, 0, -1)\}$  como retracto de deformación, por lo que  $U$  es simplemente conexo.
- $V$  tiene a  $\{(0, 0, 1)\}$  como retracto de deformación, por lo que  $V$  es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen tenemos que  $X$  es simplemente conexo.

d)  $X = S_1 \cup S_2 \cup L$ , donde  $S_1, S_2$  son cerrados disjuntos simplemente conexos de  $\mathbb{R}^n$  y  $L \subset \mathbb{R}^n$  es un segmento tal que  $L \cap S_i = \{x_i\}$ ,  $i = 1, 2$ .

Podemos imaginar que tenemos un conjunto similar a:



Si consideramos:

$$U = X \setminus S_2, \quad V = X \setminus S_1$$

Tenemos que:

- Claramente  $U \cup V = X$ .
- $U$  y  $V$  son abiertos, ya que  $S_2$  y  $S_1$  son cerrados.
- $U$  es arcoconexo, pues  $S_1$  y  $L$  son arcoconexos (el primero por ser arcoconexo y el segundo por ser imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo) que se intersecan en  $x_1$ . Análogamente, se prueba que  $V$  es arcoconexo.
- Tenemos que  $U \cap V = L \setminus \{x_1, x_2\}$ , que claramente es simplemente conexo.
- $U$  tiene a  $S_1$  como retracto de deformación, por lo que:

$$\pi_1(U) = \pi_1(S_1) = \{1\}$$


- Análogamente  $V$  tiene a  $S_2$  como retracto de deformación, por lo que:

$$\pi_1(V) = \pi_1(S_2) = \{1\}$$

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que  $\pi_1(X) = \{1\}$ .

- e)  $X \subset \mathbb{R}^3$  es la unión de una circunferencia y de una esfera que se tocan en un único punto.

Si consideramos  $X = S \cup C$  con  $S$  una esfera de  $\mathbb{R}^3$ ,  $C$  una circunferencia de  $\mathbb{R}^3$  y  $S \cap C = \{x_0\}$ :



Si consideramos:

$$U = X \setminus \{x_1\}, \quad x_1 \in S \setminus \{x_0\}$$

$$V = X \setminus \{x_2\}, \quad x_2 \in C \setminus \{x_0\}$$

Tenemos que:

- Claramente  $X = U \cup V$  y  $U, V$  son abiertos.
- $U$  es arcoconexo, como unión de  $S \setminus \{x_1\}$ , que es homeomorfo a  $\mathbb{R}^2$  luego es arcoconexo, y de  $C$ . Notemos que  $(S \setminus \{x_1\}) \cap C = \{x_0\}$ .
- $V$  es arcoconexo, como unión de  $S$ , que es arcoconexo con cada uno de los arcos que unen  $x_0$  con  $x_2$  (abiertos en  $x_2$ ), cada uno de ellos es arcoconexo e intersecan a  $S$  en  $x_0$ .
- $U \cap V$  es arcoconexo, como unión de  $S \setminus \{x_1\}$  con cada uno de los arcos, ya que todos ellos se intersecan en  $\{x_0\}$ .
- $U$  tiene a  $C$  como retracto de deformación, por lo que:

$$\pi_1(U) = \pi_1(C) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

- $V$  tiene a  $S$  como retracto de deformación, por lo que:


$$\pi_1(V) = \pi_1(S) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) = \{1\}$$

- $U \cap V$  tiene a  $\{x_0\}$  como retracto de deformación, por lo que es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que:


$$\pi_1(X) = \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \{1\} = \mathbb{Z}$$

- f)  $X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z - 2)^2 = 1\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z + 2)^2 = 1\}$ .  $X$  está compuesto por la unión de la esfera de  $\mathbb{R}^3$  junto con dos cilindros de radio 1 a lo largo del eje  $x$  (tienen altura infinita), de forma que cada cilindro tiene un único punto de intersección con la esfera.



En primer lugar, observamos que un retracto de deformación de  $X$  es el conjunto  $Y$ :

$$Y = \{(0, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z - 2)^2 = 1\} \cup \{(0, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z + 2)^2 = 1\} \cup \mathbb{S}^2$$



Si nombramos a cada una circunferencia  $C_1$  y a la otra  $C_2$  tendremos entonces que:

$$Y = C_1 \cup C_2 \cup \mathbb{S}^2, \quad C_1 \cap \mathbb{S}^2 = \{x_1\}, \quad C_2 \cap \mathbb{S}^2 = \{x_2\}$$

En este punto, consideramos los conjuntos:

$$\begin{aligned} U &= X \setminus \{y_2\}, & y_2 &\in C_2 \setminus \{x_2\} \\ V &= X \setminus \{y_1\}, & y_1 &\in C_1 \setminus \{x_1\} \end{aligned}$$


De esta forma:

- Tenemos claramente que  $U$  y  $V$  son abiertos con  $X = U \cup V$ .
- $U$ ,  $V$  y  $U \cap V$  son arcoconexos, todos ellos por ser unión de conjuntos arcoconexos que se intersecan en un punto.
- $U$  tiene a  $C_1 \cup \mathbb{S}^2$  como retracts de deformación, y en el apartado anterior vimos que dicho espacio topológico tiene grupo fundamental  $\mathbb{Z}$ , por lo que  $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$ .
- Análogamente,  $V$  tiene a  $C_2 \cup \mathbb{S}^2$  como retracts de deformación, por lo que  $\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$ .
- $U \cap V$  tiene a  $\mathbb{S}^2$  como retracts de deformación, por lo que  $U \cap V$  es simplemente conexo.

En definitiva, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, obtenemos que:

$$\pi_1(X) = \pi_1(Y) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

g)  $X = S_1 \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) \cup S_2$ , donde  $S_1$  y  $S_2$  son, respectivamente, las esferas de radio 1 centradas en el  $(0, -2, 0)$  y en el  $(0, 2, 0)$ . Tenemos el conjunto:



Notando  $S_i \cap (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) = \{x_i\}$  para  $i \in \{1, 2\}$ , definiendo los conjuntos:

$$\begin{aligned} U &= X \setminus \{y_1\}, & y_1 &\in S_1 \setminus \{x_1\} \\ V &= X \setminus \{y_2\}, & y_2 &\in (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) \setminus \{x_1, x_2\} \end{aligned}$$


Tenemos que:

- $U$  y  $V$  son abiertos, con  $X = U \cup V$ .
- Claramente  $U$ ,  $V$  y  $U \cap V$  son arcoconexos.

- $U$  tiene a  $S_2 \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$  como retracto de deformación, y en el apartado  $f$ ) vimos que este espacio topológico tiene un grupo fundamental isomorfo a  $\mathbb{Z}$ , por lo que  $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$ .
- $V$  tiene a:

$$S_1 \cup S_2 \cup ((\mathbb{S}^1 \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0\}) \times \{0\})$$

como retracto de deformación:



Por lo que  $\pi_1(V) = \{1\}$ , tal y como se vio en el apartado  $d$ ).


- $U \cap V$  tiene a  $S_2$  como retracto de deformación, por lo que  $U \cap V$  es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} * \{1\} = \mathbb{Z}$$

- h)  $X \subset \mathbb{R}^2$  es la unión de las tres circunferencias de radio 1 centradas en los puntos  $(-2, 0)$ ,  $(0, 0)$  y  $(2, 0)$ .

Tenemos que  $X = S_{-2} \cup S_0 \cup S_2$ , con  $S_{-2} \cap S_0 = \{x_1\}$  y  $S_0 \cap S_2 = \{x_2\}$ :



Si consideramos  $y_1 \in S_{-2} \setminus \{x_1\}$ ,  $y_2 \in S_0 \setminus \{x_1, x_2\}$ ,  $y_3 \in S_2 \setminus \{x_2\}$ , podemos definir los conjuntos:

$$U = X \setminus \{y_1, y_2\}, \quad V = X \setminus \{y_3\}$$

Y tenemos que:

- Claramente  $U$  y  $V$  son abiertos con  $X = U \cup V$ .
- Claramente  $U$ ,  $V$  y  $U \cap V$  son arcoconexos.
- $U$  tiene a  $S_2$  como retracto de deformación, por lo que  $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$ .
- $V$  tiene a  $Y = S_{-2} \cup S_0$  como retracto de deformación, y tomando:

$$W = Y \setminus \{y_1\}, \quad Z = Y \setminus \{y_2\}$$

tenemos que:

- $Y = W \cup Z$  con  $W$  y  $Z$  abiertos arcoconexos, con  $W \cap Z$  arcoconexo.
- $W$  tiene a  $S_2$  como retracto de deformación, por lo que  $\pi_1(W) \cong \mathbb{Z}$ .
- $Z$  tiene a  $S_0$  como retracto de deformación, por lo que  $\pi_1(Z) \cong \mathbb{Z}$ .
- $W \cap Z$  tiene a  $x_1$  como retracto de deformación, por lo que  $W \cap Z$  es simplemente conexo.

De aquí deducimos aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen que  $\pi_1(V) = \pi_1(Y) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ .

- $U \cap V$  tiene a  $\{x_2\}$  como retracto de deformación, por lo que  $U \cap V$  es simplemente conexo.


En definitiva, por el Teorema de Seifert-van Kampen deducimos que:

$$\pi_1(X) \cong (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Observemos que un razonamiento similar puede hacerse para el caso de  $n$  circunferencias de forma que la intersección dos a dos de ellas es unitaria, obteniendo que la unión de dichas  $n$  circunferencias sería  $*_{i=1}^n \mathbb{Z}$ .

i)  $X = \mathbb{S}^1 \cup [(-1, 0), (1, 0)]$ .

Tenemos el conjunto:



Si consideramos:

$$U = X \setminus \{(0, 0)\}, \quad V = X \setminus \{(0, 1)\}$$

tenemos que:

- $X = U \cup V$  con  $U$  y  $V$  abiertos.
- $U$ ,  $V$  y  $U \cap V$  son arcoconexos.
- $U$  tiene a  $\mathbb{S}^1$  como retracto de deformación, por lo que  $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$ .
- $V$  tiene a:

$$(\{(x, y) : y \leq 0\} \cap \mathbb{S}^1) \cup [(-1, 0), (1, 0)]$$

como retracto de deformación, y este último es homeomorfo a  $\mathbb{S}^1$ , por lo que  $\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$ .

- $U \cap V$  es contráctil, ya que tiene por ejemplo a  $\{(0, -1)\}$  como retracto de deformación, por lo que  $U \cap V$  es simplemente conexo.

En definitiva, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen tenemos que:

$$\pi_1(X) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

**Ejercicio 1.2.22.** Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Sean  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \Omega(X, x_0)$  con  $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$ . Entonces  $[\alpha_1] = [\alpha_2]$  y  $[\beta_1] = [\beta_2]$ .

Es falsa, puesto que si consideramos  $X = \mathbb{S}^1$ ,  $x_0 = (1, 0)$ , el arco:

$$\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \quad \forall t \in [0, 1]$$

Y tomamos:

$$\alpha_1 = \alpha = \beta_2, \quad \alpha_2 = \varepsilon_{x_0} = \beta_1$$

Tenemos que  $[\alpha_1] \neq [\alpha_2]$ ,  $[\beta_1] \neq [\beta_2]$  y  $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$ .

- b) Sean  $f : A \rightarrow Y$  una aplicación continua con  $A \subset X$  y  $X$  simplemente conexo. Si existe  $F : X \rightarrow Y$  continua con  $F|_A = f$ , entonces  $f_*$  es trivial.

Es verdadera, como  $F$  es una extensión de  $f$ , tenemos que  $f \circ i = F$ , es decir:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xhookrightarrow{i} & X & \xrightarrow{F} & Y \\ & & \searrow f & \nearrow & \end{array}$$

Y como cada una de ellas es continua, podemos inducir el diagrama a grupos fundamentales, obteniendo para cada  $x_0 \in A$ :

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(A, x_0) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{F_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & & \searrow f_* & \nearrow & \end{array}$$

de donde:

$$f_*([\alpha]_A) = F_*(i_*([\alpha]_A)) = F_*([\alpha]_X) \stackrel{(*)}{=} F_*([\varepsilon_{x_0}]_X) = [\varepsilon_{f(x_0)}]_Y \quad \forall [\alpha]_A \in \pi_1(A, x_0)$$

donde en  $(*)$  hemos usado que  $X$  es simplemente conexo.

- c) Si  $f : X \rightarrow Y$  es continua y nulhomótopa, entonces  $f_*$  es trivial.

Veradera, si  $f : X \rightarrow Y$  es continua y nulhomótopa, existe entonces una constante  $y_0 \in Y$  de forma que la aplicación constantemente igual a  $y_0$

$$\begin{array}{ccc} c : X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & y_0 \end{array}$$

sea homotópica a  $f$ , es decir, existe una aplicación continua  $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$  de forma que:

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = c(x) = y_0 \quad \forall x \in X$$

En este caso, hemos visto en teoría que para cada  $x_0 \in X$  existe un isomorfismo  $\varphi : \pi_1(Y, f(x_0)) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$  que hace conmutar el siguiente diagrama:



$$\begin{array}{ccc}
 & & \pi_1(Y, f(x_0)) \\
 & \nearrow f_* & \downarrow \varphi \\
 \pi_1(X, x_0) & & \pi_1(Y, y_0) \\
 & \searrow c_* &
 \end{array}$$

De donde deducimos que:

$$f_* = \varphi^{-1} \circ c_*$$


Luego si tomamos  $\alpha \in \Omega(X, x_0)$ , tenemos que:

$$f_*([\alpha]) = \varphi^{-1}(c_*([\alpha])) = \varphi^{-1}([c \circ \alpha]) = \varphi^{-1}([\varepsilon_{y_0}]) = [\varepsilon_{f(x_0)}]$$

de donde deducimos que  $f_*$  es trivial.

d) Si  $f : X \rightarrow \mathbb{S}^n$  es continua y no sobreyectiva, entonces es nulhomótopa.

Verdadera, si  $f$  no es sobreyectiva existirá entonces  $x_0 \in \mathbb{S}^n$  de forma que  $x_0 \notin f(X)$ . Si pensamos ahora en unir cada punto  $f(x)$  con  $-x_0$  podemos hacerlo a lo largo de  $\mathbb{S}^n$ :



De esta forma, definimos  $H : X \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^n$  dada por:

$$H(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + t(-x_0)}{|(1-t)f(x) + t(-x_0)|}$$

Observamos que:

$$|(1-t)f(x) + t(-x_0)| = 0 \iff (1-t)f(x) = tx_0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Como  $f(x), x_0 \in \mathbb{S}^n$ , esto último solo puede suceder si:

- $f(x) = x_0$ , pero  $x_0 \notin f(X)$ .
- $f(x) = -x_0$ , pero en este caso tenemos  $(1-t)f(x) + t(-x_0) = 1$ .

Por lo que el denominador nunca se anula, lo que nos permite obtener la función  $H$  continua, que hemos definido, que verifica:

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = -x_0 \quad \forall x \in X$$

Por lo que  $f$  es homotópica a la función  $X \rightarrow \mathbb{S}^n$  constantemente igual a  $-x_0$ , de donde  $f$  es nulhomótopa.

- e) Si  $X$  es simplemente conexo y  $A \subset X$  un retracto de  $X$ , entonces  $A$  es simplemente conexo.

Verdadera, puesto que si  $A$  es un retracto de  $X$ , entonces fijado  $x_0 \in A$  la aplicación inclusión  $i : A \rightarrow X$  induce un monomorfismo entre grupos fundamentales  $i_* : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ . Como

$$\pi_1(X, x_0) \cong \{1\}$$

ha de ser  $\pi_1(X, x_0) \cong \{1\}$ . Además, por ser  $A$  un retracto de  $X$ , existe una aplicación  $r : X \rightarrow A$  continua de forma que  $r(a) = a \quad \forall a \in A$ , por lo que  $A = r(X)$ , y como  $X$  es arcoconexo  $A$  también debe serlo.

- f) Si  $f : X \rightarrow Y$  es continua e inyectiva con  $f(x_0) = y_0$  entonces el homomorfismo  $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$  es un monomorfismo.

Falsa, puesto que la aplicación inclusión

$$\begin{aligned} i : \mathbb{S}^1 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

es continua e inyectiva, y si tomamos  $x_0 \in X$ ,  $y_0 = f(x_0)$ , tenemos el homomorfismo  $i_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \rightarrow \pi_1(\mathbb{R}^2, x_0)$  que no es inyectivo, puesto que:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(\mathbb{R}^2, x_0) \cong \{1\}$$

- g) Sea  $f : X \rightarrow Y$  una equivalencia homotópica y  $A \subset X$ . La restricción  $f|_A : A \rightarrow f(A)$  es una equivalencia homotópica.

Falsa: sean  $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  y  $Y = \mathbb{S}^1$ , sabemos que  $Y$  es retracto de deformación de  $X$ , por lo que existe una aplicación continua  $r : X \rightarrow Y$  dada por:

$$r(x) = \frac{x}{|x|}$$

de forma que su composición con la inclusión  $Y \xrightarrow{i} X$  es homotópica a la identidad. Tomando por tanto  $f = r$  y  $g = i$  tenemos que  $r$  es una equivalencia homotópica.

**Opción 1.** Si consideramos el conjunto:

$$A = \left\{ (r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) : r(\theta) = 1 + \frac{\theta}{2\pi}, \theta \in [0, 2\pi] \right\}$$




Figura 1.4: Representación gráfica de  $X$ ,  $Y$  y  $A$ .

Tenemos la aplicación  $r|_A : A \rightarrow \mathbb{S}^1$ , que no puede ser una equivalencia homotópica, ya que  $A$  es simplemente conexo y  $\mathbb{S}^1$  tiene un grupo isomorfo a  $\mathbb{Z}$  como grupo fundamental.

**Opción 2.** Si consideramos el conjunto:

$$A = B((1,5), 0,5)$$




Figura 1.5: Representación gráfica de  $X$ ,  $Y$ ,  $A$  y  $r(A)$  en azul.

Tenemos la aplicación  $r|_A : A \rightarrow r(A)$ , que no puede ser una equivalencia homotópica, ya que  $A$  es homeomorfo a  $\mathbb{S}^1$ , por lo que tiene grupo fundamental isomorfo a  $\mathbb{Z}$  y  $r(A)$  es un subconjunto simplemente conexo de  $\mathbb{S}^1$ .

h)  $\mathbb{S}^1$  no tiene ningún retracto de deformación  $D \neq \mathbb{S}^1$ .

Verdadera: por reducción al absurdo, si fuese  $D \subsetneq \mathbb{S}^1$  un retracto de deformación suyo, como  $D \neq \mathbb{S}^1$  ha de existir  $x_0 \in \mathbb{S}^1$  de forma que  $D \subseteq \mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\}$ . Como  $\mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\}$  es homeomorfo a  $\mathbb{R}$ ,  $D$  es homeomorfo a un subconjunto de  $\mathbb{R}$ , y como  $D$  es un retracto de deformación de  $\mathbb{S}^1$  ha de existir una función  $r : \mathbb{S}^1 \rightarrow D$  continua de forma que  $D = r(\mathbb{S}^1)$ . Como  $\mathbb{S}^1$  es conexo,  $D$  ha de ser homeomorfo a un subconjunto conexo de  $\mathbb{R}$ , es decir, a un intervalo, que siempre es simplemente conexo, por lo que  $D$  es simplemente conexo, pero por ser retracto de deformación de  $\mathbb{S}^1$  debería tener grupo fundamental isomorfo a  $\mathbb{Z}$ , hemos llegado a una contradicción.

i) Existe un homeomorfismo de  $\mathbb{R}^2$  que intercambia las componentes conexas de  $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{S}^1$ .

Falsa: por reducción al absurdo, si existiera  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  que intercambia las componentes conexas de  $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{S}^1$ , es decir, que si:

$$A = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| > 1\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$$

se tiene  $f(A) = B$ ,  $f(B) = A$ ; tendríamos entonces al considerar  $f|_A$  que  $A$  es homeomorfo a  $B$ , por lo que ambos han de tener el mismo grupo fundamental. Sin embargo:

- $B$  es estrellado, por lo que tiene grupo fundamental trivial.
- $A$  tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| = 2\}$$

que es una homotecia de  $\mathbb{S}^1$ , luego  $S \cong \mathbb{S}^1$ , de donde deducimos que:

$$\pi_1(A) = \pi_1(S) = \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Vemos que  $\pi_1(A) \neq \pi_1(B)$ , contradicción que viene de suponer la existencia del homeomorfismo  $f$  que intercambia  $A$  y  $B$ .

- j) Si  $A$  es un retracto del disco unidad cerrado de  $\mathbb{R}^2$ , entonces toda aplicación continua  $f : A \rightarrow A$  tiene al menos un punto fijo.

Verdadera, si  $A$  es un retracto de  $\mathbb{D}$  tenemos entonces que existe  $r : \mathbb{D} \rightarrow A$  continua de forma que  $r(a) = a \quad \forall a \in A$ . Sea ahora una aplicación continua  $f : A \rightarrow A$ , tenemos que la aplicación  $h : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  dada como la siguiente composición de funciones continuas:

$$\mathbb{D} \xrightarrow{r} A \xrightarrow{f} A \xhookrightarrow{i} \mathbb{D}$$

tiene un punto fijo por el Teorema de Brouwer, es decir, existe  $x_0 \in \mathbb{D}$  de forma que:

$$x_0 = h(x_0) = i(f(r(x_0))) = f(r(x_0))$$

como  $f$  toma valores en  $A$  tenemos que  $x_0 \in A$ , por lo que  $r(x_0) = x_0$ , con lo que:

$$x_0 = f(r(x_0)) = f(x_0)$$

Por lo que  $f$  tiene un punto fijo.

### 1.3. Espacios recubridores

**Ejercicio 1.3.1.** Sea  $R = ]-1, 1[ \subset \mathbb{R}$ . Demuestra que existe una aplicación recubridora  $p : R \rightarrow \mathbb{S}^1$ . ¿Se puede levantar al recubridor la aplicación  $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  dada por  $f(x, y) = (y, x)$ ?

Sabemos que  $R$  es homeomorfo a  $\mathbb{R}$  y que la aplicación  $p_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$  dada por:

$$p_0(x) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x))$$

es una aplicación recubridora. Si tomamos  $h : R \rightarrow \mathbb{R}$  cualquier homeomorfismo tendremos entonces que  $p = p_0 \circ h : R \rightarrow \mathbb{S}^1$  es una aplicación recubridora (como vimos en el Tema 1). En vistas del segundo apartado daremos  $h$  de forma explícita, como por ejemplo:

$$h(t) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

Si consideramos la aplicación  $f$  enunciada, estamos en la siguiente situación:

$$\begin{array}{ccc} & R & \\ & \downarrow p & \\ \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Fijado  $x_0 = (0, 1) \in \mathbb{S}^1$ , tomamos  $b_0 = f(x_0) = (1, 0)$  y  $r_0 = 0 \in p^{-1}(b_0)$ . Tenemos que existe un levantamiento  $\hat{f} : \mathbb{S}^1 \rightarrow R$  de  $f$  con  $\hat{f}(x_0) = r_0$  si y solo si:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, (0, 1))) \subseteq p_*(\pi_1(R, 0)) \quad (1.2)$$

Pero tenemos que:

$$\pi_1(R, 0) = \{[\varepsilon_0]\} \implies p_*(\pi_1(R, 0)) = \{[\varepsilon_{(1,0)}]\}$$

$f_*$  es un isomorfismo por ser  $f$  un homeomorfismo, por lo que:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1, (0, 1)) \cong \mathbb{Z} \implies f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, (0, 1))) \cong \mathbb{Z}$$

como no se puede cumplir la ecuación (1.2) tenemos que no existe dicho levantamiento. El mismo razonamiento puede repetirse para todo punto  $x_0 \in \mathbb{S}^1$ .

**Ejercicio 1.3.2.** Dada la aplicación recubridora estándar  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$  definida por

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x)),$$

determina si la aplicación  $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  dada por  $f(x, y) = (x, |y|)$  puede ser levantada al recubridor. Y, en tal caso, calcula sus levantamientos.

Fijado  $x_0 = (1, 0) \in \mathbb{S}^1$ , tomamos  $b_0 = f(x_0) = (1, 0)$  y consideramos el punto  $r_0 = 0 \in p^{-1}(b_0)$ . Existirá un levantamiento  $\hat{f} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$  de  $f$  con  $\hat{f}(x_0) = r_0$  si y solo si:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0))$$

Tenemos que:

$$\pi_1(\mathbb{R}, r_0) = \{[\varepsilon_{r_0}]\} \implies p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$$

Por otra parte,  $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)$  está generado por  $[\alpha]$ , con  $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1$  dado por:

$$\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

y tenemos que:

$$f_*([\alpha]) = [f \circ \alpha]$$

donde:

$$(f \circ \alpha)(t) = (\cos(2\pi t), |\sin(2\pi t)|)$$

que claramente es un arco homotópico a  $\varepsilon_{b_0}$ , por lo que tenemos:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$$

De donde existe una única  $\hat{f} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$  aplicación continua con  $\hat{f}(x_0) = r_0$ .

**Ejercicio 1.3.3.** ¿Existe una aplicación recubridora desde  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$  en  $\mathbb{S}^1$ ?

No: por reducción al absurdo, si existiera una aplicación recubridora  $p : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ :

**Opción 1.** Tendríamos entonces por el Teorema de Monodromía que la aplicación  $p$  induce un homomorfismo inyectivo  $p_* : \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x_0) \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0))$  con  $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  y  $\pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0)) \cong \mathbb{Z}$ . Sin embargo, ningún subgrupo de  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  es isomorfo a  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , por lo que llegamos a una contradicción.

**Opción 2.**  $\mathbb{R}$  es el recubridor universal de  $\mathbb{S}^1$ , por lo que entonces este también recubre a  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ , y  $\mathbb{R}^2$  también es recubridor universal de  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ , por lo que ha de existir un isomorfismo de recubridores (y por tanto, un homeomorfismo) entre  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{R}^2$ , algo imposible, pues  $\mathbb{R}$  menos un punto no es conexo y  $\mathbb{R}^2$  menos un punto sí lo es.

**Ejercicio 1.3.4.** Determina, salvo isomorfismos, todos los recubridores del cilindro  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ .

Fijado  $b_0 = (1, 0, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ , tenemos que  $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, b_0) \cong \mathbb{Z}$ , y los subgrupos de  $\mathbb{Z}$  son:

$$H_k = k\mathbb{Z} \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

- Asociado a  $H_0 = \{0\}$  tenemos el recubridor  $(\mathbb{R}^2, p)$ , donde  $p = p_0 \times Id_{\mathbb{R}}$ , con  $p_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$  la aplicación recubridora estándar.
- Asociado a  $H_k$  con  $k \geq 1$  tenemos el recubridor  $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, p_k)$ , con la aplicación recubridora  $p_k : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$  dada por:

$$p_k(\cos \theta, \sin \theta, y) = (\cos(k\theta), \sin(k\theta), y)$$

**Ejercicio 1.3.5.** Demuestra que si  $p : R \rightarrow B$  es un homeomorfismo local con  $R$  compacto y  $B$  Hausdorff (y conexo), entonces  $p$  es una aplicación recubridora.

Recordamos que si  $p$  es un homeomorfismo local entonces es una aplicación continua de forma que para cada punto  $x \in R$  existe un abierto  $U_x$  entorno de  $x$  de forma que  $p(U_x)$  es abierto en  $B$  y  $p|_{U_x} : U_x \rightarrow p(U_x)$  es un homeomorfismo.

- Tenemos que  $p$  es continua por ser un homeomorfismo local.
- Como  $R$  es compacto y  $B$  es Hausdorff tenemos que  $p$  es cerrada.
- Sea  $U \subseteq R$  un abierto, podemos escribir:

$$U = \bigcup_{x \in U} U_x$$

de donde  $U_x \cap U$  es un abierto para cada  $x \in U$ , por lo que

$$U = \bigcup_{x \in U} U_x \cap U$$

Para cada  $x \in X$  tenemos que  $p|_{U_x} : U_x \rightarrow p(U_x)$  es un homeomorfismo, por lo que  $p(U_x \cap U)$  es un abierto de  $B$ . Finalmente, vemos:

$$p(U) = p\left(\bigcup_{x \in U} U_x \cap U\right) = \bigcup_{x \in U} p(U_x \cap U)$$

Por lo que  $p(U)$  es abierto, de donde  $p$  es una aplicación abierta<sup>6</sup>.

Como  $p$  es abierta y cerrada tenemos que  $p(R) \subseteq B$  es abierto y cerrado, como  $B$  es conexo ha de ser  $p(R) = B$ , por lo que  $p$  es sobreyectiva. Falta probar que todo punto  $b \in B$  tiene un entorno abierto regularmente recubierto.

**Ejercicio 1.3.6.** Sea  $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un homeomorfismo local tal que para todo  $r > 0$  se tiene que  $p^{-1}(\overline{B}(0, r))$  es compacto. Demuestra que  $p$  es un homeomorfismo.

Por ser  $p$  un homeomorfismo local sabemos ya que es continua. Bastará ver que  $p$  es una aplicación recubridora (es decir, probar que es sobreyectiva y que todo punto del codominio admite un entorno abierto regularmente recubierto) para así poder aplicar el Ejercicio 1.2.10, puesto que  $\mathbb{R}^n$  es arcoconexo y también simplemente conexo.

- Para ver que  $p$  es sobreyectiva, demostraremos que  $p(\mathbb{R}^n)$  es un conjunto abierto y cerrado, por lo que como  $\mathbb{R}^n$  es conexo (y  $p(\mathbb{R}^n)$  es no vacío) tendrá que ser  $p(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$ .

$p(\mathbb{R}^n)$  es abierto por ser  $p$  una aplicación abierta, puesto que es un homeomorfismo local (se probó en el ejercicio anterior).

<sup>6</sup>Notemos que no hemos usado nada más que  $p$  es un homeomorfismo local, por lo que todo homeomorfismo local es una aplicación abierta.

Para ver que  $p(\mathbb{R}^n)$  es cerrado, si tomamos  $\{y_n\}$  una sucesión de puntos de  $p(\mathbb{R}^n)$  convergente a cierto  $y_0 \in \mathbb{R}^n$ , como la sucesión  $\{y_n\}$  es convergente, esta estará acotada, lo que nos permite encontrar  $r > 0$  de forma que:

$$\{y_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \overline{B}(0, r)$$

Para cada  $n \in \mathbb{N}$  tomamos  $x_n \in \mathbb{R}^n$  con  $p(x_n) = y_n$  y la condición superior nos dice que:

$$\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq p^{-1}(\overline{B}(0, r))$$

siendo este último un conjunto compacto, por hipótesis, por lo que podemos extraer una sucesión parcial convergente  $\{x_{\sigma(n)}\}$  a cierto  $x_0 \in p^{-1}(\overline{B}(0, r))$ . Si aplicamos ahora la aplicación  $p$ :

$$y_0 \leftarrow \{y_{\sigma(n)}\} = \{p(x_{\sigma(n)})\} \rightarrow p(x_0)$$

Y como  $\mathbb{R}^n$  es Hausdorff tenemos que  $y_0 = p(x_0)$ , como queríamos probar.

- Hay que probar que todo punto en  $\mathbb{R}^n$  admite un entorno abierto regularmente recubierto.

**Ejercicio 1.3.7.** Sea  $X$  conexo y localmente arcoconexo con grupo fundamental finito. Si  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  son aplicaciones continuas cumpliendo que  $f(x)^2 + g(x)^2 = 1$  para todo  $x \in X$ . Prueba que existe  $h : X \rightarrow \mathbb{R}$  continua tal que  $\cos(h(x)) = f(x)$  y  $\sin(h(x)) = g(x)$  para cada  $x \in X$ .

Observando la condición que cumplen  $f$  y  $g$  así como de la presencia de senos y cosenos pensamos en que el problema está relacionado con una circunferencia. Definimos por tanto  $F : X \rightarrow \mathbb{S}^1$  dada por:

$$F(x) = (f(x), g(x))$$

que está bien definida, pues  $f(x)^2 + g(x)^2 = 1$ , por lo que  $F(x) \in \mathbb{S}^1$  para todo  $x \in X$ . Si consideramos la aplicación recubridora estándar  $p_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ , fijado  $x_0 \in X$ ,  $b_0 = F(x_0)$  y tomando  $r_0 \in p^{-1}(b_0)$  tenemos que existe un levantamiento  $\hat{F} : X \rightarrow \mathbb{R}$  de  $F$  con  $\hat{F}(x_0) = r_0$  si y solo si:

$$F_*(\pi_1(X, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0))$$

Por una parte:

$$\pi_1(\mathbb{R}, r_0) = \{[\varepsilon_{r_0}]\} \implies p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$$

Por otra tenemos que como  $\pi_1(X, x_0)$  es un grupo finito ha de ser por tanto  $F_*(\pi_1(X, x_0))$  un subgrupo finito de  $\pi_1(\mathbb{S}^1, b_0) \cong \mathbb{Z}$ , que solo tiene un subgrupo finito,  $\{[\varepsilon_{b_0}]\}$ , de donde deducimos que ha de ser  $F_*(\pi_1(X, x_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$ . Sea por tanto  $\hat{F} : X \rightarrow \mathbb{R}$  el único levantamiento de  $F$  con  $\hat{F}(x_0) = r_0$ , tenemos que:

$$(\cos(2\pi\hat{F}(x)), \sin(2\pi\hat{F}(x))) = p(\hat{F}(x)) = F(x) = (f(x), g(x)) \quad \forall x \in X$$

Por lo que si definimos  $h : X \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $h(x) = 2\pi\hat{F}(x)$ , tenemos que:

$$(\cos(h(x)), \sin(h(x))) = F(x) = (f(x), g(x)) \quad \forall x \in X$$



**Ejercicio 1.3.8.** Sean  $p : X \rightarrow Y$  y  $f : Y \rightarrow Z$  dos aplicaciones continuas tales que  $p$  y  $f \circ p$  son aplicaciones recubridoras. Prueba que  $f$  es también una aplicación recubridora.

Como  $f \circ p$  es una aplicación recubridora es en particular sobreyectiva, por lo que  $f$  también es sobreyectiva. Basta ver que para todo  $z \in Z$  existe un entorno abierto de  $z$  regularmente recubierto. Fijado  $z \in Z$ , tomamos  $O_z$  un entorno abierto y arcoconexo de  $z$  regularmente recubierto por la aplicación recubridora  $f \circ p$ , por lo que:

$$p^{-1}(f^{-1}(O_z)) = (f \circ p)^{-1}(O_z) = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

con  $A_i \subseteq X$  abierto y  $(f \circ p)|_{A_i} : A_i \rightarrow O_z$  homeomorfismo para cada  $i \in I$ . Si aplicamos  $p$  a dicha igualdad, obtenemos que:

$$\bigcup_{i \in I} p(A_i) = p\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = p(p^{-1}(f^{-1}(O_z))) \stackrel{(*)}{=} f^{-1}(O_z)$$

donde en  $(*)$  hemos usado que  $p$  es sobreyectiva, y tenemos además que  $p(A_i)$  es abierto para cada  $i \in I$ , ya que  $p$  es una aplicación abierta por ser una aplicación recubridora.

Veamos ahora que si  $p(A_i) \cap p(A_j) \neq \emptyset \implies p(A_i) = p(A_j)$ : sea  $y \in p(A_i) \cap p(A_j)$  existen entonces  $x_i \in A_i$ ,  $x_j \in A_j$  de forma que  $p(x_i) = y = p(x_j)$ , basta demostrar que  $p(A_i) \subseteq p(A_j)$  y la otra inclusión será análoga. Para ello, sea  $y' \in p(A_i)$ , tenemos que existe  $x' \in A_i$  de forma que  $p(x') = y'$ . Tomamos ahora  $w = f(y)$ ,  $w' = f(y')$  y tendremos que  $w, w' \in O_z$ . Como  $O_z$  es arcoconexo, existirá  $\gamma : [0, 1] \rightarrow Z$  de forma que  $\gamma(0) = w$ ,  $\gamma(1) = w'$ . Si tomamos como  $\hat{\gamma}$  el único levantamiento de  $\gamma$  por  $f \circ p$  con  $\hat{\gamma}(0) = x_i$ , como  $Im \hat{\gamma}$  es un conjunto conexo ha de ser  $Im \hat{\gamma} \subseteq A_i$  y como  $(f \circ p)|_{A_i} : A_i \rightarrow O_z$  es un homeomorfismo, ha de ser  $\hat{\gamma}(1) = x'$ , ya que  $(f \circ p)^{-1}(\{w'\}) \cap A_i = \{x'\}$ .

Si consideramos ahora  $\delta = p \circ \hat{\gamma}$  tenemos que:

$$\delta(0) = p(x_i) = y, \quad \delta(1) = p(x') = y'$$

y consideramos como  $\hat{\delta}$  el único levantamiento de  $\delta$  por  $p$  con  $\hat{\delta}(0) = x_j$ . Tendremos:

$$(f \circ p) \circ \hat{\delta} = f \circ \delta = f \circ p \circ \hat{\gamma} = \gamma$$

Por lo que  $\hat{\delta}$  es el único levantamiento de  $\gamma$  por  $f \circ p$  con  $\hat{\delta}(0) = x_j \in A_j$ . Tendrá que ser  $Im \hat{\delta} \subseteq A_j$ , luego  $\hat{\delta}(1) \in A_j$  y tenemos que:

$$p(\hat{\delta}(1)) = \delta(1) = y'$$

por lo que  $y' \in p(A_j)$ , como queríamos probar. De esta forma, si eliminamos de la unión:

$$\bigcup_{i \in I} p(A_i)$$

los conjuntos repetidos, obtendremos una unión disjunta, luego será:

$$f^{-1}(O_z) = \bigsqcup_{j \in J} p(A_j)$$

y como  $(f \circ p)|_{A_j} : A_j \rightarrow O_z$  es un homeomorfismo para cada  $j \in J$  tenemos que:

$$(f \circ p)|_{A_j} = f|_{p(A_j)} \circ p|_{A_j}$$

Por lo que  $f|_{p(A_j)} : A_j \rightarrow O_z$  es inyectiva y con todas las demás propiedades que hemos probado de  $f$  deducimos que  $f|_{p(A_j)} : p(A_j) \rightarrow O_z$  es un homeomorfismo para cada  $j \in J$ . En definitiva, hemos probado que la aplicación  $f$  es una aplicación recubridora.

**Ejercicio 1.3.9.** Sean  $p_1 : X \rightarrow Y$  y  $p_2 : Y \rightarrow Z$  dos aplicaciones recubridoras. Prueba que si  $Z$  tiene recubridor universal, entonces  $p_2 \circ p_1 : X \rightarrow Z$  es una aplicación recubridora.

Si  $Z$  tiene recubridor universal  $(R, p)$  tenemos que como  $(Y, p_2)$  también recubre a  $Z$  existirá entonces un homomorfismo de recubridores  $\phi_1$  de  $(R, p)$  en  $(Y, p_2)$ , por lo que  $R$  es recubridor universal de  $Y$ . Repetiendo el razonamiento con el recubridor  $(X, p_1)$  de  $Y$  tenemos que existe un homomorfismo de recubridores  $\phi_2$  de  $(R, p)$  en  $(X, p_1)$ , obteniendo que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} & & R & & \\ & \searrow \phi_2 & \downarrow p & \nearrow \phi_1 & \\ X & \xrightarrow{p_1} & Y & \xrightarrow{p_2} & Z \end{array}$$

De esta forma, tenemos que:

$$(p_2 \circ p_1) \circ \phi_2 = p$$

con  $\phi_2$  y  $p$  aplicaciones recubridoras, por lo que por el ejercicio anterior tenemos que  $p_2 \circ p_1$  es una aplicación recubridora.

**Ejercicio 1.3.10.** Sean  $p : R \rightarrow B$  una aplicación recubridora y  $b_0 \in B$ . Definimos la aplicación (correspondencia del levantamiento generalizada)

$$\begin{aligned} \phi : p^{-1}(\{b_0\}) \times \pi_1(B, b_0) &\longrightarrow p^{-1}(\{b_0\}) \\ (r, [\alpha]) &\longmapsto \hat{\alpha}_r(1) \end{aligned}$$

donde  $\hat{\alpha}_r(s)$  es el único levantamiento de  $\alpha(s)$  con condición inicial  $\hat{\alpha}_r(0) = r$ . Demuestra que:

a)  $\phi$  está bien definida.

Fijado  $r \in p^{-1}(b_0)$  tenemos que la aplicación correspondencia del levantamiento

$$\begin{aligned} \phi_r : \pi_1(B, b_0) &\longrightarrow p^{-1}(\{b_0\}) \\ [\alpha] &\longmapsto \hat{\alpha}(1) \end{aligned}$$

donde  $\hat{\alpha}$  es el único levantamiento de  $\alpha$  con condición inicial  $\hat{\alpha}(0) = r$  está bien definida, por lo que  $\phi$  estará bien definida.

b)  $\phi(r, [\varepsilon_{b_0}]) = r$ , para cualquier  $r \in p^{-1}(\{b_0\})$ .

Sea  $r \in p^{-1}(\{b_0\})$ , si consideramos  $\varepsilon_r$  tenemos que:

$$p \circ \varepsilon_r = \varepsilon_{b_0}, \quad \varepsilon_r(0) = r$$

Por lo que  $\varepsilon_r$  es el único levantamiento de  $\varepsilon_{b_0}$  con  $\varepsilon_r(0) = r$ , de donde ha de ser:

$$\phi_r(r, [\varepsilon_{b_0}]) = \varepsilon_r(1) = r$$

c)  $\phi(\phi(r, [\alpha]), [\beta]) = \phi(r, [\alpha] * [\beta])$ , para cualesquiera  $r \in p^{-1}(\{b_0\})$  y  $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(B, b_0)$ .

Sea  $\hat{\alpha}_r$  el único levantamiento de  $\alpha$  con  $\hat{\alpha}_r(0) = r$  tenemos entonces que  $\phi(r, [\alpha]) = \hat{\alpha}_r(1) = r_1 \in p^{-1}(\{b_0\})$ . Sea  $\hat{\beta}_{r_1}$  el único levantamiento de  $\beta$  con  $\hat{\beta}_{r_1}(0) = r_1$ , tenemos que  $\phi(r_1, [\beta]) = \hat{\beta}_{r_1}(1)$ .

Veamos finalmente que  $\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1}$  es un levantamiento de  $\alpha * \beta$ , que además cumple:

$$(\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1})(0) = \hat{\alpha}_r(0) = r$$

Para ello, vemos que:

$$\begin{aligned} p((\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1})(t)) &= p \left( \begin{cases} \hat{\alpha}_r(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \hat{\beta}_{r_1}(2t-1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \right) \\ &= \begin{cases} p(\hat{\alpha}_r(2t)) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ p(\hat{\beta}_{r_1}(2t-1)) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} = (\alpha * \beta)(t) \end{aligned}$$

Por lo que ha de ser:

$$\phi(r, [\alpha] * [\beta]) = \phi(r, [\alpha * \beta]) = (\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1})(1) = \hat{\beta}_{r_1}(1) = \phi(\phi(r, [\alpha]), [\beta])$$

d)  $\phi$  es sobreyectiva.

En efecto, sea  $r \in p^{-1}(b_0)$ , tenemos que  $\phi(r, [\varepsilon_{b_0}]) = r$ .

e)  $\phi(r, [\alpha]) = r$  si y solo si  $[\alpha] \in p_*(\pi_1(R, r))$ . Por doble implicación:

$\Leftarrow$ ) Si  $[\alpha] \in p_*(\pi_1(R, r))$  tenemos entonces que existe  $[\beta] \in \pi_1(R, r)$  de forma que  $[p \circ \beta] = p_*([\beta]) = [\alpha]$ , por lo que  $\beta$  es un levantamiento de  $\alpha$ , que además cumple  $\beta(0) = r$ , por lo que:

$$\phi(r, [\alpha]) = \hat{\alpha}_r(0) = \beta(0) = r$$

$\Rightarrow$ ) Si  $\phi(r, [\alpha]) = r$  tenemos entonces que el único levantamiento  $\hat{\alpha}_r$  de  $\alpha$  con  $\hat{\alpha}_r(0) = r$  es un lazo en  $R$ ,  $[\hat{\alpha}_r] \in \pi_1(R, r)$ , y tenemos que  $p_*([\hat{\alpha}_r]) = [\alpha]$  por ser  $\hat{\alpha}_r$  levantamiento de  $\alpha$ .

f) El cardinal de  $p^{-1}(\{b_0\})$  coincide con el cardinal de  $\pi_1(B, b_0)/p_*(\pi_1(R, r))$  (es decir, el índice de  $p_*(\pi_1(R, r))$  como subgrupo de  $\pi_1(B, b_0)$ ).

**Ejercicio 1.3.11.** Sea  $X$  un espacio topológico (conexo y localmente arcoconexo),  $G$  un grupo de homeomorfismos de  $X$  y  $X/\mathcal{R}_G$  el espacio topológico cociente dado por la relación de equivalencia:

$$x\mathcal{R}_G y \iff \exists \varphi \in G : y = \varphi(x)$$

para cualesquiera  $x, y \in X$ .

Demuestra que la aplicación proyección  $\pi : X \rightarrow X/\mathcal{R}_G$  es recubridora si y solo si para cada  $x \in X$  existe un entorno suyo  $U_x$  tal que  $\varphi(U_x) \cap U_x = \emptyset$  para todo  $\varphi \in G \setminus \{Id_X\}$ .

Deduce que, además,  $\varphi : (X, \pi) \rightarrow (X, \pi)$  es un isomorfismo de recubridores si y solo si  $\varphi \in G$ .

Comenzamos probando que la aplicación proyección  $\pi : X \rightarrow X/\mathcal{R}_G$  es recubridora si y solo si para cada  $x \in X$  existe un entorno suyo  $U_x$  tal que  $\varphi(U_x) \cap U_x = \emptyset$  para todo  $\varphi \in G \setminus \{Id_X\}$ .

$\Leftarrow$ ) Como  $\pi$  es una proyección al cociente tenemos ya que es continua y sobreyectiva. Sea ahora  $\xi \in X/\mathcal{R}_G$ , tenemos que existe  $x \in X$  con  $\xi = \pi(x)$ . Para  $x$  tenemos que existe un entorno  $U_x$  de forma que  $\varphi(U_x) \cap U_x = \emptyset$ . Como  $U_x$  es entorno de  $x$  ha de existir un abierto  $O_x$  de forma que  $x \in O_x \subseteq U_x$ . Si consideramos ahora:

$$A = \bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x)$$

Tenemos que  $A$  es abierto, como unión de conjuntos abiertos, así como  $\pi$ -saturado<sup>7</sup>, pues si  $y \in X$  cumple que  $y\mathcal{R}_G z$  para  $z \in A$  tenemos entonces que  $\exists \varphi \in G$  con:

$$y = \varphi(z)$$

pero por ser  $z \in A$  tenemos que existe  $\phi \in G$  con  $z = \phi(w)$ , con  $w \in O_x$ , de donde:

$$y = \varphi(z) = \varphi(\phi(w))$$

tenemos ahora que  $\varphi \circ \phi \in G$  por ser  $G$  un grupo, de donde deducimos que  $y \in A$ , luego  $A$  es  $\pi$ -saturado. Si consideramos:

$$V_x = \pi(A) = \pi\left(\bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x)\right) = \bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x)$$

Tenemos que  $V_x$  es un abierto en  $X/\mathcal{R}_G$ , como imagen de un abierto  $\pi$ -saturado. Observemos que como  $A$  es saturado tenemos:

$$\bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x) = A = \pi^{-1}(\pi(A)) = \pi^{-1}(V_x)$$

con cada  $\varphi(O_x)$  abierto y la unión es disjunta, pues si tuviéramos  $\varphi(O_x) \cap \psi(O_x) \neq \emptyset$  para  $\varphi, \psi \in G$  tenemos entonces que:

$$\emptyset \neq \psi^{-1}(\varphi(O_x) \cap \psi(O_x)) = \psi^{-1}(\varphi(O_x)) \cap O_x$$

<sup>7</sup>Para comprobar que  $A$  es  $\pi$ -saturado basta ver que si  $\pi(y) = \pi(z)$  para algún  $z \in A$  se tiene entonces que  $y \in A$ .

lo que lleva a una contradicción (pues  $\psi^{-1} \circ \varphi \in G$ ), por lo que la unión ha de ser disjunta. Fijada  $\varphi \in G$ , consideramos:

$$\pi|_{\varphi(O_x)} : \varphi(O_x) \rightarrow V_x$$

tenemos que es continua, así como que:

- Es sobreyectiva, puesto que si  $\eta \in V_x$  tenemos entonces que  $\exists v \in O_x$ ,  $\phi \in G$  de forma que  $\eta = \pi(\phi(v))$ , con lo que:

$$\eta = \pi(\phi(v)) = \pi(v) = \pi(\varphi(v)) = \pi|_{\varphi(O_x)}(\varphi(v))$$

- Es inyectiva, pues si  $u, v \in O_x$  son elementos distintos con  $\pi(\varphi(u)) = \pi(\varphi(v))$  tenemos entonces que existe  $\phi \in G$  con  $\phi(\varphi(u)) = \varphi(v)$ , luego:

$$\varphi^{-1}(\phi(\varphi(u))) = v$$

con  $\varphi^{-1} \circ \phi \circ \varphi \in G$  y por tanto  $\varphi^{-1}(\phi(\varphi(U_x))) \cap U_x \neq \emptyset$ .

- Es abierta, pues si  $B_x \subseteq \varphi(O_x)$  es un conjunto abierto tenemos entonces que  $\pi(B_x)$  es un conjunto abierto, ya que podemos verlo como la imagen de cierto conjunto abierto y saturado.

En conclusión,  $\pi|_{\varphi(O_x)} : \varphi(O_x) \rightarrow V_x$  es un homeomorfismo.

$\implies$ ) Sea  $x \in X$ , tomamos  $b = \pi(x)$  y como  $\pi$  es una aplicación recubridora, ha de existir un entorno abierto  $O_b$  de  $b$  regularmente recubierto, con lo que:

$$\pi^{-1}(O_b) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

con  $A_i$  abierto y  $\pi|_{A_i} : A_i \rightarrow O_b$  homeomorfismo para cada  $i \in I$ . Como  $x \in \pi^{-1}(O_b)$  debe existir  $j \in I$  para el que  $x \in A_j$ , tomamos  $U_x = A_j$  y vemos ya que  $U_x$  es entorno de  $x$ . Para probar la condición enunciada sobre  $U_x$ , sea  $\varphi \in G \setminus \{Id\}$ , suponemos por reducción al absurdo que existe  $y \in \varphi(U_x) \cap U_x$ , por lo que ha de existir  $z \in U_x$  con  $y = \varphi(z)$ , de donde tenemos que  $y \mathcal{R}_G z$ , luego  $\pi(y) = \pi(z)$ . Como tenemos que  $y, z \in U_x$  y  $\pi|_{U_x}$  es inyectiva tiene que ser  $y = z$ . Si observamos que tenemos:

$$\begin{array}{c} \varphi \curvearrowright X \\ \downarrow \pi \\ X/\mathcal{R}_G \end{array}$$

$Id$  es un levantamiento de  $\pi \circ Id$  y  $\varphi$  es un levantamiento de  $\pi \circ \varphi$ , pero por la forma de definir  $\mathcal{R}_G$  tenemos que  $\pi \circ Id = \pi \circ \varphi$ , y además que:

$$Id(y) = y = \varphi(y)$$

como ambos son levantamientos de la misma aplicación y coinciden en un punto han de ser necesariamente iguales,  $\varphi = Id$ , pero esto contradice la elección que habíamos hecho de  $\varphi$ , pues la habíamos tomado del conjunto  $G \setminus \{Id\}$ .

$\varphi : (X, \pi) \rightarrow (X, \pi)$  es un isomorfismo de recubridores si y solo si  $\varphi \in G$ .

$\Leftarrow$ ) Si  $\varphi \in G$  tenemos entonces que  $\varphi : X \rightarrow X$  es un homeomorfismo, y es claro que si  $x \in X$  tenemos entonces que  $x\mathcal{R}_G\varphi(x)$ , luego:

$$\pi(x) = \pi(\varphi(x))$$

podemos repetir el argumento para todo  $x \in X$ , obteniendo que:

$$\pi = \pi \circ \varphi$$

Por lo que  $\varphi$  es un isomorfismo de recubridores.

$\Rightarrow$ ) Si  $\varphi$  es un isomorfismo de recubridores tenemos entonces que  $\varphi : X \rightarrow X$  es un homeomorfismo, así como que:

$$\pi = \pi \circ \varphi$$

por lo que:

$$\pi(x) = \pi(\varphi(x)) \quad \forall x \in X$$

o en otras palabras,  $x\mathcal{R}_G\varphi(x) \quad \forall x \in X$  y esto solo sucede si  $\exists \phi \in G$  con:

$$\phi(x) = \varphi(x) \quad \forall x \in X$$

de donde  $\phi = \varphi$ , por lo que  $\varphi \in G$ .

**Ejercicio 1.3.12.** Para cada  $n \in \mathbb{Z}$  se define la aplicación  $f_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  como  $f_n(x, y) = (x + 2n, (-1)^n y)$ . Utiliza el ejercicio anterior para demostrar que:

- a)  $G = \{f_n : n \in \mathbb{Z}\}$  es un grupo de homeomorfismos de  $\mathbb{R}^2$  y para cada  $x \in \mathbb{R}^2$  existe un entorno suyo  $U_x$  tal que  $f_n(U_x) \cap U_x = \emptyset$  para todo  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

Veamos primero que  $G$  es un grupo de homeomorfismos de  $\mathbb{R}^2$ :

- Primero, si  $f_n, f_m \in G$  para  $n, m \in \mathbb{Z}$ , tenemos entonces que:

$$\begin{aligned} f_n(f_m(x, y)) &= f_n(x + 2m, (-1)^m y) = (x + 2m + 2n, (-1)^n (-1)^m y) \\ &= (x + 2(m + n), (-1)^{n+m} y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Por lo que  $\circ$  es una operación en  $G$ , en particular:

$$f_n \circ f_m = f_{n+m} \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}$$

- Tenemos claramente que  $\circ$  es asociativa, ya que la composición de aplicaciones siempre es una operación asociativa.
- Observamos que se tiene que  $f_n \circ f_0 = f_{n+0} = f_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$ .
- Análogamente,  $f_n \circ f_{-n} = f_{n-n} = f_0$ .

Para cada  $x \in \mathbb{R}^2$  consideramos:

$$U_x = x + ([-1/2, 1/2] \times \mathbb{R}) = \{x + (u, v) : u \in [-1/2, 1/2], v \in \mathbb{R}\}$$

vemos claramente que  $U_x$  es un entorno de  $x$ , y supongamos ahora que para cierto  $n \in \mathbb{Z}$  existe  $(z, y) \in f_n(U_x) \cap U_x$ , de donde existe  $(u, v) \in U_x$  de forma que:

$$(z, y) = f_n(u, v) = (u + 2n, (-1)^n v) \iff z = u + 2n \iff z - u = 2n$$

Pero como  $z, u \in [x_1 - 1/2, x_1 + 1/2]$ , tenemos entonces que  $z - u \in [-1, 1]$  y en estas condiciones solo puede ser  $z - u = 2n$  si  $n = 0$ , por lo que:

$$f_n(U_x) \cap U_x = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

- b) La proyección  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$  es una aplicación recubridora de  $\mathbb{R}^2$  en la cinta de Moebius  $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$ .

Como  $\forall x \in X \exists U_x$  entorno de  $x$  con:

$$f_n(U_x) \cap U_x = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

tenemos por el Ejercicio anterior que la aplicación proyección  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$  es una aplicación recubridora.

**Ejercicio 1.3.13.** Para cada  $n, m \in \mathbb{Z}$  se define  $f_{n,m} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  como:

$$f_{n,m}(x, y) = (x, (-1)^n y) + 2(n, (-1)^n m).$$

Utiliza el ejercicio 1.3.11 para demostrar que:

- a)  $G = \{f_{n,m} : n, m \in \mathbb{Z}\}$  es un grupo de homeomorfismos de  $\mathbb{R}^2$  y para cada  $x \in \mathbb{R}^2$  existe un entorno suyo  $U_x$  tal que  $f_{n,m}(U_x) \cap U_x = \emptyset$  para todo  $n, m \in \mathbb{Z}$  con  $(n, m) \neq (0, 0)$ .

Vemos primero que:

$$f_{n,m}(x, y) = (x, (-1)^n y) + 2(n, (-1)^n m) = (x + 2n, (-1)^n (y + 2m))$$

Veamos que  $G$  es un grupo de homeomorfismos de  $\mathbb{R}^2$ :

- Si  $f_{n,m}, f_{s,t} \in G$  tenemos entonces que:

$$\begin{aligned} f_{n,m}(f_{s,t}(x, y)) &= f_{n,m}(x + 2s, (-1)^s (y + 2t)) \\ &= (x + 2s + 2n, (-1)^n ((-1)^s (y + 2t) + 2m)) \\ &= (x + 2(n + s), (-1)^{n+s} (y + 2t) + (-1)^n 2m) \\ &= (x + 2(n + s), (-1)^{n+s} (y + 2t + 2m(-1)^{-s})) \\ &= (x + 2(n + s), (-1)^{n+s} (y + 2(t + m(-1)^{-s}))) \\ &= f_{n+s, t+m(-1)^{-s}}(x, y) \end{aligned}$$

- La composición es asociativa.

- Tenemos que  $f_{n,m} \circ f_{0,0} = f_{n,m}$ .
- Además, dada  $f_{n,m} \in G$  tomando  $s = -n$ ,  $t = m(-1)^{-n}$  obtenemos que  $f_{n,m} \circ f_{s,t} = f_{0,0}$ .

Fijado  $x \in \mathbb{R}^2$ , podemos tomar:

$$U_x = x + ([-1/2, 1/2] \times [-1/2, 1/2])$$

y tenemos que  $U_x$  es un entorno de  $x$ . Si para  $n \in \mathbb{Z}$  existe  $(z, y) \in f_{n,m}(U_x) \cap U_x$  tenemos entonces que existe  $(u, v) \in U_x$  con:

$$(z, y) = f_{n,m}(u, v) = (u + 2n, (-1)^n(v + 2m)) \iff \begin{cases} z = u + 2n \\ y = (-1)^n(v + 2m) \end{cases}$$

de la primera igualdad y de forma análoga al ejercicio anterior deducimos que ha de ser  $n = 0$  y por tanto tenemos  $y = v + 2m$ , cuya única posibilidad vuelve a ser nuevamente  $m = 0$ , por lo que:

$$f_{n,m}(U_x) \cap U_x = \emptyset \quad \forall (n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{(0, 0)\}$$

- b) La proyección  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$  es una aplicación recubridora de  $\mathbb{R}^2$  en la botella de Klein  $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$ .

Como  $\forall x \in X \exists U_x$  entorno de  $x$  con:

$$f_{n,m}(U_x) \cap U_x = \emptyset \quad \forall (n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{(0, 0)\}$$

tenemos por el Ejercicio 1.3.11 que la aplicación proyección  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$  es una aplicación recubridora.

**Ejercicio 1.3.14.** Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Existe una aplicación recubridora  $p : \mathbb{S}^1 \rightarrow [0, 1]$ .

Es falsa, ya que si existiera una aplicación recubridora  $p : \mathbb{S}^1 \rightarrow [0, 1]$  el Teorema de Monodromía nos diría que el homomorfismo inducido por la aplicación  $p$   $p_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \rightarrow \pi_1([0, 1], p(x_0))$  es inyectivo, con  $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$  y  $\pi_1([0, 1], p(x_0)) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$ , lo que llevaría a una contradicción.

- b) Existe una aplicación recubridora  $p : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ .

Es falsa, ya que si existiera una aplicación recubridora  $p : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ :

**Opción 1.** el Teorema de Monodromía nos diría que el homomorfismo inducido  $p_* : \pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0) \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0))$  es inyectivo, con  $\pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0) \cong \mathbb{Z}_2$ , pero entonces tenemos que  $p_*(\pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0)) \cong \mathbb{Z}_2$  y subgrupo de  $\pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0)) \cong \mathbb{Z}$ , que es una contradicción.

**Opción 2.** Como  $\mathbb{R}$  es el recubridor universal de  $\mathbb{S}^1$  tendríamos entonces que  $\mathbb{R}$  recubriría a  $\mathbb{RP}^2$ , y el recubridor universal de  $\mathbb{RP}^2$  es  $\mathbb{S}^2$ , por lo que tendríamos entonces un homeomorfismo entre  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{S}^2$ , algo imposible, pues  $\mathbb{S}^2$  es compacto y  $\mathbb{R}$  no.




- c) El semiplano  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$  es el recubridor universal de la bola cerrada punteada  $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ .

Es verdadera, es claro que  $X$  es simplemente conexo, por lo que basta ver que existe alguna aplicación recubridora  $p : X \rightarrow Y$ .



Sabemos ya de la existencia de una aplicación recubridora  $p_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ , por lo que sabemos llevarnos el “borde” de  $X$  al “borde” de  $Y$ . Si repetimos el proceso subiendo la altura en  $X$  y achicando el radio en  $Y$  conseguiremos una aplicación recubridora  $p : X \rightarrow Y$ . La idea es buscar una aplicación que en 0 valga 1 y que su imagen tienda a 0 en infinito. Tomamos por tanto  $p : X \rightarrow Y$  dada por:

$$p(x, y) = e^{-y} p_0(x)$$



Es claro que  $p$  es continua y sobreyectiva. Se comprueba además que  $p$  es una aplicación recubridora.

- d) Si  $X$  es un espacio topológico (conexo y localmente arcoconexo) con grupo fundamental finito y  $p : X \rightarrow X$  es una aplicación recubridora, entonces  $p$  es un homeomorfismo.

Es verdadera. Para probar que  $p$  es un homeomorfismo basta probar que  $p$  es inyectiva, pues al ser una aplicación recubridora tenemos ya que es continua, sobreyectiva y abierta. Para ver que es inyectiva, tomamos dos puntos  $x, y \in X$  con  $p(x) = p(y)$ , como  $X$  es conexo y localmente arcoconexo vimos en el Tema 1 que entonces  $X$  es arcoconexo, por lo que en particular ha de existir un arco  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  de forma que  $\alpha(0) = x$  y  $\alpha(1) = y$ . Si consideramos el arco  $p \circ \alpha$  tenemos que:

$$(p \circ \alpha)(0) = p(x) = p(y) = (p \circ \alpha)(1)$$

por lo que  $p \circ \alpha$  es un lazo en  $X$ . Por otra parte, el Teorema de Monodromía nos dice que el homomorfismo  $p_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(X, p(x))$  es inyectivo, por lo que será un isomorfismo de grupos, al ser  $\pi_1(X, x)$  finito. De esta forma, como  $[p \circ \alpha] \in \pi_1(X, p(x))$ , ha de existir  $\beta \in \Omega(X, x)$  de forma que  $p_*([\beta]) = [p \circ \alpha]$ . En este momento tenemos que tanto  $\beta$  como  $\alpha$  son dos levantamientos de  $p \circ \alpha$  con:

$$\beta(0) = x = \alpha(0)$$

por lo que han de ser iguales, de donde:

$$y = \alpha(1) = \beta(1) = x$$

## 1.4. Superficies compactas

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $X = \mathbb{S}^2 \cup \{x_0\}$ , donde  $x_0 \in \mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{S}^2$ . En  $X$  se considera la topología tal que los entornos de los puntos de  $\mathbb{S}^2$  son los usuales, y los de  $x_0$  son de la forma  $(V \setminus \{N\}) \cup \{x_0\}$ , donde  $N = (0, 0, 1)$  y  $V$  es un entorno de  $N$  en  $\mathbb{S}^2$ . Demuestra que  $X$  es localmente euclídeo, es 2AN, pero no es T2.

**Ejercicio 1.4.2.** Consideremos el espacio producto  $X = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ , donde en  $\mathbb{R}^2$  se considera la topología usual y en  $\mathbb{R}$  la topología discreta. Demuestra que  $X$  es localmente euclídeo, es T2 pero no es 2AN.

**Ejercicio 1.4.3.** Prueba que los siguientes espacios topológicos no son superficies:

- a)  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ .
- b)  $\mathbb{R}^n$  con  $n \neq 2$ .
- c)  $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$ .

¿Es la unión o intersección de dos superficies en  $\mathbb{R}^3$  una superficie?

**Ejercicio 1.4.4.** Sea  $(R, p)$  un recubridor de una superficie topológica  $S$ . Si  $R$  es 2AN, demuestra que  $R$  es una superficie topológica.

**Ejercicio 1.4.5.** Sean  $S$  una superficie y  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Definimos el grafo de  $f$  como el espacio topológico

$$G(f) = \{(x, t) \in S \times \mathbb{R} : t = f(x)\}$$

con la topología inducida por la topología producto en  $S \times \mathbb{R}$ . Prueba que  $G(f)$  es una superficie, que además es compacta si y solo si lo es  $S$ .

**Ejercicio 1.4.6.** Prueba que la característica de Euler de la suma conexa de dos superficies compactas es igual a la suma de sus características de Euler menos dos.

**Ejercicio 1.4.7.** Calcula la característica de Euler de la suma conexa de un plano proyectivo y  $n$  toros.

**Ejercicio 1.4.8.** Estudia la orientabilidad de  $S_1 \# S_2$  a partir de la de  $S_1$  y de  $S_2$ .

**Ejercicio 1.4.9.** Para cada una de las siguientes presentaciones poligonales de superficies compactas, calcula la característica de Euler y determina a cuál de las superficies modelo es homeomorfa:

- a)  $\langle a, b, c; abacb^{-1}c^{-1} \rangle$ .
- b)  $\langle a, b, c; abca^{-1}b^{-1}c^{-1} \rangle$ .
- c)  $\langle a, b, c, d; abcdca^{-1}bd^{-1} \rangle$ .
- d)  $\langle a, b, c, d, e; aba^{-1}cdb^{-1}c^{-1}ed^{-1}e^{-1} \rangle$ .
- e)  $\langle a, b, c, d, e, f; abcadb^{-1}efce^{-1}df^{-1} \rangle$ .

- f)  $\langle a, b, c, d, e, f; abc, bde, c^{-1}df, e^{-1}fa \rangle$ .
- g)  $\langle a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o;$   
 $abc, bde, df, ghi, haj, c^{-1}kl, e^{-1}mn, g^{-1}ok^{-1}, i^{-1}l^{-1}m^{-1}, j^{-1}n^{-1}o^{-1} \rangle$ .
- h)  $\langle a, b, c, d, e, f; abc, bde, c^{-1}df, e^{-1}fa \rangle$ .

**Ejercicio 1.4.10.** Clasifica la suma conexa de las superficies representadas en los apartados a) y b) del ejercicio anterior.

**Ejercicio 1.4.11.** Demuestra que toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a una y solo una de las siguientes superficies:

$$\mathbb{S}^2, \quad \mathbb{T}_n, \quad \mathbb{RP}^2, \quad K, \quad \mathbb{T}_n \# \mathbb{RP}^2, \quad \mathbb{T}_n \# K$$

donde  $K$  denota la botella de Klein.

**Ejercicio 1.4.12.** Identifica, salvo homeomorfismos, las superficies compactas y conexas con característica de Euler igual a  $-2$ .

**Ejercicio 1.4.13.** Sea  $S$  una superficie compacta y conexa. Probar que  $\chi(S) \geq -2$  si y solo si  $S$  tiene una presentación poligonal  $\mathcal{P} = \langle A; W \rangle$  donde  $A$  tiene exactamente 4 elementos.

**Ejercicio 1.4.14.** Discute de forma razonada si cada par de las siguientes superficies compactas y conexas son homeomorfas entre sí:

- a)  $S_1$  tiene por presentación poligonal a  $\langle a, b, c, d; abcdad^{-1}cb^{-1} \rangle$ .
- b)  $S_2$  cumple que  $\chi(S_2) \geq 0$  y  $\pi_1(S_2)$  no es abeliano.
- c)  $S_3$  cumple que  $\pi_1(S_3)$  es isomorfo al grupo  $F(a, b, c)/\langle acbcb a^{-1} \rangle_N$ .

**Ejercicio 1.4.15.** Obten la presentación poligonal canónica de la superficie  $S_1$  del ejercicio anterior efectuando para ello las transformaciones elementales que sean necesarias.

**Ejercicio 1.4.16.** Sea  $S$  la superficie compacta y conexa que admite una presentación poligonal de la forma

$$\langle a, b, c, d, e; ab^{-1}c - da^{-1}ebc^{-1} - \rangle$$

donde cada guión - está ocupado por un único símbolo. Completa los guiones correspondientes para que  $S$  sea homeomorfa a:

- a)  $\mathbb{T}_2$ .
- b)  $\mathbb{RP}_4^2$ .
- c) La superficie compacta con grupo fundamental abelianizado isomorfo a  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}^4$ .