

Análisis Funcional
Examen XI



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen XI

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2025/26.

Grado Grado en Matemáticas.

Profesor Miguel Martín Suárez.

Descripción Parcial 1.

Fecha En el mes de Noviembre.

Ejercicio 1. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = f(1)\}$$

en el que se define el funcional lineal $\varphi : X \to \mathbb{K}$ dado por

$$\varphi(f) = \int_0^1 t^8 f(t)\ dt \qquad \forall f \in X$$

(a) Probar que X es completo.

(b) Probar que φ es continuo y calcular su norma.

(c) ¿Alcanza φ su norma?

Ejercicio 2. En el espacio $C[0,1]$ se define

$$F(x) = \int_0^1 t^{15} x(t^{21})\ dt$$

para cada $x \in C[0,1]$. Prueba que F es un funcional lineal y continuo y calcula su norma. ¿La alcanza?

Ejercicio 3. Explica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Cuando sean ciertas, indica el resultado de teoría que lo justifique o proporciona una prueba; cuando sean falsas, indica un contraejemplo.

1. Un espacio normado tiene dimensión finita si y sólo si todos sus subespacios vectoriales son cerrados.

2. Si X e Y son espacios de Banach y la dimension de Y es finita, entonces todo operador lineal de X en Y es continuo.

3. Sea X un espacio de Banach. X es separable si y sólo si todos sus subespacios cerrados son separables.

4. El conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales no es abierto ni es cerrado en $C[0,1]$.

5. El interior de un subconjunto compacto de un espacio de Banach es vacío.

6. El subespacio

   $$X = \{f \in C[-1,1] : f(t) = f(-t) \quad \forall t \in [0,1]\}$$

   considerado como subespacio del espacio $C[-1,1]$ con la norma del supremo es denso en $C[-1,1]$.

7. En un espacio normado no completo, el único funcional lineal y continuo que alcanza su norma es el cero.

8. Dos hiperplanos cualesquiera de un espacio normado son isométricamente isomorfos.

9. Sea X un espacio de Banach. Si todo hiperplano cerrado de X es proximinal, entonces X tiene dimensión finita.

10. En el espacio vectorial Z de los polinomios reales de grado menor o igual que $N \in \mathbb{N}$, consideramos la norma

$$\|p\| = \sup\{|p(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall p \in Z$$

Entonces, para cada $k \in \mathbb{N}$, existe una constante $M_k > 0$ tal que

$$|p(k)| \leqslant M_k \|p\| \qquad \forall p \in Z$$

¿puede haber una constante M que valga para todo $k \in \mathbb{N}$?

Ejercicio 1. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = f(1)\}$$

en el que se define el funcional lineal $\varphi : X \to \mathbb{K}$ dado por

$$\varphi(f) = \int_0^1 t^8 f(t)\ dt \qquad \forall f \in X$$

(a) Probar que X es completo.

De manera rutinaria Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X. Como $C[0,1]$ es completo, existe $f \in C[0,1]$ tal que $\{f_n\} \to f$ empleando la norma del supremo. Faltaría por tanto ver que $f \in X$. Como se tiene que $f_n(0) = f_n(1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$|f(0)-f(1)| = |f(0)-f_n(0)+f_n(1)-f(1)| \leqslant |f(0)-f_n(0)|+|f_n(1)-f(1)| \leqslant 2\|f-f_n\|$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$ obtenemos que $f(0) = f(1)$, por lo que $f \in X$ y $\{f_n\} \to f$ en X. Por tanto, X es completo.

Otra manera Queremos ver que X es cerrado en $C[0,1]$. Consideramos el siguiente funcional lineal $\psi : C[0,1] \to \mathbb{K}$ dado por:

$$\psi(f) = f(0) - f(1) \qquad \forall f \in C[0,1]$$

Es fácil ver que ψ es lineal y continuo, ya que:

$$|\psi(f)| = |f(0) - f(1)| \leqslant |f(0)| + |f(1)| \leqslant 2\|f\| \qquad \forall f \in C[0,1]$$

Por tanto, ψ es continuo y $X = \ker(\psi)$, por lo que X es cerrado en $C[0,1]$. Como $C[0,1]$ es completo, X también lo es.

(b) Probar que φ es continuo y calcular su norma.

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 t^8 f(t)\ dt\right| \leqslant \int_0^1 |t^8 f(t)|\ dt = \int_0^1 t^8 |f(t)|\ dt \leqslant \int_0^1 t^8 \|f\|\ dt =$$
$$= \|f\| \int_0^1 t^8\ dt = \frac{1}{9}\|f\|$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1/9$. Para ver que $\|\varphi\| = 1/9$ consideramos la función $f_0(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$. Tenemos que $f_0 \in X$ y $\|f_0\| = 1$, así como que:

$$|\varphi(f_0)| = \left|\int_0^1 t^8\ dt\right| = \frac{1}{9}$$

Por tanto, $\|\varphi\| \geqslant 1/9$, y como ya habíamos visto que $\|\varphi\| \leqslant 1/9$, obtenemos que $\|\varphi\| = 1/9$.

(c) ¿Alcanza φ su norma?

Ya hemos visto que, empleando la función $f_0(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$, se alcanza la norma de φ. Por tanto, φ alcanza su norma.

Ejercicio 2. En el espacio $C[0,1]$ se define

$$F(x) = \int_0^1 t^{15} x(t^{21})\ dt$$

para cada $x \in C[0,1]$. Prueba que F es un funcional lineal y continuo y calcula su norma. ¿La alcanza?

Claramente, $F : C[0,1] \to \mathbb{K}$ es un funcional. Veamos que es lineal. Para ello, sean $x, y \in C[0,1]$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} F(\alpha x + y) &= \int_0^1 t^{15}(\alpha x(t^{21}) + y(t^{21}))\ dt = \int_0^1 t^{15}\alpha x(t^{21})\ dt + \int_0^1 t^{15} y(t^{21})\ dt = \\ &= \alpha \int_0^1 t^{15} x(t^{21})\ dt + \int_0^1 t^{15} y(t^{21})\ dt = \alpha F(x) + F(y) \end{aligned}$$

Por tanto, F es lineal. Veamos que es continuo. Para ello, sea $x \in C[0,1]$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} |F(x)| &= \left| \int_0^1 t^{15} x(t^{21})\ dt \right| \leqslant \int_0^1 |t^{15} x(t^{21})|\ dt = \int_0^1 t^{15} |x(t^{21})|\ dt \leqslant \int_0^1 t^{15} \|x\|\ dt = \\ &= \|x\| \int_0^1 t^{15}\ dt = \frac{1}{16}\|x\| \end{aligned}$$

Por tanto, F es continuo y $\|F\| \leqslant 1/16$. Para ver que $\|F\| = 1/16$ consideramos la función $x_0(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$. Tenemos que $x_0 \in C[0,1]$ y $\|x_0\| = 1$, así como que:

$$|F(x_0)| = \left| \int_0^1 t^{15}\ dt \right| = \frac{1}{16}$$

Por tanto, $\|F\| \geqslant 1/16$, y como ya habíamos visto que $\|F\| \leqslant 1/16$, obtenemos que $\|F\| = 1/16$. Además, F alcanza su norma, ya que $|F(x_0)| = \|F\|$.

Ejercicio 3. Explica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Cuando sean ciertas, indica el resultado de teoría que lo justifique o proporciona una prueba; cuando sean falsas, indica un contraejemplo.

1. Un espacio normado tiene dimensión finita si y sólo si todos sus subespacios vectoriales son cerrados.

   Veamos que es cierta.

   $\Longrightarrow$) Si X es un espacio normado de dimensión finita, entonces por el Teorema de Hausdorff todo subespacio vectorial de X es cerrado.

$\Longleftarrow$) Supongamos que X es un espacio normado de dimensión infinita, y buscamos un subespacio vectorial que no sea cerrado. Para ello, buscamos un funcional $T : X \to \mathbb{K}$ lineal que no sea continuo, lo que nos afirmará que $\ker(T)$ no es cerrado.

Como X es de dimensión infinita, consideramos su base algebraica $\mathcal{B}$, que será infinita pero no necesariamente numerable, y que consideramos normalizada. Consideramos un subconjunto numerable de $\mathcal{B}$, que podemos denotar por $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, que es linealmente independiente. Definimos entonces el funcional lineal $T : X \to \mathbb{K}$ definido en su base por:

$$\begin{aligned} T(u_n) &= n \qquad \forall n \in \mathbb{N} \\ T(u) &= 0 \qquad \forall u \in \mathcal{B} \setminus \{u_n\}_{n\in\mathbb{N}} \end{aligned}$$

Este funcional es lineal, pero no es continuo. Veámoslo:

$$\|T(u_n)\| = |T(u_n)| = n = n\|u_n\| \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, como esta igualdad es válida para todo $n \in \mathbb{N}$, no existe una constante $C > 0$ tal que $\|T(x)\| \leqslant C\|x\|$ para todo $x \in X$, por lo que T no es continuo. Por tanto, $\ker(T)$ no es cerrado, y hemos encontrado un subespacio vectorial de X que no es cerrado.

Por el recíproco, si todos los subespacios vectoriales de X son cerrados, entonces X tiene dimensión finita.

2. Si X e Y son espacios de Banach y la dimension de Y es finita, entonces todo operador lineal de X en Y es continuo.

   Este resultado no es cierto. Dos resultados similares que sí son ciertos son:

   - Si X e Y son espacios normados e Y tiene dimensión finita, entonces un operador lineal de X en Y es continuo si y sólo si su núcleo es cerrado.
   - Si X e Y son espacios normados y X tiene dimensión finita, entonces todo operador lineal de X en Y es continuo.

   No obstante, el resultado que se nos pide demostrar es falso, y buscamos un contraejemplo que, necesariamente, tendrá que tener $\dim(X) = \infty$ y, además, $\dim(Y) < \infty$. Consideramos $X = c_0 \subset l_\infty$ e $Y = \mathbb{R}$. Partimos de la base algebraica de c_{00}, dada por $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, y consideramos el funcional $T : c_{00} \to \mathbb{R}$ definido por:

$$T(e_n) = n \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

   Este funcional es lineal, pero no es continuo. Veámoslo:

$$\|T(e_n)\| = |T(e_n)| = n = n\|e_n\| \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

   Por tanto, como esta igualdad es válida para todo $n \in \mathbb{N}$, no existe una constante $C > 0$ tal que $\|T(x)\| \leqslant C\|x\|$ para todo $x \in c_{00}$, por lo que T no es

continuo.

Como c_{00} no es de Banach, lo extendemos a c_0. Por el Lema de Zorn, se puede extender $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ a una base algebraica de c_0, que denotamos por $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = \{e_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \mathcal{B}' \qquad \mathcal{B}' \subset c_0 \qquad \mathcal{B}' \cap \{e_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \emptyset$$

Definimos entonces el funcional lineal $T : c_0 \to \mathbb{R}$ definido en su base por:

$$\begin{aligned} T(e_n) &= n \qquad \forall n \in \mathbb{N} \\ T(u) &= 0 \qquad \forall u \in \mathcal{B}' \end{aligned}$$

Este funcional es lineal, pero no es continuo por la misma razón que antes. Por tanto, hemos encontrado un operador lineal de c_0 en $\mathbb{R}$ que no es continuo, y el resultado es falso.

3. Sea X un espacio de Banach. X es separable si y sólo si todos sus subespacios cerrados son separables.

4. El conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales no es abierto ni es cerrado en $C[0,1]$.

   Veamos que no es abierto ni cerrado.

   - Por el Teorema de Aproximación de Weierstrass, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales es denso en $C[0,1]$. Como hay funciones continuas que no son polinomios, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales no es cerrado.
   - Para ver que no es abierto, consideremos el polinomio $p_0(t) = 0$ para todo $t \in [0,1]$. Fijado $\varepsilon > 0$, consideremos la función:

   $$\begin{array}{rccc} g_\varepsilon : & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & \varepsilon \cdot \left| t - \dfrac{1}{2} \right| \end{array}$$

   Claramente, $g_\varepsilon \in C[0,1]$ y:

   $$\|g_\varepsilon - p_0\| = \sup_{t\in[0,1]} |g_\varepsilon(t) - p_0(t)| = \sup_{t\in[0,1]} |g_\varepsilon(t)| = \sup_{t\in[0,1]} \varepsilon \cdot \left| t - \frac{1}{2} \right| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

   Por tanto, $g_\varepsilon \in B(p_0, \varepsilon)$. No obstante, g_ε no es un polinomio pues no es diferenciable en $t = 1/2$. Por tanto, para todo $\varepsilon > 0$, existe $g_\varepsilon \in B(p_0, \varepsilon)$ tal que g_ε no es un polinomio. Por tanto, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales no es abierto.

5. El interior de un subconjunto compacto de un espacio de Banach es vacío.

   Si la dimensión del espacio de Banach fuese infinita, efectivamente el interior de un subconjunto compacto sería vacío. No obstante, si la dimensión del espacio de Banach fuese finita, el interior de un subconjunto compacto podría

no ser vacío. Consideramos $\mathbb{R}^n$ con cualquiera de sus normas (pues todas son equivalentes). Consideramos su bola unidad cerrada, que es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}^n$ por ser cerrado y acotado. Su interior es la bola unidad abierta, que no es vacío por contener al origen. Por tanto, el resultado es falso.

6. El subespacio

$$X = \{f \in C[-1,1] : f(t) = f(-t) \quad \forall t \in [0,1]\}$$

considerado como subespacio del espacio $C[-1,1]$ con la norma del supremo es denso en $C[-1,1]$.

Veamos que es falso. Fijado $t \in [0,1]$, consideramos el funcional:

$$\begin{array}{rccc} \Phi_t : & C[-1,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & f(t) - f(-t) \end{array}$$

Claramente, Φ_t es lineal, y además es continuo, ya que:

$$|\Phi_t(f)| = |f(t) - f(-t)| \leqslant |f(t)| + |f(-t)| \leqslant 2\|f\|$$

Por tanto, Φ_t es lineal y continuo. Además:

$$\begin{aligned} \ker(\Phi_t) &= \{f \in C[-1,1] : \Phi_t(f) = 0\} = \{f \in C[-1,1] : f(t) - f(-t) = 0\} = \\ &= \{f \in C[-1,1] : f(t) = f(-t)\} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$X = \bigcap_{t \in [0,1]} \ker(\Phi_t)$$

Como la intersección arbitraria de cerrados es cerrado, X es cerrado en $C[-1,1]$. Por tanto, puesto que $X \neq C[-1,1]$, X no puede ser denso en $C[-1,1]$.

7. En un espacio normado no completo, el único funcional lineal y continuo que alcanza su norma es el cero.

Veamos que es falso. Consideremos el espacio normado $X = c_{00}$, que no es completo. Consideremos el funcional lineal $\varphi : c_{00} \to \mathbb{K}$ dado por:

$$\varphi(x) = x(1) \qquad \forall x \in c_{00}$$

Veamos que φ es lineal y continuo. Para ello, sea $x, y \in c_{00}$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Tenemos que:

$$\varphi(\alpha x + y) = (\alpha x + y)(1) = \alpha x(1) + y(1) = \alpha\varphi(x) + \varphi(y)$$

Por tanto, φ es lineal. Además, para ver que es continuo, sea $x \in c_{00}$. Tenemos que:

$$|\varphi(x)| = |x(1)| \leqslant \sup_{n \in \mathbb{N}} |x(n)| = \|x\|$$

Por tanto, φ es continuo. Veamos que alcanza su norma. Consideremos $e_1 \in c_{00}$, que es el elemento de la base canónica de c_{00} definido por:

$$e_1(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \neq 1 \end{cases}$$

Claramente, $\|e_1\| = 1$, y además:

$$|\varphi(e_1)| = |e_1(1)| = 1$$

Por tanto, φ alcanza su norma, y hemos encontrado un funcional lineal y continuo que alcanza su norma en un espacio normado no completo que no es el cero. Por tanto, el resultado es falso.

8. Dos hiperplanos cualesquiera de un espacio normado son isométricamente isomorfos.

   Consideramos el espacio producto $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, donde:

   $$\|((x,y),z)\| = \text{máx}\{\|(x,y)\|_2, |z|\} = \text{máx}\{\sqrt{x^2+y^2}, |z|\} \qquad \forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$$

   Consideramos los hiperplanos:

   $$H_1 = \{((x,y),z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : z = 0\}$$
   $$H_2 = \{((x,y),z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : y = 0\}$$

   Claramente, H_1 y H_2 son hiperplanos de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$.

   - Calculemos la norma en H_1. Sea $((x,y),z) \in H_1$. Tenemos que $z = 0$, por lo que:

     $$\|((x,y),z)\| = \text{máx}\{\sqrt{x^2+y^2}, |z|\} = \text{máx}\{\sqrt{x^2+y^2}, 0\} = \sqrt{x^2+y^2}$$

     Por tanto, H_1 es isométricamente isomorfo a $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$, con isomorfismo isométrico dado por:

     $$\begin{array}{rccc} \Phi_1 : & H_1 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & ((x,y),0) & \longmapsto & (x,y) \end{array}$$

   - Calculemos la norma en H_2. Sea $((x,y),z) \in H_2$. Tenemos que $y = 0$, por lo que:

     $$\|((x,y),z)\| = \text{máx}\{\sqrt{x^2+y^2}, |z|\} = \text{máx}\{\sqrt{x^2+0^2}, |z|\} = \text{máx}\{|x|, |z|\}$$

     Por tanto, H_2 es isométricamente isomorfo a $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, con isomorfismo isométrico dado por:

     $$\begin{array}{rccc} \Phi_2 : & H_2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & ((x,0),z) & \longmapsto & (x,z) \end{array}$$

Como $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ y $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ no son isométricamente isomorfos, los hiperplanos H_1 y H_2 no son isométricamente isomorfos. Por tanto, el resultado es falso.

9. Sea X un espacio de Banach. Si todo hiperplano cerrado de X es proximinal, entonces X tiene dimensión finita.

   Si todo hiperplano cerrado de X es proximinal, como todo hiperplano cerrado $H \subset X$ es de la forma $H = \ker(\varphi)$ para algún funcional lineal y continuo $\varphi \in X^*$, tenemos que $\ker(\varphi)$ es proximinal y, por tanto, φ alcanza su norma. No obstante, no tenemos que $\dim X$ sea finita. Veamos que puede darse que la dimensión de X sea infinita.

   Para ver un contraejemplo, sea el espacio de Banach $X = l_2 = \left(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \|\cdot\|_2\right)$. Este espacio es de dimensión infinita, y veamos que todo funcional lineal y continuo $\varphi \in l_2^*$ alcanza su norma. Para ello, consideremos $\varphi \in l_2^*$. Como l_2^* es isométricamente isomorfo a l_2, existe $y \in l_2$ tal que:

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \qquad \forall x \in l_2$$

   Consideramos ahora el vector $u \in l_2$ normalizado dado por:

$$u(n) = \frac{y(n)}{\|y\|} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

   Claramente, $\|u\| = 1$, y además:

$$|\varphi(u)| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} u(n)y(n)\right| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y(n)}{\|y\|}y(n)\right| = \frac{1}{\|y\|}\left|\sum_{n=1}^{\infty} y(n)^2\right| = \frac{1}{\|y\|}\|y\|^2 = \|y\|$$

   Por tanto, φ alcanza su norma, y como φ era arbitrario, todo funcional lineal y continuo de l_2 alcanza su norma. Por tanto, todo hiperplano cerrado de l_2 es proximinal, y como $\dim(l_2) = \infty$, el resultado es falso.

   De hecho, en un ejercicio de las relaciones se probó que, para $1 < p < \infty$, todo funcional lineal y continuo de l_p alcanza su norma, y como $\dim(l_p) = \infty$, el resultado es falso para todo $1 < p < \infty$.

10. En el espacio vectorial Z de los polinomios reales de grado menor o igual que $N \in \mathbb{N}$, consideramos la norma

$$\|p\| = \sup\{|p(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall p \in Z$$

    Entonces, para cada $k \in \mathbb{N}$, existe una constante $M_k > 0$ tal que

$$|p(k)| \leqslant M_k\|p\| \qquad \forall p \in Z$$

    ¿puede haber una constante M que valga para todo $k \in \mathbb{N}$?

La primera afirmación es verdadera. Para ver que es cierta, consideramos el funcional de evaluación en $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{array}{rccc} \delta_k : & Z & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & p & \longmapsto & p(k) \end{array}$$

Este funcional es lineal, pero su acotación no es trivial, pues:

$$|\delta_k(p)| = |p(k)|$$

Como $k \in \mathbb{N}$, no tenemos una cota inmediata. No obstante, como se tiene $\dim(Z) = N + 1 < \infty$, tenemos que δ_k es inmediatamente continuo, y por tanto existe una constante $M_k > 0$ (que desconocemos) tal que:

$$|\delta_k(p)| = |p(k)| \leqslant M_k \|p\| \qquad \forall p \in Z$$

No obstante, la segunda afirmación es falsa. Consideramos el polinomio dado por $p(t) = t$. Claramente, $p \in Z$ y $\|p\| = \sup_{t \in [0,1]} |p(t)| = 1$. No obstante, para todo $k \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$|p(k)| = |k| = k$$

Por tanto, no existe una constante $M > 0$ tal que $|p(k)| \leqslant M\|p\|$ para todo $k \in \mathbb{N}$, y la segunda afirmación es falsa.