Ecuaciones Diferenciales II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

1. Movimiento de partículas en un fluido **5**
1.1. Problema a resolver 8
1.2. Ecuación integral de Volterra 9
1.2.1. El Teorema global 11
1.2.2. Demostración del Teorema global 14

2. Relaciones de Problemas **25**
2.1. Movimientos de partículas en un fluido 25

1. Movimiento de partículas en un fluido

Fijado un espacio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$, supondremos siempre que será abierto[1] y conexo[2].

Notación. A cada punto de Ω lo notaremos normalmente por $p \in \Omega$, que tendrá coordenadas:

$$p = (x, y, z)$$

El fluido suele llevar en cada punto una dirección y una velocidad, por lo que en cada punto $p \in \Omega$ tendremos un vector v que determina la velocidad del fluido, la cual supondremos conocida siempre. Este vector no tiene por qué ser constante sino que puede depender del tiempo, por lo que generalmente v será una función $v = v(t, p)$, es decir, $v : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}^3$ es una aplicación que a cada momento t y posición p le asigna un vector $v(t, p)$.

Si tenemos una partícula en el fluido que se mueve esta determinará una trayectoria, que podemos modelar como una curva parametrizada $p(t)$.

Podremos medir la velocidad de la partícula de dos formas: observando la velocidad de la partícula de forma interna (como el cuentakilómetros de un coche) o suponiendo que es una partícula que se deja llevar por la corriente y que su velocidad es la del fluido. La velocidad es la derivada de p.

En el segundo caso:

$$\dot{p}(t) = V(t, p(t))$$

Estamos ante una ecuación diferencial. Observemos que es un sistema de primer orden en forma normal, puesto que las coordenadas de p son funciones del tiempo. Si escribimos $V = (u, v, w)$ tenemos:

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t, x, y, z) \\ \dot{y} = v(t, x, y, z) \\ \dot{z} = w(t, x, y, z) \end{cases}$$

Un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que conocidas las velocidades del fluido determina la trayectoria de la partícula.

[1] Queremos estudiar movimientos de partículas en un fluido y pasan cosas no deseadas en la frontera.

[2] Por comodidad.

Observación. Observemos que en la notación primera hemos escrito explícitamente que $\dot{p}$ está en función de t. En la segunda notación estamos usando la notación habitual en las ecuaciones diferenciales, omitiendo la dependencia de t y pensándola de forma implícita. Podemos así reescribir la primera ecuación como:

$$\dot{p} = V(t, p)$$

Una vez denotamos $\dot{p}(t)$ estamos diciendo que es una solución concreta, por lo que será una variable dependiente de t. Sin embargo, cuando hablamos de $V(t, p)$ vemos p como una variable independiente.

Aparecerán sistemas autónomos, que representan fluidos estacionarios, donde la velocidad $V(t, p)$ no depende del tiempo.

Ejemplo. Comenzamos primero con dos ejemplos de fluidos estacionarios (el vector en cada posición no depende del tiempo):

- Consideramos $\Omega = \mathbb{R}^3$ y tomamos:

  $$V(t, x, y, z) = (0, 1, 0)$$

  Observamos que es un sistema autónomo (no depende del tiempo) y en el que la velocidad tampoco depende de la posición:

  $$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 1 \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

  Con lo que las soluciones son de la forma:

  $$\begin{aligned} x(t) &= c_1 \\ y(t) &= t + c_2 \\ z(t) &= c_3 \end{aligned}$$

  Es una familia que depende de 3 parámetros.

- Tomamos la ecuación de un vórtice lineal, $\Omega = \mathbb{R}^3$ y:

  $$V(t, x, y, z) = (y, -x, 0)$$

  Tenemos el sistema:

  $$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

  Es un sistema lineal homogéneo, que nos da las soluciones:

  $$z(t) = c_3$$

  Reducimos a una ecuación de segundo orden, derivando en la primera:

  $$\ddot{x} + \dot{x} = 0$$

Por lo que:

$$x(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \operatorname{sen}(t)$$

Y también tendremos:

$$y(t) = -c_1 \operatorname{sen}(t) + c_2 \cos(t)$$

Para ciertas condiciones iniciales $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Nuestro objetivo ahora es tratar de probar que el sistema:

$$\dot{p} = V(t, p)$$

con la condición inicial $p(t_0) = p_0$ tiene una solución. Luego trataremos de ver que en cada condición inicial tenemos una única solución. Demostraremos el Teorema de existencia y unicidad en cualquier número de dimensiones.

Notación. Notaremos a los puntos por $x = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ y al campo que define la ecuación diferencial por X, que será función de t y de x, que estará definido en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y exigiremos que sea abierto y conexo. Así, tendremos

$$\begin{array}{rccc} X: & D & \longrightarrow & \mathbb{R}^d \\ & (t,x) & \longmapsto & X(t,x) \end{array}$$

donde el campo X tiene d coordenadas:

$$X = (X_1, \ldots, X_d)$$

donde tratamos de resolver la ecuación $\dot{x} = X(t, x)$, que en realidad es un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = X_1(t, x_1, \ldots, x_d) \\ \vdots \\ \dot{x_d} = X_d(t, x_1, \ldots, x_d) \end{cases}$$

Supondremos siempre que X es una función continua.

Tomaremos $(t_0, x_0) \in D$ y queremos resolver el problema de condiciones iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \qquad x(t_0) = x_0$$

que consiste en resolver la ecuación diferencial superior mediante una solución que cumpla la condición enunciada.

1.1. Problema a resolver

Así, queremos resolver el problema:

$$\dot{x} = X(t, x) \tag{1.1}$$

con $X : D \to \mathbb{R}^d$ continuo, donde $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un subconjunto abierto y conexo. La condición de que X sea continuo es equivalente a que cada una de sus coordenadas

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

sea una aplicación continua.

Definición 1.1. Una **solución** del problema (1.1) es una aplicación $x : I \to \mathbb{R}^d$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo[3] de forma que $x(t) \subset D$:

i) $x(t)$ es derivable.

ii) $(t, x(t)) \in D \qquad \forall t \in I.$

iii) $\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \qquad \forall t \in I.$

Observación. Observemos que la definición de solución del problema planteado anteriormente es equivalente si sustituimos la condición de que x sea derivable por la condición de que x sea de clase 1, puesto que la condición *iii)* nos da automáticamente la continuidad de la derivada de x.
Así, la condición *i)* se puede sustituir por la condición *i')* $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$.

Ejemplo. Veamos un par de ejemplos para fijar las ideas:

1. Consideramos $\dot{x} = x^2$ y la aplicación $x(t) = \dfrac{1}{1-t}$. Vamos a analizar el marco del problema.

   Tenemos en este caso $d = 1$ y $D = \mathbb{R}^2$, puesto que tenemos el campo vectorial $X(t, x) = x^2$, que es continuo en todo $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

   Tenemos una primera solución en $I_1 =]-\infty, 1[$, $x_1(t) = \frac{1}{1-t}$.

   Y otra solución en $I_2 =]1, +\infty[$, $x_2(t) = \frac{1}{1-t}$.

   Son <u>dos soluciones distintas</u>, con la misma fórmula.

2. Consideramos ahora $\dot{x} = \frac{x}{t}$ y la aplicación $x(t) = -7t$.

   Tenemos $d = 1$ y el campo es $X(t, x) = \frac{x}{t}$, que tiene dos posibles dominios de definición:

   $$D_1 = \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}, \qquad D_2 = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$$

   Tenemos en realidad dos ecuaciones diferenciales.

   Para discutir una de sus soluciones, si consideramos:

   $$I_1 = \mathbb{R}^-, \qquad I_2 = \mathbb{R}^+$$

   tenemos que $x\big|_{I_1}$ es solución de la ecuación diferencial considerando el dominio D_1 y análogamente para $x\big|_{I_2}$ con el dominio D_2.

[3] No necesariamente abierto.

Para una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ definida en un dominio $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo, acompañaremos usualmente la ecuación de una **condición inicial**, que es fijar un punto $(t_0, x_0) \in D$ y obligaremos a la solución $x(t)$ de la ecuación que verifique la condición:

$$x(t_0) = x_0 \tag{1.2}$$

Cuando nos refiramos próximamente al problema (1.1) nos estaremos refiriendo usualmente a un problema de valores iniciales dado por la fórmula destacada y por la condición (1.2).

Ejemplo. En el primer ejemplo anterior tenemos para la condición inicial $x(0) = 1$ que la solución de $\dot{x} = x^2$ es $x :]-\infty, 1[\to \mathbb{R}$ dada por:

$$x(t) = \frac{1}{1-t}$$

Teorema 1.1 (Cauchy-Peano, Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales.)**.** *Todo problema de valores iniciales admite una solución definida en algún intervalo*[4] I *con* $t_0 \in \mathring{I}$.

Observación. El ejepmlo anterior nos demuestra que el Teorema de Cauchy-Peano no puede generalizarse a otro que resuelva el problema de forma global, puesto que tenemos una solución para la ecuación que no puede extenderse a todo $\mathbb{R}$; a pesar de ser el dominio de la ecuación todo $\mathbb{R}^2$.

Lo que venga a continuación estará destinado a probar el Teorema anterior.

El primer paso será pasar el problema de valores iniciales a una ecuación integral, puesto que la ecuación diferencial y el problema de condiciones iniciales son muy intuitivos pero difíciles de manipular desde el punto de vista de las demostraciones.

1.2. Ecuación integral de Volterra

La ecuación integral de Volterra es:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\ ds \tag{1.3}$$

Es la ecuación que obtenemos al integrar $\dot{x} = X(t, x)$. Así, a cada ecuación diferencial podemos asociarle una ecuación de Volterra y a cada ecuación de Volterra podemos asociarle una ecuación diferencial.

Ejemplo. El problema de valores iniciales $\dot{x} = 3x$ con la condición inicial $x(2) = -5$ tiene ecuación integral de Volterra:

$$x(t) = -5 + \int_{2}^{t} 3x(s)\ ds \tag{1.4}$$

Definición 1.2. Una solución de (1.3) es una función $x : I \to \mathbb{R}^d$ con I un intervalo que contiene a t_0 en su interior y:

[4] Por tanto, el Teorema nos da una solución local.

i) x es continua.

ii) $(t, x(t)) \in D \qquad \forall t \in I$.

iii) Se cumple la condición (1.3) para todo $t \in I$.

Ejemplo. Una solución de la ecuación integral de Volterra (1.4) es:

$$x(t) = -5e^{3(t-2)} \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

La estrategia será enunciar los Teoremas como ecuaciones diferenciales y realizar sus demostraciones con ecuaciones integrales.

Proposición 1.2. *Los problemas* (1.1) *y* (1.3) *son equivalentes*[5].

Demostración. Supondremos que tenemos una solución de una ecuación y tendremos que probar entonces que tenemos una solución de la otra ecuación. Basta aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo en un caso y la Regla de Barrow en el otro.

- Supuesto que $x : I \to \mathbb{R}^d$ es solución de la ecuación (1.1), tenemos entonces que x es una aplicación derivable que verifica[6]:

  $$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \qquad \forall t \in I$$

  Por lo que $\dot{x}$ es una primitiva de la aplicación $t \mapsto X(t, x(t))$ definida en I, que sabemos que es continua. La Regla de Barrow nos dice entonces que fijado $t_0 \in I$ se tiene:

  $$\int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds = x(t) - x(t_0) = x(t) - x_0 \qquad \forall t \in I$$

  Y despejando obtenemos (1.3).

- Supuesto que $x : I \to \mathbb{R}^d$ es solución de la ecuación (1.3), tenemos en este caso que x es una aplicación continua que verifica:

  $$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds \qquad \forall t \in I$$

  Como x es continua, la aplicación $s \mapsto X(s, x(s))$ y de dominio I será también continua. Bajo estas hipótesis, el Teorema Fundamental del Cálculo nos dice que la aplicación

  $$t \longmapsto \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds$$

  de dominio I es derivable, por lo que también lo será la aplicación x, y su derivada es:

  $$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \qquad \forall t \in I$$

  Hemos obtenido que x es solución de (1.1), y es claro que $x(t_0) = x_0$.

□

[5] Es decir, tienen las mismas soluciones.

[6] Observemos que la condición *ii)* en el primer caso es equivalente a la condición *ii)* del segundo caso.

1.2.1. El Teorema global

La estrategia a seguir será probar un Teorema global con hipótesis extra para luego retringir el problema y obtener la demostración del Teorema local.

Teorema 1.3 (global de existencia)**.** *Sea* $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ *para ciertos* $a, b \in \mathbb{R}$ *y* $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ *continuo de forma que*

$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leqslant M \qquad \forall (t, x) \in D$$

Entonces (1.1) *tiene una solución definida en todo el intervalo* $]a, b[$.

Ejemplo. Familiaricémonos con este problema.

1. Consideramos el sistema

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dfrac{x_2}{1 + x_2^2 + x_1^2} + t \operatorname{sen}(x_1), & x_1(0) = 3 \\ \\ \dot{x}_2 = e^{-x_1^2} + \sqrt{1 - t^2}, & x_2(0) = 7 \end{cases}$$

   Aquí tenemos $d = 2$, $]a, b[=]-1, 1[$, con $X :]-1, 1[\times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ continuo.

   Veamos que X está acotado, como todas las normas son equivalentes, tomaremos la norma del máximo: $\|(x_1, x_2)\| = \text{máx}\{|x_1|, |x_2|\}$:

$$\|X(t, x)\| \leqslant \text{máx}\{2, 2\} = 2 \qquad \forall (t, x) \in]-1, 1[\times \mathbb{R}^2$$

   Tenemos además que $t_0 = 0 \in]a, b[$ así como que $x_0 = (3, 7) \in \mathbb{R}^2$.

2. Veamos ahora que la hipótesis de que X es acotado es esencial, puesto que el problema de valores iniciales $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$ con solución

$$x(t) = \frac{1}{1 - t}, \qquad t \in]-3, 1[$$

   donde tenemos[7] $D =]-3, 3[\times \mathbb{R}$. Próximamente veremos que esta solución es la única para la condición inicial enunciada, lo que nos garantizará que esta solución no puede extenderse a otra que esté definida en $]-3, 3[$.

Vamos a ver a continuación que el Teorema 1.1 puede deducirse a partir del Teorema 1.3, por lo que nuestro futuro trabajo será probar este segundo. Para probar esta relación usaremos el Lema del Pegado, que ya conocíamos de Topología I.

Lema 1.4. *Sean* X, Y *espacios métricos y* $F_1, F_2 \subset X$ *dos cerrados de forma que* $F_1 \cup F_2 = X$. *Sean* $f_i : F_i \to Y$ *continuas para* $i \in \{1, 2\}$ *verificando que* $f_1 = f_2$ *en* $F_1 \cap F_2$. *Entonces la función* $f : X \to Y$ *dada por:*

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & si\ x \in F_1 \\ f_2(x) & si\ x \in F_2 \end{cases}$$

está bien definida y es continua.

[7] Podríamos haber tomado $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, pero queremos verificar las hipótesis del Teorema.

Proposición 1.5. *Del Teorema 1.3 puede deducirse el Teorema 1.1.*

Demostración. Como D es abierto y $(t_0, x_0) \in D$, podemos tomar $a, b > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leqslant a, \|x - x_0\| \leqslant b\} \subset D$$



Nuestro objetivo es tratar de extender el campo X definido en el conjunto D a toda la banda $]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d$. Inicialmente podríamos pensar en asignarle el valor 0 fuera de la región R, pero entonces podríamos perder la continuidad del campo X. Este problema tiene fácil arreglo, pues basta reservar una zona en la que "unir" el campo X con la función constantemente igual a cero de forma continua. Para ello, tomaremos $0 < b^* < b$ y consideraremos:

$$R^* = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leqslant a, \|x - x_0\| \leqslant b^*\} \subset D$$



Definimos $\psi :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ continua de forma que:

$$\begin{gathered} \psi = 1 \quad \text{en} \quad \|x - x_0\| < b^* \\ \psi = 0 \quad \text{en} \quad \|x - x_0\| > b \\ 0 \leqslant \psi \leqslant 1 \quad \text{siempre} \end{gathered}$$

Y definimos el campo modificado $X^* :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ dado por:

$$X^*(t,x) = \begin{cases} \psi(t,x) \cdot X(t,x) & \text{si } \|x - x_0\| \leqslant b \\ 0 & \text{si } \|x - x_0\| > b \end{cases}$$

Vemos que $X(t,x) = X^*(t,x)$ para todo $(t,x) \in R^*$.

Buscamos aplicar ahora el Teorema 1.3 a $\dot{x} = X^*(t,x)$, $x(t_0) = x_0$. Falta comprobar la contiuidad de X^* y su acotación.

- Para la contuidad de X^*, si consideramos en el espacio $]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d$:

  $$F_1 = \{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a, \|x - x_0\| \leqslant b\}$$
  $$F_2 = \{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a, \|x - x_0\| \geqslant b\}$$

  Vemos que definiendo $f_1 = \psi \cdot X$, $f_2 = 0$ se tiene que[8] $f_1 = f_2$ en $F_1 \cap F_2$. Aplicando el Lema 1.4 obtenemos que la función X^* es continua.

- X es continuo y $R \subset D$ es compacto, por lo que:

  $$\exists M > 0 : \|X(t,x)\| \leqslant M \qquad \forall (t,x) \in R$$

  Como $\psi \leqslant 1$ obtenemos que X^* es también acotada a partir de su definición.

Aplicando ahora el Teorema 1.3 obtenemos que existe $x :]t_0 - a, t_0 + a[\to \mathbb{R}^d$ que es solución del problema:

$$\dot{x}(t) = X^*(t, x(t)), \qquad x(t_0) = x_0$$

Vemos que $x(t)$ no puede (quizás) ser solución del problema planteado con el campo X en el dominio D.



Sin embargo, sí que nos podemos restringir a un entorno en el que sea solución. Tenemos que:

$$\dot{x}(t) = X(t,x) = X^*(t,x) \quad \text{si} \quad \|x - x_0\| < b^*$$
$$x(t_0) = x_0, \qquad x(t) \quad \text{continua}$$

[8] Por la contiuidad de ψ tenemos que $\psi(x) = 0$ cuando $\|x - x_0\| = b$.

Y además:

$$\exists \delta > 0 : \|x(t) - x_0\| < b^* \qquad \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$$

Con lo que $x\big|_{[t_0-\delta,t_0+\delta]}$ sí que es solución de $\dot{x} = X(t,x)$, $x(t_0) = x_0$. □

1.2.2. Demostración del Teorema global

Nuestro interés será ahora probar el Teorema 1.3. Recordando las hipótesis, tenemos una función $X :]a,b[\times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continuo y acotado:

$$\exists M : \|X(t,x)\| \leqslant M \qquad \forall (t,x) \in]a,b[\times \mathbb{R}^d$$

Así como $t_0 \in]a,b[$ y $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Queremos llegar a probar que existe una solución definida en $]a,b[$ de $\dot{x} = X(t,x)$, $x(t_0) = x_0$.

La demostración se dividirá en 3 etapas:

1 - Construcción de soluciones aproximadas. Fijado $\varepsilon > 0$, definiremos $x_\varepsilon :]a,b[\to \mathbb{R}^d$ continua de forma que se verifica[9]:

$$\left\| x_\varepsilon - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds \right\| \leqslant M\varepsilon \qquad \forall t \in]a,b[$$

Estas funciones x_ε serán soluciones aproximasdas a la ecuación de Volterra que estamos buscando, y seguiremos el método de Tonelli para construirlas.

2 - Argumento de compacidad (Ascoli-Arzelà). En esta etapa queremos pasar al límite de una sucesión de aproximaciones x_{ε_n}, que queremos que tengan límite, para lo que nos serán de especial relevancia los conjuntos compactos en un espacio de funciones. La convergencia que nos interesará será la convergencia uniforme.

3 - Paso al límite. Tendiendo n a infinito obtendremos la solución como límite de la sucesión construida.

Ejemplo. Consideramos $x' = \operatorname{sen} x$, $x(0) = \frac{\pi}{2}$, $[0,2]$ y $\varepsilon = 1$. La solución aproximada sería:

$$x_1(t) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} & \text{si } t \in [0,1] \\[2ex] \dfrac{\pi}{2} + \displaystyle\int_0^{t-1} \operatorname{sen} x_1(s)\, ds = \dfrac{\pi}{2} + \int_0^{t-1} ds = \dfrac{\pi}{2} + t - 1 & \text{si } t \in [1,2] \end{cases}$$

[9] La constante $M\varepsilon$ es por comodidad, se podría haber sustituido por ε.

1 - Construcción de soluciones aproximadas

Sea $\varepsilon > 0$ cumpliendo $\varepsilon < \text{mín}(t_0 - a, b - t_0)$ (así $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \subset]a, b[$), definimos $x_\varepsilon :]a, b[\to \mathbb{R}^d$ dada por:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]t_0 + \varepsilon, b[\\ \\ x_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \varepsilon[\end{cases}$$

Es fácil ver que x_ε está bien definida y que es continua, pues la definición en cierto intervalo depende de la definición de la función en otro intervalo y el intervalo inicial a considerar es $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, donde las soluciones aproximadas comienzan tomando un valor de x_0.



Veamos ahora que son soluciones aproximadas, es decir, que:

$$\|E(t)\| = \left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds \right\| \leqslant M\varepsilon \qquad \forall t \in]a, b[$$

Para ello:

- Si $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ tenemos que:

$$\|E(t)\| = \left\| \int_{t_0}^{t} X(s, x_0)\, ds \right\| \leqslant \left| \int_{t_0}^{t} \|X(s, x_0)\|\, ds \right| \leqslant M|t - t_0| \leqslant M\varepsilon$$

- Si $t \in]t_0 + \varepsilon, b[$:

$$\begin{aligned} \|E(t)\| &= \left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds - \int_{t-\varepsilon}^{t} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds \right\| \\ &= \left\| \int_{t-\varepsilon}^{t} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds \right\| \leqslant \int_{t-\varepsilon}^{t} \|X(s, x_\varepsilon(s))\|\, ds \leqslant M\varepsilon \end{aligned}$$

2 - Argumento de compacidad (Ascoli-Arzelà)

Abstrayendo el problema actual a un marco general, trabajaremos con un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y una sucesión de funciones $f_n : I \to \mathbb{R}^d$. Sea $f : I \to \mathbb{R}^d$, diremos que $f_n \to f$ **converge uniformemente** si:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : n > N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon \qquad \forall t \in I$$

La idea que hay detrás es que para cada error ε existe un término suficientemente avanzado de forma que toda la sucesión se queda dentro de un "tubo" de radio ε alrededor de la gráfica de la función f que aproximamos:



Por otra parte, decimos que $f_n \to f$ **converge puntualmente** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \forall t \in I \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; : \;\; n > N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon$$

Con lo que la constante N que encontramos cada vez depende ahora del punto $t \in I$ en el que nos encontramos.

Ejemplo. Sea $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ cuya gráfica es para cada $n \in \mathbb{N}$ la de un triángulo de base $1/n$, altura 1 y que vale 0 en el resto de su dominio:



Tenemos que $f_n \to 0$ de forma puntual. Tomando un tubo de cualquier radio menor que 1 es claro que f_n no converge uniformemente a f.
Formalmente, por reducción al absurdo, si $f_n \to f$ converge uniformemente, aplicamos la definición para (sirve cualquier valor $0 < \varepsilon < 1$) $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Observamos que:

$$\|f_n(t)\| < \frac{1}{2} \qquad n \geqslant N \quad \forall t \in [0,1]$$

Sin embargo, tenemos que $f_n(1/2n) = 1$, lo que contradice que $f_n \to f$ uniformemente.

El interés en trabajar con la convergencia uniforme en lugar de con la convergencia puntual es que si tenemos una sucesión de funciones continuas $\{f_n\}$ que converge uniformemente a una función f tendremos entonces que f ha de ser una función continua.

Ejemplo. La convergencia puntual de funciones continuas a otra función no necesariamente mantiene la continuidad. Por ejemplo, vemos que la sucesión de funciones $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f_n(t) = t^n$$



Figura 1.1: Gráficas de las funciones f_n para $n \leqslant 7$.

Tenemos que para $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0,1[\\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

$f_n \to f$ puntualmente, con f_n continua para cada $n \in \mathbb{N}$ y f no es continua.

Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \to \mathbb{R}^d$ es **uniformemente de Cauchy** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} : n, m \geqslant N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n(t) - f_m(t)\| < \varepsilon$$

Recordemos además que una sucesión de funciones $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy si y solo si $\{f_n\}$ converge uniformemente a una función f.

Para realizar de forma cómoda el trabajo posterior, conviene tener claro el concepto de sucesión **parcial** de una sucesión de funciones. Dada una aplicación $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente, se dice que la sucesión $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de la sucesión $\{f_n\}$. Además, recordemos que si tenemos una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ y queremos extraer de esta una sucesión parcial mediante una aplicación estrictamente creciente $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tenemos que considerar entonces[10]:

$$\{f_{\sigma(\tau(n))}\}$$

Ejercicio 1.2.1. Si $\sigma, \tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ son dos funciones estrictamente crecientes con $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$, tenemos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$ y $\sigma(n) \geqslant \tau(n)$.

La condición $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$ se traduce a que:

$$\forall n \in \mathbb{N} \;\; \exists m \in \mathbb{N} \quad : \quad \sigma(n) = \tau(m)$$

[10]Uno podría estar tentado a escribir $\{f_{\tau(\sigma(n))}\}$, pero tras una tarea de reflexión se daría cuenta de que está equivocado.

Para ver que $\sigma(n) \geqslant \tau(n)$, dado $n \in \mathbb{N}$ tenemos que existe $m_n \in \mathbb{N}$ de forma que $\sigma(n) = \tau(m_n)$. ¿Puede ser $m_n < n$? No, ya que para cada $0 \leqslant i < n$ debemos poder encontrar $m_i \in \mathbb{N}$ cumpliendo que $\sigma(i) = \tau(m_i)$ con σ y τ estrictamente crecientes, por lo que:

$$\sigma(n) > \sigma(n-1) > \ldots > \sigma(1) > \sigma(0)$$
$$\tau(m_n) > \tau(m_{n-1}) > \ldots > \tau(m_1) > \tau(m_0)$$

Donde para la primera cadena de desigualdades hemos usado que σ es estrictamente creciente y ahora tenemos que τ es estrictamente creciente, por lo que:

$$m_n > m_{n-1} > \ldots > m_1 > m_0 \geqslant 0$$

Así, debemos tener forzosamente $m_n \geqslant n$. En este punto, vemos que:

$$\sigma(n) = \tau(m_n) \geqslant \tau(n)$$

por ser τ estrictamente creciente. Ahora, si consideramos la aplicación $\delta : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por la correspondencia $n \longmapsto m_n$ (δ está bien definida por ser τ estrictamente creciente y por tanto inyectiva) acabamos de probar que δ es estrictamente creciente, así como que $\tau(\delta(n)) = \tau(m_n) = \sigma(n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$ por definición de δ, con lo que:

$$\{f_{\tau(\delta(n))}\} = \{f_{\sigma(n)}\}$$

y así tenemos que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$.

Extraer una parcial que conerge uniformemente

Nos interesa ahora responder a la pregunta de dada una sucesión de funciones, ¿cuándo podemos extraer una parcial que converja uniformemente? La respuesta en $\mathbb{R}$ es clara, basta con que la sucesión esté acotada para poder extraer una sucesión parcial convergente.

Definición 1.3. Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \to \mathbb{R}^d$ está **uniformemente acotada** si:

$$\exists M > 0 \quad : \quad \|f_n(t)\| \leqslant M \qquad \forall t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo. A partir del ejemplo anterior, vemos que tomando $M = 1$ tenemos que $\{f_n\}$ es uniformemente acotada, pero no puede tener una parcial que converja uniformemente, pues si existiera una parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ convergente uniformemente tendríamos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\} \to f^*$ uniformemente para cierta función f^* continua en $[0,1]$. En dicho caso, tendríamos que $f_n \to f^*$ puntualmente, pero también $f_n \to f$ puntualmente, por lo que $f = f^*$, pero tenemos que f no es continua y las funciones $f_{\sigma(n)}$ sí lo son.

Un ejemplo análogo se podría haber hecho para la sucesión de funciones $\{f_n\}$ cuyas gráficas son la del triángulo cuyo área tiende a 0, que vimos hace dos ejemplos.

Definición 1.4. Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \to \mathbb{R}^d$ es **equicontinua**[11] si

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 \quad : \quad \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \quad \text{si} \quad |t-s| < \delta \quad \forall t, s \in I \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

[11] En realidad el nombre debería ser equi-uniformemente-continua.

Ejemplo. Consideramos $f_n, g_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < n \\ t - n & \text{si } t \in [n, n+1] \\ 1 & \text{si } t > n+1 \end{cases} \qquad g_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ nt & \text{si } t \in [0, 1/n] \\ 1 & \text{si } t > 1/n \end{cases}$$



Vemos que $\{f_n\}$ es equicontinua. Para ello, basta ver que f_n es lipschitziana para $M = 1$, es decir, que:

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leqslant |t - s| \qquad \forall t, s \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Para ello, bien distinguimos (muchos) casos o notamos que si definimos:

$$h_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [n, n+1] \\ 0 & \text{si } t < n \text{ ó } t > n+1 \end{cases}$$

tenemos que:

$$f_n(t) = \int_0^t h_n(s)\, ds \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

Y así obtenemos fácilmente que:

$$\|f_n(s) - f_n(t)\| = \left\| \int_s^t h(\tau)\, d\tau \right\| \leqslant |t - s|$$

Veamos ahora que $\{g_n\}$ no es equicontinua. Para ello, si fuese equicontinua, para $\varepsilon = 1/3$ existiría $\delta > 0$ tal que

$$|g_n(t) - g_n(s)| < \frac{1}{3} \qquad \forall t, s \in \mathbb{R}, \quad |t - s| < \delta$$

Sin embargo, tenemos que:

$$\left| g_n\left(\frac{1}{n}\right) - g_n(0) \right| = 1$$

Y existirá $N \in \mathbb{N}$ de forma que para $n \geqslant N$ se tenga $\frac{1}{n} < \delta$, con lo que tendremos:

$$1 = \left| g_n\left(\frac{1}{n}\right) - g_n(0) \right| < \frac{1}{3}$$

Hemos llegado a una contradicción.

Teorema 1.6 (Ascoli-Arzelà). *Sea I un intervalo acotado y sea $f_n : I \to \mathbb{R}^d$ una sucesión de funciones uniformemente acotada y equicontinua, entonces existe una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ que converge uniformemente.*

Demostración. La demostración se divide en varias partes:

1. Primero buscaremos $D \subset I$ denso y una parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ de forma que $\{f_{\sigma(n)}(t)\}$ es convergente $\forall t \in D$.

   Tomaremos $D = I \cap \mathbb{Q}$ denso y numerable. Así, podemos escribir:

   $$D = \{t_n : n \geqslant 0\}$$

   Tenemos la sucesión $\{f_n(t_0)\}$, que por hipótesis es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^d$. Así, existe $\sigma_0 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente de forma que:

   $$\{f_{\sigma_0(n)}(t_0)\} \text{ es convergente en } \mathbb{R}^d$$

   Ahora, $\{f_{\sigma_0(n)}(t_1)\}$ es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^d$, por lo que existe también $\sigma_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente de forma que:

   $$\{f_{\sigma_1(n)}(t_1)\} \text{ es convergente} \quad \text{y} \quad \sigma_1(\mathbb{N}) \subset \sigma_0(\mathbb{N})$$

   Por lo que $\{f_{\sigma_1(n)}\}$ es convergente en t_1 y en t_0, como parcial de $\{f_{\sigma_0(n)}\}$.

   Así, para cada $m \in \mathbb{N}$ podemos obtener $\sigma_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente con $\sigma_m(\mathbb{N}) \subset \sigma_{m-1}(\mathbb{N})$ y de forma que la sucesión $\{f_{\sigma_m(n)}\}$ es convergente en $t_0, t_1, \ldots, t_m$.

   Hemos obtenido:

   $$\begin{array}{cccccl} f_{\sigma_0(0)} & f_{\sigma_0(1)} & \cdots & f_{\sigma_0(n)} & \cdots & \text{convergente en } t_0 \\ f_{\sigma_1(0)} & f_{\sigma_1(1)} & \cdots & f_{\sigma_1(n)} & \cdots & \text{convergente en } t_0, t_1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \\ f_{\sigma_n(0)} & f_{\sigma_n(1)} & \cdots & f_{\sigma_n(n)} & \cdots & \text{convergente en } t_0, t_1, \ldots, t_n \end{array}$$

   Y si tomamos ahora la sucesión que obtenemos observando la diagonal de la "matriz" superior, podemos considerar ahora la sucesión $\{f_{\sigma_n(n)}\}$, tenemos que es una parcial de $\{f_n\}$, puesto que la aplicación $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por:

   $$\sigma(n) = \sigma_n(n)$$

   es estrictamente creciente, puesto que para $m \in \mathbb{N}$ tenemos que:

   $$\sigma(m+1) = \sigma_{m+1}(m+1) \geqslant \sigma_{m+1}(m) \geqslant \sigma_m(m) = \sigma(m)$$

   Con $\{f_{\sigma(n)}\}_{n \geqslant m}$ parcial de $\{f_{\sigma_m(n)}\}_{n \geqslant m}$ para cada $m \in \mathbb{N}$, con lo que es convergente en todo punto de D.

2. Ahora vamos a ver que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es uniformemente de Cauchy. Para ello, dado $\varepsilon > 0$, buscamos $N \in \mathbb{N}$ de forma que si $n, m \geqslant N$ obtengamos que:

   $$\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon \qquad \forall t \in I$$

Fijado $\varepsilon > 0$, como $\{f_n\}$ es equicontinua, existe $\delta > 0$ tal que si $t, s \in I$ con $|t - s| < \delta$ tenemos entonces que:

$$\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall n \geqslant 0$$

Podemos observar que para cualquier $r > 0$ tenemos que:

$$\overline{I} \subset \bigcup_{t \in D} B(t, r)$$

Y como $\overline{I}$ es compacto (por ser I acotado) podemos extraer un subrecubrimiento finito del mismo. Si tomamos $r = \delta$, esto nos permite obtener $D_\delta \subset D$ finito tal que para todo $t \in I$ existe $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$.

Ahora, tenemos que $\{f_{\sigma(n)}(s)\}$ es de Cauchy para cada $s \in D_\delta$, por ser convergente para $s \in D$, de donde para $\varepsilon/3$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n, m \geqslant N$ tenemos que:

$$\|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall s \in D_\delta$$

En definitiva, para ε tomamos el N recién encontrado y para cada $t \in I$ existirá $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$, de donde:

$$\begin{aligned}\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| \leqslant \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| + \|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| \\ + \|f_{\sigma(m)}(s) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon\end{aligned}$$

□

Observación. En realidad el Teorema sigue siendo cierto con saber que para cada $t \in I$ existe M_t con $\|f_n(t)\| \leqslant M_t$. Más aún, basta con que $\{f_n(t_0)\}$ esté acotada.

Ejemplo. Notemos que en el enunciado del Teorema exigimos que I sea un intervalo acotado, pues si no lo fuera el Teorema es mentira. Para verlo, si tomamos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ del ejemplo anterior tenemos que es una sucesión uniformemente acotada y equicontinua pero que no admite una parcial que converja uniformemente.

Continuando con la demostración del Teorema 1.3, para

$$0 < \varepsilon < \text{mín}\{t_0 - a, b - t_0\} = d$$

Hemos construido $x_\varepsilon :]a, b[\to \mathbb{R}^d$ por el método de Tonelli, obteniendo:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]t_0 + \varepsilon, b[\\ \\ x_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \varepsilon[\end{cases}$$

Que están bien definidas, son continuas y cumplen la condición inicial. No van a cumplir la ecuación diferencial que tratamos de resolver, pero sí sabemos que "casi" la cumplen, ya que:

$$\left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds \right\| \leqslant M\varepsilon \qquad \forall t \in]a, b[$$

Lo que haremos será tomar una sucesión $\{\varepsilon_n\}$ decreciente y convergente a 0, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\varepsilon_n < d$ para todo $n \geqslant 0$. Ahora, se demostró en el pasado que la sucesión $\{x_{\varepsilon_n}\}$ no tiene por qué converger. Sin embargo, vamos a tratar de buscar una parcial $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ para así obtener una sucesión $\{x_{\varepsilon_n}\}$ que converge uniformemente.

Para ello, nuestra intención es aplicar el Teorema **??**, por lo que buscamos probar que $\{x_{\varepsilon_n}\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.

Tomando $D = \text{máx}\{t_0 - a, b - t_0\}$, vemos que la sucesión es uniformemente acotada[12]:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t)\| \leqslant \|x_0\| + MD \qquad \forall t \in \,]a, b[$$

Demostración. Para demostrar la desigualdad, lo vemos en cada intervalo de definición de x_ε:

- Para $t \in [t_0 - \varepsilon_n, t_0 + \varepsilon_n]$ es evidente.
- Para $t \in \,]t_0 + \varepsilon_n, b[$ tenemos que:

$$\begin{aligned}\|x_{\varepsilon_n}(t)\| &\leqslant \|x_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t-\varepsilon_n} X(s, x_{\varepsilon_n}(s))\, ds \right\| \leqslant \|x_0\| + \int_{t_0}^{t-\varepsilon_n} \|X(s, x_{\varepsilon_n}(s))\|\, ds \\ &\leqslant \|x_0\| + M(t - \varepsilon_n - t_0) \leqslant \|x_0\| + M(b - t_0) \leqslant \|x_0\| + MD\end{aligned}$$

- Para $t \in \,]a, t_0 - \varepsilon_n[$

□

Para ver ahora que la sucesión es equicontinua, veamos que[13]:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| \leqslant M|t - s| \qquad \forall t, s \in \,]a, b[\,, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Demostración. Tenemos dos puntos t y s, tenemos que distinguir bastantes casos:

- Si $t, s \in [t_0 - \varepsilon_n, t_0 + \varepsilon_n]$ es evidente, pues $x_{\varepsilon_n}(t) = x_{\varepsilon_n}(s)$.
- Si $t, s \in \,]t_0 + \varepsilon_n, b[$ tenemos que:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| = \left\| \int_{s-\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma))\, d\sigma \right\| \leqslant \left| \int_{s-\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} \|X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma))\, d\sigma \right| \leqslant M|t - s|$$

- Si $t \in \,]t_0 + \varepsilon_n, b[$ y $s \in \,]a, t_0 - \varepsilon_n[$:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| = \left\| \int_{s+\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma))\, d\sigma \right\| \leqslant M(t - s - 2\varepsilon_n) \leqslant M(t - s)$$

- Continuar distinguiendo casos.

□

[12] Aquí usamos que $e = vt$ es una cota máxima para el espacio que puede recorrerse en tiempo t a un máximo de velocidad v.

[13] La idea es que entre el instante t y el s nos hemos movido de alguna forma por el fluido, con lo que el espacio recorrido es menor o igual que la velocidad por el tiempo $e \leqslant tv_{max}$.

3 - Paso al límite

En definitiva, aplicando el Teorema **??** hemos encontrado una sucesión parcial $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}\}$ de sucesiones aproximadas que converge uniformemente. Esta sucesión tendrá un límite, al que llamaremos $x :]a, b[\to \mathbb{R}^d$, que sabemos que es continua, puesto que es límite uniforme de funciones continuas.

Tenemos la desigualdad:

$$\left\| x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s))\ ds \right\| \leqslant M\varepsilon_{\sigma(n)}$$

Vemos que $\{M\varepsilon_{\sigma(n)}\} \to 0$, y para estudiar el límite de la izquierda basta estudiar el límite de:

$$\xi_n = x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s))\ ds$$

En primer lugar observamos que $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t)\} \to x(t)$, puesto que la convergencia uniforme implica la puntual. Fijado $t \in]a, b[$, queremos probar que:

$$\left\{ \int_{t_0}^{t} X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s))\ ds \right\} \to \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\ ds \tag{1.5}$$

Para ello, recordamos el Teorema:

Teorema 1.7 (Convergencia dominada)**.** *Tenemos una sucesión de funciones integrables $f_n : I \to \mathbb{R}^d$ con $f_n(t) \to f(t)$ en casi todo punto $t \in I$ y de forma que existe una función $\varphi : I \to \mathbb{R}$ integrable tal que:*

$$\|f_n(t)\| \leqslant \varphi(t) \qquad \textit{para casi todo } t \in I$$

Entonces, f es integrable y:

$$\int_I f = \lim \int_I f_n$$

Con vistas a aplicarlo, tomamos $I = [t_0, t]$ si $t > t_0$ ó $I = [t, t_0]$ si $t \leqslant t_0$ y:

$$f_n(s) = X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Que son integrables, pues son continuas en un intervalo compacto, como composición de funciones continuas. Además, es claro que:

$$\{f_n(s)\} \to f(s) = X(s, x(s)) \qquad \forall s \in I$$

Tomando $\varphi(s) = M \quad \forall s \in I$ podemos aplicar el Teorema de la convergencia dominada, obteniendo (1.5). En definitiva, tenemos que:

$$\{\xi_n\} \to x(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\ ds = \xi$$

de donde $\{\|xi_n\|\} \to \|\xi\|$, por lo que $\|\xi\| = 0$ en vista de $\{M\varepsilon_{\sigma(n)}\} \to 0$, de donde:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\ ds$$

2. Relaciones de Problemas

2.1. Movimientos de partículas en un fluido

Ejercicio 2.1.1. Tratamos de resolver el sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

de donde obtenemos:

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t \\ y(t) &= -c_1 \operatorname{sen} t + c_2 \cos t \\ z(t) &= c_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

para ciertas constantes $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$. El ejercicio consiste en demostrar que la curva $\alpha = (x, y, z)$ tiene como traza una circunferencia.

Para ello, vemos por una parte que la curva $\alpha = (x, y, z)$ está contenida en el plano $P(z = 3)$ y que esta misma cumple:

$$x^2(t) + y^2(t) = c_1^2 + c_2^2 \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

Queda claro que $\operatorname{tr} \alpha$ queda contenida en la circunferencia de centro 0 y radio $\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$. Veamos ahora que α recubre toda la circunferencia. Para ello, recordamos que todos los puntos de la circunferencia son de la forma:

$$\begin{aligned} x(t) &= r \cos(t + \theta) \\ y(t) &= r \operatorname{sen}(t + \theta) \end{aligned}$$

para ciertos $r > 0$ y $\theta \in \mathbb{R}$. Buscamos relacionar r y θ con c_1 y c_2:

$$\begin{aligned} c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t &= r \cos(t + \theta) \\ &= r(\cos t \cos \theta - \operatorname{sen} t \operatorname{sen} \theta) \\ &= r \cos t \cos \theta - r \operatorname{sen} t \operatorname{sen} \theta \end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{cases} c_1 = r \cos \theta \\ c_2 = -r \operatorname{sen} \theta \\ c_1^2 + c_2^2 = r^2(\cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta) = r^2 \end{cases} \implies r = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

Despejando y suponiendo que $(c_1, c_2) \neq (0,0)$:

$$\cos\theta = \frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{-c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \tag{2.1}$$

Vemos que el vector:

$$\left(\frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}, \frac{-c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}\right)$$

Tiene módulo 1, por lo que podemos encontrar $\theta \in \mathbb{R}$ verificando 2.1.

Otra forma: Buscamos ver que:

$$\begin{cases} c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t = r\cos(t+\theta) \\ -c_1 \operatorname{sen} t + c_2 \cos t = r \operatorname{sen}(t+\theta) \end{cases}$$

Tomando $r = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ y $\theta \in \mathbb{R}$ verificando:

$$\cos\theta = \frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{-c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}$$

Vemos que se da la igualdad.

Ejercicio 2.1.2. Sean $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ dadas por:

$$f_n(t) = \sqrt{t + \frac{1}{n}} \qquad \forall t \in [0,1], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Probar que $\{f_n\}$ es equicontinua.

Para ello, si miramos a la definición, buscamos acotar la diferencia:

$$f_n(t) - f_n(s) = \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{s + \frac{1}{n}}$$

Por ε sabiendo acotar $t - s$ por δ. Si multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$|f_n(t) - f_n(s)| = \frac{|t-s|}{\sqrt{t + \frac{1}{n}} + \sqrt{s + \frac{1}{n}}}$$

Ahora:

$$|f_n(t) - f_n(s)| = \frac{|t-s|^{1/2}}{\sqrt{t + \frac{1}{n}} + \sqrt{s + \frac{1}{n}}} |t-s|^{1/2}$$

Tenemos que:

$$|t-s| \leqslant t + s \quad \Longrightarrow \quad |t-s|^{1/2} \leqslant \sqrt{t} + \sqrt{s}$$

De donde podemos acotar el primer término del producto anterior por 1, de donde:

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leqslant |t-s|^{1/2} \qquad \forall t, s \in [0,1], \quad \forall n \geqslant 0$$

Ahora, para $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon^2$ tenemos que si $|t-s| < \delta$ entonces $|t-s|^{1/2} < \varepsilon$, de donde:

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leqslant |t-s|^{1/2} < \varepsilon \qquad \forall n \geqslant 0$$

Ejercicio 2.1.3. Probar que la sucesión anterior converge uniformemente.

Ejercicio 2.1.4. Probar que la única función que verifica:

$$|f(t) - f(s)| \leqslant L|t - s|^{\alpha}$$

con $\alpha > 1$ son las constantes.

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función verificando:

$$|f(t) - f(s)| \leqslant L|t - s|^{\alpha} \qquad \forall t, s \in I$$

con $L > 0$ y $\alpha > 1$ tenemos entonces que para $h \neq 0$:

$$\left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| \leqslant L|h|^{\alpha - 1}$$

Por lo que $\exists \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(t+h)-f(t)}{h} = 0$, luego f tiene que ser constante.

Ejercicio 2.1.5. ¿Existe una sucesión de funciones $\{f_n\}$ con $f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continuas tales que $\{f_n\}$ converge uniformemente pero no es equicontinua? ¿Y si $f_n :]0, 1[\to \mathbb{R}$?

No:

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leqslant |f_n(t) - f(t)| + |f(t) - f(s)| + |f(s) - f_n(s)|$$

Las dos por convergencia uniforme y la de enmedio por continuidad uniforme, continua en compacto.

Para el segundo sí que es cierto.