

Análisis Funcional Ejercicios

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional

Ejercicios

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2026

Índice general

1. Relaciones de Ejercicios	5
1.1. Espacios normados	5
1.1.1. Cuestiones básicas	5
1.1.2. Ejemplos	12
1.1.3. Operadores y funcionales	23
1.1.4. Operaciones con espacios normados	24
1.1.5. Espacios de dimensión finita	25
1.2. Espacios de Hilbert	26
1.3. Teorema de Hahn-Banach	27
1.4. Dualidad y topologías débiles	29
1.5. El Ppio. de Acotación Uniforme	30

1. Relaciones de Ejercicios

1.1. Espacios normados

1.1.1. Cuestiones básicas

Ejercicio 1.1.1. Probar que dos normas en un mismo espacio vectorial son equivalentes si, y sólo si, dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

$\Rightarrow$) Sea X un espacio vectorial y $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas equivalentes en X . Entonces existen constantes $C_1, C_2 \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Sea $A \subset X$ un conjunto acotado en la norma $\|\cdot\|_1$. Entonces existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|x\|_1 \leq M$ para todo $x \in A$. Por lo tanto, para todo $x \in A$ se tiene que

$$\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \leq C_2M$$

y, por tanto, A es acotado en la norma $\|\cdot\|_2$, con cota C_2M . De manera análoga se demuestra que si A es acotado en la norma $\|\cdot\|_2$, entonces también lo es en la norma $\|\cdot\|_1$.

$\Leftarrow$) Sea X un espacio vectorial y $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X que dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

Fijado $x \in X \setminus \{0\}$, consideremos el conjunto $A = \left\{ \frac{x}{\|x\|_1} \right\}$. Este conjunto es acotado en la norma $\|\cdot\|_1$, y por hipótesis también lo es en la norma $\|\cdot\|_2$. Por tanto, existe $C_2 \in \mathbb{R}^+$ tal que

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\|_2 \leq C_2$$

y, por tanto, $\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$. De manera análoga se demuestra que existe $C'_1 \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|x\|_1 \leq C'_1\|x\|_2$. Considerando $C_1 = 1/C'_1$, se obtiene que:

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$$

Puesto que $x \in X \setminus \{0\}$ es arbitrario, y para $x = 0$ se tiene que $\|0\|_1 = \|0\|_2 = 0$, se concluye que las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes.

Ejercicio 1.1.2. Si X es un espacio normado, para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$, denotamos por $B(x, r)$ a la bola cerrada de centro x y radio r . Para $x, y \in X$ y $r, \rho \in \mathbb{R}^+$, probar las siguientes equivalencias:




Figura 1.1: Intersección no vacía de dos bolas cerradas.

a) $B(x, r) \cap B(y, \rho) \neq \emptyset \iff \|x - y\| \leq r + \rho$

La situación está ilustrada en la figura 1.1.

Consideramos la distancia inducida por la norma: $d(x, y) = \|x - y\|$, $\forall x, y \in X$.

$\implies$) Sea $z \in B(x, r) \cap B(y, \rho)$. Por definición de bola cerrada, $d(x, z) \leq r$ y $d(y, z) \leq \rho$. Entonces, por la desigualdad triangular:

$$\|x - y\| = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \leq r + \rho$$

$\impliedby$) Suponemos $\|x - y\| \leq r + \rho$, y buscamos $z \in B(x, r) \cap B(y, \rho)$.

Si $x = y$, basta tomar $z = x$, ya que $\|x - x\| = 0 \leq r$ y $\|x - y\| = 0 \leq \rho$.

Supongamos por tanto que $x \neq y$. Consideramos un punto del segmento que une x e y , definido por $z := \lambda x + (1 - \lambda)y$ para $\lambda \in [0, 1]$. Estudiamos las condiciones para que pertenezca a ambas bolas:

$$\begin{aligned} z \in B(x, r) &\iff \|z - x\| \leq r \iff \|(1 - \lambda)(y - x)\| = (1 - \lambda)\|x - y\| \leq r \\ &\iff 1 - \frac{r}{\|x - y\|} \leq \lambda \\ z \in B(y, \rho) &\iff \|z - y\| \leq \rho \iff \|\lambda(x - y)\| = \lambda\|x - y\| \leq \rho \\ &\iff \lambda \leq \frac{\rho}{\|x - y\|} \end{aligned}$$

Por tanto, buscamos $\lambda \in [0, 1]$ que satisfaga:

$$1 - \frac{r}{\|x - y\|} \leq \lambda \leq \frac{\rho}{\|x - y\|}$$

Dicho valor existe en $\mathbb{R}$ si y solo si el extremo inferior es menor o igual que el superior:

$$1 - \frac{r}{\|x - y\|} \leq \frac{\rho}{\|x - y\|} \iff \|x - y\| - r \leq \rho \iff \|x - y\| \leq r + \rho$$

lo cual es cierto por hipótesis. Además, como $r, \rho > 0$, se tiene $1 - \frac{r}{\|x - y\|} < 1$ y $\frac{\rho}{\|x - y\|} > 0$. Tomando, por ejemplo,

$$\lambda = \max \left\{ 0, 1 - \frac{r}{\|x - y\|} \right\}$$

se comprueba que $\lambda \in [0, 1]$ y cumple ambas desigualdades. Por tanto, existe $z \in B(x, r) \cap B(y, \rho)$, concluyendo que la intersección no es vacía.

b) $B(x, r) \subset B(y, \rho) \iff \|x - y\| \leq \rho - r$

La situación está ilustrada en la figura 1.2.




Figura 1.2: Inclusión de la bola $B(x, r)$ en la bola $B(y, \rho)$.

$\implies$) Supuesto $x = y$, tenemos que $B(x, r) \subset B(x, \rho)$ si y solo si $r \leq \rho$, lo cual equivale a $\|x - y\| = 0 \leq \rho - r$. Supongamos por tanto que $x \neq y$. Consideramos el punto:

$$z = x + r \frac{x - y}{\|x - y\|}$$

Calculamos su distancia a x :

$$\|z - x\| = \left\| r \frac{x - y}{\|x - y\|} \right\| = r \frac{\|x - y\|}{\|x - y\|} = r \leq r$$

Por tanto, $z \in B(x, r)$. Como por hipótesis $B(x, r) \subset B(y, \rho)$, se deduce que $z \in B(y, \rho)$, es decir, $\|z - y\| \leq \rho$.

Calculamos explícitamente $\|z - y\|$:

$$\begin{aligned} \|z - y\| &= \left\| x - y + r \frac{x - y}{\|x - y\|} \right\| = \left\| (x - y) \left(1 + \frac{r}{\|x - y\|} \right) \right\| \\ &= \left(1 + \frac{r}{\|x - y\|} \right) \|x - y\| = \|x - y\| + r \end{aligned}$$

Como $\|z - y\| \leq \rho$, obtenemos directamente:

$$\|x - y\| + r \leq \rho \iff \|x - y\| \leq \rho - r$$

$\impliedby$) Supongamos que $\|x - y\| \leq \rho - r$. Sea $z \in B(x, r)$ arbitrario, es decir, $\|z - x\| \leq r$. Veamos que $z \in B(y, \rho)$:

$$\|z - y\| \leq \|z - x\| + \|x - y\| \leq r + (\rho - r) = \rho$$

Por tanto, $z \in B(y, \rho)$, demostrando la inclusión $B(x, r) \subset B(y, \rho)$.

Ejercicio 1.1.3. Sea X un espacio de Banach y $\{B_n\}$ una sucesión de bolas cerradas en X , que sea decreciente, es decir, $B_{n+1} \subset B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset.$$

En vistas a emplear la propiedad de completitud de X , buscamos una sucesión de Cauchy $\{x_n\}$ con $x_n \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sabiendo que X es completo, la sucesión $\{x_n\}$ convergerá a un punto $x \in X$ que, por ser límite de una sucesión de puntos de B_n conjunto cerrado, pertenecerá a B_n para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto a la intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$. Formalicemos esta idea.

Fijado $n \in \mathbb{N}$, sea $B_n = B(x_n, r_n)$, con $x_n \in X$ y $r_n \in \mathbb{R}^+$. Como $\{B_n\}$ es decreciente, se tiene que $B_{n+1} \subset B_n$, y por lo demostrado en el ejercicio anterior, se deduce que $\|x_{n+1} - x_n\| \leq r_n - r_{n+1}$. De esta idea, deducimos que $\{r_n\}$ es una sucesión decreciente de números reales minorada por cero. Por la caracterización del ínfimo por sucesiones, $\{r_n\}$ converge a un número real $R \in \mathbb{R}_0^+$.

$$\{r_n\} \longrightarrow R \geq 0$$

Asímismo, y en vistas de demostrar que $\{x_n\}$ es de Cauchy, fijados $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$, hemos de calcular $\|x_m - x_n\|$. Por la desigualdad triangular, tenemos que:

$$\|x_m - x_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} (r_k - r_{k+1}) = r_n - r_m$$

Distinguimos ahora en función del valor de R .

Si $R = 0$: Entonces, por definición de convergencia de $\{r_n\}$, tenemos que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies r_n < \varepsilon$$

Por tanto, fijado $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, consideramos el valor de n_0 dado por la convergencia de $\{r_n\}$. Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n \geq n_0$, se tiene que:

$$\|x_m - x_n\| \leq r_n - r_m < r_n < \varepsilon$$

Por tanto, $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, y como X es completo, $\{x_n\}$ converge a un punto $x \in X$.

$$\{x_n\} \longrightarrow x \in X$$

Veamos ahora que $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$. Fijado $n \in \mathbb{N}$, como B_n es cerrado y $\{x_m\}_{m \geq n} \subset B_n$, se tiene que $x \in B_n$, puesto que el límite de una sucesión de puntos de un conjunto cerrado pertenece al conjunto. Por tanto, $x \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$.

Si $R > 0$: En este caso, la sucesión $\{r_n\}$ converge a un número real positivo. Podemos no obstante definir una nueva sucesión de bolas cerradas $\{B'_n\}$, con $B'_n = B(x_n, r_n - R)$, que cumpla la hipótesis del caso anterior.

En primer lugar, veamos que es decreciente. Fijados $n \in \mathbb{N}$, veamos que:

$$B'_{n+1} = B(x_{n+1}, r_{n+1} - R) \subset B(x_n, r_n - R) = B'_n$$

Tenemos que:

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq r_n - r_{n+1} = (r_n - R) - (r_{n+1} - R)$$

Aplicando el ejercicio anterior, se deduce que $B'_{n+1} \subset B'_n$, y por tanto $\{B'_n\}$ es decreciente. Además, como $\{r_n - R\}$ converge a cero, podemos aplicar el caso anterior para deducir que:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B'_n \neq \emptyset$$

Por tanto, existe $x \in X$ tal que $x \in B'_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $B'_n \subset B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se concluye que $x \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$.

Ejercicio 1.1.4. Probar que, si X es un espacio normado, para cualesquiera $x, y \in X \setminus \{0\}$ se verifica la siguiente desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x - y\|}{\max\{\|x\|, \|y\|\}}$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\|y\| \leq \|x\|$, puesto que en caso contrario, intercambiando x e y , se obtiene la misma desigualdad. Entonces, $\max\{\|x\|, \|y\|\} = \|x\|$. Sumamos y restamos $\frac{y}{\|x\|}$ en el primer miembro de la desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|x\|} + \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \left\| \frac{x - y}{\|x\|} \right\| + \left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\|$$

Respecto al primer sumando, por homogeneidad de la norma, se tiene que:

$$\left\| \frac{x - y}{\|x\|} \right\| = \frac{\|x - y\|}{\|x\|}$$

Respecto al segundo sumando, factorizamos y y aplicamos la desigualdad triangular inversa:

$$\left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \|y\| \left\| \frac{1}{\|x\|} - \frac{1}{\|y\|} \right\| = \|y\| \frac{|\|y\| - \|x\||}{\|x\| \|y\|} \leq \|y\| \frac{\|x - y\|}{\|x\| \|y\|} = \frac{\|x - y\|}{\|x\|}$$

Por tanto, se concluye que:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{\|x - y\|}{\|x\|} + \frac{\|x - y\|}{\|x\|} = \frac{2\|x - y\|}{\|x\|} = \frac{2\|x - y\|}{\max\{\|x\|, \|y\|\}}$$

Ejercicio 1.1.5. Sean A y B subconjuntos no vacíos de un espacio normado. Probar las siguientes afirmaciones:

a) Si A es abierto, entonces $A + B$ es abierto.

Recordamos que:

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$

Opción 1 Si $x \in A + B$, entonces existen $a \in A$ y $b \in B$ tales que $x = a + b$. Como A es abierto, existe $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $U(a, r) \subset A$. Consideremos la bola abierta $U(x, r)$, y tenemos que demostrar que $U(x, r) \subset A + B$. Sea $y \in U(x, r)$ arbitrario, y escribamos $y = (y - b) + b$. Veamos que $y - b \in U(a, r)$:

$$\|y - b - a\| = \|y - (a + b)\| = \|y - x\| < r$$

Por tanto, $y - b \in U(a, r) \subset A$, y como $b \in B$, se puede concluir que $y = (y - b) + b \in A + B$. Por tanto, $U(x, r) \subset A + B$, y como $x \in A + B$ es arbitrario, se concluye que $A + B$ es abierto.

Opción 2 Tenemos que:

$$A + B = \bigcup_{b \in B} (A + b)$$

Fijado $b \in B$, consideremos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} T_b : X &\longrightarrow X \\ x &\longmapsto x + b \end{aligned}$$

Esta aplicación, traslación por b , es un homeomorfismo en X , y por tanto $A + b = T_b(A)$ es abierto. Como $A + B$ es la unión de abiertos, se concluye que $A + B$ es abierto.

b) Si A es compacto y B es cerrado, entonces $A + B$ es cerrado.

Consideramos una sucesión $\{x_n\}$ en $A + B$ que converge a un punto $x \in X$. Queremos ver que $x \in A + B$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existen $a_n \in A$ y $b_n \in B$ tales que:

$$x_n = a_n + b_n$$

Como A es compacto¹, existe una parcial $\{a_{\sigma(n)}\}$ de $\{a_n\}$ que converge a un punto $a \in A$. Por tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$b_{\sigma(n)} = x_{\sigma(n)} - a_{\sigma(n)} \in B$$

Además, como $\{x_n\} \rightarrow x$ y $\{a_{\sigma(n)}\} \rightarrow a$ y toda parcial de una sucesión convergente converge al mismo límite, se concluye que $\{b_{\sigma(n)}\} \rightarrow x - a$. Como B es cerrado, se deduce que $x - a \in B$, y por tanto $x = a + (x - a) \in A + B$. Por tanto, $A + B$ es cerrado.

¹Notemos que no estamos empleando el concepto general de compacidad, sino su equivalente para espacios métricos visto en Análisis Matemático I.

Dar un ejemplo en el que A y B sean cerrados pero $A + B$ no sea cerrado.

Notemos que hemos de buscar un ejemplo en el que A no sea compacto, ya que de lo contrario, por el resultado anterior, $A + B$ sería cerrado. En particular, podemos buscar un ejemplo. En $\mathbb{R}^n$, vimos que ser compacto es equivalente a ser cerrado y acotado, luego hemos de buscar dos conjuntos cerrados pero no acotados. Veamos dos ejemplos:

1. Consideramos el espacio normado $\mathbb{R}$, y sean:

$$A = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad B = \left\{ n + \frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Tenemos que A y B son cerrados, pero veamos que $A + B$ no es cerrado. Consideremos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n = -n + \left(n + \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \in A + B$$

La sucesión $\{x_n\}$ converge a 0, y veamos que $0 \notin A + B$.

- Supongamos que $0 \in A + B$. Entonces, existen $a \in A = \mathbb{Z}$ y $b \in B$ tales que $0 = a + b$. Como $b \in B$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b = n + \frac{1}{n+1}$, luego:

$$0 = a + b = a + n + \frac{1}{n+1} \implies -(a + n) = \frac{1}{n+1}$$

Como $a + n \in \mathbb{Z}$, se deduce que $-(a + n) \in \mathbb{Z}$. No obstante, tenemos que:

$$0 < \frac{1}{n+1} < 1$$


lo cual es una contradicción, ya que ningún número entero puede ser igual a un número estrictamente positivo menor que 1. Por tanto, $0 \notin A + B$.

Por tanto, $A + B$ no es cerrado.

2. Consideramos el espacio normado $\mathbb{R}^2$, y sean:

$$A = \mathbb{R}^+ \times \{0\} \quad \text{y} \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = e^x\}$$

Los conjuntos A y B están mostrados en la figura 1.3. El conjunto A es trivialmente cerrado, y el conjunto B es cerrado porque es la gráfica de una función continua. No obstante, tenemos que $A + B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, que no es cerrado, ya que su frontera $\mathbb{R} \times \{0\}$ no está incluida en el conjunto.

Figura 1.3: Conjuntos A y B en $\mathbb{R}^2$.

1.1.2. Ejemplos

Ejercicio 1.1.6. En el espacio vectorial $C^1[0, 1]$ formado por todas las funciones de clase C^1 en el intervalo $[0, 1]$, con valores en $\mathbb{K}$, se define

$$\|f\| = |f(0)| + \max\{|f'(t)| : t \in [0, 1]\} \quad \forall f \in C^1[0, 1]$$

Probar que de esta forma se obtiene una norma completa en $C^1[0, 1]$.

En primer lugar, veamos que $\|\cdot\|$ está bien definida. Para cada $f \in C^1[0, 1]$, f' es continua en $[0, 1]$, y por el teorema de Weierstrass, alcanza su máximo en dicho intervalo. Por tanto, $\max\{|f'(t)| : t \in [0, 1]\}$ está bien definido y es finito. Por tanto, $\|f\| \in \mathbb{R}_0^+$ para todo $f \in C^1[0, 1]$, luego $\|\cdot\|$ está bien definida. Por simplicidad, empleamos la norma del supremo en $C[0, 1]$ como se ha visto en teoría:

$$\|f\|_\infty := \max\{|f(t)| : t \in [0, 1]\} \quad \forall f \in C[0, 1]$$

De esta forma, podemos escribir la norma como:

$$\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_\infty \quad \forall f \in C^1[0, 1]$$

Veamos ahora que $\|\cdot\|$ es una norma. Para ello, hemos de verificar las tres propiedades de una norma:

1. $\|f\| = 0 \iff f = 0$.

Si $f = 0$, entonces $f(0) = 0$ y $f' = 0$, luego $\|f\| = 0$. Supongamos ahora que $\|f\| = 0$. Entonces, $|f(0)| = 0$ y $\|f'\|_\infty = 0$. Por ser $|\cdot|$ y $\|\cdot\|_\infty$ normas, se deduce que $f(0) = 0$ y $f' = 0$. De $f' = 0$ se deduce que f es constante, y como $f(0) = 0$, se concluye que $f = 0$. Por tanto, $\|f\| = 0 \iff f = 0$.

2. $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todo $f \in C^1[0, 1]$.

$$\begin{aligned} \|\alpha f\| &= |\alpha f(0)| + \|(\alpha f)'\|_\infty \stackrel{(*)}{=} |\alpha| |f(0)| + \|\alpha f'\|_\infty \stackrel{(**)}{=} |\alpha| |f(0)| + |\alpha| \|f'\|_\infty = \\ &= |\alpha| (|f(0)| + \|f'\|_\infty) = |\alpha| \|f\| \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos empleado tanto la desigualdad triangular en $\mathbb{K}$ como la linealidad de la derivada, y en $(**)$ hemos empleado la homogeneidad de la norma del supremo.

3. $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ para todo $f, g \in C^1[0, 1]$.

$$\begin{aligned}\|f + g\| &= |(f + g)(0)| + \|(f + g)'\|_\infty \leq |f(0)| + |g(0)| + \|f' + g'\|_\infty \leq \\ &\leq |f(0)| + |g(0)| + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty = \\ &= (|f(0)| + \|f'\|_\infty) + (|g(0)| + \|g'\|_\infty) = \|f\| + \|g\|\end{aligned}$$

donde en la primera desigualdad hemos empleado tanto la desigualdad triangular en $\mathbb{K}$ como la derivada de la suma, y en la segunda desigualdad hemos empleado la desigualdad triangular para la norma del supremo.

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en $C^1[0, 1]$. Veamos ahora que $C^1[0, 1]$ es completo con esta norma. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de Cauchy en $C^1[0, 1]$. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$m, n \geq n_0 \implies \|f_n - f_m\| = |f_n(0) - f_m(0)| + \|f'_n - f'_m\|_\infty < \varepsilon$$

En particular, $\{f_n(0)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$, y como $\mathbb{K}$ es completo, existe $a \in \mathbb{K}$ tal que:

$$\{f_n(0)\} \longrightarrow a \in \mathbb{K}$$

Además, también se tiene que $\{f'_n\}$ es una sucesión de Cauchy en $C[0, 1]$ con la norma del supremo, y como $C[0, 1]$ es completo, existe $g \in C[0, 1]$ tal que:

$$\{f'_n\} \longrightarrow g \in C[0, 1]$$

Para demostrar la completitud, en primer lugar definimos nuestro candidato a límite $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$, que ha de cumplir que $f(0) = a$ y $f' = g$. Para ello, definimos:

$$f(x) = a + \int_0^x g(s) ds \quad \forall x \in [0, 1]$$

Por el teorema fundamental del cálculo, $f \in C^1[0, 1]$ y $f' = g$. Además, se tiene que:

$$f(0) = a + \int_0^0 g(s) ds = a$$

Para demostrar la completitud, hemos de ver que $\{f_n\} \rightarrow f$ en $C^1[0, 1]$. Para ello, hemos de demostrar que:

$$\{\|f_n - f\|\} = \{|f_n(0) - f(0)| + \|f'_n - f'\|_\infty\} = \{|f_n(0) - a| + \|f'_n - g\|_\infty\} \longrightarrow 0$$

Como $\{f_n(0)\} \rightarrow a$ en $\mathbb{K}$ y $\{f'_n\} \rightarrow g$ en $C[0, 1]$, se concluye que $\{|f_n(0) - a|\} \rightarrow 0$ y $\{\|f'_n - g\|_\infty\} \rightarrow 0$, y por tanto $\{f_n\} \rightarrow f$ en $C^1[0, 1]$. Por tanto, $C^1[0, 1]$ es completo con la norma definida.

Ejercicio 1.1.7. En el espacio $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de todas las sucesiones de escalares, se considera el subespacio definido por

$$X = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty \right\}$$

y se define una norma en X escribiendo

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} \quad \forall x \in X$$

Probar que con esta norma, X es un espacio de Banach.

En primer lugar, aunque no lo pide explícitamente el enunciado, veamos que $\|\cdot\|$ es una norma. Para ello, hemos de verificar las tres propiedades de una norma:

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

Si $x = 0$, entonces $x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $\|x\| = 0$. Supongamos ahora que $\|x\| = 0$. Entonces, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = 0$, y como todos los sumandos son no negativos, se deduce que $|x(n)| = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $x = 0$.

2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todo $x \in X$.

$$\|\alpha x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha x(n)|}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha| |x(n)|}{n} = |\alpha| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = |\alpha| \|x\|$$

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ para todo $x, y \in X$.

$$\|x+y\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n) + y(n)|}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)| + |y(n)|}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|y(n)|}{n} = \|x\| + \|y\|$$

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en X . Veamos ahora que X es completo con esta norma. Aunque podría hacerse de forma directa, vemos que la norma es muy similar a la dada en ℓ_1 , luego veamos que X es isomorfo a ℓ_1 . Consideramos la aplicación:

$$\begin{aligned} \Phi : X &\longrightarrow \ell_1 \\ x &\longmapsto \Phi(x) \end{aligned}$$

donde la sucesión $\Phi(x)$ está definida por:

$$\begin{aligned} \Phi(x) : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ n &\longmapsto \frac{x(n)}{n} \end{aligned}$$

Veamos que Φ es un isomorfismo lineal.

- En primer lugar, veamos que Φ está bien definida; es decir, que dado $x \in X$, se tiene que $\Phi(x) \in \ell_1$. Como $x \in X$, se tiene que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty$$

Por tanto, $\Phi(x) \in \ell_1$.

- Veamos que Φ es lineal. Sean $x, y \in X$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\Phi(\alpha x + \beta y)(n) = \frac{(\alpha x + \beta y)(n)}{n} = \frac{\alpha x(n) + \beta y(n)}{n} = \alpha \frac{x(n)}{n} + \beta \frac{y(n)}{n} = \alpha \Phi(x)(n) + \beta \Phi(y)(n)$$

Por tanto, $\Phi(\alpha x + \beta y) = \alpha \Phi(x) + \beta \Phi(y)$, y se concluye que Φ es lineal.

- Veamos que Φ es biyectiva. En primer lugar, veamos que es inyectiva. Supongamos que $\Phi(x) = \Phi(y)$ para algunos $x, y \in X$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\Phi(x)(n) = \Phi(y)(n) \implies \frac{x(n)}{n} = \frac{y(n)}{n} \implies x(n) = y(n)$$

Por tanto, $x = y$, y se concluye que Φ es inyectiva. Ahora, veamos que es sobreyectiva. Sea $z \in \ell_1$. Definimos $x \in X$ por:

$$x(n) = nz(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Puesto que $z \in \ell_1$, se tiene que $x \in X$. Además, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\Phi(x)(n) = \frac{x(n)}{n} = \frac{nz(n)}{n} = z(n)$$

Por tanto, $\Phi(x) = z$, y se concluye que Φ es sobreyectiva. Por tanto, Φ es biyectiva.

- Por el momento, tenemos que Φ es un isomorfismo lineal entre X y ℓ_1 . Veamos que es un isomorfismo isométrico; es decir, que preserva la norma. Para ello, sea $x \in X$. Entonces, se tiene que:

$$\|\Phi(x)\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |\Phi(x)(n)| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = \|x\|_X$$

Por tanto, Φ es un isomorfismo isométrico entre X y ℓ_1 .

Por tanto, X es isométrico a ℓ_1 . Veamos ahora que ℓ_1 es completo.

- Sea $\{z_n\}$ una sucesión de Cauchy en ℓ_1 . Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$m, n \geq n_0 \implies \|z_n - z_m\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| < \varepsilon$$

Fijado $k \in \mathbb{N}$, se tiene que $|z_n(k) - z_m(k)| \leq \|z_n - z_m\|_1$ para todo $m, n \geq n_0$, y por tanto $\{z_n(k)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, existe $z(k) \in \mathbb{K}$ tal que $\{z_n(k)\} \rightarrow z(k)$. Definimos la sucesión $z \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ por:

$$z(n) = \lim_{m \rightarrow \infty} z_m(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

La demostración concluirá mostrando que $z \in \ell_1$ y que $\{z_n\} \rightarrow z$ en ℓ_1 . Para ello, consideramos la sucesión de sumas parciales:

$$S_n = \sum_{k=1}^n |z(k)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Veamos que $\{S_n\}$ es acotada. Para ello, sea $\varepsilon > 0$. Entonces, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$m, n \geq n_0 \implies \|z_n - z_m\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| < \varepsilon$$

Fijado $n \geq n_0$, tenemos que:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| \leq \varepsilon$$

Por tanto, $\sum_{k=1}^{\infty} |z(k)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| + \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k)| \leq \varepsilon + \|z_n\|_1$, luego $\sum_{k=1}^{\infty} |z(k)|$ está acotada. Por tanto, $z \in \ell_1$. Además, se tiene que:

$$\|z_n - z\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| \leq \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Por tanto, $\{z_n\} \rightarrow z$ en ℓ_1 . Por tanto, ℓ_1 es completo.

Como X es isométrico a ℓ_1 y ℓ_1 es completo, se concluye que X es completo con la norma definida.

Ejercicio 1.1.8. Dar un ejemplo de una sucesión $\{x_n\}$ en ℓ_1 :

1. que converja a cero en ℓ_{∞} pero no esté acotada en ℓ_2 .

En primer lugar, notemos que $\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_{\infty}$. Buscamos una sucesión $\{x_n\}$ en ℓ_1 que converja a cero en ℓ_{∞} , es decir, que $\|x_n\|_{\infty} \rightarrow 0$, pero que no esté acotada en ℓ_2 .

- Como $\{x_n\}$ está en ℓ_1 , ha de tenerse que:

$$\|x_n\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)| < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Como $\{x_n\}$ ha de converger a cero en ℓ_{∞} , ha de tenerse que:

$$\|x_n\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k)| \rightarrow 0$$

- Como $\{x_n\}$ no ha de estar acotada en ℓ_2 , ha de tenerse que:

$$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)|^2 \right)^{1/2} \rightarrow \infty$$

Consideramos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1/n^\alpha & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Al tratarse de una sucesión de soporte finito, se tiene que $\{x_n\} \in \ell_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k)| = \sup_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha}$$

Por tanto, $\|x_n\|_\infty \rightarrow 0$ si y solo si $\alpha > 0$.

- Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_n(k)|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \left(\frac{n}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$$

Por tanto, $\|x_n\|_2 \rightarrow \infty$ si y solo si $\alpha - 1/2 < 0 \iff \alpha < 1/2$.

Por tanto, para que $\{x_n\}$ cumpla las condiciones del enunciado, basta con tomar $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:

$$0 < \alpha < 1/2$$

2. que converja a cero en ℓ_2 pero no esté acotada en ℓ_1 .

De forma análoga al apartado anterior, consideramos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1/n^\alpha & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Al tratarse de una sucesión de soporte finito, se tiene que $\{x_n\} \in \ell_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_n(k)|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \left(\frac{n}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$$

Por tanto, $\|x_n\|_2 \rightarrow 0$ si y solo si $\alpha - 1/2 > 0 \iff \alpha > 1/2$.

- Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_n(k)| = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^\alpha} = \frac{n}{n^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

Por tanto, $\|x_n\|_1 \rightarrow \infty$ si y solo si $\alpha - 1 < 0 \iff \alpha < 1$.

Por tanto, para que $\{x_n\}$ cumpla las condiciones del enunciado, basta con tomar $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:

$$1/2 < \alpha < 1$$

Ejercicio 1.1.9. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $t \in [0, 1]$ se define $f_n(t) = t^n - t^{n+1}$ y $g_n(t) = t^n - t^{2n}$. Estudiar la convergencia de las sucesiones $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$:

1. en el espacio de Banach $C[0, 1]$.

- En el caso de $\{f_n\}$, buscamos el límite de la sucesión $\{f_n\}$ en $C[0, 1]$. Para obtener un candidato a límite, estudiamos la convergencia puntual de $\{f_n\}$. Fijado $t \in [0, 1]$, se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (t^n - t^{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n(1 - t) = 0 \cdot (1 - t) = 0$$

Por tanto, $\{f_n\}$ converge puntualmente a la función nula $0(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1]$. Por tanto, el candidato a límite es la función nula. Para ver si converge en $C[0, 1]$, hemos de ver si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - 0\|_\infty = 0$$

Tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f_n(t)| = \max_{t \in [0, 1]} |t^n - t^{n+1}|$$

Para encontrar el punto crítico, derivamos $f_n(t)$:

$$f'_n(t) = nt^{n-1} - (n+1)t^n = t^{n-1}(n - (n+1)t) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ n - (n+1)t = 0 \end{cases} \implies t = \frac{n}{n+1}$$

Hemos de ver si dicho punto crítico es un máximo. Para ello, estudiamos el signo de $f'_n(t)$:

- Para $t \in]0, \frac{n}{n+1}[$, se tiene que $f'_n(t) > 0$, luego $f_n(t)$ es creciente en este intervalo.
- Para $t \in]\frac{n}{n+1}, 1]$, se tiene que $f'_n(t) < 0$, luego $f_n(t)$ es decreciente en este intervalo.

Por tanto, $t = \frac{n}{n+1}$ es un máximo relativo. Veamos el máximo absoluto:

$$\begin{aligned} f_n(0) = f_n(1) &= 0 \\ f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n - \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en $t = \frac{n}{n+1}$, y tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - 0\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{e} \cdot 0 = 0$$

Por tanto, $\{f_n\}$ converge a 0 en $C[0, 1]$.

Observación. Notemos que, gracias a la estructura de espacio normado, vemos las funciones como elementos de un espacio vectorial, y por tanto tan solo se habla de convergencia en norma. Es cierto que, en $\ell_\infty([0, 1])$, la convergencia en norma equivale a la convergencia uniforme visto desde el punto de vista de funciones, pero no es necesario hablar de convergencia uniforme para demostrar que $\{f_n\}$ converge a 0 en $C[0, 1]$.

- En el caso de $\{g_n\}$, calculamos el límite puntual para obtener un candidato a límite. Fijado $t \in [0, 1]$, se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (t^n - t^{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n(1 - t^n) = 0 \cdot (1 - 0) = 0$$

Por tanto, $\{g_n\}$ converge puntualmente a la función nula $0(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1]$. Por tanto, el candidato a límite es la función nula. Para ver si converge en $C[0, 1]$, hemos de ver si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n - 0\|_\infty = 0$$

Tenemos que:

$$\|g_n - 0\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |g_n(t)| = \max_{t \in [0, 1]} |t^n - t^{2n}|$$

Para encontrar el punto crítico, derivamos $g_n(t)$:

$$g'_n(t) = nt^{n-1} - 2nt^{2n-1} = nt^{n-1}(1 - 2t^n) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ 1 - 2t^n = 0 \implies t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n} \end{cases}$$

Hemos de ver si dicho punto crítico es un máximo. Para ello, estudiamos el signo de $g'_n(t)$:

- Para $t \in \left]0, \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right[$, se tiene que $g'_n(t) > 0$, luego $g_n(t)$ es creciente en este intervalo.
- Para $t \in \left]\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}, 1\right]$, se tiene que $g'_n(t) < 0$, luego $g_n(t)$ es decreciente en este intervalo.

Por tanto, $t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$ es un máximo relativo. Veamos el máximo absoluto:

$$\begin{aligned} g_n(0) &= g_n(1) = 0 \\ g_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n \cdot n} - \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n \cdot 2n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en $t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$, y tenemos que:

$$\|g_n - 0\|_\infty = g_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) = \frac{1}{4}$$

Por tanto, tomando límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n - 0\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \neq 0$$

Por tanto, $\{g_n\}$ no converge a 0 en $C[0, 1]$. El lector podría pensar que $\{g_n\}$ converge a otra función g en $C[0, 1]$, pero no es así, puesto que la convergencia en norma implica la convergencia puntual, ya que, fijado $t \in [0, 1]$, se tiene que:

$$|g_n(t) - g(t)| \leq \|g_n - g\|_\infty \rightarrow 0$$

Por tanto, si $\{g_n\}$ converge a g en $C[0, 1]$, entonces $\{g_n\}$ converge puntualmente a g . Como $\{g_n\}$ converge puntualmente a 0 pero ya se ha visto que no converge a 0 en $C[0, 1]$, se concluye que $\{g_n\}$ no converge en $C[0, 1]$.

2. en el espacio de Banach L_p , con $1 \leq p < \infty$.

Como se vio en el apartado anterior, $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$ convergen puntualmente a 0 en $[0, 1]$. En este caso la convergencia en norma no implica la convergencia puntual, por lo que no sería sencillo demostrar que no convergen en L_p . Sin embargo, veamos que sí convergen en L_p . Para ello, basta con ver que $\|f_n\|_p \rightarrow 0$ y $\|g_n\|_p \rightarrow 0$.

- El caso de $\{f_n\}$, es más sencillo. Puesto que $C([0, 1])$ es isométricamente isomorfo a L_∞ , tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

donde, en este caso, la norma $\|\cdot\|_\infty$ es la norma de L_∞ (aunque su valor sea el mismo que la norma de $C([0, 1])$ por ser estos isométricamente isomorfos). Por otro lado, de la relación entre los espacios de Lebesgue, tenemos que $f_n - 0 \in L_p$, y:

$$0 \leq \|f_n - 0\|_p \leq \|f_n - 0\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$ por el Lema del Sandwich, se concluye que $\|f_n - 0\|_p \rightarrow 0$, y por tanto $\{f_n\}$ converge a 0 en L_p .

- El caso de $\{g_n\}$, es más complicado, puesto que no se puede aplicar el Lema del Sandwich (al ser la norma de la diferencia $1/4 \neq 0$). Por tanto, hemos de calcular la norma $\|g_n\|_p$, aunque también usaremos el Lema del Sandwich. Tenemos que, para todo $t \in [0, 1]$ y todo $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq |g_n(t)|^p = |t^n - t^{2n}|^p = (t^n - t^{2n})^p \leq t^{np}$$

Por tanto, por ser el operador integral estrictamente creciente, se tiene que:

$$0 \leq \int_0^1 |g_n(t)|^p dt \leq \int_0^1 t^{np} dt = \left[\frac{t^{np+1}}{np+1} \right]_0^1 = \frac{1}{np+1}$$

Por tanto, tomando raíz p -ésima:

$$0 \leq \|g_n\|_p = \left(\int_0^1 |g_n(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left(\frac{1}{np+1} \right)^{1/p}$$

Por tanto, tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$ por el Lema del Sandwich, se concluye que $\|g_n\|_p \rightarrow 0$, y por tanto $\{g_n\}$ converge a 0 en L_p .

Ejercicio 1.1.10. Se consideran los conjuntos

$$U = \{x \in c_0 : |x(n)| < 1 \ \forall n \in \mathbb{N}\} \quad \text{y} \quad V = \{x \in \ell_\infty : |x(n)| < 1 \ \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Probar que U es abierto en c_0 pero V no es abierto en ℓ_∞ .

Veamos que U es abierto en c_0 . Para ello, sea $x \in U$, y busquemos un $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $B(x, r) \subset U$; es decir, busquemos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que, para todo $y \in c_0$ con $\|x - y\|_\infty < r$, se tenga que $y \in U$. De la definición de U , busquemos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que, para todo $y \in c_0$ con $\|x - y\|_\infty < r$, se tenga que $|y(n)| < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En vez de dar de manera directa el valor de $r \in \mathbb{R}^+$, vamos a ver qué condiciones ha de cumplir r para que se cumpla lo anterior.

- Sea $y \in c_0$ con $\|x - y\|_\infty < r$. Buscamos acotar $|y(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, pero solo tenemos acotado $|x(n) - y(n)|$ y $|x(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, vamos a acotar $|y(n)|$ empleando la desigualdad triangular:

$$|y(n)| = |y(n) - x(n) + x(n)| \leq |y(n) - x(n)| + |x(n)| < r + |x(n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, busquemos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $r + |x(n)| \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$; o equivalente, busquemos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $r \leq 1 - |x(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como 0 es un minorante de $1 - |x(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, podemos tomar:

$$r = \inf\{1 - |x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = 1 - \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = 1 - \|x\|_\infty$$

Veamos que $\|x\|_\infty < 1$. Como $x \in U \subset c_0$ y en c_0 la norma del supremo es la del máximo, tenemos que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x(n_0)| = \|x\|_\infty$. Como $x \in U$, se tiene que $|x(n_0)| < 1$, luego $\|x\|_\infty < 1$. Por tanto, $r = 1 - \|x\|_\infty > 0$.

Veamos ahora la demostración rigurosa de que U es abierto en c_0 . Sea $x \in U$, y tomamos $r = 1 - \|x\|_\infty > 0$. Sea $y \in c_0$ tal que $\|x - y\|_\infty < r$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$|y(n)| = |y(n) - x(n) + x(n)| \leq |y(n) - x(n)| + |x(n)| < r + |x(n)| \leq r + \|x\|_\infty = 1 - \|x\|_\infty + \|x\|_\infty = 1$$

Por tanto, $y \in U$, y se concluye que $B(x, r) \subset U$. Por tanto, U es abierto en c_0 .

- Como aspecto adicional, veamos que $U = B(0, 1)$ con la norma del máximo (puesto que, en c_0 , la norma del supremo es la del máximo). En efecto, tenemos que:

⊂) Sea $x \in U$. Entonces, $|x(n)| < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego

$$\|x\|_\infty = \max\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} < 1$$

Por tanto, $x \in B(0, 1)$. Notemos que es clave que $x \in c_0$, ya que, de lo contrario, no se podría garantizar que la norma del supremo sea la del máximo, y por tanto tendríamos que el supremo podría ser 1.

⊃) Sea $x \in B(0, 1)$. Entonces, $\|x\|_\infty < 1$, luego $|x(n)| \leq \|x\|_\infty < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $x \in U$.

Veamos ahora que V no es abierto en ℓ_∞ . Para ello, veremos que $\ell_\infty \setminus V$ no es cerrado. Buscamos una sucesión $\{x_n\}$ en $\ell_\infty \setminus V$ que converja a un elemento $x \in V$. Sea el punto límite

$$x(k) = 1 - \frac{1}{k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Como $\sup\{|x(k)| : k \in \mathbb{N}\} = 1 < \infty$, se tiene que $x \in \ell_\infty$. Además, como $|x(k)| < 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$, se tiene que $x \in V$. Por tanto, x es un candidato a límite. Para definir la sucesión que convergerá a x , buscamos que sea muy similar a excepción de un elemento, que será el que haga que la sucesión no esté en V . Sea la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ x(k) & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Tenemos que $\sup\{|x_n(k)| : k \in \mathbb{N}\} = 1 < \infty$, luego $x_n \in \ell_\infty$. Además, como $|x_n(n)| = 1$, se tiene que $x_n \notin V$. Veamos que $\{x_n\}$ converge a x en ℓ_∞ .

$$\|x_n - x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k) - x(k)| = \sup_{k \in \mathbb{N}} \left| \begin{cases} 1 - x(n) & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases} \right| = |1 - x(n)| = \left| 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n}$$

Por tanto, $\|x_n - x\|_\infty \rightarrow 0$, luego $\{x_n\}$ converge a x en ℓ_∞ . Por tanto, $\ell_\infty \setminus V$ no es cerrado, y por tanto V no es abierto en ℓ_∞ .

1.1.3. Operadores y funcionales

Ejercicio 1.1.11. Sean X e Y espacios normados y $T : X \longrightarrow Y$ un operador lineal. Supongamos que, para toda sucesión $\{x_n\}$ de vectores de X tal que $\{x_n\} \rightarrow 0$, se tiene que la sucesión $\{T(x_n)\}$ está acotada. Probar que T es continuo.

Ejercicio 1.1.12. En cada uno de los siguientes casos, probar que la aplicación $f \mapsto T(f)$ es un operador lineal continuo de $C[0, 1]$ en sí mismo, y calcular su norma:

- I) $[T(f)](t) = \int_0^t f(s) ds \quad \forall t \in [0, 1], \forall f \in C[0, 1]$
- II) $[T(f)](t) = t^2 f(0) \quad \forall t \in [0, 1], \forall f \in C[0, 1]$
- III) $[T(f)](t) = f(t^2) \quad \forall t \in [0, 1], \forall f \in C[0, 1]$

Ejercicio 1.1.13. Fijada $g \in L_\infty[0, 1]$, probar que, para $1 \leq p \leq \infty$, la aplicación $f \mapsto fg$ es un operador lineal continuo de $L_p[0, 1]$ en sí mismo, y calcular su norma.

Ejercicio 1.1.14. Se considera el espacio normado $X = \{f \in C[0, 1] : f(1/2) = 0\}$, con la norma inducida por $C[0, 1]$, y el funcional lineal $\varphi : X \longrightarrow \mathbb{K}$ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in X$$

Probar que es continuo y calcular su norma.

Ejercicio 1.1.15. Sea $\{e_n\}$ la base de vectores unidad de c_0 . Probar que, para $f \in c_0^*$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- I) La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de c_0 .
- II) Existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f(e_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq m$.

Dar un ejemplo en el que no se verifiquen estas afirmaciones.

Ejercicio 1.1.16. Para $1 < p < \infty$, cualquier funcional lineal definido en ℓ_p alcanza su norma.

Ejercicio 1.1.17. Encontrar un operador lineal acotado de ℓ_2 en otro espacio de Banach que no alcance su norma (esto es, que el supremo que define su norma no sea un máximo).

1.1.4. Operaciones con espacios normados

Ejercicio 1.1.18. Dado un espacio normado X , sean $f, g \in X^* \setminus \{0\}$. Probar que los espacios normados $\ker f$ y $\ker g$, ambos con la norma inducida por X , son isomorfos. Dar un ejemplo en el que dichos espacios no sean isométricamente isomorfos.

Ejercicio 1.1.19. Si X e Y son espacios normados y $Z = X \times Y$ es el espacio normado producto, probar que Z^* es isomorfo al espacio de Banach producto $X^* \times Y^*$.

Ejercicio 1.1.20. En el espacio normado cociente ℓ_∞/c_0 , calcular la norma cociente $\|x + c_0\|$, para cada $x \in \ell_\infty$.

Ejercicio 1.1.21. En el espacio de Banach $C[0, 1]$ se considera el subespacio

$$M = \{g \in C[0, 1] : g(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 1/2]\}$$

Probar que M es cerrado en $C[0, 1]$, y calcular la norma cociente $\|f + M\|$ para cada $f \in C[0, 1]$.

Ejercicio 1.1.22. Para $1 \leq p < \infty$, se consideran los subespacios de L_p definidos por

$$M = \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.t.p. } t \in [0, 1/2]\}$$

$$Z = \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.t.p. } t \in [1/2, 1]\}$$

Probar que $L_p = M \oplus Z$, suma topológica directa. Deducir que L_p es isomorfo al espacio de Banach producto $L_p \times L_p$.

1.1.5. Espacios de dimensión finita

Ejercicio 1.1.23. Sean X e Y espacios normados y supongamos que Y tiene dimensión finita. Probar que todo operador lineal sobreyectivo $T : X \longrightarrow Y$ es una aplicación abierta.

Ejercicio 1.1.24. Sea $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{K}$ una función continua, y supongamos que existen dos sucesiones de escalares $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ tales que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f(t) - a_n e^t - b_n e^{-t}|^4 dt = 0$$

Probar que existen $a, b \in \mathbb{K}$ tales que $f(t) = a e^t + b e^{-t}$ para todo $t \in [0, 1]$.

Ejercicio 1.1.25. Probar que, para cada $N \in \mathbb{N}$, existe una constante $C_N \in \mathbb{R}^+$ verificando que, si P es un polinomio de grado N con coeficientes complejos, se tiene:

$$\sum_{k=0}^N |P(k)| \leq C_N \int_0^1 |P(t)| dt$$

Ejercicio 1.1.26. Sea X un espacio normado y M un subespacio de dimensión finita de X , tal que $M \neq X$. Probar que existe $x \in X$ tal que $\|x\| = d(x, M) = 1$. Deducir que, si X tiene dimensión infinita, existe una sucesión $\{x_n\}$ en la esfera unidad de X , tal que $\|x_n - x_m\| \geq 1$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$.

Ejercicio 1.1.27. En el espacio de Banach $C[0, 1]$ se considera el subespacio

$$M = \left\{ f \in C[0, 1] : \int_0^1 f(t) dt = 0 \right\}$$

Probar que M es proximal en $C[0, 1]$.

1.2. Espacios de Hilbert

Ejercicio 1.2.1. Sean $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones en la bola unidad de un espacio prehilbertiano. Probar que si $\|x_n + y_n\| \rightarrow 2$ entonces $\|x_n - y_n\| \rightarrow 0$.

Ejercicio 1.2.2. Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en un espacio prehilbertiano X y $x \in X$ tal que $\{(x_n | x)\} \rightarrow \|x\|^2$ y $\{\|x_n\|\} \rightarrow \|x\|$. Probar que $\{x_n\} \rightarrow x$.

Ejercicio 1.2.3. Sea X un espacio prehilbertiano real. Demostrar que para $x, y \in X$ equivalen:

- a) $x \perp y$.
- b) $\|x + ty\| = \|x - ty\|$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
- c) $\|x + ty\| \geq \|x\|$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 1.2.4. Calcular la proyección ortogonal en ℓ_2 sobre el subespacio M generado por los vectores $v_1 = (1, 1, 0, 0, \dots)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0, \dots)$ y $v_3 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$.

Ejercicio 1.2.5. Calcular el mínimo valor de la integral

$$\int_{-1}^1 |\operatorname{sen}(\pi t) - a - bt|^2 dt$$

para $a, b \in \mathbb{C}$.

Ejercicio 1.2.6. Calcular el mínimo valor de

$$\int_{-1}^1 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 dx$$

siendo a, b, c números reales.

Ejercicio 1.2.7. Sea $M = \{x \in \ell_2 : x(1) = x(2) = x(3)\}$. Probar que M es el complemento ortogonal del subespacio de ℓ_2 generado por los vectores $u = (1, -1, 0, 0, \dots)$ y $v = (0, 1, -1, 0, \dots)$. Obtener la descomposición de cualquier vector de ℓ_2 como suma de un elemento de M y otro de $M^\perp$.

1.3. Teorema de Hahn-Banach

Ejercicio 1.3.1. Sean φ, ψ dos seminormas en un espacio vectorial X , y sea $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ un funcional lineal verificando que

$$|f(x)| \leq \varphi(x) + \psi(x) \quad \forall x \in X$$

Probar que existen dos funcionales lineales $g, h : X \rightarrow \mathbb{K}$ tales que:

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad |g(x)| \leq \varphi(x), \quad |h(x)| \leq \psi(x) \quad \forall x \in X$$

[Indicación: En el espacio vectorial $X \times X$ considérese la seminorma p definida por $p(x_1, x_2) = \varphi(x_1) + \psi(x_2)$ y en el subespacio $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ considérese el funcional lineal h definido por $h(x, x) = f(x)$.]

Ejercicio 1.3.2. Sean X un espacio normado real y M un subespacio vectorial de X . Probar que si $f, g \in M^*$ verifican que $|f(m)| + |g(m)| \leq \|m\|$ para todo $m \in M$, entonces existen $h, k \in X^*$ que extienden a f y g respectivamente y verifican

$$|h(x)| + |k(x)| \leq \|x\| \quad \forall x \in X$$

[Indicación: Considérense $f + g$ y $f - g$.]

Ejercicio 1.3.3. Sea X un espacio normado complejo, y $f : \mathbb{C} \rightarrow X$ una función entera, es decir, derivable en todo punto de $\mathbb{C}$. Probar que, si f está acotada, entonces f es constante. (Se supone conocido el caso $X = \mathbb{C}$).

Ejercicio 1.3.4. Sea X un espacio de Banach y Z un subespacio cerrado de X^* , tal que $Z \neq X^*$. Supongamos que Z separa los puntos de X , es decir,

$$x \in X, \quad x^*(x) = 0 \quad \forall x^* \in Z \implies x = 0$$

Probar que X no es reflexivo.

Ejercicio 1.3.5. Probar que un subespacio de c_0 , con la norma inducida por c_0 , no puede ser isomorfo a ℓ_1 .

Ejercicio 1.3.6. Sean X un espacio normado y M un subespacio vectorial de X . Probar que para cada operador $T \in L(M, \ell_\infty)$, existe $S \in L(X, \ell_\infty)$ tal que $S|_M = T$ y $\|S\| = \|T\|$.

Ejercicio 1.3.7. Sean X un espacio normado, M un subespacio cerrado y $u \in X$. Probar que existe $f \in X^*$ tal que $|f(x)| \leq \text{dist}(x, M)$ para todo $x \in X$ y $f(u) = \text{dist}(u, M)$.

Ejercicio 1.3.8. Fijado $n \in \mathbb{N}$, probar que existe un funcional lineal y continuo f en $C[0, 1]$ verificando que $f(p) = p'(0)$ para todo polinomio p de grado menor o igual que n . ¿Existe un funcional lineal y continuo f en $C[0, 1]$ tal que $f(p) = p'(0)$ para todo polinomio p ?

Ejercicio 1.3.9. (Límites de Banach) Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos $f_n : \ell_\infty \rightarrow \mathbb{K}$ el funcional definido por

$$f_n(x) = \frac{x(1) + x(2) + \cdots + x(n)}{n} \quad (x \in \ell_\infty)$$

Sea $M = \{x \in \ell_\infty : \{f_n(x)\} \text{ converge}\}$ y definamos $f(x) = \lim_n f_n(x)$ ($x \in M$).

- a) Probar que $f_n \in \ell_\infty^*$ y que $\|f_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- b) Probar que M es un subespacio vectorial de ℓ_∞ que contiene al espacio c de las sucesiones convergentes.
- c) Probar que $f \in M^*$ con $\|f\| = 1$ y que $f(x) = \lim\{x_n\}$ para todo $x \in c$.
- d) Sea $\tau(x) = (x(2), x(3), \dots)$ para todo $x \in \ell_\infty$. Probar que $x - \tau(x) \in \ker(f) \subseteq M$ para todo $x \in \ell_\infty$.
- e) Deducir que existe $L \in \ell_\infty^*$, extensión de f , tal que $\|L\| = 1$ y $L(x) = L(\tau^n(x))$ para todo $x \in \ell_\infty$ y para todo $n \in \mathbb{N}$.
- f) Probar que $L(0, 1/2, 0, 1/2, \dots) = 1/4$. [Indicación: comparar con $L(1/2, 0, 1/2, 0, \dots)$]. ¿Cuánto vale $L(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, \dots)$?

Ejercicio 1.3.10. Sean A y B subconjuntos no vacíos, abiertos, convexos y disjuntos de un espacio normado X . Probar que existen $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $\operatorname{Re} f(a) < \alpha < \operatorname{Re} f(b)$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. ¿Es siempre posible encontrar f tal que $\sup \operatorname{Re} f(A) < \inf \operatorname{Re} f(B)$?

1.4. Dualidad y topologías débiles

Ejercicio 1.4.1. Sea X un espacio de Banach, $\{x_n\} \subset X$, $\{f_n\} \subset X^*$ tales que $\{x_n\}$ converge débilmente a $x \in X$ y $\{f_n\}$ converge en norma a $f \in X^*$. Prueba que $\lim_n f_n(x_n) = f(x)$.

Ejercicio 1.4.2. En ℓ_∞ consideremos la siguiente sucesión de funcionales: para $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n \in \ell_\infty^*$ está definido por

$$\varphi_n(x) = x(n) \quad \forall x \in \ell_\infty$$

Prueba que $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\} \subset B_{X^*}$ pero ninguna subsucesión de la sucesión $\{\varphi_n\}$ converge en la topología débil-*, $\sigma(\ell_\infty^*, \ell_\infty)$. ¿Contradice esto el Teorema de Banach-Alaoglu?

Ejercicio 1.4.3. Consideremos los funcionales $\varphi_n \in C[-1, 1]^*$ dados por

$$\varphi_n(f) = f(-1/n) - f(1/n) \quad \forall f \in C[-1, 1], \forall n \in \mathbb{N}$$

Prueba que $\{\varphi_n\} \rightarrow 0$ en la topología $\sigma(C[-1, 1]^*, C[-1, 1])$ pero no en la norma de $C[-1, 1]^*$.

Ejercicio 1.4.4. Sea, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n : c_0 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$\varphi_n(x) = \frac{x(1) + x(2) + \cdots + x(n)}{n} \quad \forall x \in c_0$$

- Prueba que $\varphi_n \in c_0^*$ y calcula su norma.
- Prueba que $\{\varphi_n\} \rightarrow 0$ en la topología $\sigma(c_0^*, c_0)$ pero no en la topología $\sigma(c_0^*, c_0^{**})$.

Ejercicio 1.4.5. Sea X un espacio de Banach separable de dimensión infinita. Construye un operador lineal y continuo $T : X \rightarrow c_0$ que no alcance su norma. [Idea: prueba que existe una sucesión $\{x_n^*\} \subset S_{X^*}$ que converge a 0 en la topología $\sigma(X^*, X)$].

1.5. El Ppio. de Acotación Uniforme

Ejercicio 1.5.1. Probar que, en el espacio de Banach $C[0, 1]$, las funciones que son derivables en el punto $1/2$ forman un conjunto de primera categoría.

Ejercicio 1.5.2. Sea $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ una sucesión de escalares y sea $1 < p < \infty$. Supongamos que, para todo $x \in \ell_p$, la serie

$$\sum_{n \geq 1} x(n)y(n)$$

está acotada. Probar que $y \in \ell_{p^*}$.

Ejercicio 1.5.3. Sean X e Y espacios de Banach y sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Probar que T es un monomorfismo si, y sólo si, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\alpha\|x\| \leq \|T(x)\| \leq \beta\|x\| \quad \forall x \in X$$

Ejercicio 1.5.4. Probar que el conjunto de los monomorfismos entre dos espacios de Banach es abierto en el espacio de todos los operadores lineales y continuos.

Ejercicio 1.5.5. Sean X e Y espacios de Banach y $T \in L(X, Y)$. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) Existe $S \in L(Y, X)$ tal que $S(T(x)) = x$ para todo $x \in X$.
- b) T es inyectivo y $T(X)$ es un subespacio complementado de Y .

Ejercicio 1.5.6. Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal. Se define una nueva norma en X mediante la expresión $\|x\|_1 = \|x\| + \|T(x)\|$ para todo $x \in X$. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) T es continua.
- b) $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_1$ son normas equivalentes.
- c) $\|\cdot\|_1$ es una norma completa en X .

Ejercicio 1.5.7. Probar que no existe ninguna sucesión $u = \{u_n\}$ en $\mathbb{K}$ tal que, para toda sucesión $x = \{x_n\}$ en $\mathbb{K}$, se verifica que:

$$x \in \ell_1 \iff \{x_n u_n\} \text{ está acotada.}$$

[Sugerencia: Supuesta la existencia de una tal sucesión $u = \{u_n\}$, nótese que se puede suponer que todos sus términos son no nulos, y considérese para cada sucesión $x = \{x_n\}$ la sucesión $x' = \left\{\frac{x_n}{u_n}\right\}$, y demuéstrese que la aplicación $x \mapsto x'$ sería un isomorfismo topológico de ℓ_∞ sobre ℓ_1].

Ejercicio 1.5.8. Sea X un espacio de Banach real. Dada una aplicación lineal $T : X \rightarrow L_1([0, 1])$ se considera, para cada $A \subseteq [0, 1]$ medible, el funcional lineal $T_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$T_A(x) = \int_A T(x) dx$$

Probar que si $T_A \in X^*$ para todo $A \subseteq [0, 1]$ medible, entonces T es continua.

Ejercicio 1.5.9. Sean X un espacio de Banach real y $T : X \longrightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$ una aplicación lineal. Se considera, para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, el funcional lineal $T_n : X \longrightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$T_n(x) = \int_0^1 t^n T(x)(t) dt$$

Probar que si $T_n \in X^*$ para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, entonces T es continua.

Ejercicio 1.5.10. Sean (E, d) un espacio métrico y X un espacio normado. Probar que una función $F : E \longrightarrow X$ es lipschitziana si, y sólo si, para todo $x^* \in X^*$, la función $x^* \circ F : E \longrightarrow \mathbb{K}$ lo es.

Ejercicio 1.5.11. Sea $\mathcal{H}$ el espacio vectorial de las funciones enteras de variable compleja.

a) Probar que la fórmula

$$\|f\| = \max\{|f(z)| : |z| = 1\}$$

define una norma en $\mathcal{H}$.

b) Probar que la aplicación $F : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$ definida por

$$[F(f)](z) = f\left(\frac{z}{2}\right) \quad (f \in \mathcal{H}, z \in \mathbb{C})$$

es una biyección lineal y continua. (Indicación: Utilizar el principio del módulo máximo).

c) Probar que F^{-1} es discontinua.

d) ¿Es $\mathcal{H}$ un espacio de Banach?