Bd. 28 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**

2 Halbgruppen **4**

2.1 Definition der Halbgruppe 4
2.2 Produkte endlicher Wörter 6
2.3 Klammerungsunabhängigkeit 6
2.4 Beispiele von Halbgruppen 7
2.4.1 Die Potenzhalbgruppe 7
2.5 Weitere Beispiele 9
2.6 Potenzen in Halbgruppen 15
2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge 16
2.6.2 Positive Potenzen 19
2.6.3 Potenzgesetze 25
2.7 Idempotente Elemente 30
2.8 Unterhalbgruppen 33
2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen 39
2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen 47
2.9 Ideale 57
2.9.1 Hauptideale 73
2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen 94
2.11 Green-Relationen 105
2.11.1 Äquivalenzeigenschaften 115
2.12 Morphismen von Halbgruppen 133
2.12.1 Grundlegende Eigenschaften 135
2.13 Ausblick auf Rechtecksbänder 142
2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen 142
2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz 146
2.14.2 Transport von Lösungsmengen 164
2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern . 167
2.15 Beispiele von Isomorphismen 175
2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen 176
2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse 202
2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen 216

2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen 226
2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen 233
2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen . 266
2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen . . . 275
2.15.8 Kongruenzen und Quotienten 291
2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen 311
2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen 324
2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen 336
2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen 343
2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit . 344
2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung 360
2.17 Produktquadrate mit höchstens zwei Werten 361

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 28.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Axiome:	
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \star y \in A$
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
Neues Symbol:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 28.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 28.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{BinOp}(A, \star)$$

Theorem 28.2.1.1 (Fünfgliedrige Umklammerung in Halbgruppen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d,e \in A \vdash \\ (a\star b)\star\big((c\star d)\star e\big) = \big((a\star(b\star c))\star d\big)\star e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $d \in A$	A
6	6 $e \in A$	A
1,2,3	7 $a\star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1,4,5	8 $c\star d \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	9 $((a\star b)\star c)\star d = (a\star b)\star(c\star d)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10 $(a\star b)\star(c\star d) = ((a\star b)\star c)\star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5, 6	11 $((a\star b)\star(c\star d))\star e = (a\star b)\star((c\star d)\star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 6)
1,2,3,4,5, 6	12 $(a\star b)\star((c\star d)\star e) = ((a\star b)\star(c\star d))\star e$	Th. 2.9.1.1(11)
	13 $((a\star b)\star(c\star d))\star e = ((a\star b)\star(c\star d))\star e$	$= I$
1,2,3,4,5	14 $((a\star b)\star(c\star d))\star e = (((a\star b)\star c)\star d)\star e$	$= E(10, 13)$
1,2,3,4	15 $(a\star b)\star c = a\star(b\star c)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 3, 4)
	16 $(((a\star b)\star c)\star d)\star e = (((a\star b)\star c)\star d)\star e$	$= I$
1,2,3,4	17 $(((a\star b)\star c)\star d)\star e = ((a\star(b\star c))\star d)\star e$	$= E(15, 16)$
1,2,3,4,5, 6	18 $(a\star b)\star((c\star d)\star e) = (((a\star b)\star c)\star d)\star e$	$= E(14, 12)$
1,2,3,4,5, 6	19 $(a\star b)\star((c\star d)\star e) = ((a\star(b\star c))\star d)\star e$	$= E(17, 18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x\star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x\star y)\star z = x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

2.2 Produkte endlicher Wörter

Für eine Halbgruppe $\mathsf{HGr}(A, \star)$ bezeichnet $\Pi_\star(u)$ die in Band 27 rekursiv definierte Linksfaltung des nichtleeren Wortes $u \in A^+$. Sie wertet die Faktoren von links nach rechts aus. Das Blockgesetz in den Beweistabellen zeigt, dass man auch zunächst zusammenhängende Blöcke auswerten und danach deren Werte verknüpfen darf.

2.3 Klammerungsunabhängigkeit

Alle vollständigen Klammerungen desselben nichtleeren Wortes liefern in einer Halbgruppe denselben Wert. Der folgende Hauptsatz hält diese Aussage in der Sprache der Klammerungsbäume fest.

Theorem 28.2.3.4 (Unabhängigkeit von der Klammerung).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ w \in A^+,\ S, T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash \mathrm{ev}_\star(S) = \mathrm{ev}_\star(T)$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Beweiskette mit Beispielen, Diagrammen und den beiden Induktionsargumenten. Die Beweistabellen enthalten die sechs Hilfsresultate und alle Ableitungen einschließlich des Schlussbeweises zum Hauptsatz.

Anmerkung zur Produktschreibweise. In einer Halbgruppe haben alle vollständigen Klammerungen eines endlichen, nichtleeren Produkts denselben Wert, sofern die Reihenfolge der Faktoren unverändert bleibt. Für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ und Faktoren $a_1, \ldots, a_n \in A$ dürfen wir deshalb einfach

$$a_1 \star a_2 \star \cdots \star a_n$$

schreiben. Gemeint ist der gemeinsame Wert aller dieser Klammerungen, beispielsweise der von links ausgewertete Wert. Bei einem einzigen Faktor ist das Produkt gleich a_1.

Die Klammern können somit weggelassen oder nach Bedarf gesetzt werden. Ein beliebiges Vertauschen von Faktoren ist damit nicht erlaubt; dazu

wäre zusätzlich Kommutativität nötig. Ein leeres Produkt wird hier nicht eingeführt, da eine Halbgruppe kein neutrales Element besitzen muss.

Die im Beweis verwendete Baum-Normalform, die jede Baumauswertung auf die Linksfaltung ihres Blattwortes zurückführt, steht zusammen mit ihrem Beweis in den Beweistabellen.

2.4 Beispiele von Halbgruppen

2.4.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 28.2.4.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen:	$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen:	$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:	
Mengenweise Operation:	$\triangleright\star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}\end{array}$$

Die rechte Seite verwendet unmittelbar die Mehrfachindex- und Operatorschreibweise aus Def. 3.18.1.1. Sie bezeichnet eine Menge: Ausgeschrieben ist

$$\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} = \bigcup \big\{ \{x \star y \mid y \in Y\} \;\big|\; x \in X \big\}.$$

Die inneren Termbildmengen und ihre äußere Familie existieren nach Th. 3.18.1.1; ihre Vereinigung sammelt alle erzeugten Werte. Gleichwertig kann $X \times Y$ als Menge der Paarindizes verwendet werden. Nach Th. 3.20.2.5 ist die Produktmenge für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ wieder eine nichtleere Teilmenge von A.

Theorem 28.2.4.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 28.2.4.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Abgeschlossenheit und die Assoziativität anhand eines durchgehenden Beispiels. Die Beweistabellen führen die Gleichheitskette mit Th. 3.20.1.2 und Th. 3.20.1.3 aus; der abschließende Schritt steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Die folgenden Hilfsaussagen halten die im Beweis benötigten Teilmengenschritte fest. Ihre Beweise stehen in der Tabellenfassung.

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge Th. 28.2.4.2(H2)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt Th. 28.2.4.2(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash$$
$$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger Th. 28.2.4.2(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash X\star_{\mathcal{P}}Y\subseteq A$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Äußere Darstellung bei linker Klammerung Th. 28.2.4.2(H5)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash\\ (X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=\{u\star z\mid u\in X\star_{\mathcal{P}}Y,z\in Z\}\end{array}$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Äußere Darstellung bei rechter Klammerung Th. 28.2.4.2(H6)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash\\ \{x\star v\mid x\in X,v\in Y\star_{\mathcal{P}}Z\}=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)\end{array}$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Assoziativität der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(H7)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash\\ (X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)\end{array}$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A,\star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

Definition 28.2.4.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a$
Funktionen:	$\star,\ \eta_A$
Neue Symbole:	
Einermengenschicht:	$\triangleright\,\mathrm{Sing}(A)$
Einermengenabbildung:	$\triangleright\,\eta_A$

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\\ \mathrm{Sing}(A)\coloneqq\big\{\{a\}\;\big|\;a\in A\big\},\\ \eta_A\colon A\to\mathrm{Sing}(A),\qquad \eta_A(a)\coloneqq\{a\}\end{array}$$

2.5 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen $\min_{A,\leq}$ und $\max_{A,\leq}$; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

Theorem 28.2.5.1 (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \mathsf{HGr}\left(A, \min_{A,\leq}\right)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
1	2 $\min_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4(1)
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
3,4	5 $(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6 $\min_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7 $z \in A$	A
1,3,4,7	8 $\min\limits_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(x,y),z) = \min\limits_{A,\leq}(x,\min\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.19(1, 3, 4, 7)
1	9 $\mathsf{HGr}(A,\min_{A,\leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 15.2.3.4
A	Th. 15.2.3.4
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.4
$\leq$	Th. 15.2.3.4
Funktionen:	Th. 15.2.3.4
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.4
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \min\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 15.2.3.19
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 15.2.3.19
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.19
$\leq$	Th. 15.2.3.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 15.2.3.19
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.19
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y,z \in A \vdash$ $\min\limits_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(x,y),z) = \min\limits_{A,\leq}(x,\min\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.19
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.5.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \mathsf{HGr}\left(A, \max_{A,\leq}\right)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
1	2 $\max_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8(1)
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
3,4	5 $(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6 $\max_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7 $z \in A$	A
1,3,4,7	8 $\max\limits_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(x,y),z) = \max\limits_{A,\leq}(x,\max\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.20(1, 3, 4, 7)
1	9 $\mathsf{HGr}(A,\max_{A,\leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 15.2.3.8
A	Th. 15.2.3.8
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.8
$\leq$	Th. 15.2.3.8
Funktionen:	Th. 15.2.3.8
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.8
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 15.2.3.20
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 15.2.3.20
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.20
$\leq$	Th. 15.2.3.20

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 15.2.3.20
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.20
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y,z \in A \vdash$ $\max\limits_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(x,y),z) = \max\limits_{A,\leq}(x,\max\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.20
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.5.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{N},+)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $(a+b)+c = a+(b+c)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N},+)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+c = a+(b+c)$	Th. 10.4.4.41
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.5.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1$(1, 2)$
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.7.11$(1, 2, 4)$
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1$(3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.7.11
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.11
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.7.11
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

2.6 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf

die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 28.2.6.1 (Rechtstranslation).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$
Neues Symbol:
Rechtstranslation: $\triangleright\, \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\rho_{A,\star,a}(x) \coloneqq x \star a\right)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2,3	4 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3, 2)
1,2	5 $\forall x \in A\, x \star a \in A$	$\forall I(\to I(3,4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1

Theorem 28.2.6.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Def. 28.2.6.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.6.1
$A,\ a,\ x$	Def. 28.2.6.1
Funktionen:	Def. 28.2.6.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Def. 28.2.6.1
Neues Symbol	Def. 28.2.6.1
Rechtstranslation:	Def. 28.2.6.1
$\triangleright\, \rho_{A,\star,a}$	Def. 28.2.6.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\rho_{A,\star,a}(x) \coloneqq x \star a\right)$	Def. 28.2.6.1

Theorem 28.2.6.2 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a, x \in A \vdash \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2	4 $\forall u \in A\, \rho_{A,\star,a}(u) = u \star a$	Def. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5 $\rho_{A,\star,a}(x) = x \star a$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.6.1
$A,\ a,\ x$	Def. 28.2.6.1
Funktionen:	Def. 28.2.6.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Def. 28.2.6.1
Neues Symbol	Def. 28.2.6.1
Rechtstranslation:	Def. 28.2.6.1
$\triangleright\, \rho_{A,\star,a}$	Def. 28.2.6.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\rho_{A,\star,a}(x) \coloneqq x \star a\right)$	Def. 28.2.6.1

Definition 28.2.6.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a},\ \mathrm{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Potenzfolge: $\triangleright\ \mathrm{pow}_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a) \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$$

Theorem 28.2.6.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N} \to A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\rho_{A,\star,a}\colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}\colon \mathbb{N} \to A$	Th. 10.4.3.2(2, 3)
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2	6 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N} \to A$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.6.1
$A,\ a$	Th. 28.2.6.1
Funktionen:	Th. 28.2.6.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 28.2.6.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a}\colon A \to A$	Th. 28.2.6.1
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Def. 28.2.6.2
$A,\ a$	Def. 28.2.6.2
Funktionen:	Def. 28.2.6.2
$\star,\ \rho_{A,\star,a},\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Def. 28.2.6.2
Neues Symbol	Def. 28.2.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Potenzfolge:	Def. 28.2.6.2
$\triangleright \operatorname{pow}_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.6.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \operatorname{pow}_{A,\star}(a) \coloneqq \operatorname{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2

2.6.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $(n-1)+1 = n$. Der Index $n-1$ stimmt daher die bei 0 beginnende Potenzfolge auf die bei 1 beginnenden Exponenten ab.

Definition 28.2.6.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \operatorname{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$$
$$a^n \coloneqq \operatorname{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$$

Theorem 28.2.6.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \operatorname{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \operatorname{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5 $n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
1,2,3	6 $a^{n+1} = \operatorname{pow}_{A,\star}(a)((n+1)-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 4, 5)
3	7 $(n+1)-1 = n$	Th. 10.4.4.49(3)
1,2,3	8 $a^{n+1} = \operatorname{pow}_{A,\star}(a)(n)$	$= E(7,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Def. 28.2.6.3
$A,\ a,\ n$	Def. 28.2.6.3
Funktionen:	Def. 28.2.6.3
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Def. 28.2.6.3
Neues Symbol	Def. 28.2.6.3
Positive Potenz:	Def. 28.2.6.3
$\triangleright a^n$	Def. 28.2.6.3
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$ $a^n \coloneqq \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3
Mengen:	Th. 10.4.4.49
n	Th. 10.4.4.49
$n \in \mathbb{N} \vdash (n+1) - 1 = n$	Th. 10.4.4.49

Theorem 28.2.6.5 (Erste positive Potenz).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	4	$a^{0+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	5	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	7	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 10.4.3.4(2, 6)
1,2	8	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0) = a$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1,2	9	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, 8)
	10	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	11	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(10)

1,2 $12\ a^1 = a$ $= E(11, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 28.2.6.4
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.4
Funktionen:	Th. 28.2.6.4
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4
Mengen:	Def. 28.2.6.2
$A,\ a$	Def. 28.2.6.2
Funktionen:	Def. 28.2.6.2
$\star,\ \rho_{A,\star,a},\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Def. 28.2.6.2
Neues Symbol	Def. 28.2.6.2
Potenzfolge:	Def. 28.2.6.2
$\triangleright\ \mathrm{pow}_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.6.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a) \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2
Mengen:	Th. 28.2.6.1
$A,\ a$	Th. 28.2.6.1
Funktionen:	Th. 28.2.6.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 28.2.6.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39

Theorem 28.2.6.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3,4	7	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	8	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1))$	Th. 10.4.4.54(2, 6, 3, 4)
1,2,3,4	9	$n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	10	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \in A$	Th. 10.4.3.3(2, 6, 9)
1,2,3,4	11	$\rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a$	Th. 28.2.6.2(1, 2, 10)
1,2,3,4	12	$a^n = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	13	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	14	$a^n = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4	15	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) = a^n$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	16	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a = a^n \star a$	$= E(15)$
1,2,3,4	17	$\rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(11, 16)
1,2,3,4	18	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(8, 17)
1,2,3,4	19	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(7, 18)
1,2,3,4	20	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(5, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.6.4
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.4
Funktionen:	Th. 28.2.6.4
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4
Mengen:	Th. 28.2.6.1
$A,\ a$	Th. 28.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 28.2.6.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 28.2.6.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1
Mengen:	Def. 28.2.6.2
$A,\ a$	Def. 28.2.6.2
Funktionen:	Def. 28.2.6.2
$\star,\ \rho_{A,\star,a},\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Def. 28.2.6.2
Neues Symbol	Def. 28.2.6.2
Potenzfolge:	Def. 28.2.6.2
$\triangleright\ \mathrm{pow}_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.6.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a) \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2
Mengen:	Th. 10.4.4.54
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.54
Funktionen:	Th. 10.4.4.54
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.54
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$	Th. 10.4.4.54
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Th. 28.2.6.2
$A,\ a,\ x$	Th. 28.2.6.2
Funktionen:	Th. 28.2.6.2
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 28.2.6.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,x \in A \vdash \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a$	Th. 28.2.6.2
Mengen:	Def. 28.2.6.3
$A,\ a,\ n$	Def. 28.2.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.6.3
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Def. 28.2.6.3
Neues Symbol	Def. 28.2.6.3
Positive Potenz:	Def. 28.2.6.3
$\triangleright a^n$	Def. 28.2.6.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$ $a^n \coloneqq \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 28.2.6.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \neq 0$	A
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3(1, 2)
3,4	6 $(n-1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	7 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1) \in A$	Th. 5.2.3.9(5, 6)
1,2,3,4	8 $a^n = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9 $a^n \in A$	$= E(8, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.6.3
$A,\ a$	Th. 28.2.6.3
Funktionen:	Th. 28.2.6.3
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3
Mengen:	Th. 10.4.4.47

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 28.2.6.3
$A,\ a,\ n$	Def. 28.2.6.3
Funktionen:	Def. 28.2.6.3
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Def. 28.2.6.3
Neues Symbol	Def. 28.2.6.3
Positive Potenz:	Def. 28.2.6.3
$\triangleright\, a^n$	Def. 28.2.6.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$ $a^n \coloneqq \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3

2.6.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 28.2.6.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ m,n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash a^{m+n} = a^m \star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1 Th. 28.2.6.8(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ m \in \mathbb{N},\ m \neq 0 \vdash a^{m+1} = a^m \star a^1$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}$	A

4	4 $m \neq 0$	A
1,2,3,4	5 $a^{m+1} = a^m \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 3, 4)
1,2	6 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2,3,4	7 $a^{m+1} = a^m \star a^1$	$= E(6, 5)$

Induktionsschritt von k auf $k+1$ Th. 28.2.6.8(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,k\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ k\neq 0,$$
$$a^{m+k}=a^m\star a^k\vdash a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $k\in\mathbb{N}$	A
5	5 $m\neq 0$	A
6	6 $k\neq 0$	A
7	7 $a^{m+k}=a^m\star a^k$	A
3,4	8 $m+k\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
3,4,5	9 $m+k\neq 0$	Th. 10.4.4.45(3, 4, 5)
3,4	10 $m+(k+1)=(m+k)+1$	Th. 10.4.4.15(3, 4)
1,2,3,4,5	11 $a^{(m+k)+1}=a^{m+k}\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 8, 9)
1,2,3,5	12 $a^m\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 3, 5)
1,2,4,6	13 $a^k\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	14 $(a^m\star a^k)\star a=a^m\star(a^k\star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 13, 2)
1,2,4,6	15 $a^{k+1}=a^k\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	16 $a^{m+(k+1)}=(a^m\star a^k)\star a$	$=E(10,=E(7,11))$
1,2,3,4,5, 6	17 $(a^m\star a^k)\star a=a^m\star a^{k+1}$	$=E(15,14)$
1,2,3,4,5, 6,7	18 $a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$	Th. 2.9.1.2(16, 17)

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $n\in\mathbb{N}$	A
5	5 $m\neq 0$	A
6	6 $n\neq 0$	A
1,2,3,5	7 $a^{m+1}=a^m\star a^1$	Th. 28.2.6.8($H1$)(1, 2, 3, 5)
8	8 $k\in\mathbb{N}$	A
9	9 $k\neq 0$	A

10	10 $a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
1,2,3,5,8, 9,10	11 $a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	Th. 28.2.6.8($H2$)(1, 2, 3, 8, 5, 9, 10)
1,2,3,5	12 $\forall k \in \mathbb{N}\,\big(k \neq 0 \rightarrow (a^{m+k} = a^m \star a^k \rightarrow a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 11))))$
1,2,3,5	13 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \rightarrow a^{m+k} = a^m \star a^k)$	Th. 10.4.4.18(7, 12)
1,2,3,4,5, 6	14 $a^{m+n} = a^m \star a^n$	$\rightarrow E(6, \rightarrow E(4, \forall E(13)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.6.6
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.6
Funktionen:	Th. 28.2.6.6
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.6
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6
Mengen:	Th. 28.2.6.5
$A,\ a$	Th. 28.2.6.5
Funktionen:	Th. 28.2.6.5
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash a^1 = a$	Th. 28.2.6.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$	Th. 10.4.4.45
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Mengen:	Th. 28.2.6.7
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.7
Funktionen:	Th. 28.2.6.7
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.7
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^n \in A$	Th. 28.2.6.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
$a=b,\ b=c\vdash a=c$	Th. 2.9.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m\in\mathbb{N},\ m\neq 0\vdash a^{m+1}=a^m\star a^1$	Th. 28.2.6.8(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,k\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ k\neq 0,$ $a^{m+k}=a^m\star a^k\vdash a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$	Th. 28.2.6.8(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x\in\mathbb{N}\,(x\neq 0\to(P(x)\to P(x+1)))$ $\vdash\forall x\in\mathbb{N}\,(x\neq 0\to P(x))$	Th. 10.4.4.18

Theorem 28.2.6.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: $A,\ a,\ m,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,n\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ n\neq 0\vdash a^m\star a^n=a^n\star a^m$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
3	3	$m\in\mathbb{N}$	A
4	4	$n\in\mathbb{N}$	A
5	5	$m\neq 0$	A
6	6	$n\neq 0$	A
1,2,3,4,5,6	7	$a^{m+n}=a^m\star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5,6	8	$a^m\star a^n=a^{m+n}$	Th. 2.9.1.1(7)
3,4	9	$m+n=n+m$	Th. 10.4.4.42(3, 4)
3,4	10	$a^{m+n}=a^{n+m}$	$=E(9)$
1,2,3,4,5,6	11	$=a^n\star a^m$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 4, 3, 6, 5)
1,2,3,4,5,6	12	$a^m\star a^n=a^n\star a^m$	Tr.(8, 10, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.6.8
$A,\ a,\ m,\ n,\ k$	Th. 28.2.6.8
Funktionen:	Th. 28.2.6.8
$\star$	Th. 28.2.6.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,n\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ n\neq 0\vdash a^{m+n}=a^m\star a^n$	Th. 28.2.6.8
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{N}\vdash a+b=b+a$	Th. 10.4.4.42

2.7 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 28.2.7.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash E_{A,\star}\coloneqq\left\{e\in A\;\middle|\;e\star e=e\right\}$$

Theorem 28.2.7.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash e\in E_{A,\star}\leftrightarrow\big(e\in A\wedge e\star e=e\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2	$E_{A,\star}=\{u\in A\mid u\star u=u\}$	Def. 28.2.7.1(1)
1	3	$e\in\{u\in A\mid u\star u=u\}\leftrightarrow(e\in A\wedge e\star e=e)$	Th. 3.7.2.5
1	4	$e\in E_{A,\star}\leftrightarrow\big(e\in A\wedge e\star e=e\big)$	$=E(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.7.1
$A,\ e$	Def. 28.2.7.1
Funktionen:	Def. 28.2.7.1
$\star$	Def. 28.2.7.1
Neues Symbol	Def. 28.2.7.1
Idempotentenmenge:	Def. 28.2.7.1
$\triangleright E_{A,\star}$	Def. 28.2.7.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash E_{A,\star} \coloneqq \left\{e \in A \;\middle|\; e \star e = e\right\}$	Def. 28.2.7.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 28.2.7.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: $A,\ e,\ n,\ k$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in E_{A,\star},\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash e^n = e$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1 Th. 28.2.7.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
1,2	3 $e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2	4 $e \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $e^1 = e$	Th. 28.2.6.5(1, 4)

Induktionsschritt von k auf $k+1$ Th. 28.2.7.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in E_{A,\star},\ k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ e^k = e \vdash e^{k+1} = e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \neq 0$	A
5	5 $e^k = e$	A
1,2	6 $e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2,3,4	7 $e^{k+1} = e^k \star e$	Th. 28.2.6.6(1, $\wedge E1$ (6), 3, 4)
1,2,3,4,5	8 $e^{k+1} = e \star e$	$= E(5, 7)$
1,2,3,4,5	9 $e^{k+1} = e$	Th. 2.9.1.2(8, $\wedge E2$ (6))

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \neq 0$	A
1,2	5 $e^1 = e$	Th. 28.2.7.2($H1$)(1, 2)
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $k \neq 0$	A
8	8 $e^k = e$	A
1,2,6,7,8	9 $e^{k+1} = e$	Th. 28.2.7.2($H2$)(1, 2, 6, 7, 8)
1,2	10 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \to (e^k = e \to e^{k+1} = e))$	$\forall I(\to I(6, \to I(7, \to I(8, 9))))$
1,2	11 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \to e^k = e)$	Th. 10.4.4.18(5, 10)
1,2,3,4	12 $e^n = e$	$\to E(4, \to E(3, \forall E(11)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.7.1
$A,\ e$	Th. 28.2.7.1
Funktionen:	Th. 28.2.7.1
$\star$	Th. 28.2.7.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow \big(e \in A \wedge e \star e = e\big)$	Th. 28.2.7.1
Mengen:	Th. 28.2.6.5
$A,\ a$	Th. 28.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 28.2.6.5
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash a^1 = a$	Th. 28.2.6.5
Mengen:	Th. 28.2.6.6
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.6
Funktionen:	Th. 28.2.6.6
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.6
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$	Th. 28.2.7.2(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star},\ k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ e^k = e \vdash e^{k+1} = e$	Th. 28.2.7.2(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$	Th. 10.4.4.18

2.8 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U); das Prädikat schreiben wir als $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 28.2.8.1 (Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$U \subseteq A$
Nichtleerheit:	$U \neq \varnothing$
Produktabschluss:	$x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$
Neues Symbol:	
Unterhalbgruppe:	$\triangleright \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$

$$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$$

Axiom 28.2.8.1 (Träger einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

Axiom 28.2.8.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.8.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$$

Theorem 28.2.8.1 (Kriterium für eine Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3 $U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2	4 $U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(1, 2)

5	5	$x \in U$	A
6	6	$y \in U$	A
1,2,5,6	7	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 5, 6)
1,2	8	$\forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9	$U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \rightarrow (U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11	$U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U)$	A
11	12	$U \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$U \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14	$\forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15	$x \in U$	A
16	16	$y \in U$	A
11,15,16	17	$x \star y \in U$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 12, 13, 17)
1	19	$(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U)) \rightarrow \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow (U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U \, \forall y \in U \, (x \star y \in U))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A, \ U, \ x, \ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \, , \ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
Mengen:	Ax. 28.2.8.2
$A, \ U, \ x, \ y$	Ax. 28.2.8.2
Funktionen:	Ax. 28.2.8.2
$\star$	Ax. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \, , \ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2
Mengen:	Ax. 28.2.8.3
$A, \ U, \ x, \ y$	Ax. 28.2.8.3
Funktionen:	Ax. 28.2.8.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Ax. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x\in U,\ y\in U \vdash x\star y\in U$	Ax. 28.2.8.3
Mengen:	Def. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Def. 28.2.8.1
Funktionen:	Def. 28.2.8.1
$\star$	Def. 28.2.8.1
Voraussetzung	Def. 28.2.8.1
Umgebende Halbgruppe:	Def. 28.2.8.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.8.1
Axiome	Def. 28.2.8.1
Träger:	Def. 28.2.8.1
$U\subseteq A$	Def. 28.2.8.1
Nichtleerheit:	Def. 28.2.8.1
$U\neq\varnothing$	Def. 28.2.8.1
Produktabschluss:	Def. 28.2.8.1
$x\in U,\ y\in U\vdash x\star y\in U$	Def. 28.2.8.1
Neues Symbol	Def. 28.2.8.1
Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.1
$\triangleright\,\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	Def. 28.2.8.1
$\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	Def. 28.2.8.1

Theorem 28.2.8.2 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star)\vdash\mathsf{HGr}(U,\star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit Th. 28.2.8.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x,y\in U\vdash x\star y\in U$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
3	3 $x\in U$	A

4	4 $y \in U$	A
1,2,3,4	5 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 3, 4)

Vererbte Assoziativität Th. 28.2.8.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	3 $x \in U$	A
4	4 $y \in U$	A
5	5 $z \in U$	A
1,2	6 $U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2,3	7 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 3)
1,2,4	8 $y \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
1,2,5	9 $z \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
1,2,3,4,5	10 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 9)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3 $\forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	Th. 28.2.8.2($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\forall x, y, z \in U\, ((x \star y) \star z = x \star (y \star z))$	Th. 28.2.8.2($H2$)(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	Def. 28.2.1.1(3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.8.3
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.3
Funktionen:	Ax. 28.2.8.3
$\star$	Ax. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3
Mengen:	Ax. 28.2.8.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x,y \in U \vdash x \star y \in U$	Th. 28.2.8.2(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x,y,z \in U \vdash$ $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 28.2.8.2(H2)
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.8.3 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A

1,4,5	$6\ x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1	$7\ \forall x \in A\, \forall y \in A\, (x \star y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	$8\ A \subseteq A \wedge A \neq \varnothing \wedge \forall x \in A\, \forall y \in A\, (x \star y \in A)$	$\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$
1,2	$9\ \mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$	Th. 28.2.8.1

2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ X$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$$
$$\langle X \rangle_{A,\star} \coloneqq \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$$

Theorem 28.2.8.4 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: $A,\ U,\ X,\ x,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$$
$$X \subseteq \langle X \rangle_{A,\star}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
3	4 $\exists u\,(u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5 $u \in X$	A
2,5	6 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7 $A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8 $A \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	11 $x \in X$	A
12	12 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	13 $X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	14 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
11	15 $\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to x \in U\right)$	$\forall I(\to I(12, 14))$
1,2,3,11	16 $x \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10, 15)
1,2,3	17 $\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,11	18 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U = \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,3,11	19 $x \in \langle X \rangle_{A,\star}$	$= E(18, 16)$
1,2,3	20 $X \subseteq \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1([11]$\dot{:}$19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.3
$A,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.3
Funktionen:	Th. 28.2.8.3
$\star$	Th. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.8
Mengen:	Def. 28.2.8.2
$A,\ U,\ X$	Def. 28.2.8.2
Funktionen:	Def. 28.2.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\star$	Def. 28.2.8.2
Neues Symbol	Def. 28.2.8.2
Erzeugte Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.2
$\triangleright \langle X \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$ $\langle X \rangle_{A,\star} \coloneqq \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 28.2.8.5 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ V,\ X$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X \subseteq U \vdash \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq U$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
4	4 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
5	5 $X \subseteq U$	A
4,5	6 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U$	$\wedge I(4,5)$
4,5	7 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(V;A,\star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	8 $\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(V;A,\star) \wedge X \subseteq V} V$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9 $\langle X \rangle_{A,\star} \subseteq U$	$= E(8,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.10.3.10
Mengen:	Def. 28.2.8.2
$A,\ U,\ X$	Def. 28.2.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.8.2
$\star$	Def. 28.2.8.2
Neues Symbol	Def. 28.2.8.2
Erzeugte Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.2
$\triangleright \langle X \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$ $\langle X \rangle_{A,\star} := \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2

Theorem 28.2.8.6 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ X,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ x,y \in \langle X \rangle_{A,\star} \vdash$$
$$x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}$$

Beweis.

Trägerzeugen und Schnittdarstellung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
4	4 $x \in \langle X \rangle_{A,\star}$	A
5	5 $y \in \langle X \rangle_{A,\star}$	A
3	6 $\exists u\,(u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
7	7 $u \in X$	A
2,7	8 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,7	9 $A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	10 $A \neq \varnothing$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 10)
1,2,3	12 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	13 $\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	14 $x \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	15 $y \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	16 $\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 14)
1,2,3,5	17 $\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 15)

Abschluss in jedem Oberträger und Schnittschluss:

18	18 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U$	A
18	19 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4, 18	20 $x \in U$	$\to E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5, 18	21 $y \in U$	$\to E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5, 18	22 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 19, 20, 21)
1,2,3,4,5	23 $\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U \to x \star y \in U\right)$	$\forall I(\to I(18, 22))$
1,2,3,4,5	24 $x \star y \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12, 23)
1,2,3,4,5	25 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U = \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5	26 $x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}$	$= E(25, 24)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.3
$A,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.3
Funktionen:	Th. 28.2.8.3
$\star$	Th. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A;A,\star)$	Th. 28.2.8.3
Mengen:	Def. 28.2.8.2
$A,\ U,\ X$	Def. 28.2.8.2
Funktionen:	Def. 28.2.8.2
$\star$	Def. 28.2.8.2
Neues Symbol	Def. 28.2.8.2
Erzeugte Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.2
$\triangleright \langle X \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$ $\langle X \rangle_{A,\star} := \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.8
Mengen:	Ax. 28.2.8.3
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.3
Funktionen:	Ax. 28.2.8.3
$\star$	Ax. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 28.2.8.7 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star}; A,\star)$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses Th. 28.2.8.7(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
3	4	$\exists u\,(u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\mathsf{UHGr}(A; A,\star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A$	Th. 28.2.8.5(1, 2, 3, 9, 2)
1,2,3	11	$X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1, 2, 3)
2,3	12	$\exists u\,(u \in \langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	13	$\langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	14	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	$\wedge I(10, 13)$

Produktabschluss des Erzeugnisses Th. 28.2.8.7(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\subseteq A,\ X\neq\varnothing\vdash$$
$$\forall x\in\langle X\rangle_{A,\star}\,\forall y\in\langle X\rangle_{A,\star}\,(x\star y\in\langle X\rangle_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\subseteq A$	A
3	3 $X\neq\varnothing$	A
4	4 $x\in\langle X\rangle_{A,\star}$	A
5	5 $y\in\langle X\rangle_{A,\star}$	A
1,2,3,4,5	6 $x\star y\in\langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.6(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	7 $\forall x\in\langle X\rangle_{A,\star}\,\forall y\in\langle X\rangle_{A,\star}\,(x\star y\in\langle X\rangle_{A,\star})$	$\forall I(\to I(4,\forall I(\to I(5,6))))$

Schluss Th. 28.2.8.7(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\subseteq A,\ X\neq\varnothing\vdash$$
$$\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star};A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\subseteq A$	A
3	3 $X\neq\varnothing$	A
1,2,3	4 $\langle X\rangle_{A,\star}\subseteq A\wedge$ $\langle X\rangle_{A,\star}\neq\varnothing$	Th. 28.2.8.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\langle X\rangle_{A,\star}\subseteq A$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $\langle X\rangle_{A,\star}\neq\varnothing$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\forall x\in\langle X\rangle_{A,\star}$ $\quad\forall y\in\langle X\rangle_{A,\star}\,(x\star y\in\langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 28.2.8.7($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	8 $\langle X\rangle_{A,\star}\subseteq A\wedge\langle X\rangle_{A,\star}\neq\varnothing\wedge$ $\forall x\in\langle X\rangle_{A,\star}$ $\quad\forall y\in\langle X\rangle_{A,\star}\,(x\star y\in\langle X\rangle_{A,\star})$	$\wedge I(5,\wedge I(6,7))$
1,2,3	9 $\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star};A,\star)$	Th. 28.2.8.1(1, 8)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A\neq\varnothing\dashv\vdash\exists x\,(x\in A)$	Th. 3.6.3.7
$A\subseteq B,\ x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.3
$A,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.3
Funktionen:	Th. 28.2.8.3
$\star$	Th. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A; A,\star)$	Th. 28.2.8.3
Mengen:	Th. 28.2.8.5
$A,\ U,\ V,\ X$	Th. 28.2.8.5
Funktionen:	Th. 28.2.8.5
$\star$	Th. 28.2.8.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ \mathsf{UHGr}(U; A,\star),\ X \subseteq U \vdash \langle X\rangle_{A,\star} \subseteq U$	Th. 28.2.8.5
Mengen:	Th. 28.2.8.4
$A,\ U,\ X,\ x,\ u$	Th. 28.2.8.4
Funktionen:	Th. 28.2.8.4
$\star$	Th. 28.2.8.4
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4
Mengen:	Th. 3.6.3.9
$A,\ M,\ a$	Th. 3.6.3.9
$A \subseteq M,\ A \neq \varnothing \vdash \exists a \in M\, a \in A$	Th. 3.6.3.9
Mengen:	Th. 28.2.8.6
$A,\ U,\ X,\ x,\ y,\ u$	Th. 28.2.8.6
Funktionen:	Th. 28.2.8.6
$\star$	Th. 28.2.8.6
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ x, y \in \langle X\rangle_{A,\star} \vdash x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.6
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 28.2.8.7(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}\, \forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\, (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 28.2.8.7(H2)
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$	Th. 28.2.8.1

2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a \rangle_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} \coloneqq \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$$

Theorem 28.2.8.8 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star};A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	4 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	5 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1,2	6 $\mathsf{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A,\star};A,\star)$	Th. 28.2.8.7(1, 3, 5)
1,2	7 $\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	8 $\mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star};A,\star)$	$= E(7, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.7
$A,\ X,\ x,\ y,\ u$	Th. 28.2.8.7
Funktionen:	Th. 28.2.8.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\star$	Th. 28.2.8.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\subseteq A,\ X\neq\varnothing\vdash$ $\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star};A,\star)$	Th. 28.2.8.7
Mengen:	Def. 28.2.8.3
$A,\ a$	Def. 28.2.8.3
Funktionen:	Def. 28.2.8.3
$\star$	Def. 28.2.8.3
Neues Symbol	Def. 28.2.8.3
Monogene Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.3
$\triangleright\langle a\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\langle a\rangle_{A,\star}\coloneqq\langle\{a\}\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3

Definition 28.2.8.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash P_{A,\star}(a)\coloneqq\left\{x\in A\;\middle|\;\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\right\}$$

Theorem 28.2.8.9 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\left(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\right)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge u=a^n)\}$	Def. 28.2.8.4(1, 2)
1,2	4	$x\in\{u\in A\mid\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge u=a^n)\}\leftrightarrow(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\left(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\right)$	$=E(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.8.4
$A,\ a,\ x,\ n$	Def. 28.2.8.4
Funktionen:	Def. 28.2.8.4
$\star$	Def. 28.2.8.4
Neues Symbol	Def. 28.2.8.4
Positive Potenzmenge:	Def. 28.2.8.4
$\triangleright P_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.8.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \left\{x \in A \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)\right\}$	Def. 28.2.8.4
	Def. 28.2.8.4
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 28.2.8.10 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ y,\ m,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit Th. 28.2.8.10(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$$
$$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $P_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7 $a = a^1$	Th. 2.9.1.1(6)

1,2	8	$a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, 7)))$
1,2	9	$a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 8)
1,2	10	$P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	$\wedge I(3, 10)$

Produktabschluss der positiven Potenzen Th. 28.2.8.10(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$$
$$\forall x \in P_{A,\star}(a)\,\forall y \in P_{A,\star}(a)\,(x \star y \in P_{A,\star}(a))$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A,\star}(a)$	A
4	4	$y \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	5	$x \in A \wedge \exists m \in \mathbb{N}\,(m \neq 0 \wedge x = a^m)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\exists m \in \mathbb{N}\,(m \neq 0 \wedge x = a^m)$	$\wedge E2(5)$
1,2,4	7	$y \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge y = a^n)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 4)
1,2,4	8	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge y = a^n)$	$\wedge E2(7)$
9	9	$m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	A
10	10	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	A
9	11	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	12	$m \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	13	$x = a^m$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
10	14	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	15	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	16	$y = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
9,10	17	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(11, 14)
9,10	18	$m + n \neq 0$	Th. 10.4.4.45(11, 14, 12)
1,2,9,10	19	$a^{m+n} = a^m \star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 11, 14, 12, 15)
1,2,9,10	20	$x \star y = a^{m+n}$	$= E(13, 16, 19)$
1,2,9,10	21	$a^{m+n} \in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 17, 18)
1,2,9,10	22	$x \star y \in A$	$= E(20, 21)$
1,2,9,10	23	$x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$	$\wedge I(22, \exists I(17, \wedge I(18, 20)))$
1,2,9,10	24	$x \star y \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 23)
1,2,3,4	25	$x \star y \in P_{A,\star}(a)$	$\exists E(6, 9, \exists E(8, 10, 24))$
1,2	26	$\forall x \in P_{A,\star}(a)\,\forall y \in P_{A,\star}(a)\,(x \star y \in P_{A,\star}(a))$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, 25))))$

Schluss Th. 28.2.8.10(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge$ $P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	Th. 28.2.8.10($H1$) $(1,2)$
1,2	4 $P_{A,\star}(a)\subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	$\wedge E2(3)$
1,2	6 $\forall x\in P_{A,\star}(a)$ $\quad\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$	Th. 28.2.8.10($H2$) $(1,2)$
1,2	7 $P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge P_{A,\star}(a)\neq\varnothing\wedge$ $\forall x\in P_{A,\star}(a)$ $\quad\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$	$\wedge I(4,\wedge I(5,6))$
1,2	8 $\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.8.1$(1,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x\in A\mid P(x)\}\subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1\neq 0$	Th. 10.4.4.6
Mengen:	Th. 28.2.6.5
$A,\ a$	Th. 28.2.6.5
Funktionen:	Th. 28.2.6.5
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash a^1=a$	Th. 28.2.6.5
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.8.9
$A,\ a,\ x,\ n$	Th. 28.2.8.9
Funktionen:	Th. 28.2.8.9
$\star$	Th. 28.2.8.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\left(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\right)$	Th. 28.2.8.9
$a\in A\vdash A\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{N}\vdash a+b\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45
$r,s\in\mathbb{N},\ r\neq 0\vdash r+s\neq 0$	Th. 10.4.4.45
Mengen:	Th. 28.2.6.8
$A,\ a,\ m,\ n,\ k$	Th. 28.2.6.8
Funktionen:	Th. 28.2.6.8
$\star$	Th. 28.2.6.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,n\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ n\neq 0\vdash$ $a^{m+n}=a^m\star a^n$	Th. 28.2.6.8
Mengen:	Th. 28.2.6.7
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.7
Funktionen:	Th. 28.2.6.7
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash a^n\in A$	Th. 28.2.6.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	Th. 28.2.8.10(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $\forall x\in P_{A,\star}(a)\,\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$	Th. 28.2.8.10(H2)
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\leftrightarrow$ $\big(U\subseteq A\wedge U\neq\varnothing\wedge\forall x\in U\,\forall y\in U\,(x\star y\in U)\big)$	Th. 28.2.8.1

Theorem 28.2.8.11 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n,\ k,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \langle a\rangle_{A,\star}=P_{A,\star}(a)$$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen Th. 28.2.8.11(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ k\in\mathbb{N},\ k\neq 0\vdash a^k\in\langle a\rangle_{A,\star}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $k\in\mathbb{N}$	A
4	4 $k\neq 0$	A
2	5 $\{a\}\subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	6 $a\in\{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7 $\{a\}\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1,2	8 $a\in\{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2	9 $a\in\langle\{a\}\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1, 5, 7, 8)
1,2	10 $\langle a\rangle_{A,\star}=\langle\{a\}\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	11 $a\in\langle a\rangle_{A,\star}$	$=E(10,9)$
1,2	12 $a^1=a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	13 $a^1\in\langle a\rangle_{A,\star}$	$=E(12,11)$
1,2	14 $\mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star};A,\star)$	Th. 28.2.8.8(1, 2)
15	15 $j\in\mathbb{N}$	A
16	16 $j\neq 0$	A
17	17 $a^j\in\langle a\rangle_{A,\star}$	A
1,2,15,16	18 $a^{j+1}=a^j\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 15, 16)
1,2,17	19 $a^j\star a\in\langle a\rangle_{A,\star}$	Ax. 28.2.8.3(1, 14, 17, 11)
1,2,15, 16,17	20 $a^{j+1}\in\langle a\rangle_{A,\star}$	$=E(18,19)$
1,2	21 $\forall j\in\mathbb{N}\left(j\neq 0\rightarrow (a^j\in\langle a\rangle_{A,\star}\rightarrow a^{j+1}\in\langle a\rangle_{A,\star})\right)$	$\forall I(\rightarrow I(15,\rightarrow I(16,\rightarrow I(17,20))))$
1,2	22 $\forall j\in\mathbb{N}\,(j\neq 0\rightarrow a^j\in\langle a\rangle_{A,\star})$	Th. 10.4.4.18(13, 21)
1,2,3,4	23 $a^k\in\langle a\rangle_{A,\star}$	$\rightarrow E(4,\rightarrow E(3,\forall E(22)))$

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen Th. 28.2.8.11(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$\langle a\rangle_{A,\star}\subseteq P_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.10(1, 2)
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7 $a = a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\exists I(4, \wedge I(5, 7))$
1,2	9 $a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, 8)$
1,2	10 $a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 9)
1,2	11 $\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 3.11.3.15(10)
2	12 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	13 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	14 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(13)
1,2	15 $\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.5(1, 12, 14, 3, 11)
1,2	16 $\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	17 $\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$= E(16, 15)$

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen Th. 28.2.8.11(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$$
$$P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $x \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	4 $x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)$	$\wedge E2(4)$
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	A
6	7 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $x = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,6	10 $a^n \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11($H1$) (1, 2, 7, 8)
1,2,6	11 $x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(9, 10)$
1,2,3	12 $x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\exists E(5, 6, 11)$
1,2	13 $P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1([3]⁝12)

Gleichheit aus beiden Inklusionen Th. 28.2.8.11(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$$
$$\langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\langle a\rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11($H2$) $(1,2)$
1,2	4 $P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11($H3$) $(1,2)$
1,2	5 $\langle a\rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.3.5$(3,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.4
$A,\ U,\ X,\ x,\ u$	Th. 28.2.8.4
Funktionen:	Th. 28.2.8.4
$\star$	Th. 28.2.8.4
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$ $X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4
Mengen:	Def. 28.2.8.3
$A,\ a$	Def. 28.2.8.3
Funktionen:	Def. 28.2.8.3
$\star$	Def. 28.2.8.3
Neues Symbol	Def. 28.2.8.3
Monogene Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.3
$\triangleright \langle a\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \langle a\rangle_{A,\star} \coloneqq \langle\{a\}\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3
Mengen:	Th. 28.2.6.5
$A,\ a$	Th. 28.2.6.5
Funktionen:	Th. 28.2.6.5
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash a^1 = a$	Th. 28.2.6.5
Mengen:	Th. 28.2.8.8
$A,\ a$	Th. 28.2.8.8
Funktionen:	Th. 28.2.8.8
$\star$	Th. 28.2.8.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star};A,\star)$	Th. 28.2.8.8
Mengen:	Th. 28.2.6.6
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.6
Funktionen:	Th. 28.2.6.6
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash$ $a^{n+1}=a^n\star a$	Th. 28.2.6.6
Mengen:	Ax. 28.2.8.3
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.3
Funktionen:	Ax. 28.2.8.3
$\star$	Ax. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x\in U,\ y\in U\vdash x\star y\in U$	Ax. 28.2.8.3
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x\in\mathbb{N}\,(x\neq 0\to(P(x)\to P(x+1)))$ $\vdash\forall x\in\mathbb{N}\,(x\neq 0\to P(x))$	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 28.2.8.10
$A,\ a,\ x,\ y,\ m,\ n$	Th. 28.2.8.10
Funktionen:	Th. 28.2.8.10
$\star$	Th. 28.2.8.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.8.10
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1\neq 0$	Th. 10.4.4.6
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.8.9
$A,\ a,\ x,\ n$	Th. 28.2.8.9
Funktionen:	Th. 28.2.8.9
$\star$	Th. 28.2.8.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\left(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\right)$	Th. 28.2.8.9
Mengen:	Th. 28.2.8.5
$A,\ U,\ V,\ X$	Th. 28.2.8.5
Funktionen:	Th. 28.2.8.5
$\star$	Th. 28.2.8.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\subseteq A,\ X\neq\varnothing,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X\subseteq U\vdash$ $\langle X\rangle_{A,\star}\subseteq U$	Th. 28.2.8.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ k\in\mathbb{N},\ k\neq 0\vdash a^k\in\langle a\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11(H1)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x\in M]\dot{:}x\in N\vdash M\subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $\langle a\rangle_{A,\star}\subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11(H2)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $P_{A,\star}(a)\subseteq\langle a\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11(H3)
$A\subseteq B, B\subseteq A\vdash A=B$	Th. 3.5.3.5

2.9 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 28.2.9.1 (Linksideal).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$
Axiome:	
Träger:	$I\subseteq A$
Nichtleerheit:	$I\neq\varnothing$
Linksabsorption:	$a\in A,\ x\in I\vdash a\star x\in I$
Neues Symbol:	
Linksideal:	$\triangleright\,\mathsf{LId}(I;A,\star)$
	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$

Axiom 28.2.9.1 (Träger eines Linksideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.2 (Nichtleerheit eines Linksideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.9.3 (Linksabsorption eines Linksideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$$

Theorem 28.2.9.1 (Kriterium für ein Linksideal).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star) \leftrightarrow \big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)
5	5 $a \in A$	A
6	6 $x \in I$	A
1,2,5,6	7 $a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 5, 6)
1,2	8 $\forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10 $\mathsf{LId}(I;A,\star) \rightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)$	A
11	12 $I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $I \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $\forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$

15	15 $a \in A$	A
16	16 $x \in I$	A
11,15,16	17 $a \star x \in I$	$\to E(16, \forall E(\to E (15, \forall E(14))))$
1,11	18 $\mathsf{Lld}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.1(1, 12, 13, 17)
1	19 $(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)) \to \mathsf{Lld}(I; A, \star)$	$\to I(11, 18)$
1	20 $\mathsf{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.1
Funktionen:	Ax. 28.2.9.1
$\star$	Ax. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Lld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1
Mengen:	Ax. 28.2.9.2
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.2
Funktionen:	Ax. 28.2.9.2
$\star$	Ax. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Lld}(I; A, \star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2
Mengen:	Ax. 28.2.9.3
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.3
Funktionen:	Ax. 28.2.9.3
$\star$	Ax. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Lld}(I; A, \star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3
Mengen:	Def. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Def. 28.2.9.1
Funktionen:	Def. 28.2.9.1
$\star$	Def. 28.2.9.1
Voraussetzung	Def. 28.2.9.1
Umgebende Halbgruppe:	Def. 28.2.9.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.9.1
Axiome	Def. 28.2.9.1
Träger:	Def. 28.2.9.1
$I \subseteq A$	Def. 28.2.9.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Nichtleerheit:	Def. 28.2.9.1
$I \neq \varnothing$	Def. 28.2.9.1
Linksabsorption:	Def. 28.2.9.1
$a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Def. 28.2.9.1
Neues Symbol	Def. 28.2.9.1
Linksideal:	Def. 28.2.9.1
$\triangleright\, \mathsf{LId}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.1
$\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.1

Definition 28.2.9.2 (Rechtsideal).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \varnothing$
Rechtsabsorption:	$x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$
Neues Symbol:	
Rechtsideal:	$\triangleright\, \mathsf{RId}(I; A, \star)$

$$\mathsf{RId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.4 (Träger eines Rechtsideals).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{RId}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Rechtsideals).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{RId}(I; A, \star) \vdash I \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.9.6 (Rechtsabsorption eines Rechtsideals).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x\in I,\ a\in A\vdash x\star a\in I$$

Theorem 28.2.9.2 (Kriterium für ein Rechtsideal).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash \mathsf{RId}(I;A,\star)\leftrightarrow \big(I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$I\subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$I\neq\varnothing$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5	$x\in I$	A
6	6	$a\in A$	A
1,2,5,6	7	$x\star a\in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 5, 6)
1,2	8	$\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5,\forall I(\rightarrow I(6,7))))$
1,2	9	$I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)$	$\wedge I(3,\wedge I(4,8))$
1	10	$\mathsf{RId}(I;A,\star)\rightarrow (I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I))$	$\rightarrow I(2,9)$
11	11	$I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)$	A
11	12	$I\subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$I\neq\varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14	$\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15	$x\in I$	A
16	16	$a\in A$	A
11,15,16	17	$x\star a\in I$	$\rightarrow E(16,\forall E(\rightarrow E(15,\forall E(14))))$
1,11	18	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.2(1, 12, 13, 17)
1	19	$(I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I))\rightarrow \mathsf{RId}(I;A,\star)$	$\rightarrow I(11,18)$
1	20	$\mathsf{RId}(I;A,\star)\leftrightarrow (I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I))$	$\leftrightarrow I(10,19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.9.4
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.4
Funktionen:	Ax. 28.2.9.4
$\star$	Ax. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4
Mengen:	Ax. 28.2.9.5
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.5
Funktionen:	Ax. 28.2.9.5
$\star$	Ax. 28.2.9.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5
Mengen:	Ax. 28.2.9.6
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.6
Funktionen:	Ax. 28.2.9.6
$\star$	Ax. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6
Mengen:	Def. 28.2.9.2
$A,\ I,\ x,\ a$	Def. 28.2.9.2
Funktionen:	Def. 28.2.9.2
$\star$	Def. 28.2.9.2
Voraussetzung	Def. 28.2.9.2
Umgebende Halbgruppe:	Def. 28.2.9.2
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.9.2
Axiome	Def. 28.2.9.2
Träger:	Def. 28.2.9.2
$I \subseteq A$	Def. 28.2.9.2
Nichtleerheit:	Def. 28.2.9.2
$I \neq \varnothing$	Def. 28.2.9.2
Rechtsabsorption:	Def. 28.2.9.2
$x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$	Def. 28.2.9.2
Neues Symbol	Def. 28.2.9.2
Rechtsideal:	Def. 28.2.9.2
$\triangleright\, \mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.2
$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.2

Definition 28.2.9.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Linksideal:	$\mathsf{LId}(I; A, \star)$
Rechtsideal:	$\mathsf{RId}(I; A, \star)$
Neues Symbol:	
Zweiseitiges Ideal:	$\triangleright \mathsf{Id}(I; A, \star)$

$$\mathsf{Id}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.7 (Zugriff auf das Linksideal eines Ideals).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.8 (Zugriff auf das Rechtsideal eines Ideals).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(I; A, \star)$$

Theorem 28.2.9.3 (Kriterium für ein zweiseitiges Ideal).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{RId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2	5	$\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)$	$\wedge I(3, 4)$
1	6	$\mathsf{Id}(I; A, \star) \rightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7	$\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)$	A
1,7	8	$\mathsf{Id}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.3(1, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2$(7))
1	9	$(\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)) \rightarrow \mathsf{Id}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(7, 8)$
1	10	$\mathsf{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.9.7
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.7
Funktionen:	Ax. 28.2.9.7
$\star$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7
Mengen:	Ax. 28.2.9.8
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.8
Funktionen:	Ax. 28.2.9.8
$\star$	Ax. 28.2.9.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.8
Mengen:	Def. 28.2.9.3
$A,\ I$	Def. 28.2.9.3
Funktionen:	Def. 28.2.9.3
$\star$	Def. 28.2.9.3
Voraussetzung	Def. 28.2.9.3
Umgebende Halbgruppe:	Def. 28.2.9.3
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.9.3
Axiome	Def. 28.2.9.3
Linksideal:	Def. 28.2.9.3
$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3
Rechtsideal:	Def. 28.2.9.3
$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3
Neues Symbol	Def. 28.2.9.3
Zweiseitiges Ideal:	Def. 28.2.9.3
$\triangleright\, \mathsf{Id}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3
$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3

Theorem 28.2.9.4 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.9.7
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.7
Funktionen:	Ax. 28.2.9.7
$\star$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7
Mengen:	Ax. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.1
Funktionen:	Ax. 28.2.9.1
$\star$	Ax. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{LId}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1

Theorem 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.9.7
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.7
Funktionen:	Ax. 28.2.9.7
$\star$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.9.2
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.2
Funktionen:	Ax. 28.2.9.2
$\star$	Ax. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2

Theorem 28.2.9.6 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $x \in I$	A
1,2	5 $\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7$(1,2)$
1,2,3,4	6 $a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3$(1,5,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.9.7
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.7
Funktionen:	Ax. 28.2.9.7
$\star$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7
Mengen:	Ax. 28.2.9.3
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.3
Funktionen:	Ax. 28.2.9.3
$\star$	Ax. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3

Theorem 28.2.9.7 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ x\in I,\ a\in A\vdash x\star a\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $x\in I$	A
4	4 $a\in A$	A
1,2	5 $\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2,3,4	6 $x\star a\in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 5, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.9.8
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.8
Funktionen:	Ax. 28.2.9.8
$\star$	Ax. 28.2.9.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star)\vdash\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.8
Mengen:	Ax. 28.2.9.6
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.6
Funktionen:	Ax. 28.2.9.6
$\star$	Ax. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x\in I,\ a\in A\vdash x\star a\in I$	Ax. 28.2.9.6

Theorem 28.2.9.8 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash\mathsf{Id}(A;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
	3 $A\subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $a\in A$	A
5	5 $x\in A$	A
1,4,5	6 $a\star x\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)

1	7 $\forall a \in A \forall x \in A\,(a \star x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5,6))))$
1,2	8 $\mathsf{LId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.1$(1, \wedge I(3, \wedge I(2,7)))$
1	9 $\forall x \in A \forall a \in A\,(x \star a \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(4,6))))$
1,2	10 $\mathsf{RId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.2$(1, \wedge I(3, \wedge I(2,9)))$
1,2	11 $\mathsf{Id}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.3$(1, \wedge I(8, 10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.1
Funktionen:	Th. 28.2.9.1
$\star$	Th. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)\big)$	Th. 28.2.9.1
Mengen:	Th. 28.2.9.2
$A,\ I,\ x,\ a$	Th. 28.2.9.2
Funktionen:	Th. 28.2.9.2
$\star$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{RId}(I; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I \forall a \in A\,(x \star a \in I)\big)$	Th. 28.2.9.2
Mengen:	Th. 28.2.9.3
$A,\ I$	Th. 28.2.9.3
Funktionen:	Th. 28.2.9.3
$\star$	Th. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$	Th. 28.2.9.3

Theorem 28.2.9.9 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ a,\ x,\ i,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{Id}(I \cap J;A,\star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit Th. 28.2.9.9(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash I \cap J \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,3	5 $J \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 3)
1,2	6 $I \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5(1, 2)
1,3	7 $J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5(1, 3)
1,2	8 $\exists i\,(i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9 $\exists j\,(j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10 $i \in I$	A
11	11 $j \in J$	A
1,2,10	12 $i \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,3,11	13 $j \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 11)
1,3,10,11	14 $i \star j \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 12, 11)
1,2,10,11	15 $i \star j \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 13)
1,2,3,10, 11	16 $i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(15, 14))
1,2,3,10, 11	17 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18 $I \cap J \neq \varnothing$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19 $I \cap J \neq \varnothing$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft Th. 28.2.9.9(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I \cap J;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A

3	3 $\mathsf{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.9($H1$)(1, 2, 3)
8	8 $a \in A$	A
9	9 $x \in I \cap J$	A
9	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	12 $a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 8, 10)
1,3,8,9	13 $a \star x \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 8, 11)
1,2,3,8,9	14 $a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(12, 13))
1,2,3	15 $\forall a \in A \, \forall x \in I \cap J \, (a \star x \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16 $\mathsf{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 15)))

Rechtsidealeigenschaft Th. 28.2.9.9(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star), \ \mathsf{Id}(I; A, \star), \ \mathsf{Id}(J; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.9($H1$)(1, 2, 3)
8	8 $x \in I \cap J$	A
9	9 $a \in A$	A
8	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	12 $x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 9)
1,3,8,9	13 $x \star a \in J$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 11, 9)
1,2,3,8,9	14 $x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(12, 13))

1,2,3	15 $\forall x \in I \cap J \, \forall a \in A \, (x \star a \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I (9, 14))))$
1,2,3	16 $\mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.2$(1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15)))$

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J; A, \star)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9$(H2)(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $\mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9$(H3)(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $\mathsf{Id}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.3$(1, \wedge I(4, 5))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.4
$A,\ I$	Th. 28.2.9.4
Funktionen:	Th. 28.2.9.4
$\star$	Th. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4
Mengen:	Th. 28.2.9.5
$A,\ I$	Th. 28.2.9.5
Funktionen:	Th. 28.2.9.5
$\star$	Th. 28.2.9.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x \, (x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 28.2.9.6
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.6
Funktionen:	Th. 28.2.9.6
$\star$	Th. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.7
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.7
Funktionen:	Th. 28.2.9.7
$\star$	Th. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ x\in I,\ a\in A\vdash x\star a\in I$	Th. 28.2.9.7
$x\in A\cap B\dashv\vdash x\in A\wedge x\in B$	Th. 3.10.2.3
$a\in A\vdash A\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5
$A\cap B\subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A\subseteq B, B\subseteq C\vdash A\subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star)\vdash I\cap J\neq\varnothing$	Th. 28.2.9.9(H1)
$x\in A\cap B\vdash x\in A$	Th. 3.10.2.1
$x\in A\cap B\vdash x\in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Th. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.1
Funktionen:	Th. 28.2.9.1
$\star$	Th. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{LId}(I;A,\star)\leftrightarrow$ $\big(I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall a\in A\,\forall x\in I\,(a\star x\in I)\big)$	Th. 28.2.9.1
Mengen:	Th. 28.2.9.2
$A,\ I,\ x,\ a$	Th. 28.2.9.2
Funktionen:	Th. 28.2.9.2
$\star$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{RId}(I;A,\star)\leftrightarrow$ $\big(I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)\big)$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star)\vdash\mathsf{LId}(I\cap J;A,\star)$	Th. 28.2.9.9(H2)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star)\vdash\mathsf{RId}(I\cap J;A,\star)$	Th. 28.2.9.9(H3)
Mengen:	Th. 28.2.9.3
$A,\ I$	Th. 28.2.9.3
Funktionen:	Th. 28.2.9.3
$\star$	Th. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{Id}(I;A,\star)\leftrightarrow(\mathsf{LId}(I;A,\star)\wedge\mathsf{RId}(I;A,\star))$	Th. 28.2.9.3

2.9.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 28.2.9.4 (Linkshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash L_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)\right\}$$

Definition 28.2.9.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash R_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)\right\}$$

Definition 28.2.9.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash\\ &J_{A,\star}(a) \coloneqq \Big\{b \in A \;\Big|\; b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)\\ &\qquad\qquad \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)\Big\}\end{aligned}$$

Theorem 28.2.9.10 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash\\ &b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a))\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$L_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A\,(u = x \star a)\}$	Def. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$b \in \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A\,(u = x \star a)\} \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a))\big)$	$= E(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.9.4
$A,\ a,\ b,\ x$	Def. 28.2.9.4
Funktionen:	Def. 28.2.9.4
$\star$	Def. 28.2.9.4
Neues Symbol	Def. 28.2.9.4
Linkshauptideal:	Def. 28.2.9.4
$\triangleright L_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \big\{b \in A \,\big|\, b = a \vee \exists x \in A\,(b = x$	Def. 28.2.9.4
$\star\, a)\big\}$	Def. 28.2.9.4
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 28.2.9.11 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$$
$$b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y))\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$R_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A\,(u = a \star y)\}$	Def. 28.2.9.5(1, 2)
1,2	4	$b \in \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A\,(u = a \star y)\} \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)))$	Th. 3.7.2.5

1,2	5	$b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y))\big)$	$= E(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.9.5
$A,\ a,\ b,\ y$	Def. 28.2.9.5
Funktionen:	Def. 28.2.9.5
$\star$	Def. 28.2.9.5
Neues Symbol	Def. 28.2.9.5
Rechtshauptideal:	Def. 28.2.9.5
$\triangleright R_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.9.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash R_{A,\star}(a) := \big\{b \in A \;\big|\; b = a \vee \exists y \in A\,(b = a$	Def. 28.2.9.5
$\star\, y)\big\}$	Def. 28.2.9.5
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 28.2.9.12 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$
$$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)\big)\Big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A

$$
\begin{array}{lll}
1,2 & 3\ J_{A,\star}(a) = \Big\{ u \in A \;\Big|\; u = a & \text{Def. 28.2.9.6}(1,2) \\
& \quad \vee \exists x \in A\,(u = x \star a) & \\
& \quad \vee \exists y \in A\,(u = a \star y) & \\
& \quad \vee \exists x, y \in A\,(u = (x \star a) \star y) \Big\} & \\
1,2 & 4\ b \in \{ u \in A \mid u = a & \text{Th. 3.7.2.5} \\
& \quad \vee \exists x \in A\,(u = x \star a) & \\
& \quad \vee \exists y \in A\,(u = a \star y) & \\
& \quad \vee \exists x, y \in A\,(u = (x \star a) \star y) \} & \\
& \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a & \\
& \quad \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) & \\
& \quad \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) & \\
& \quad \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)) \big) & \\
1,2 & 5\ b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a & = E(3,4) \\
& \quad \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) & \\
& \quad \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) & \\
& \quad \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)) \Big) &
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.9.6
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Def. 28.2.9.6
Funktionen:	Def. 28.2.9.6
$\star$	Def. 28.2.9.6
Neues Symbol	Def. 28.2.9.6
Zweiseitiges Hauptideal:	Def. 28.2.9.6
$\triangleright J_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$	Def. 28.2.9.6
$J_{A,\star}(a) := \Big\{ b \in A \;\Big\vert\; b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	Def. 28.2.9.6
$\vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x$	Def. 28.2.9.6
$\star\, a) \star y) \Big\}$	Def. 28.2.9.6
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{ u \in A \mid P(u) \} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 28.2.9.13 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$a\in L_{A,\star}(a)\wedge a\in R_{A,\star}(a)\wedge a\in J_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $a\in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10$(1,2,\wedge I(2,\vee I1(=I)))$
1,2	4 $a\in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11$(1,2,\wedge I(2,\vee I1(=I)))$
1,2	5 $a\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12$(1,2,\wedge I(2,\vee I1(=I)))$
1,2	6 $a\in L_{A,\star}(a)\wedge a\in R_{A,\star}(a)\wedge a\in J_{A,\star}(a)$	$\wedge I(3,\wedge I(4,5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.10
$A,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.9.10
Funktionen:	Th. 28.2.9.10
$\star$	Th. 28.2.9.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $b\in L_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a))\big)$	Th. 28.2.9.10
Mengen:	Th. 28.2.9.11
$A,\ a,\ b,\ y$	Th. 28.2.9.11
Funktionen:	Th. 28.2.9.11
$\star$	Th. 28.2.9.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $b\in R_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y))\big)$	Th. 28.2.9.11
Mengen:	Th. 28.2.9.12
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.12
Funktionen:	Th. 28.2.9.12
$\star$	Th. 28.2.9.12
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$	Th. 28.2.9.12
$b\in J_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(b\in A\wedge\big(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)$	Th. 28.2.9.12
$\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)\vee\exists x,y\in A\,(b$	Th. 28.2.9.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$= (x \star a) \star y))\Big)$	Th. 28.2.9.12

Theorem 28.2.9.14 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $L_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)

Linksabsorption:

7	7 $s \in A$	A
8	8 $b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	13 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A
7,14	15 $s \star b = s \star a$	$= E(14)$
7,14	16 $\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16))$)
18	18 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20 $x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22 $s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)

1,2,7,19	23 $(s \star x) \star a = s \star (x \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	24 $s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(21, 23)$
1,2,7,19	25 $\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29 $\forall s \in A\,\forall b \in L_{A,\star}(a)\,(s \star b \in L_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 28.2.9.13
$A,\ a$	Th. 28.2.9.13
Funktionen:	Th. 28.2.9.13
$\star$	Th. 28.2.9.13
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.9.10
$A,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.9.10
Funktionen:	Th. 28.2.9.10
$\star$	Th. 28.2.9.10
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a))\big)$	Th. 28.2.9.10
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A \vdash (x\star y)\star z = x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.1
Funktionen:	Th. 28.2.9.1
$\star$	Th. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(I\subseteq A \wedge I\neq\varnothing \wedge \forall a\in A\,\forall x\in I\,(a\star x\in I)\big)$	Th. 28.2.9.1

Theorem 28.2.9.15 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A \vdash \mathsf{RId}(R_{A,\star}(a);A,\star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a)\subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a\in L_{A,\star}(a)\wedge a\in R_{A,\star}(a)\wedge a\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a\in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	6 $R_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)

Rechtsabsorption:

7	7 $b\in R_{A,\star}(a)$	A
8	8 $s\in A$	A
1,2,7	9 $b\in A\wedge\big(b=a\vee\exists v\in A\,(b=a\star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	10 $b\in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $b\star s\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12 $b\in A\wedge\big(b=a\vee\exists v\in A\,(b=a\star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	13 $b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b=a$	A
8,14	15 $b\star s=a\star s$	$=E(14)$
8,14	16 $\exists u\in A\,(b\star s=a\star u)$	$\exists I(8,15)$

1,2,7,8, 14	17 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16))$)
18	18 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
19	19 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
19	20 $y \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = a \star y$	$\wedge E2(19)$
1,8,19	22 $y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 8)
1,2,8,19	23 $(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 20, 8)
1,2,8,19	24 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(21, 23)$
1,2,8,19	25 $\exists u \in A\,(b \star s = a \star u)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29 $\forall b \in R_{A,\star}(a)\,\forall s \in A\,(b \star s \in R_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 28.2.9.13
$A,\ a$	Th. 28.2.9.13
Funktionen:	Th. 28.2.9.13
$\star$	Th. 28.2.9.13
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.9.11
$A,\ a,\ b,\ y$	Th. 28.2.9.11
Funktionen:	Th. 28.2.9.11
$\star$	Th. 28.2.9.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $b\in R_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y))\big)$	Th. 28.2.9.11
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.9.2
$A,\ I,\ x,\ a$	Th. 28.2.9.2
Funktionen:	Th. 28.2.9.2
$\star$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{RId}(I;A,\star)\leftrightarrow$ $\big(I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall x\in I\,\forall a\in A\,(x\star a\in I)\big)$	Th. 28.2.9.2

Theorem 28.2.9.16 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a\in I\vdash L_{A,\star}(a)\subseteq I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $b\in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6 $b\in A\wedge\big(b=a\vee\exists u\in A\,(b=u\star a)\big)$	Th. 28.2.9.10$(1,2,5)$
1,2,5	7 $b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)$	$\wedge E2(6)$
8	8 $b=a$	A
4,8	9 $a=b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10 $b\in I$	$=E(9,4)$
11	11 $\exists x\in A\,(b=x\star a)$	A
12	12 $x\in A\wedge b=x\star a$	A
12	13 $x\in A$	$\wedge E1(12)$

12	14 $b = x \star a$	$\wedge E2(12)$
1,3	15 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall u \in A \forall v \in I\,(u \star v \in I)$	Th. 28.2.9.1(1, 3)
1,3	16 $\forall u \in A \forall v \in I\,(u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17 $x \star a \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(13, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18 $b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19 $b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21 $L_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⁝20)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.10
$A,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.9.10
Funktionen:	Th. 28.2.9.10
$\star$	Th. 28.2.9.10
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a))\big)$	Th. 28.2.9.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.1
Funktionen:	Th. 28.2.9.1
$\star$	Th. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)\big)$	Th. 28.2.9.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 28.2.9.17 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathsf{RId}(I; A, \star),\ a \in I \vdash$$
$$R_{A,\star}(a) \subseteq I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 5)
1,2,5	7 $b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8 $b = a$	A
4,8	9 $a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10 $b \in I$	$= E(9, 4)$
11	11 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
12	12 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
12	13 $y \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14 $b = a \star y$	$\wedge E2(12)$
1,3	15 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall u \in A\,\forall v \in I\,(v \star u \in I)$	Th. 28.2.9.2(1, 3)
1,3	16 $\forall u \in I\,\forall v \in A\,(u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17 $a \star y \in I$	$\rightarrow E(13, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18 $b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19 $b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21 $R_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⋮20)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.11
$A,\ a,\ b,\ y$	Th. 28.2.9.11
Funktionen:	Th. 28.2.9.11
$\star$	Th. 28.2.9.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$ $b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y))\big)$	Th. 28.2.9.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.9.2
$A,\ I,\ x,\ a$	Th. 28.2.9.2
Funktionen:	Th. 28.2.9.2
$\star$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\,\forall a \in A\,(x \star a \in I)\big)$	Th. 28.2.9.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 28.2.9.18 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft Th. 28.2.9.18(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6 $J_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7 $s \in A$	A
8	8 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	13 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A

7,14	15	$s \star b = s \star a$	Th. 2.9.1.8(14)
7,14	16	$\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1$ (16))))
18	18	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
7,19	23	$s \star b = s \star (x \star a)$	Th. 2.9.1.8(21)
1,2,7,19	24	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	25	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(24, 23)$
1,2,7,19	26	$\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 25)$
1,2,7,8, 19	27	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1$ (26))))
28	28	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
29	29	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
29	30	$y \in A$	$\wedge E1(29)$
29	31	$b = a \star y$	$\wedge E2(29)$
7,29	32	$s \star b = s \star (a \star y)$	Th. 2.9.1.8(31)
1,2,7,29	33	$s \star (a \star y) = (s \star a) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 2, 30)
1,2,7,29	34	$s \star b = (s \star a) \star y$	$= E(33, 32)$
1,2,7,29	35	$\exists u, v \in A\,(s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(7, \exists I(30, 34))$
1,2,7,8, 29	36	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ ($\vee I2(35)$)))))
37	37	$\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
38	38	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
38	39	$x \in A$	$\wedge E1(38)$
38	40	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(38))$
38	41	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(38))$
1,7,38	42	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 39)
1,2,38	43	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 39, 2)
7,38	44	$s \star b = s \star ((x \star a) \star y)$	Th. 2.9.1.8(41)
1,2,7,38	45	$s \star ((x \star a) \star y) = (s \star (x \star a)) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 43, 40)
1,2,7,38	46	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 39, 2)
1,2,7,38	47	$s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	$= E(45, 46, 44)$
1,2,7,38	48	$\exists u, v \in A\,(s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(42, \exists I(40, 47))$

1,2,7,8, 38	49	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2 (\vee I2(48)))))$
1,2,7,8, 37	50	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(37, 38, 49)$
1,2,7,8, 28	51	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(28, 29, 36)$
1,2,7,8, 18	52	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 27)$
53	53	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
54	54	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 54	55	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(54, 28, 51, 37, 50)$
1,2,7,8, 53	56	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(53, 18, 52, 54, 55)$
1,2,7,8	57	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 53, 56)$
1,2	58	$\forall s \in A\, \forall b \in J_{A,\star}(a)\,(s \star b \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 57))))$
1,2	59	$\mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 58)))$

Rechtsidealeigenschaft Th. 28.2.9.18(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6	$J_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
8	8	$s \in A$	A
1,2,7	9	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11	$b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)

1,2,7	13 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A
8,14	15 $b \star s = a \star s$	Th. 2.9.1.9(14)
8,14	16 $\exists v \in A\,(b \star s = a \star v)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1$ (16)))))
18	18 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20 $x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,2,8,19	22 $b \star s = (x \star a) \star s$	Th. 2.9.1.9(21)
1,2,8,19	23 $\exists u, v \in A\,(b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(20, \exists I(8, 22))$
1,2,7,8, 19	24 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(23)))))$
25	25 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
26	26 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
26	27 $y \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28 $b = a \star y$	$\wedge E2(26)$
1,8,26	29 $y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 27, 8)
8,26	30 $b \star s = (a \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(28)
1,2,8,26	31 $(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 27, 8)
1,2,8,26	32 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(31, 30)$
1,2,8,26	33 $\exists v \in A\,(b \star s = a \star v)$	$\exists I(29, 32)$
1,2,7,8, 26	34 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1$ (33)))))
35	35 $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
36	36 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
36	37 $x \in A$	$\wedge E1(36)$
36	38 $y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(36))$
36	39 $b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,8,36	40 $y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 38, 8)
1,2,36	41 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 2)
8,36	42 $b \star s = ((x \star a) \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(39)
1,2,8,36	43 $((x \star a) \star y) \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 41, 38, 8)
1,2,8,36	44 $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(43, 42)$
1,2,8,36	45 $\exists u, v \in A\,(b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(37, \exists I(40, 44))$

1,2,7,8, 36	46 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(45)))))$
1,2,7,8, 35	47 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(35, 36, 46)$
1,2,7,8, 25	48 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(25, 26, 34)$
1,2,7,8, 18	49 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 24)$
50	50 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
51	51 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 51	52 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(51, 25, 48, 35,$ $47)$
1,2,7,8, 50	53 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(50, 18, 49, 51,$ $52)$
1,2,7,8	54 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 50,$ $53)$
1,2	55 $\forall b \in J_{A,\star}(a)\, \forall s \in A\,(b \star s \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ $(8, 54))))$
1,2	56 $\mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3,$ $\wedge I(6, 55)))$

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18($H1$) $(1, 2)$
1,2	4 $\mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18($H2$) $(1, 2)$
1,2	5 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I(3,$ $4))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 28.2.9.13
$A,\ a$	Th. 28.2.9.13
Funktionen:	Th. 28.2.9.13
$\star$	Th. 28.2.9.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $a\in L_{A,\star}(a)\wedge a\in R_{A,\star}(a)\wedge a\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13
$a\in A\vdash A\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.9.12
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.12
Funktionen:	Th. 28.2.9.12
$\star$	Th. 28.2.9.12
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$	Th. 28.2.9.12
$b\in J_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(b\in A\wedge\big(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)$	Th. 28.2.9.12
$\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)\vee\exists x,y\in A\,(b$	Th. 28.2.9.12
$=(x\star a)\star y)\big)\Big)$	Th. 28.2.9.12
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.8
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.8
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.8
f	Th. 2.9.1.8
$a=b\vdash f(c,a)=f(c,b)$	Th. 2.9.1.8
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.1
Funktionen:	Th. 28.2.9.1
$\star$	Th. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{LId}(I;A,\star)\leftrightarrow$ $\big(I\subseteq A\wedge I\neq\varnothing\wedge\forall a\in A\,\forall x\in I\,(a\star x\in I)\big)$	Th. 28.2.9.1
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.9
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.9
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.9
f	Th. 2.9.1.9
$a=b\vdash f(a,c)=f(b,c)$	Th. 2.9.1.9
Mengen:	Th. 28.2.9.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ I,\ x,\ a$	Th. 28.2.9.2
Funktionen:	Th. 28.2.9.2
$\star$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)\big)$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(J_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.18(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(J_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.18(H2)
Mengen:	Th. 28.2.9.3
$A,\ I$	Th. 28.2.9.3
Funktionen:	Th. 28.2.9.3
$\star$	Th. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{Id}(I;A,\star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I;A,\star) \wedge \mathsf{RId}(I;A,\star))$	Th. 28.2.9.3

Theorem 28.2.9.19 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus (a∈I) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall Th. 28.2.9.19(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I,\ b = a \vdash b \in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $b = a$	A
4,5	6 $a = b$	Th. 2.9.1.1(5)
4,5	7 $b \in I$	$= E(6,4)$

Fall eines linken Faktors Th. 28.2.9.19(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists x\in A\,(b=x\star a)\vdash b\in I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
3	3	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4	$a\in I$	A
5	5	$\exists x\in A\,(b=x\star a)$	A
6	6	$x\in A\wedge b=x\star a$	A
6	7	$x\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b=x\star a$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9	$x\star a\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	10	$b\in I$	$=E(8,9)$
1,3,4,5	11	$b\in I$	$\exists E(5,6,10)$

Fall eines rechten Faktors Th. 28.2.9.19(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists y\in A\,(b=a\star y)\vdash b\in I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
3	3	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4	$a\in I$	A
5	5	$\exists y\in A\,(b=a\star y)$	A
6	6	$y\in A\wedge b=a\star y$	A
6	7	$y\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b=a\star y$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9	$a\star y\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 4, 7)
1,3,4,6	10	$b\in I$	$=E(8,9)$
1,3,4,5	11	$b\in I$	$\exists E(5,6,10)$

Fall zweier Faktoren Th. 28.2.9.19(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)\vdash b\in I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A

2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
6	6 $x \in A \wedge \big(y \in A \wedge b = (x \star a) \star y\big)$	A
6	7 $x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	10 $x \star a \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	11 $(x \star a) \star y \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 10, 8)
1,3,4,6	12 $b \in I$	$= E(9, 11)$
1,3,4,5	13 $b \in I$	$\exists E(5, 6, 12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 5)
1,2,5	7 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8 $b = a$	A
1,2,3,4,8	9 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H1$) (1, 2, 3, 4, 8)
10	10 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
1,2,3,4, 10	11 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H2$) (1, 2, 3, 4, 10)
12	12 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
1,2,3,4, 12	13 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H3$) (1, 2, 3, 4, 12)
14	14 $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4, 14	15 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H4$) (1, 2, 3, 4, 14)
1,2,3,4,5	16 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17 $J_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⋮16)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.9.6
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.6
Funktionen:	Th. 28.2.9.6
$\star$	Th. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6
Mengen:	Th. 28.2.9.7
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.7
Funktionen:	Th. 28.2.9.7
$\star$	Th. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7
Mengen:	Th. 28.2.9.12
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.12
Funktionen:	Th. 28.2.9.12
$\star$	Th. 28.2.9.12
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$	Th. 28.2.9.12
$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	Th. 28.2.9.12
$\vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b$	Th. 28.2.9.12
$= (x \star a) \star y)\big)\Big)$	Th. 28.2.9.12
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I,\ b = a \vdash b \in I$	Th. 28.2.9.19(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I,$ $\exists x \in A\,(b = x \star a) \vdash b \in I$	Th. 28.2.9.19(H2)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I,$ $\exists y \in A\,(b = a \star y) \vdash b \in I$	Th. 28.2.9.19(H3)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I,$ $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$	Th. 28.2.9.19(H4)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf.

Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Linksteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$
Neues Symbol:
Linksteilbarkeit: $\triangleright\, a \mid^{\ell}_{A,\star} b$

$$a \mid^{\ell}_{A,\star} b$$

Definition 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$
Neues Symbol:
Rechtsteilbarkeit: $\triangleright\, a \mid^{r}_{A,\star} b$

$$a \mid^{r}_{A,\star} b$$

Definition 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$
$\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$
$\vee \exists x, y \in A\,\big(b = (x \star a) \star y\big)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright\, a \mid_{A,\star} b$

$$a \mid_{A,\star} b$$

Theorem 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechtshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid^{\ell}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \to b \in R_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in R_{A,\star}(a) \to a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.10.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 28.2.10.1
Funktionen:	Def. 28.2.10.1
$\star$	Def. 28.2.10.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.10.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.10.1
Elemente:	Def. 28.2.10.1
$a, b \in A$	Def. 28.2.10.1
Linksteilbarkeit:	Def. 28.2.10.1
$b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 28.2.10.1
Neues Symbol	Def. 28.2.10.1
Linksteilbarkeit:	Def. 28.2.10.1
$\triangleright\, a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1
$a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1
Mengen:	Th. 28.2.9.11
$A,\ a,\ b,\ y$	Th. 28.2.9.11
Funktionen:	Th. 28.2.9.11
$\star$	Th. 28.2.9.11
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y))\big)$	Th. 28.2.9.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Linkshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$$
$$a\mid^{r}_{A,\star} b\leftrightarrow b\in L_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\mid^{r}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b=a\vee\exists c\in A\,(b=c\star a)$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b\in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(3,5)$)
1,2,3	7 $a\mid^{r}_{A,\star} b\rightarrow b\in L_{A,\star}(a)$	$\rightarrow I(4,6)$
8	8 $b\in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b\in A\wedge\big(b=a\vee\exists u\in A\,(b=u\star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b=a\vee\exists c\in A\,(b=c\star a)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a\mid^{r}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b\in L_{A,\star}(a)\rightarrow a\mid^{r}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(8,11)$
1,2,3	13 $a\mid^{r}_{A,\star} b\leftrightarrow b\in L_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.10.2
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 28.2.10.2
Funktionen:	Def. 28.2.10.2
$\star$	Def. 28.2.10.2
Halbgruppe:	Def. 28.2.10.2
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.10.2
Elemente:	Def. 28.2.10.2
$a,b\in A$	Def. 28.2.10.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Rechtsteilbarkeit:	Def. 28.2.10.2
$b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$	Def. 28.2.10.2
Neues Symbol	Def. 28.2.10.2
Rechtsteilbarkeit:	Def. 28.2.10.2
$\triangleright a \mid^r_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2
$a \mid^r_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2
Mengen:	Th. 28.2.9.10
$A,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.9.10
Funktionen:	Th. 28.2.9.10
$\star$	Th. 28.2.9.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$ $b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a))\big)$	Th. 28.2.9.10

Theorem 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$$
$$a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(3,5)$)
1,2,3	7 $a \mid_{A,\star} b \to b \in J_{A,\star}(a)$	$\to I(4,6)$
8	8 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(9)$

1,2,3,8	11 $a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in J_{A,\star}(a) \to a \mid_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.10.3
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Def. 28.2.10.3
Funktionen:	Def. 28.2.10.3
$\star$	Def. 28.2.10.3
Halbgruppe:	Def. 28.2.10.3
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.10.3
Elemente:	Def. 28.2.10.3
$a, b \in A$	Def. 28.2.10.3
Zweiseitige Teilbarkeit:	Def. 28.2.10.3
$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,\big(b = (x \star a) \star y\big)$	Def. 28.2.10.3
Neues Symbol	Def. 28.2.10.3
Zweiseitige Teilbarkeit:	Def. 28.2.10.3
$\triangleright a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3
$a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3
Mengen:	Th. 28.2.9.12
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.12
Funktionen:	Th. 28.2.9.12
$\star$	Th. 28.2.9.12
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$	Th. 28.2.9.12
$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	Th. 28.2.9.12
$\vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b$	Th. 28.2.9.12
$= (x \star a) \star y)\big)\Big)$	Th. 28.2.9.12

Theorem 28.2.10.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$a\mid^{\ell}_{A,\star} a\wedge a\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $a\mid^{\ell}_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.1$(1,2,2,\vee I1(=I))$
1,2	4 $a\mid^{r}_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.2$(1,2,2,\vee I1(=I))$
1,2	5 $a\mid_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.3$(1,2,2,\vee I1(=I))$
1,2	6 $a\mid^{\ell}_{A,\star} a\wedge a\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid_{A,\star} a$	$\wedge I(3,\wedge I(4,5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.10.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 28.2.10.1
Funktionen:	Def. 28.2.10.1
$\star$	Def. 28.2.10.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.10.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.10.1
Elemente:	Def. 28.2.10.1
$a,b\in A$	Def. 28.2.10.1
Linksteilbarkeit:	Def. 28.2.10.1
$b=a\vee\exists c\in A\,(b=a\star c)$	Def. 28.2.10.1
Neues Symbol	Def. 28.2.10.1
Linksteilbarkeit:	Def. 28.2.10.1
$\triangleright\,a\mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1
$a\mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1
Mengen:	Def. 28.2.10.2
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 28.2.10.2
Funktionen:	Def. 28.2.10.2
$\star$	Def. 28.2.10.2
Halbgruppe:	Def. 28.2.10.2
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.10.2
Elemente:	Def. 28.2.10.2
$a,b\in A$	Def. 28.2.10.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Rechtsteilbarkeit:	Def. 28.2.10.2
$b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$	Def. 28.2.10.2
Neues Symbol	Def. 28.2.10.2
Rechtsteilbarkeit:	Def. 28.2.10.2
$\triangleright\, a \mid^{r}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2
$a \mid^{r}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2
Mengen:	Def. 28.2.10.3
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Def. 28.2.10.3
Funktionen:	Def. 28.2.10.3
$\star$	Def. 28.2.10.3
Halbgruppe:	Def. 28.2.10.3
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.10.3
Elemente:	Def. 28.2.10.3
$a, b \in A$	Def. 28.2.10.3
Zweiseitige Teilbarkeit:	Def. 28.2.10.3
$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,\big(b = (x \star a) \star y\big)$	Def. 28.2.10.3
Neues Symbol	Def. 28.2.10.3
Zweiseitige Teilbarkeit:	Def. 28.2.10.3
$\triangleright\, a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3
$a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3

Theorem 28.2.10.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \mid^{\ell}_{A,\star} b,\ b \mid^{\ell}_{A,\star} c \vdash a \mid^{\ell}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A

5	5 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid^{\ell}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,2,3,5	10 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11 $c \in R_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12 $a \mid^{\ell}_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 4, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.10.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.10.1
Funktionen:	Th. 28.2.10.1
$\star$	Th. 28.2.10.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$ $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1
Mengen:	Th. 28.2.9.15
$A,\ a,\ b,\ s,\ y$	Th. 28.2.9.15
Funktionen:	Th. 28.2.9.15
$\star$	Th. 28.2.9.15
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15
Mengen:	Th. 28.2.9.17
$A,\ I,\ a,\ b,\ y$	Th. 28.2.9.17
Funktionen:	Th. 28.2.9.17
$\star$	Th. 28.2.9.17
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathsf{RId}(I; A, \star),\ a \in I \vdash$ $R_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 28.2.9.17
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 28.2.10.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\mid^r_{A,\star} b,\ b\mid^r_{A,\star} c\vdash$
$a\mid^r_{A,\star} c$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $c\in A$	A
5	5 $a\mid^r_{A,\star} b$	A
6	6 $b\mid^r_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b\in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c\in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,2,3,5	10 $L_{A,\star}(b)\subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5,6	11 $c\in L_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5,6	12 $a\mid^r_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 4, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.10.2
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.10.2
Funktionen:	Th. 28.2.10.2
$\star$	Th. 28.2.10.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$ $a\mid^r_{A,\star} b\leftrightarrow b\in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2
Mengen:	Th. 28.2.9.14
$A,\ a,\ b,\ s,\ x$	Th. 28.2.9.14
Funktionen:	Th. 28.2.9.14
$\star$	Th. 28.2.9.14
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.14
Mengen:	Th. 28.2.9.16
$A,\ I,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.9.16
Funktionen:	Th. 28.2.9.16
$\star$	Th. 28.2.9.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a\in I\vdash L_{A,\star}(a)\subseteq I$	Th. 28.2.9.16
$A\subseteq B,\ x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 28.2.10.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\mid_{A,\star} b,\ b\mid_{A,\star} c\vdash a\mid_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $c\in A$	A
5	5 $a\mid_{A,\star} b$	A
6	6 $b\mid_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c\in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,2,3,5	10 $J_{A,\star}(b)\subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11 $c\in J_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12 $a\mid_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 4, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.10.3
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.10.3
Funktionen:	Th. 28.2.10.3
$\star$	Th. 28.2.10.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash a\mid_{A,\star} b\leftrightarrow b\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.9.18
$A,\ a,\ b,\ s,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.18
Funktionen:	Th. 28.2.9.18
$\star$	Th. 28.2.9.18
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18
Mengen:	Th. 28.2.9.19
$A,\ I,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.19
Funktionen:	Th. 28.2.9.19
$\star$	Th. 28.2.9.19
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I; A, \star),\ a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 28.2.9.19
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.11 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes (A,$\star$) bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 28.2.11.1 (Greensche $\mathcal{L}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.2 (Greensche $\mathcal{R}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.3 (Greensche $\mathcal{J}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.4 (Greensche $\mathcal{H}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash\\ &a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \coloneqq \left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\right)\end{aligned}$$

Theorem 28.2.11.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash\\ &a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ |^r_{A,\star}\ b \wedge b\ |^r_{A,\star}\ a\right)\end{aligned}$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10 $a\ |^r_{A,\star}\ b$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4	13 $a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5, 12)$

1,2,3,4	14 $b \mid^r_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow \left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right)$	$\rightarrow I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a$	A
17	18 $a \mid^r_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b \mid^r_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 3)
1,2,3,17	24 $L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.16(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25 $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(17, 27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.11.1
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.1
Funktionen:	Def. 28.2.11.1
$\star$	Def. 28.2.11.1
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.1
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1
Mengen:	Th. 28.2.9.13
$A,\ a$	Th. 28.2.9.13
Funktionen:	Th. 28.2.9.13
$\star$	Th. 28.2.9.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$ $a\in L_{A,\star}(a)\wedge a\in R_{A,\star}(a)\wedge a\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.10.2
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.10.2
Funktionen:	Th. 28.2.10.2
$\star$	Th. 28.2.10.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$ $a\mid^{r}_{A,\star} b\leftrightarrow b\in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2
Mengen:	Th. 28.2.9.14
$A,\ a,\ b,\ s,\ x$	Th. 28.2.9.14
Funktionen:	Th. 28.2.9.14
$\star$	Th. 28.2.9.14
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\mathsf{LId}(L_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.14
Mengen:	Th. 28.2.9.16
$A,\ I,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.9.16
Funktionen:	Th. 28.2.9.16
$\star$	Th. 28.2.9.16
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a\in I\vdash$ $L_{A,\star}(a)\subseteq I$	Th. 28.2.9.16
$A\subseteq B,B\subseteq A\vdash A=B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28.2.11.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$$
$$a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b\leftrightarrow\left(a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A

4	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in R_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b \in R_{A,\star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13 $a \in R_{A,\star}(b)$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4	14 $b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \to \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$	$\to I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
17	18 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Rld}(R_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 3)
1,2,3,17	24 $R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.17(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right) \to a \mathcal{R}_{A,\star} b$	$\to I(17, 27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.11.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.2
Funktionen:	Def. 28.2.11.2
$\star$	Def. 28.2.11.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.2
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2
Mengen:	Th. 28.2.9.13
$A,\ a$	Th. 28.2.9.13
Funktionen:	Th. 28.2.9.13
$\star$	Th. 28.2.9.13
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$ $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.10.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.10.1
Funktionen:	Th. 28.2.10.1
$\star$	Th. 28.2.10.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a,b \in A \vdash$ $a\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1
Mengen:	Th. 28.2.9.15
$A,\ a,\ b,\ s,\ y$	Th. 28.2.9.15
Funktionen:	Th. 28.2.9.15
$\star$	Th. 28.2.9.15
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15
Mengen:	Th. 28.2.9.17
$A,\ I,\ a,\ b,\ y$	Th. 28.2.9.17
Funktionen:	Th. 28.2.9.17
$\star$	Th. 28.2.9.17
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{RId}(I; A, \star),\ a \in I \vdash$ $R_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 28.2.9.17
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28.2.11.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$$
$$a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a\right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in J_{A,\star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b \in J_{A,\star}(a)$	$= E(8,7)$
1,2,3,4	10 $a\ |_{A,\star}\ b$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13 $a \in J_{A,\star}(b)$	$= E(5,12)$
1,2,3,4	14 $b\ |_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a$	$\wedge I(10,14)$
1,2,3	16 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \rightarrow \left(a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a\right)$	$\rightarrow I(4,15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a$	A
17	18 $a\ |_{A,\star}\ b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b\ |_{A,\star}\ a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 3)
1,2,3,17	24 $J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.19(1, 2, 23, 21)

1,2,3,17	25 $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{J}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a\right) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(17, 27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.3
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.3
Funktionen:	Def. 28.2.11.3
$\star$	Def. 28.2.11.3
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.3
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.3
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3
Mengen:	Th. 28.2.9.13
$A,\ a$	Th. 28.2.9.13
Funktionen:	Th. 28.2.9.13
$\star$	Th. 28.2.9.13
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash$ $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.10.3
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.10.3
Funktionen:	Th. 28.2.10.3
$\star$	Th. 28.2.10.3
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b \in A \vdash$ $a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3
Mengen:	Th. 28.2.9.18
$A,\ a,\ b,\ s,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.18
Funktionen:	Th. 28.2.9.18
$\star$	Th. 28.2.9.18
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18
Mengen:	Th. 28.2.9.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ I,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.19
Funktionen:	Th. 28.2.9.19
$\star$	Th. 28.2.9.19
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 28.2.9.19
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28.2.11.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$$
$$a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ |^r_{A,\star}\ b \wedge b\ |^r_{A,\star}\ a \wedge a\ |^\ell_{A,\star}\ b \wedge b\ |^\ell_{A,\star}\ a\right)$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$- und eine $\mathcal{R}$-Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung Th. 28.2.11.4(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \vdash$$
$$a\ |^r_{A,\star}\ b \wedge b\ |^r_{A,\star}\ a \wedge a\ |^\ell_{A,\star}\ b \wedge b\ |^\ell_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $a\ |^r_{A,\star}\ b \wedge b\ |^r_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7 $a\ |^\ell_{A,\star}\ b \wedge b\ |^\ell_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8 $a\ |^r_{A,\star}\ b \wedge b\ |^r_{A,\star}\ a \wedge a\ |^\ell_{A,\star}\ b \wedge b\ |^\ell_{A,\star}\ a$	$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$

Rückrichtung Th. 28.2.11.4(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,$$
$$a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a\vdash a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a$	A
4	5 $a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(4),\wedge E1(\wedge E2(4)))$
4	6 $a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))),\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	7 $a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4	8 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, 6)
1,2,3,4	9 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, $\wedge I(7,8)$)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	A
1,2,3,4	5 $a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.4($H1$) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\to\big(a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a\big)$	$\to I(4,5)$
7	7 $a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a$	A
1,2,3,7	8 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.4($H2$) (1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\big(a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a\big)\to a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\leftrightarrow\big(a\mid^r_{A,\star} b\wedge b\mid^r_{A,\star} a\wedge a\mid^\ell_{A,\star} b\wedge b\mid^\ell_{A,\star} a\big)$	$\leftrightarrow I(6,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.11.4
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.4
Funktionen:	Def. 28.2.11.4
$\star$	Def. 28.2.11.4
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.4
$\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$ $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \coloneqq \left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\right)$	Def. 28.2.11.4
Mengen:	Th. 28.2.11.1
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.1
Funktionen:	Th. 28.2.11.1
$\star$	Th. 28.2.11.1
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.1
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$ $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ \vert^{r}_{A,\star}\ b \wedge b\ \vert^{r}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.1
Mengen:	Th. 28.2.11.2
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.2
Funktionen:	Th. 28.2.11.2
$\star$	Th. 28.2.11.2
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.2
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$ $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ b \wedge b\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \vdash$ $a\ \vert^{r}_{A,\star}\ b \wedge b\ \vert^{r}_{A,\star}\ a \wedge a\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ b \wedge b\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.4(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,$ $a\ \vert^{r}_{A,\star}\ b \wedge b\ \vert^{r}_{A,\star}\ a \wedge a\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ b \wedge b\ \vert^{\ell}_{A,\star}\ a \vdash a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b$	Th. 28.2.11.4(H2)

2.11.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 28.2.11.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.11.1
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.1
Funktionen:	Def. 28.2.11.1
$\star$	Def. 28.2.11.1
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.1
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1

Theorem 28.2.11.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 2, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.1
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.1
Funktionen:	Def. 28.2.11.1
$\star$	Def. 28.2.11.1
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.1
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 28.2.11.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
6	6 $b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$	A
1,2,3,5	7 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 4, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.1
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.11.1
$\star$	Def. 28.2.11.1
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.1
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 28.2.11.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2	$\forall a \in A \left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.5(1)
1	3	$\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \to b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.6(1)
1	4	$\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c\right) \to a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.7(1)
1	5	$\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.11.5
$A,\ a$	Th. 28.2.11.5
Funktionen:	Th. 28.2.11.5
$\star$	Th. 28.2.11.5
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.5
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.5
Mengen:	Th. 28.2.11.6
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.6
Funktionen:	Th. 28.2.11.6
$\star$	Th. 28.2.11.6
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b\vdash$ $b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.6
Mengen:	Th. 28.2.11.7
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.11.7
Funktionen:	Th. 28.2.11.7
$\star$	Th. 28.2.11.7
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.7
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c\vdash$ $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$	Th. 28.2.11.7
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x\in A\vdash x\sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x,y\in A,\ x\sim y\vdash y\sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x,y,z\in A,\ x\sim y,\ y\sim z\vdash x\sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\,\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1

Theorem 28.2.11.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.2
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.2
Funktionen:	Def. 28.2.11.2
$\star$	Def. 28.2.11.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.2
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2

Theorem 28.2.11.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 2, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.2
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.2
Funktionen:	Def. 28.2.11.2
$\star$	Def. 28.2.11.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.2
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 28.2.11.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b$	A
6	6 $b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c$	A
1,2,3,5	7 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 4, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.2
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.11.2
$\star$	Def. 28.2.11.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.2
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 28.2.11.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A,\mathcal{R}_{A,\star})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2	$\forall a \in A \left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.9(1)
1	3	$\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \to b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.10(1)
1	4	$\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c\right) \to a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.11(1)
1	5	$\mathsf{EqRel}(A,\mathcal{R}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.11.9
$A,\ a$	Th. 28.2.11.9
Funktionen:	Th. 28.2.11.9
$\star$	Th. 28.2.11.9
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.9
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.9
Mengen:	Th. 28.2.11.10
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.10
Funktionen:	Th. 28.2.11.10
$\star$	Th. 28.2.11.10
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b\vdash b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$	Th. 28.2.11.10
Mengen:	Th. 28.2.11.11
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.11.11
Funktionen:	Th. 28.2.11.11
$\star$	Th. 28.2.11.11
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.11
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b,\ b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c\vdash a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	Th. 28.2.11.11
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x\in A\vdash x\sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x,y\in A,\ x\sim y\vdash y\sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x,y,z\in A,\ x\sim y,\ y\sim z\vdash x\sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\,\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1

Theorem 28.2.11.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.11.3
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.3
Funktionen:	Def. 28.2.11.3
$\star$	Def. 28.2.11.3
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.3
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3

Theorem 28.2.11.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 2, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.3
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.3
Funktionen:	Def. 28.2.11.3
$\star$	Def. 28.2.11.3
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.3
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 28.2.11.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
6	6 $b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	A
1,2,3,5	7 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5,6	9 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5,6	10 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 4, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.3
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.11.3
$\star$	Def. 28.2.11.3
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.3
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 28.2.11.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2	$\forall a \in A \left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.13(1)
1	3	$\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \to b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.14(1)
1	4	$\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\right) \to a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.15(1)
1	5	$\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.11.13
$A,\ a$	Th. 28.2.11.13
Funktionen:	Th. 28.2.11.13
$\star$	Th. 28.2.11.13
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.13
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.13
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.13
Mengen:	Th. 28.2.11.14
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.14
Funktionen:	Th. 28.2.11.14
$\star$	Th. 28.2.11.14
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.14
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b\vdash b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.14
Mengen:	Th. 28.2.11.15
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.11.15
Funktionen:	Th. 28.2.11.15
$\star$	Th. 28.2.11.15
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.15
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.15
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\vdash$ $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	Th. 28.2.11.15
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x\in A\vdash x\sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x,y\in A,\ x\sim y\vdash y\sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x,y,z\in A,\ x\sim y,\ y\sim z\vdash x\sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\,\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1

Theorem 28.2.11.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.5$(1,2)$
1,2	4 $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.9$(1,2)$
1,2	5 $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.4$(1,2,$ $2,\wedge I(3,4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.11.5
$A,\ a$	Th. 28.2.11.5
Funktionen:	Th. 28.2.11.5
$\star$	Th. 28.2.11.5
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.5
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.5
Mengen:	Th. 28.2.11.9
$A,\ a$	Th. 28.2.11.9
Funktionen:	Th. 28.2.11.9
$\star$	Th. 28.2.11.9
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.9
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.9
Mengen:	Def. 28.2.11.4
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.4
Funktionen:	Def. 28.2.11.4
$\star$	Def. 28.2.11.4
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.4
$\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$ $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \coloneqq \big(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\big)$	Def. 28.2.11.4

Theorem 28.2.11.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\vdash b\,\mathcal{H}_{A,\star}\,a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	A
1,2,3,4	5 $a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b\wedge a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b\,\mathcal{L}_{A,\star}\,a$	Th. 28.2.11.6(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7 $b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$	Th. 28.2.11.10(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8 $b\,\mathcal{H}_{A,\star}\,a$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 2, $\wedge I(6,7)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.11.4
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.4
Funktionen:	Def. 28.2.11.4
$\star$	Def. 28.2.11.4
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.4
$\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$ $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\coloneqq\left(a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b\wedge a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b\right)$	Def. 28.2.11.4
Mengen:	Th. 28.2.11.6
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.6
Funktionen:	Th. 28.2.11.6
$\star$	Th. 28.2.11.6
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.6
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b\vdash$ $b\,\mathcal{L}_{A,\star}\,a$	Th. 28.2.11.6
Mengen:	Th. 28.2.11.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.10
Funktionen:	Th. 28.2.11.10
$\star$	Th. 28.2.11.10
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.10
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b\vdash b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$	Th. 28.2.11.10

Theorem 28.2.11.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b,\ b\,\mathcal{H}_{A,\star}\,c\vdash a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $c\in A$	A
5	5 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	A
6	6 $b\,\mathcal{H}_{A,\star}\,c$	A
1,2,3,5	7 $a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b\wedge a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $b\,\mathcal{L}_{A,\star}\,c\wedge b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,c$	Th. 28.2.11.7(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5, 6	10 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	Th. 28.2.11.11(1, 2, 3, 4, $\wedge E2(7), \wedge E2$ (8))
1,2,3,4,5, 6	11 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,c$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 4, $\wedge I(9, 10)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.11.4
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.11.4
$\star$	Def. 28.2.11.4
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.4
$\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$ $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \coloneqq \big(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\big)$	Def. 28.2.11.4
Mengen:	Th. 28.2.11.7
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.11.7
Funktionen:	Th. 28.2.11.7
$\star$	Th. 28.2.11.7
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.7
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c \vdash$ $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$	Th. 28.2.11.7
Mengen:	Th. 28.2.11.11
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.11.11
Funktionen:	Th. 28.2.11.11
$\star$	Th. 28.2.11.11
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.11
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c \vdash$ $a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c$	Th. 28.2.11.11

Theorem 28.2.11.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A,\mathcal{H}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $\forall a \in A \big(a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a\big)$	Th. 28.2.11.17(1)
1	3 $\forall a,b \in A \big(a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \to b\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a\big)$	Th. 28.2.11.18(1)
1	4 $\forall a,b,c \in A \Big(\big(a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{H}_{A,\star}\ c\big) \to a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ c\Big)$	Th. 28.2.11.19(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A,\mathcal{H}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.11.17
$A,\ a$	Th. 28.2.11.17
Funktionen:	Th. 28.2.11.17
$\star$	Th. 28.2.11.17
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.17
$\mathcal{H}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.17
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.17
Mengen:	Th. 28.2.11.18
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.11.18
Funktionen:	Th. 28.2.11.18
$\star$	Th. 28.2.11.18
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.18
$\mathcal{H}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.18
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.11.18
Mengen:	Th. 28.2.11.19
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.11.19
Funktionen:	Th. 28.2.11.19
$\star$	Th. 28.2.11.19
Relationsoperatoren:	Th. 28.2.11.19
$\mathcal{H}_{A,\star}$	Th. 28.2.11.19
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{H}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ c$	Th. 28.2.11.19
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x,y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1

2.12 Morphismen von Halbgruppen

Definition 28.2.12.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung:	$\triangleright\, f \colon A \to B$
Operationserhaltung:	$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:	
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.12.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 28.2.12.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$$

Definition 28.2.12.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

2.12.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.12.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$$
$$\vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen Th. 28.2.12.1(H1)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$$
$$g \circ f \colon A \to C$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$f \colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	4	$g \colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,2	5	$g \circ f \colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(3, 4)

Einsetzen der ersten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H2)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f \colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g \colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1	7	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1,3,4	8	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(7, 3, 4)
1,3,4	9	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 3, 4)
1,2,3,4	10	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 8)
1,2,3,4	11	$= g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	$= E(9)$
1,2,3,4	12	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	$\mathsf{Tr}.(10, 11)$

Einsetzen der zweiten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H3)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)\,,\ x, y \in A \vdash$
$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
1	5 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6 $g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,3	7 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,4	8 $f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 4)
1,2,3	9 $g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 3)
1,2,4	10 $g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 4)
1,2,3,4	11 $g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 28.2.12.3(2, 7, 8)
1,2,3,4	12 $= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y))$	$= E(9)$
1,2,3,4	13 $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(10)$
1,2,3,4	14 $g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung Th. 28.2.12.1(H4)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$
$\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
2	4 $\mathsf{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1,2	5 $g \circ f\colon A \to C$	Th. 28.2.12.1($H1$) (1, 2)
6	6 $x \in A$	A
7	7 $y \in A$	A
1,2,6,7	8 $(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	Th. 28.2.12.1($H2$) (1, 2, 6, 7)
1,2,6,7	9 $g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 28.2.12.1($H3$) (1, 2, 6, 7)
1,2,6,7	10 $(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(8, 9)
1,2	11 $\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.1(3, 4, 5, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.4
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.4
Funktionen:	Ax. 28.2.12.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.3
Funktionen:	Th. 5.3.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.3
$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 5.3.3.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$ $g \circ f\colon A \to C$	Th. 28.2.12.1(H1)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet),\ x, y \in A \vdash$ $(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	Th. 28.2.12.1(H2)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet),\ x, y \in A \vdash$ $g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 28.2.12.1(H3)
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1

Theorem 28.2.12.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
2	6	$\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	7	$x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
3	9	$y = \mathrm{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\mathrm{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(5)
1,2,3	11	$= \mathrm{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 12)$
1	14	$\mathsf{HGrHom}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$	Def. 28.2.12.1(1, 1, 2, 13)
	15	$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	16	$\mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A,\star; A,\star)$	Def. 28.2.12.2(14, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.2.12.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$$
$$\vdash \mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
2	4 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,2	5 $\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
2	7 $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 28.2.12.6(2)
1,2	8 $g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.2(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Th. 28.2.12.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 28.2.12.1
Funktionen:	Th. 28.2.12.1
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$ $\vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

2.13 Ausblick auf Rechtecksbänder

Die Frage, wann die e-Koordinatenabbildung eine Halbgruppenisomorphie liefert, führt zu den Rechtecksbändern. Die Konstruktion, das Isomorphiekriterium und die Charakterisierung dieser Halbgruppen werden zusammenhängend in Band 31 behandelt.

2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 28.2.14.1 (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ X,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis. Seien $a, b \in A$. Ihre Einermengen liegen in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Ferner ist $a \star b \in A$ nach Ax. 28.2.1.1. Nach Th. 28.2.4.1 gilt für jedes z

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \quad \Longleftrightarrow \quad z = a \star b \quad \Longleftrightarrow \quad z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \tag{1}$$

Da $a \star b \in A$, liegt die rechte Seite von (1) in $\mathrm{Sing}(A)$. Damit ist $\mathrm{Sing}(A)$ unter $\star_{\mathcal{P}}$ abgeschlossen. Jedes $X \in \mathrm{Sing}(A)$ ist eine nichtleere Teilmenge von A, also gilt $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Die Assoziativität aus Th. 28.2.4.2 schränkt sich daher auf $\mathrm{Sing}(A)$ ein. Nach Def. 28.2.1.1 ist folglich $\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$ erfüllt.

Nach Def. 28.2.4.2 gilt $\eta_A(a) = \{a\}$. Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von η_A, der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 28.2.12.1, dass η_A ein Halbgruppenhomomorphismus ist. Aus $\eta_A(a) = \eta_A(b)$, also $\{a\} = \{b\}$, folgt $a = b$; und jedes Element von $\mathrm{Sing}(A)$ hat nach seiner Definition die Form $\eta_A(a)$ für ein $a \in A$. Somit ist η_A bijektiv. Mit Def. 28.2.12.2 folgt die behauptete Isomorphie. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.4.2
$A,\ a$	Def. 28.2.4.2
Funktionen:	Def. 28.2.4.2
$\star,\ \eta_A$	Def. 28.2.4.2
Neue Symbole	Def. 28.2.4.2
Einermengenschicht:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright \operatorname{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2
Einermengenabbildung:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright \eta_A$	Def. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash$ $\operatorname{Sing}(A) \coloneqq \big\{\{a\} \bigm\vert a \in A\big\},$ $\eta_A \colon A \to \operatorname{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}$	Def. 28.2.4.2
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Ein Halbgruppenisomorphismus überträgt sich durch die Bildabbildung $X \mapsto f[X]$ auf die Potenzhalbgruppen. Grundlage ist die Gleichung $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$, die bereits für Homomorphismen gilt. Die Erhaltung des Mengenprodukts und die Operationserhaltung der Potenzabbildung werden in den Beweistabellen hergeleitet.

Theorem 28.2.14.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash$$
$$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Mengenprodukterhaltung und die Umkehrabbildung mit einem endlichen Beispiel. Die Beweistabellen enthalten die beiden Hilfssätze mit ihren vollständigen Ableitungen und den Schlussbeweis zum Isomorphiesatz.

2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz

Theorem 28.2.14.5 (Nichtleerheit des Potenzträgers).

Mengen: A

$$A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$$

1	1 $A \neq \varnothing$	A
1	2 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 1))
1	4 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

In dieser Untersektion bezeichnet A^2 das *Produktquadrat* einer nichtleeren Halbgruppe, also die Menge ihrer Produktwerte. Es ist nicht das kartesische Quadrat $A \times A$. Die jeweilige Operation ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe; insbesondere verwendet $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$ die Operation $\star_{\mathcal{P}}$. Auf einem Unterträger U bezeichnet $\star$ stets die Einschränkung der ursprünglichen Operation auf $U \times U$. Entsprechend ist bei $\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$ die eingeschränkte Operation gemeint.

Definition 28.2.14.1 (Produktquadrat einer nichtleeren Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Lokale Schreibweise: A^2

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$$

Die Definition ist zulässig: Aus $A \subseteq A$ und $A \neq \varnothing$ folgt nach Th. 3.16.3.1, dass $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Theorem 28.2.14.6 (Elementkriterium des Produktquadrats).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	4 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(3, 2)$)
1,2	5 $A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1$(1, 2)$
1,2	6 $z \in A \star_{\mathcal{P}} A \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\ (z = a \star b))$	Th. 28.2.4.1$(1, 4, 4)$
1,2	7 $z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$	$= E(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Def. 28.2.14.1
A	Def. 28.2.14.1
Funktionen:	Def. 28.2.14.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.14.1
Lokale Schreibweise:	Def. 28.2.14.1
A^2	Def. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1

Theorem 28.2.14.7 (Produktzeugen im Quadrat).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ z \in A^2 \vdash \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $z \in A^2$	A
1,2,3	4 $z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6$(1,2,3)$
1,2,3	5 $\exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.6
$A,\ a,\ b,\ z$	Th. 28.2.14.6
Funktionen:	Th. 28.2.14.6
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$ $z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$	Th. 28.2.14.6

Theorem 28.2.14.8 (Produktwerte liegen im Quadrat).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ a,b \in A \vdash a \star b \in A^2$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $a,b \in A$	A
1,3	4 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1$(1,3)$
3	5 $\exists x \in A\, \exists y \in A\, (a \star b = x \star y)$	$\exists I^*(3, = I)$
1,2,3	6 $a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.6$(1,2,$ $\wedge I(4,5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.6
$A,\ a,\ b,\ z$	Th. 28.2.14.6
Funktionen:	Th. 28.2.14.6
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash$ $z\in A^2\leftrightarrow\big(z\in A\wedge\exists a\in A\,\exists b\in A\,(z=a\star b)\big)$	Th. 28.2.14.6

Theorem 28.2.14.9 (Das Produktquadrat liegt im Träger).

Mengen: $A,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash A^2\subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $z\in A^2$	A
1,2,3	4 $z\in A\wedge\exists a\in A\,\exists b\in A\,(z=a\star b)$	Th. 28.2.14.6$(1,2,3)$
1,2,3	5 $z\in A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $A^2\subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.14.6
$A,\ a,\ b,\ z$	Th. 28.2.14.6
Funktionen:	Th. 28.2.14.6
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash$ $z\in A^2\leftrightarrow\big(z\in A\wedge\exists a\in A\,\exists b\in A\,(z=a\star b)\big)$	Th. 28.2.14.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x\in M]\dot{:}x\in N\vdash M\subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 28.2.14.10 (Das Produktquadrat ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$$

Die Beweisidee ist unmittelbar: Zwei Elemente des Quadrats liegen schon im ursprünglichen Träger, und ihr Produkt gehört deshalb wieder zum Quadrat.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
2	4 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 2))
1,2	6 $A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	7 $A \star_{\mathcal{P}} A \neq \varnothing$	$\wedge E2$(Th. 3.16.3.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 5, 5)))
1,2	8 $A^2 \neq \varnothing$	$= E(6, 7)$
9	9 $x, y \in A^2$	A
1,2,9	10 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
1,2,9	11 $x \star y \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 10)
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 3, 8, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Def. 28.2.14.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
A	Def. 28.2.14.1
Funktionen:	Def. 28.2.14.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.14.1
Lokale Schreibweise:	Def. 28.2.14.1
A^2	Def. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ a,b \in A \vdash a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8
Mengen:	Def. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Def. 28.2.8.1
Funktionen:	Def. 28.2.8.1
$\star$	Def. 28.2.8.1
Voraussetzung	Def. 28.2.8.1
Umgebende Halbgruppe:	Def. 28.2.8.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.8.1
Axiome	Def. 28.2.8.1
Träger:	Def. 28.2.8.1
$U \subseteq A$	Def. 28.2.8.1
Nichtleerheit:	Def. 28.2.8.1
$U \neq \varnothing$	Def. 28.2.8.1
Produktabschluss:	Def. 28.2.8.1
$x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$	Def. 28.2.8.1
Neues Symbol	Def. 28.2.8.1
Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.1
$\triangleright\, \mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	Def. 28.2.8.1
$\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	Def. 28.2.8.1

Theorem 28.2.14.11 (Das Potenzquadrat liegt über dem Grundquadrat).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$

Ein Element des Potenzquadrats ist ein Mengenprodukt. Jeder seiner Einträge ist daher ein Produkt zweier Grundelemente.

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	4	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 2))
2	6	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	A
1,2,7	8	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, (Z = X \star_{\mathcal{P}} Y)$	Th. 28.2.14.7(3, 6, 7)
9	9	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge Z = X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
10	10	$z \in Z$	A
1,9,10	11	$\exists a \in X\, \exists b \in Y\, (z = a \star b)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1(1, $\wedge E1$ ($\wedge E1$(9)), $\wedge E2(\wedge E1$ (9)))), $= E(\wedge E2$(9), 10)))
12	12	$a \in X \wedge b \in Y \wedge z = a \star b$	A
9,12	13	$a, b \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(9, 12)
1,2,9,12	14	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 13)
1,2,9,12	15	$z \in A^2$	$= E(12, 14)$
1,2,9,10	16	$z \in A^2$	$\exists E^*(11, 12\text{–}15)$
1,2,9	17	$Z \subseteq A^2$	Th. 3.5.1.1([10]⁝16)
1,9	18	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\wedge E2$(Th. 3.16.3.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(1, $\wedge E1(\wedge E1$(9)), $\wedge E2$ ($\wedge E1$(9)))))
1,9	19	$Z \neq \varnothing$	$= E(9, 18)$
1,2,9	20	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(17, 19))
1,2,7	21	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	$\exists E^*(8, 9\text{–}20)$
1,2	22	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([7]⁝21)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.14.7
$A,\ a,\ b,\ z$	Th. 28.2.14.7
Funktionen:	Th. 28.2.14.7
$\star$	Th. 28.2.14.7
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ z \in A^2 \vdash \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.7
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ a,b \in A \vdash a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)

Theorem 28.2.14.12 (Einermengen im Potenzquadrat).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ a \in A \vdash \left(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \leftrightarrow a \in A^2\right)$$

Für die Rückrichtung wird eine Produktdarstellung von a durch die Einermengenabbildung in eine Produktdarstellung von $\{a\}$ überführt.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	5 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	6 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(5, 2))
2	7 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
8	8 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	A
1,2,8	9 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,8	10 $\{a\} \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(9, 8)
1,2,8	11 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,8	12 $a \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H2$) (10, 11)
1,2	13 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \rightarrow a \in A^2$	$\rightarrow I$(8, 12)
14	14 $a \in A^2$	A
1,2,14	15 $\exists x \in A\, \exists y \in A\, (a = x \star y)$	Th. 28.2.14.7(1, 2, 14)
16	16 $x, y \in A \wedge a = x \star y$	A
1	17 $\mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
1	18 $\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(17)
1,16	19 $\forall u \in A\ (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,16	20 $\eta_A(x \star y) = \eta_A(x) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(y)$	Ax. 28.2.12.3(18, 16)
1,16	21 $\{a\} = \{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\}$	$= E$(16, 19, 20)
16	22 $x \in \{x\} \wedge y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8
16	23 $\{x\} \subseteq A \wedge \{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(16)
16	24 $\{x\} \neq \varnothing \wedge \{y\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(22)
16	25 $\{x\}, \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(23, 24)
1,2,16	26 $\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	Th. 28.2.14.8(4, 7, 25)
1,2,16	27 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$= E$(21, 26)
1,2,14	28 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$\exists E^*$(15, 16–27)
1,2	29 $a \in A^2 \rightarrow \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$\rightarrow I$(14, 28)
1,2,3	30 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \leftrightarrow a \in A^2$	$\leftrightarrow I$(13, 29)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.14.11
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.11
Funktionen:	Th. 28.2.14.11
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.11
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28.2.14.7
$A,\ a,\ b,\ z$	Th. 28.2.14.7
Funktionen:	Th. 28.2.14.7
$\star$	Th. 28.2.14.7
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ z \in A^2 \vdash \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.7
Mengen:	Th. 28.2.14.1
$A,\ a,\ b,\ X,\ z$	Th. 28.2.14.1
Funktionen:	Th. 28.2.14.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$	Th. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Def. 28.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ a$	Def. 28.2.4.2
Funktionen:	Def. 28.2.4.2
$\star,\ \eta_A$	Def. 28.2.4.2
Neue Symbole	Def. 28.2.4.2
Einermengenschicht:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright\ \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2
Einermengenabbildung:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright\, \eta_A$	Def. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash$ $\mathrm{Sing}(A) \coloneqq \big\{\{a\} \bigm\vert a \in A\big\},$ $\eta_A \colon A \to \mathrm{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}$	Def. 28.2.4.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A,\star; B,\diamond),\ x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ a,b \in A \vdash a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8

Theorem 28.2.14.13 (Isomorphismen erhalten das Produktquadrat).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A,\star; B,\diamond),\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash F[A^2] = B^2$$

1	1 $\mathsf{HGrIso}(F; A,\star; B,\diamond)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $B \neq \varnothing$	A
1	4 $\mathsf{HGrHom}(F; A,\star; B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 28.2.12.1(4)

1	6	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(5, 6)$
1	8	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	9	$F[A] = B$	Th. 8.2.2.1(8)
2	10	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	11	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(10, 2))
1,2,3	12	$A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(7, 2)
1,2,3	13	$F[A^2] = F[A \star_{\mathcal{P}} A]$	$= E$(12)
1,2,3	14	$= F[A] \diamond_{\mathcal{P}} F[A]$	Th. 28.2.14.2(4, 11, 11)
1,2,3	15	$= B \diamond_{\mathcal{P}} B$	$= E$(9)
1,2,3	16	$= B^2$	Def. 28.2.14.1(7, 3)
1,2,3	17	$F[A^2] = B^2$	Tr.(13, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Def. 28.2.14.1
A	Def. 28.2.14.1
Funktionen:	Def. 28.2.14.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.14.1
Lokale Schreibweise:	Def. 28.2.14.1
A^2	Def. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1
Mengen:	Th. 28.2.14.2
$A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.14.2
Funktionen:	Th. 28.2.14.2
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.2
$\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2

Theorem 28.2.14.14 (Einschränkung eines Isomorphismus auf Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ \mathsf{HGr}(U,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(V,\diamond)\,,$$
$$U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F\restriction_U;U,\star;V,\diamond)$$

Die Einschränkung ist bijektiv auf ihr Bild und übernimmt die Operationserhaltung. Eine Nichtleerheitsannahme wird hier nicht benötigt.

1	1 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(U,\star)$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(V,\diamond)$	A

4	4 $U \subseteq A$	A
5	5 $V \subseteq B$	A
6	6 $F[U] = V$	A
1	7 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8 $F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4	9 $F \restriction_U \colon U \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(8, 4)
1,4	10 $F \restriction_U \colon U \xrightarrow{\sim} (F \restriction_U)[U]$	Th. 8.3.2.3(9)
1,4	11 $(F \restriction_U)[U] = F[U]$	Th. 5.3.2.16(4, 8)
1,4,6	12 $F \restriction_U \colon U \xrightarrow{\sim} V$	$= E(6, 11, 10)$
13	13 $x, y \in U$	A
4,13	14 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 13)
2,13	15 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.1.1(2, 13)
1,2,4,13	16 $(F \restriction_U)(x \star y) = F(x \star y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 15)
1,2,4,13	17 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,4,13	18 $F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Ax. 28.2.12.3(17, 14)
1,2,4,13	19 $(F \restriction_U)(x) = F(x) \wedge (F \restriction_U)(y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 13)
1,2,4,13	20 $F(x) \diamond F(y) = (F \restriction_U)(x) \diamond (F \restriction_U)(y)$	$= E(19)$
1,2,4,13	21 $(F \restriction_U)(x \star y) = (F \restriction_U)(x) \diamond (F \restriction_U)(y)$	$\mathsf{Tr}.(16, 18, 20)$
1,2,3,4,6	22 $F \restriction_U \colon U \to V$	Def. 8.2.1.1(12)
1,2,3,4,6	23 $\mathsf{HGrHom}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(2, 3, 22, 21)
1,2,3,4,5, 6	24 $\mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(23, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F\restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F\restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.2.14.15 (Isomorphe Einschränkung auf die Produktquadrate).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash \mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(6, 7)$
1,2	9	$\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(8, 2)
1,2	10	$\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$	Th. 28.2.8.2(8, 9)
1,3	11	$\mathsf{UHGr}(B^2; B, \diamond)$	Th. 28.2.14.10(8, 3)
1,3	12	$\mathsf{HGr}\big(B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.8.2(8, 11)
1,2,3	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(8, 2)
1,2,3	14	$B^2 \subseteq B$	Th. 28.2.14.9(8, 3)
1,2,3	15	$F[A^2] = B^2$	Th. 28.2.14.13(1, 2, 3)
1,2,3	16	$\mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.14.14(1, 10, 12, 13, 14, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 28.2.14.10
$A,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.10
Funktionen:	Th. 28.2.14.10
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.10
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
Mengen:	Th. 28.2.14.13
$A,\ B$	Th. 28.2.14.13
Funktionen:	Th. 28.2.14.13
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.13
$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond),\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash F[A^2] = B^2$	Th. 28.2.14.13
Mengen:	Th. 28.2.14.14
$A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 28.2.14.14
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.14
$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGr}(U, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(V, \diamond)\,,$ $U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Th. 28.2.14.14

2.14.2 Transport von Lösungsmengen

Definition 28.2.14.2 (Linke Lösungsmengen einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$
Lokale Schreibweise: $L_A(a, b)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash L_A(a, b) \coloneqq \{x \in A \mid a \star x = b\}$$

Die Operation in $L_A(a, b)$ ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe. Ein Isomorphismus erhält die Gleichung $a \star x = b$ in beiden Richtungen. Das punktweise Kriterium aus Band 08 liefert deshalb eine Bijektion zwischen den Lösungsmengen.

Theorem 28.2.14.16 (Isomorphismen transportieren linke Lösungsmengen).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$
Lösungsmengen: $L_A(a, b),\ L_B(F(a), F(b))$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$F \restriction_{L_A(a,b)} \colon L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$$

Beweis.

Äquivalenz der beiden Gleichungen:

1	1 $\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $a, b \in A$	A
1	3 $F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8 $\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(6, 7)$
1,2	9 $F(a), F(b) \in B$	Th. 8.2.1.2(3, 2)

10	10 $x \in A$	A
1,2,10	11 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,10	12 $F(a \star x) = F(a) \diamond F(x)$	Ax. 28.2.12.3(11, 2, 10)
1,2,10	13 $a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 2, 10)
14	14 $a \star x = b$	A
1,2,10,14	15 $F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$= E(14, 12)$
1,2,10	16 $a \star x = b \to F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$\to I(14, 15)$
17	17 $F(a) \diamond F(x) = F(b)$	A
1,2,10,17	18 $F(a \star x) = F(b)$	$\mathsf{Tr}.(12, 17)$
1,2,10,17	19 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
1,2,10,17	20 $a \star x = b$	Ax. 6.2.1.1(19, 13, 2, 18)
1,2,10	21 $F(a) \diamond F(x) = F(b) \to a \star x = b$	$\to I(17, 20)$
1,2,10	22 $a \star x = b \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$\leftrightarrow I(16, 21)$

Lösungsmengenkriterium und eingeschränkte Bijektion:

1,10	23 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(3, 10)
1,2,10	24 $L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2,10	25 $x \in L_A(a, b) \leftrightarrow a \star x = b$	Th. 3.7.2.5(24, 10)
1,2,10	26 $L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2,10	27 $F(x) \in L_B(F(a), F(b)) \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	Th. 3.7.2.5(26, 23)
1,2	28 $\forall x \in A\,(x \in L_A(a, b) \leftrightarrow F(x) \in L_B(F(a), F(b)))$	$\forall I(\to I(10, \mathsf{Tr}.(25, 22, 27)))$
1,2	29 $L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2	30 $L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2	31 $L_A(a, b) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7(29)
1,2	32 $L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(30)
1,2	33 $L_A(a, b) \subseteq A \wedge L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	$\wedge I(31, 32)$
1,2	34 $F \restriction_{L_A(a,b)}\colon L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$	Th. 8.3.2.2(3, 33, 28)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.14.2
$A,\ a,\ b,\ x$	Def. 28.2.14.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.14.2
$\star$	Def. 28.2.14.2
Lokale Schreibweise:	Def. 28.2.14.2
$L_A(a,b)$	Def. 28.2.14.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash L_A(a,b)\coloneqq\{x\in A\mid a\star x=b\}$	Def. 28.2.14.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x\in\{u\in A\mid P(u)\}\dashv\vdash x\in A\wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$\{x\in A\mid P(x)\}\subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 8.3.2.2
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 8.3.2.2
Funktionen:	Th. 8.3.2.2
F	Th. 8.3.2.2
$F\colon A\xrightarrow{\sim}B,\ S\subseteq A,\ T\subseteq B\vdash$ $\Big(F\restriction_S\colon S\xrightarrow{\sim}T\leftrightarrow\forall x\in A\,\big(x\in S\leftrightarrow F(x)\in T\big)\Big)$	Th. 8.3.2.2

2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern

Theorem 28.2.14.17 (Die Einermengenkopie liegt in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\operatorname{Sing}(A)\subseteq\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\in\operatorname{Sing}(A)$	A
1,2	3 $\exists a\in A\,(X=\{a\})$	Def. 28.2.4.2(1, 2)
4	4 $a\in A\wedge X=\{a\}$	A
4	5 $\{a\}\subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
	6 $a\in\{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7 $\{a\}\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
4	8 $\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(5, 7))

4	9 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(4,8)$
1,2	10 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\exists E(3,4,9)$
1	11 $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([2]⁝10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.4.2
$A,\ a$	Def. 28.2.4.2
Funktionen:	Def. 28.2.4.2
$\star,\ \eta_A$	Def. 28.2.4.2
Neue Symbole	Def. 28.2.4.2
Einermengenschicht:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright\ \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2
Einermengenabbildung:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright\, \eta_A$	Def. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash$ $\mathrm{Sing}(A) \coloneqq \big\{\{a\} \bigm\vert a \in A\big\},$ $\eta_A \colon A \to \mathrm{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}$	Def. 28.2.4.2
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 28.2.14.18 (Rekonstruktion mit vorgeschriebenen Einermengenbildern).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ R,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$

$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,$
$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\mathrm{Sing}(A)]=\mathrm{Sing}(B)\vdash$
$\exists f\left(\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\wedge\forall a\in A\left(F(\{a\})=\{f(a)\}\right)\right)$

Die Einschränkung von F auf die Einermengenkopie wird mit den beiden Einermengenabbildungen zurück auf die Grundträger transportiert. Setze für den folgenden Beweis

$$R\coloneqq F\restriction_{\mathrm{Sing}(A)},\qquad f\coloneqq\eta_B^{-1}\circ(R\circ\eta_A).$$

Die punktweise Gleichung wird mitgeführt, damit spätere Rekonstruktionsschritte genau diesen Isomorphismus verwenden können.

Beweis.

Konstruktion der bijektiven Trägerabbildung:

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$F[\mathrm{Sing}(A)]=\mathrm{Sing}(B)$	A
1	5	$\mathsf{HGrIso}(\eta_A;A,\star;\mathrm{Sing}(A),\star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
2	6	$\mathsf{HGrIso}(\eta_B;B,\diamond;\mathrm{Sing}(B),\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(2)
1,2,3,4	7	$\mathsf{HGrHom}(\eta_A;A,\star;\mathrm{Sing}(A),\star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4	8	$\mathsf{HGrHom}(\eta_B;B,\diamond;\mathrm{Sing}(B),\diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4	9	$\mathrm{Sing}(A)\subseteq\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4	10	$\mathrm{Sing}(B)\subseteq\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(2)
1,2,3,4	11	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(A),\star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(7)
1,2,3,4	12	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(B),\diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(8)
1,2,3,4	13	$\mathsf{HGrIso}(R;\mathrm{Sing}(A),\star_{\mathcal{P}};\mathrm{Sing}(B),\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.14(3, 11, 12, 9, 10, 4)
1,2,3,4	14	$\mathsf{HGrIso}(R\circ\eta_A;A,\star;\mathrm{Sing}(B),\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.12.3(5, 13)
1,2,3,4	15	$R\circ\eta_A\colon A\xrightarrow{\sim}\mathrm{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(14)
2	16	$\eta_B\colon B\xrightarrow{\sim}\mathrm{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(6)
2	17	$\eta_B^{-1}\colon \mathrm{Sing}(B)\xrightarrow{\sim}B$	Th. 8.3.3.10(16)
1,2,3,4	18	$f\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Th. 8.3.4.1(15, 17)

Vorgeschriebene Einermengenbilder:

19	19	$a \in A$	A
1,2,3,4, 19	20	$f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 19	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(20, 19)
1,19	22	$\{a\} \in \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	23	$F\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4, 19	24	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 19	25	$F\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(23)
1,2,3,4, 19	26	$F(\{a\}) \in F[\mathrm{Sing}(A)]$	Th. 5.2.4.5(24, 25, 22)
1,2,3,4, 19	27	$F(\{a\}) \in \mathrm{Sing}(B)$	$= E(4, 26)$
1,2,3,4, 19	28	$f(a) = \eta_B^{-1}(F(\{a\}))$	Th. 5.3.3.2(15, 17, 19), Def. 5.3.2.2(22), Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	29	$\{f(a)\} = \eta_B(f(a))$	Def. 28.2.4.2(2, 21)
1,2,3,4, 19	30	$= \eta_B(\eta_B^{-1}(F(\{a\})))$	$= E(28)$
1,2,3,4, 19	31	$= F(\{a\})$	Th. 8.3.3.6(16, 27)
1,2,3,4, 19	32	$F(\{a\}) = \{f(a)\}$	Th. 2.9.1.1(Tr.(29, 31))
1,2,3,4	33	$\forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})$	$\forall I(\to I(19, 32))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

34	34	$a, b \in A$	A
1,34	35	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 34)
1,2,3,4, 34	36	$f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 34	37	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(36, 34)
1,2,3,4, 34	38	$\{f(a \star b)\} = F(\{a \star b\})$	Th. 2.9.1.1($\to E$(35, $\forall E$(33)))
1,2,3,4, 34	39	$\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4, 34	40	$\forall u \in A\,(\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,2,3,4, 34	41	$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b)$	Ax. 28.2.12.3(39, 34)
1,2,3,4, 34	42	$F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\})$	$= E(40, 41)$
1,2,3,4, 34	43	$\mathsf{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)

1,2,3,4, 34	44 $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 34	45 $\{a\}, \{b\} \in \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 34)
1,2,3,4, 34	46 $\{a\}, \{b\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(44, 45)
1,2,3,4, 34	47 $F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) = F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$	Ax. 28.2.12.3(43, 46)
1,2,3,4, 34	48 $F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) = \{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\}$	$= E(\to E(34, \forall E$ (33)))
1,2,3,4, 34	49 $\mathsf{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4, 34	50 $\forall u \in B\ (\eta_B(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(2)
1,2,3,4, 34	51 $\eta_B(f(a) \diamond f(b)) = \eta_B(f(a)) \diamond_{\mathcal{P}} \eta_B(f(b))$	Ax. 28.2.12.3(49, 37)
1,2,3,4, 34	52 $\{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\} = \{f(a) \diamond f(b)\}$	$= E(50, 51)$
1,2,3,4, 34	53 $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$	Th. 3.11.3.18(Tr. (38, 42, 47, 48, 52))
1,2,3,4	54 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4	55 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 54, 53)
1,2,3,4	56 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(55, 18)
1,2,3,4	57 $\exists f \left(\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})\right)$	$\exists I(\wedge I(56, 33))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.1
$A,\ a,\ b,\ X,\ z$	Th. 28.2.14.1
Funktionen:	Th. 28.2.14.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$	Th. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Th. 28.2.14.17
$A,\ X,\ a$	Th. 28.2.14.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 28.2.14.17
$\star$	Th. 28.2.14.17
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 28.2.14.14
$A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.14
Funktionen:	Th. 28.2.14.14
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.14
$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGr}(U, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(V, \diamond)\,,$ $U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Th. 28.2.14.14
Mengen:	Th. 28.2.12.3
$A,\ B,\ C$	Th. 28.2.12.3
Funktionen:	Th. 28.2.12.3
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$ $\vdash \mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 28.2.4.2
$A,\ a$	Def. 28.2.4.2
Funktionen:	Def. 28.2.4.2
$\star,\ \eta_A$	Def. 28.2.4.2
Neue Symbole	Def. 28.2.4.2
Einermengenschicht:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright \operatorname{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2
Einermengenabbildung:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright \eta_A$	Def. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash$ $\operatorname{Sing}(A) \coloneqq \{\{a\} \mid a \in A\},$ $\eta_A\colon A \to \operatorname{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}$	Def. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

2.15 Beispiele von Isomorphismen

Ein Isomorphismus liefert durch Einschränkung, mengenweise Fortsetzung, koordinatenweise Anwendung und Transport von Relationen weitere Isomorphismen. Im Folgenden steht $f : A \cong B$ abkürzend für $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$;

die jeweilige Operation auf einem Teilträger ist stets die Einschränkung der umgebenden Operation. Die Abkürzung $h = f^{-1}$ bezeichnet die Umkehrabbildung. Bei Multiplikationsketten schreiben wir die Operationen auch durch Nebeneinanderschreiben; auf A ist damit $\star$, auf B $\diamond$ gemeint. In den nummerierten Teilbeweisen werden zunächst Träger, dann Operation und schließlich Bijektivität nachgewiesen; eine bereits abgeleitete Teilbehauptung wird im nachfolgenden Teil benutzt. Die Identität und die Komposition von Isomorphismen sind bereits in Th. 28.2.12.2 und Th. 28.2.12.3 bewiesen.

2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen

Theorem 28.2.15.1 (Die Umkehrabbildung eines Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$$

Beweis.

Bijektive Umkehrabbildung Th. 28.2.15.1(H1)

$$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(2)

Operationserhaltung Th. 28.2.15.1(H2)

$$f : A \cong B,\ u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$u \in B$	A
3	3	$v \in B$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1,2	8	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)

1,2,3	11	$h(u) \star h(v) \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 8, 9)
1,2,3	12	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Ax. 28.2.12.3(4, 8, 9)
1,2	13	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 2)
1,3	14	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, 3)
1,2,3	15	$f(h(u) \star h(v)) = u \diamond v$	$= E(14, = E(13, 12))$
1,2,3	16	$h(f(h(u) \star h(v))) = h(u) \star h(v)$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1,2,3	17	$h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	$= E(15, 16)$

Isomorphieschluss:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	4	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	5	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	6	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(5)
7	7	$u \in B$	A
8	8	$v \in B$	A
7,8	9	$u, v \in B$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,7,8	10	$h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1($H2$) (1, 9)
1	11	$\forall u, v \in B\ (h(u \diamond v) = h(u) \star h(v))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, 10))))$
1	12	$\mathsf{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(4, 3, 6, 11)
1	13	$\mathsf{HGrIso}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.2(12, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
$f : A \cong B,\ u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1(H2)
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.2.15.2 (Elementare Rechenzugriffe auf einen Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ x, y \in A,\ U \subseteq A \vdash \\
&\textit{(i)} \quad \mathsf{HGr}(A, \star) \\
&\textit{(ii)} \quad \mathsf{HGr}(B, \diamond) \\
&\textit{(iii)} \quad f : A \to B \\
&\textit{(iv)} \quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \\
&\textit{(v)} \quad x = y \leftrightarrow f(x) = f(y) \\
&\textit{(vi)} \quad x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]
\end{aligned}
$$

Beweis.

Quellhalbgruppe Th. 28.2.15.2(H1)

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)

Zielhalbgruppe Th. 28.2.15.2(H2)

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)

Trägerabbildung Th. 28.2.15.2(H3)

$$f : A \cong B \vdash f : A \to B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(2)

Vollständiges Bild Th. 28.2.15.2(H4)

$$f : A \cong B \vdash f[A] = B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$f : A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(2)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f[A] = B$	Th. 7.2.1.5($H1$)(4, 3)

Produktwerte Th. 28.2.15.2(H5)

$$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $x, y \in A$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2	4 $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(3, 2)

Gleichheitsreflexion Th. 28.2.15.2(H6)

$$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $x, y \in A$	A
1	3 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4 $f : A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
5	5 $x = y$	A
5	6 $f(x) = f(y)$	$= E(5, = I)$
	7 $x = y \Rightarrow f(x) = f(y)$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8 $f(x) = f(y)$	A
1,2,8	9 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(4, 2, 8)
1,2	10 $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2	11 $x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Bildzugehörigkeit Th. 28.2.15.2(H7)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ x \in A \vdash x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $x \in A$	A
1	4 $f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
5	5 $x \in U$	A
1,2,5	6 $f(x) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(2, 4, 5)
1,2	7 $x \in U \rightarrow f(x) \in f[U]$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8 $f(x) \in f[U]$	A
1,2,8	9 $\exists z \in U\ (f(x) = f(z))$	Th. 5.2.4.3(2, 4, 8)
10	10 $z \in U \wedge f(x) = f(z)$	A
10	11 $z \in U$	$\wedge E1(10)$
10	12 $f(x) = f(z)$	$\wedge E2(10)$
2,10	13 $z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 11)
1,2,3,10	14 $x = z \leftrightarrow f(x) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 3, 13)
1,2,3,10	15 $x = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(14), 12)$

1,2,3,10	16 $z = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,10	17 $x \in U$	$= E(16, 11)$
1,2,3,8	18 $x \in U$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2,3	19 $f(x) \in f[U] \to x \in U$	$\to I(8, 18)$
1,2,3	20 $x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$	$\leftrightarrow I(7, 19)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.4
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.4
Funktionen:	Ax. 28.2.12.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 28.2.15.3 (Transport von Unterhalbgruppen und Idealen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ a,\ b$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \\
&\textit{(i)}\quad \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(ii)}\quad \mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(iii)}\quad \mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(iv)}\quad \mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Bildträger, Rückbild und Nichtleerheit Th. 28.2.15.3(H1)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
11	11	$x \in A$	A
1,11	12	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1	13	$\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(11, 12))$
1,2	14	$h[f[U]] = U$	Th. 5.3.3.12(4, 7, 13, 2)
15	15	$U \neq \varnothing$	A
1,2,15	16	$U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing$	$\wedge I(2, 15)$
1,2,15	17	$U \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(16)
1,2,15	18	$f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 17)
1,2,15	19	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(18)
1,2,15	20	$f[U] \neq \varnothing$	$\wedge E2(19)$
1,2	21	$U \neq \varnothing \Rightarrow f[U] \neq \varnothing$	$\to I(15, 20)$
22	22	$f[U] \neq \varnothing$	A
1,2,22	23	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing$	$\wedge I(10, 22)$

1,2,22	24	$f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(23)
1,2,22	25	$h[f[U]] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 24)
1,2,22	26	$h[f[U]] \subseteq A \wedge h[f[U]] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(25)
1,2,22	27	$U \neq \varnothing$	$= E(14, \wedge E2(26))$
1,2	28	$f[U] \neq \varnothing \Rightarrow U \neq \varnothing$	$\rightarrow I(22, 27)$
1,2	29	$U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing$	$\leftrightarrow I(21, 28)$
1,2	30	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U$	$\wedge I(10, 14)$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 29))$

Urbild eines Bildzeugen Th. 28.2.15.3(H2)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ u \in f[U] \vdash h(u) \in U$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$u \in f[U]$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(4)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	8	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(7)
1	9	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	10	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1,2	11	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
1,2,3	12	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(11, 3)
1,2,3	13	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 12)
1,2,3	14	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(6, 12)
1,2,3	15	$h(u) \in U \leftrightarrow f(h(u)) \in f[U]$	Th. 28.2.15.2($H7$)(1, 2, 13)
1,2,3	16	$u = f(h(u))$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3	17	$f(h(u)) \in f[U]$	$= E(16, 3)$
1,2,3	18	$h(u) \in U$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(15), 17)$

Produktabschluss Th. 28.2.15.3(H3)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)

1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1$(12)
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(\wedge E2 (\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$u \in f[U]$	A
16	16	$v \in f[U]$	A
1,2,15	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$) (1, 10, 15)
1,2,16	18	$h(v) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$) (1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(v) \in U$	Ax. 28.2.8.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(v) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(u), h(v) \in A$	$\wedge I$(20, 21)
1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 15)
1,2,15,16	25	$v \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	26	$u, v \in B$	$\wedge I$(24, 25)
1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$ (26))
1,2,15,16	28	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (26))
1,2,15,16	29	$f(h(u) \star h(v)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	30	$u \diamond v \in f[U]$	$= E(28, = E(27, = E(23, 29)))$
1,2	31	$\forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U])$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I (16, 30))))$
1,2	32	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 31))$
1	33	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U]))$	Th. 28.2.8.1(9)
1,2	34	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E2(33), 32)$

Linksabsorption Th. 28.2.15.3(H4)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{LId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,15	17	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,16	18	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(b) \star h(u) \in U$	Ax. 28.2.9.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(17, 17))$
1,2,15,16	21	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(b), h(u) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(b) \star h(u)) = f(h(b)) \diamond f(h(u))$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	25	$b, u \in B$	$\wedge I(15, 24)$
1,2,15,16	26	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(25))
1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$(25))
1,2,15,16	28	$f(h(b) \star h(u)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	29	$b \diamond u \in f[U]$	$= E(27, = E(26, = E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U])$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I(16, 29))))$

1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U]))$	Th. 28.2.9.1(9)
1,2	33	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Rechtsabsorption Th. 28.2.15.3(H5)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{RId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,2,16	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,15	18	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(b) \in U$	Ax. 28.2.9.6(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(18, 18))$
1,2,15,16	22	$h(u), h(b) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(b)) = f(h(u)) \diamond f(h(b))$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	25	$u, b \in B$	$\wedge I(24, 15)$
1,2,15,16	26	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(25))

1,2,15,16	27	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (25))
1,2,15,16	28	$f(h(u) \star h(b)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	29	$u \diamond b \in f[U]$	$= E(27, = E(26, = E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I (16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U]))$	Th. 28.2.9.2(9)
1,2	33	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Zweiseitige Ideale Th. 28.2.15.3(H6)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(U; A, \star) \vdash \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	6	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(4, 2)
1,2	7	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(4, 2)
1,2	8	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) (1, 6)
1,2	9	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) (1, 7)
1,2	10	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \wedge \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2	11	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Def. 28.2.9.3(5, 10)

Rückrichtung für UHGr Th. 28.2.15.3(H7)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 2)
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A

1,6	7	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\to I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{UHGr}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\to I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für LId Th. 28.2.15.3(H8)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{LId}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\to I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{LId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{LId}(U; A, \star)$	$\to I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für RId Th. 28.2.15.3(H9)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	A

1,6	7	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{RId}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{RId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{RId}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für Id Th. 28.2.15.3(H10)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{Id}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{Id}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{Id}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.4
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Ax. 28.2.12.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 5.3.3.12
$A,\ B,\ K,\ u,\ v,\ x$	Th. 5.3.3.12
Funktionen:	Th. 5.3.3.12
$F,\ G$	Th. 5.3.3.12
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash G[F[K]] = K$	Th. 5.3.3.12
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ x \in A \vdash x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$	Th. 28.2.15.2(H7)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
Mengen:	Ax. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.2
Funktionen:	Ax. 28.2.8.2
$\star$	Ax. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2
$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow$	Th. 28.2.15.3(H1)
$f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3(H1)
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ u \in f[U] \vdash h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2)
Mengen:	Ax. 28.2.8.3
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.3
Funktionen:	Ax. 28.2.8.3
$\star$	Ax. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$	Th. 28.2.8.1
Mengen:	Ax. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Ax. 28.2.9.1
$\star$	Ax. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1
Mengen:	Ax. 28.2.9.2
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.2
Funktionen:	Ax. 28.2.9.2
$\star$	Ax. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2
Mengen:	Ax. 28.2.9.3
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.3
Funktionen:	Ax. 28.2.9.3
$\star$	Ax. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3
Mengen:	Th. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.1
Funktionen:	Th. 28.2.9.1
$\star$	Th. 28.2.9.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)\big)$	Th. 28.2.9.1
Mengen:	Ax. 28.2.9.4
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.4
Funktionen:	Ax. 28.2.9.4
$\star$	Ax. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4
Mengen:	Ax. 28.2.9.5
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.5
Funktionen:	Ax. 28.2.9.5
$\star$	Ax. 28.2.9.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5
Mengen:	Ax. 28.2.9.6
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.6
Funktionen:	Ax. 28.2.9.6
$\star$	Ax. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.2
$A,\ I,\ x,\ a$	Th. 28.2.9.2
Funktionen:	Th. 28.2.9.2
$\star$	Th. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)\big)$	Th. 28.2.9.2
Mengen:	Ax. 28.2.9.7
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.7
Funktionen:	Ax. 28.2.9.7
$\star$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7
Mengen:	Ax. 28.2.9.8
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.8
Funktionen:	Ax. 28.2.9.8
$\star$	Ax. 28.2.9.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.8
$f : A \cong B,\ \mathsf{LId}(U;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(f[U];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3(H4)
$f : A \cong B,\ \mathsf{RId}(U;A,\star) \vdash \mathsf{RId}(f[U];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3(H5)
Mengen:	Def. 28.2.9.3
$A,\ I$	Def. 28.2.9.3
Funktionen:	Def. 28.2.9.3
$\star$	Def. 28.2.9.3
Voraussetzung	Def. 28.2.9.3
Umgebende Halbgruppe:	Def. 28.2.9.3
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.9.3
Axiome	Def. 28.2.9.3
Linksideal:	Def. 28.2.9.3
$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3
Rechtsideal:	Def. 28.2.9.3
$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3
Neues Symbol	Def. 28.2.9.3
Zweiseitiges Ideal:	Def. 28.2.9.3
$\triangleright\, \mathsf{Id}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3
$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
$f : A \cong B,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H3)
$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(U; A, \star) \vdash \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H6)

Theorem 28.2.15.4 (Einschränkung auf einen abgeschlossenen Teilträger).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash f|_U : U \cong f[U]$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur auf dem Bild Th. 28.2.15.4(H1)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash \mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	5 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1,2	6 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
7	7 $x \in f[U]$	A
8	8 $y \in f[U]$	A
7,8	9 $x, y \in f[U]$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7,8	10 $h(x), h(y) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$) (1, 2, 9)
1,2,3,7,8	11 $h(x) \star h(y) \in U$	Ax. 28.2.1.1(3, 10)
1,2,7,8	12 $x, y \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
1,2,7,8	13 $h(x \diamond y) = h(x) \star h(y)$	Th. 28.2.15.1($H2$) (1, 12)

1,2,7,8	14	$h(x) \star h(y) = h(x \diamond y)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,7,8	15	$h(x \diamond y) \in U$	$= E(14, 11)$
1	16	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2,7,8	17	$x \diamond y \in B$	Ax. 28.2.1.1(4, 12)
1,2	18	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)))$
1,2,7,8	19	$x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in h[f[U]]$	Th. 28.2.15.2($H7$) $(16, 6, 17)$
1,2,7,8	20	$x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in U$	$= E(18, 19)$
1,2,3,7,8	21	$x \diamond y \in f[U]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(20), 15)$
1,2,3	22	$\forall x, y \in f[U]\ (x \diamond y \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ $(8, 21))))$
23	23	$x \in f[U]$	A
24	24	$y \in f[U]$	A
25	25	$z \in f[U]$	A
23,24,25	26	$x, y, z \in f[U]$	$\wedge I^*(23, 24, 25)$
1,2,23, 24,25	27	$x, y, z \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 26)
1,2,23, 24,25	28	$(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$	Ax. 28.2.1.2(4, 27)
1,2	29	$\forall x, y, z \in f[U]\ ((x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z))$	$\forall I(\rightarrow I(23, \forall I(\rightarrow I$ $(24, \forall I(\rightarrow I(25,$ $28))))))$
1,2,3	30	$\mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Def. 28.2.1.1(22, 29)

Einschränkungsisomorphismus:

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1,2	5	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
1,2,3	6	$\mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Th. 28.2.15.4($H1$) $(1, 2, 3)$
	7	$f[U] = f[U]$	$= I$
1,2,3	8	$f\|_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.14.14(1, 3, 6, 2, 5, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ u \in f[U] \vdash h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2)
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$f : A \cong B,\ u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow$	Th. 28.2.15.3(H1)
$f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3(H1)
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ x \in A \vdash x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$	Th. 28.2.15.2(H7)
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash \mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Th. 28.2.15.4(H1)
Mengen:	Th. 28.2.14.14
$A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.14
Funktionen:	Th. 28.2.14.14
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.14
$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGr}(U, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(V, \diamond)\,,$ $U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Th. 28.2.14.14

Theorem 28.2.15.5 (Abgeschlossene Teilträger erben die Halbgruppenstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ U \subseteq A,\ \forall x, y \in U\ (x \star y \in U) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\forall x, y \in U\ (x \star y \in U)$	A
4	4 $x \in U$	A
5	5 $y \in U$	A
6	6 $z \in U$	A
4,5,6	7 $x, y, z \in U$	$\wedge I^*(4, 5, 6)$
2,4,5,6	8 $x, y, z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,4,5,6	9 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8)
1,2	10 $\forall x, y, z \in U\ ((x \star y) \star z = x \star (y \star z))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))))$
1,2,3	11 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	Def. 28.2.1.1(3, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z\in A\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1

2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse

Definition 28.2.15.1 (Positive Produktpotenzen eines Halbgruppenträgers).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash$$
$$A^1:=A,\qquad A^{n+1}:=A^n\star_{\mathcal{P}}A\quad(n\in\mathbb{N},\ n\neq 0).$$

Hier bezeichnet A^n die Menge der Produkte aus n Faktoren. Das bereits definierte A^2 bleibt unverändert. Ein kartesisches Potenzobjekt wird unten durch A^I mit ausdrücklich genannter Indexmenge I bezeichnet.

Theorem 28.2.15.6 (Abschluss und Rechenregeln der Produktpotenzen).

Mengen: $A,\ m,n\in\mathbb{N},\ x,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ m,n\geq 1\vdash$$
(i) $A^mA^n=A^{m+n}$
(ii) $A^{n+1}\subseteq A^n$
(iii) $\mathsf{UHGr}(A^n;A,\star)$

Beweis.

Nichtleere Teilträger Th. 28.2.15.6(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ n\geq 1\vdash \varnothing\neq A^n\subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
1,2	3 $\varnothing\neq A^1\subseteq A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
4	4 $n\geq 1$	A
5	5 $\varnothing\neq A^n\subseteq A$	A
4,5	6 $n\geq 1\,,\quad \varnothing\neq A^n\subseteq A$	$\wedge I^*(4,5)$
1,2,4,5	7 $A^n, A\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Nichtleere Teilmengen aus 6,2; Definition von $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$.
1,2,4,5	8 $A^nA\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 7)
1,2,4,5	9 $\varnothing\neq A^{n+1}\subseteq A$	Def. 28.2.15.1(8)
1,2	10 $\forall n\geq 1\ (\varnothing\neq A^n\subseteq A\Rightarrow\varnothing\neq A^{n+1}\subseteq A)$	$\forall I(\rightarrow I(4,\rightarrow I(5, 9)))$
1,2	11 $\forall n\geq 1\ (\varnothing\neq A^n\subseteq A)$	Th. 10.4.4.18(3, 10)

Addition der Produktlängen Th. 28.2.15.6(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ m,n\geq 1\vdash A^mA^n=A^{m+n}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $m\geq 1$	A
1,2,3	4 $A^mA^1=A^mA=A^{m+1}$	Def. 28.2.15.1(3)
5	5 $n\geq 1$	A
6	6 $A^mA^n=A^{m+n}$	A
5,6	7 $n\geq 1\,,\quad A^mA^n=A^{m+n}$	$\wedge I^*(5,6)$
1,2,3	8 $\varnothing\neq A^m\subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (1, 2, 3)
1,2,5,6	9 $\varnothing\neq A^n\subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (1, 2, 7)
1,2,3,5,6	10 $A^m, A^n, A\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Definition von $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$ aus 8,9,2
1,2,3,5,6	11 $A^m(A^nA)=(A^mA^n)A$	Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.4.2($H7$)(1, $\wedge E1(10), \wedge E1(\wedge E2$ (10)), $\wedge E2(\wedge E2$ (10))))

1,2,3,5,6	12 $A^m A^{n+1} = A^{m+n+1}$	Def. 28.2.15.1(11, 7)
1,2,3	13 $\forall n \geq 1\ (A^m A^n = A^{m+n} \Rightarrow A^m A^{n+1} = A^{m+n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$ 12)))
1,2,3	14 $\forall n \geq 1\ (A^m A^n = A^{m+n})$	Th. 10.4.4.18(4, 13)

Absteigende Folge und Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.6(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $A^1 = A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
1,2	4 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2	5 $A = A^1$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6 $A^2 \subseteq A^1$	$= E(5, 4)$
7	7 $n \geq 1$	A
8	8 $A^{n+1} \subseteq A^n$	A
7,8	9 $n \geq 1\,,\quad A^{n+1} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7	10 $A^{n+2} = A^{n+1} A$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)
1,2,7	11 $A^{n+1} A = A^{n+2}$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,7,8	12 $A^{n+1} A \subseteq A^n A$	Derselbe Produktzeuge liegt wegen 9 im rechten Produkt.
1,2,7	13 $A^{n+1} = A^n A$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)
1,2,7	14 $A^n A = A^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,7,8	15 $A^{n+2} \subseteq A^{n+1}$	$= E(11, 14, 12)$
1,2	16 $\forall n \geq 1\ (A^{n+1} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+2} \subseteq A^{n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8,$ 15)))
1,2	17 $\forall n \geq 1\ (A^{n+1} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(6, 16)
18	18 $n \geq 1$	A
1,2,18	19 $A^{n+1} \subseteq A^n$	$\rightarrow E(\forall E(17), 18)$
20	20 $k \geq 1$	A
21	21 $A^{n+k} \subseteq A^n$	A
20,21	22 $k \geq 1\,,\quad A^{n+k} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(20, 21)$
1,2,18,20	23 $A^{n+k+1} \subseteq A^{n+k}$	17 bei $n + k$
1,2,18, 20,21	24 $A^{n+k+1} \subseteq A^n$	Th. 3.5.3.6(23, 21)
1,2,18	25 $\forall k \geq 1\ (A^{n+k} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+k+1} \subseteq A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(20, \rightarrow I(21,$ 24)))
1,2,18	26 $\forall k \geq 1\ (A^{n+k} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(19, 25)
1,2,18	27 $A^{2n} \subseteq A^n$	26 bei $k = n$

1,2,18	28 $A^n A^n = A^{2n}$	Th. 28.2.15.6($H2$) $(1, 2, 18)$
1,2,18	29 $\varnothing \neq A^n \wedge A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) $(1, 2, 18)$
1,2,18	30 $A^n \subseteq A$	$\wedge E2(29)$
1,2,18	31 $\varnothing \neq A^n$	$\wedge E1(29)$
1,2,18	32 $A^n \neq \varnothing$	Th. 2.9.3.1(31)
1,2,18	33 $A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \varnothing$	$\wedge I(30, 32)$
1,2,18	34 $A^n \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(33)
35	35 $x \in A^n$	A
36	36 $y \in A^n$	A
1,2,18, 35,36	37 $xy \in A^n A^n$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 34, 34, 35, 36)
1,2,18, 35,36	38 $xy \in A^{2n}$	$= E(28, 37)$
1,2,18, 35,36	39 $xy \in A^n$	Th. 3.5.2.6(27, 38)
1,2,18	40 $\forall x, y \in A^n \ (xy \in A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(35, \forall I(\rightarrow I (36, 39))))$
1,2,18	41 $A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in A^n \ (xy \in A^n)$	$\wedge I(30, \wedge I(32, 40))$
1,2,18	42 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 41)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.15.1
$A,\ n$	Def. 28.2.15.1
Funktionen:	Def. 28.2.15.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.15.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$ $A^1 := A, \qquad A^{n+1} := A^n \star_{\mathcal{P}} A \quad (n \in \mathbb{N},\ n \neq 0).$	Def. 28.2.15.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1)))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \rightarrow P(x))$	Th. 10.4.4.18
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Th. 28.2.4.2(H7)
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash A^2\subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A\subseteq B, B\subseteq C\vdash A\subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ m,n\geq 1\vdash A^mA^n=A^{m+n}$	Th. 28.2.15.6(H2)
$a\neq b\vdash b\neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\dashv\vdash X\subseteq A\wedge X\neq\varnothing$	Th. 3.16.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y\vdash$ $x\star y\in X\star_{\mathcal{P}}Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$A\subseteq B,\ x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\leftrightarrow$ $\big(U\subseteq A\wedge U\neq\varnothing\wedge\forall x\in U\,\forall y\in U\,(x\star y\in U)\big)$	Th. 28.2.8.1

Theorem 28.2.15.7 (Isomorphe Einschränkungen auf alle Produktpotenzen).

Mengen: $A,\ B,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f:A\cong B,\ A\neq\varnothing,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash$$
$$\textit{(i)}\quad f[A^n]=B^n$$
$$\textit{(ii)}\quad f|_{A^n}:A^n\cong B^n$$

Beweis.

Abschluss der Produktpotenzen Th. 28.2.15.7(H1)

$$f:A\cong B,\ A\neq\varnothing,\ n\geq 1\vdash\mathsf{UHGr}(A^n;A,\star)\wedge\mathsf{UHGr}(B^n;B,\diamond)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
9	9 $n \geq 1$	A
1,8	10 $B \neq \varnothing$	7; ein Element von A liefert einen Bildzeugen.
1,8,9	11 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6($H3$) $(2, 8, 9)$
1,8,9	12 $\mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.6($H3$) $(3, 10, 9)$
1,8,9	13 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	$\wedge I(11, 12)$

Induktion für die Bildgleichheit Th. 28.2.15.7(H2)

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash f[A^n] = B^n$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
1,8	9 $f[A^1] = B^1$	Def. 28.2.15.1(2, 3, 7)
10	10 $n \geq 1$	A
11	11 $f[A^n] = B^n$	A
10,11	12 $n \geq 1 \wedge f[A^n] = B^n$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,8,10,11	13 $\varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) $(2, 8, 12)$

1,8,10,11	14	$A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	13,8; Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,10,11	15	$f[A^n A] = f[A^n]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14)
1,8,10,11	16	$f[A^{n+1}] = B^{n+1}$	Def. 28.2.15.1(15, 12, 7)
1,8	17	$\forall n \geq 1\ (f[A^n] = B^n \Rightarrow f[A^{n+1}] = B^{n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(10, \rightarrow I(11, 16)))$
1,8	18	$\forall n \geq 1\ (f[A^n] = B^n)$	Th. 10.4.4.18(9, 17)

Isomorphe Einschränkung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$A \neq \varnothing$	A
9	9	$n \geq 1$	A
1,8,9	10	$\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6($H3$) (2, 8, 9)
1,8,9	11	$A^n \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)
1,8,9	12	$\mathsf{HGr}(A^n, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	13	$f\vert_{A^n} : A^n \cong f[A^n]$	Th. 28.2.15.4(1, 11, 12)
1,8,9	14	$f[A^n] = B^n$	Th. 28.2.15.7($H2$) (1, 8, 9)
1,8,9	15	$f\vert_{A^n} : A^n \cong B^n$	$= E(14, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6(H3)
Mengen:	Def. 28.2.15.1
$A,\ n$	Def. 28.2.15.1
Funktionen:	Def. 28.2.15.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.15.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash$ $A^1 := A, \qquad A^{n+1} := A^n \star_{\mathcal{P}} A \quad (n \in \mathbb{N},\ n \neq 0).$	Def. 28.2.15.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6(H1)
Mengen:	Th. 28.2.14.2
$A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.14.2
Funktionen:	Th. 28.2.14.2
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
Mengen:	Th. 28.2.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(U,\star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 28.2.15.4
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U,\star) \vdash f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash f[A^n] = B^n$	Th. 28.2.15.7(H2)

Theorem 28.2.15.8 (Isomorphismen transportieren Erzeugnisse und Monogene).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ n,\ U,\ V$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A,\ a \in A \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f[\langle X\rangle_{A,\star}] = \langle f[X]\rangle_{B,\diamond} \\
&\textit{(ii)} \quad f\vert_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle_{A,\star} \cong \langle f[X]\rangle_{B,\diamond} \\
&\textit{(iii)} \quad f(a^n) = f(a)^n \quad (n \geq 1) \\
&\textit{(iv)} \quad f\vert_{\langle a\rangle} : \langle a\rangle_{A,\star} \cong \langle f(a)\rangle_{B,\diamond}
\end{aligned}
$$

Beweis.

Die beiden minimalen Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.8(H1)

$$f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A \vdash f\vert_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong \langle f[X]\rangle$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)

1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$X \subseteq A$	A
9	9	$X \neq \varnothing$	A
1,8,9	10	$\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle; A, \star)$	Th. 28.2.8.7(2, 8, 9)
1,8,9	11	$X \subseteq \langle X\rangle$	Th. 28.2.8.4(2, 8, 9)
1,8,9	12	$\langle X\rangle \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)
1,8,9	13	$\mathsf{UHGr}(f[\langle X\rangle]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (1, 10)
1,8,9	14	$f[X] \subseteq f[\langle X\rangle]$	Th. 5.2.4.10(4, 11, 12)
8,9	15	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,9	16	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 15)
1,8,9	17	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(16)
1,8,9	18	$f[X] \subseteq B$	$\wedge E1(17)$
1,8,9	19	$f[X] \neq \varnothing$	$\wedge E2(17)$
1,8,9	20	$\langle f[X]\rangle \subseteq f[\langle X\rangle]$	Th. 28.2.8.5(3, 18, 19, 13, 14)
1	21	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,8,9	22	$\mathsf{UHGr}(\langle f[X]\rangle; B, \diamond)$	Th. 28.2.8.7(3, 18, 19)
1,8,9	23	$f[X] \subseteq \langle f[X]\rangle$	Th. 28.2.8.4(3, 18, 19)
1,8,9	24	$\langle f[X]\rangle \subseteq B$	Ax. 28.2.8.1(3, 22)
1,8,9	25	$\mathsf{UHGr}(h[\langle f[X]\rangle]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (21, 22)
1	26	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (21)
1,8,9	27	$h[f[X]] \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	Th. 5.2.4.10(26, 23, 24)
1,8	28	$f[X] \subseteq B \wedge h[f[X]] = X \wedge (X \neq \varnothing \leftrightarrow f[X] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 8)
1,8	29	$h[f[X]] = X$	$\wedge E1(\wedge E2(28))$
1,8,9	30	$X \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	$= E(29, 27)$
1,8,9	31	$\langle X\rangle \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	Th. 28.2.8.5(2, 8, 9, 25, 30)
1,8,9	32	$f[\langle X\rangle] \subseteq \langle f[X]\rangle$	Bildmonotonie aus 31; Umkehrgleichung auf B
1,8,9	33	$f[\langle X\rangle] = \langle f[X]\rangle$	Th. 3.5.3.5(32, 20)
1,8,9	34	$\mathsf{HGr}(\langle X\rangle, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	35	$f\|_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong f[\langle X\rangle]$	Th. 28.2.15.4(1, 12, 34)
1,8,9	36	$f\|_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong \langle f[X]\rangle$	$= E(33, 35)$

Elementpotenzen und Monogene:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $a \in A$	A
1,8	9 $f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(2, 8)
1,8	11 $f(a)^1 = f(a)$	Th. 28.2.6.5(3, 9)
1,8	12 $f(a^1) = f(a)$	$= E(10, = I)$
1,8	13 $f(a) = f(a)^1$	Th. 2.9.1.1(11)
1,8	14 $f(a^1) = f(a)^1$	$= E(13, 12)$
15	15 $n \geq 1$	A
16	16 $f(a^n) = f(a)^n$	A
15,16	17 $n \geq 1 \wedge f(a^n) = f(a)^n$	$\wedge I^*(15, 16)$
1,8,15	18 $a^n \in A$	Th. 28.2.6.7(2, 8, 15)
1,8,15	19 $a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6(2, 8, 15)
1,8,15	20 $f(a^n \star a) = f(a^n) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 18, 8)
1,8,15	21 $f(a)^{n+1} = f(a)^n \diamond f(a)$	Th. 28.2.6.6(3, 9, 15)
1,8,15	22 $a^n \star a = a^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(19)
1,8,15	23 $f(a)^n \diamond f(a) = f(a)^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(21)
1,8,15,16	24 $f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1}$	$= E(23, = E(16, = E(22, 20)))$
1,8	25 $\forall n \geq 1\ (f(a^n) = f(a)^n \Rightarrow f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1})$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 24)))$
1,8	26 $\forall n \geq 1\ (f(a^n) = f(a)^n)$	Th. 10.4.4.18(14, 25)
8	27 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(8)
	28 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	29 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(28)
1,8	30 $f\|_{\langle\{a\}\rangle} : \langle\{a\}\rangle \cong \langle f[\{a\}]\rangle$	Th. 28.2.15.8($H1$) (1, 27, 29)
1,8	31 $f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
1,8	32 $f\|_{\langle a\rangle} : \langle a\rangle \cong \langle f(a)\rangle$	Def. 28.2.8.3(2, 3, 30, 31)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 28.2.8.7
$A,\ X,\ x,\ y,\ u$	Th. 28.2.8.7
Funktionen:	Th. 28.2.8.7
$\star$	Th. 28.2.8.7
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$ $\mathsf{UHGr}(\langle X \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.7
Mengen:	Th. 28.2.8.4
$A,\ U,\ X,\ x,\ u$	Th. 28.2.8.4
Funktionen:	Th. 28.2.8.4
$\star$	Th. 28.2.8.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$ $X \subseteq \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
$f : A \cong B,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H3)
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 28.2.8.5
$A,\ U,\ V,\ X$	Th. 28.2.8.5
Funktionen:	Th. 28.2.8.5
$\star$	Th. 28.2.8.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X \subseteq U \vdash \langle X\rangle_{A,\star} \subseteq U$	Th. 28.2.8.5
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1};B,\diamond;A,\star\big)$	Th. 28.2.15.1
$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow$	Th. 28.2.15.3(H1)
$f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3(H1)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(U,\star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 28.2.15.4
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 28.2.6.5
$A,\ a$	Th. 28.2.6.5
Funktionen:	Th. 28.2.6.5
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.5
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash a^1 = a$	Th. 28.2.6.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.6.7
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.7
Funktionen:	Th. 28.2.6.7
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.7
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^n \in A$	Th. 28.2.6.7
Mengen:	Th. 28.2.6.6
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.6
Funktionen:	Th. 28.2.6.6
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.6
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$ $a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$	Th. 10.4.4.18
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
$f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A \vdash f\vert_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle \cong \langle f[X] \rangle$	Th. 28.2.15.8(H1)
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Def. 28.2.8.3
$A,\ a$	Def. 28.2.8.3
Funktionen:	Def. 28.2.8.3
$\star$	Def. 28.2.8.3
Neues Symbol	Def. 28.2.8.3
Monogene Unterhalbgruppe:	Def. 28.2.8.3
$\triangleright \langle a \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} \coloneqq \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3

2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen

Theorem 28.2.15.9 (Einseitige Ideale als Unterhalbgruppen).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ (\mathsf{LId}(I;A,\star) \vee \mathsf{RId}(I;A,\star) \vee \mathsf{Id}(I;A,\star)) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

Beweis.

Linksideale Th. 28.2.15.9(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $y \in I$	A
5,6	7 $x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5,6	9 $x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 8, 7)

1,2	10 $\forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I (6, 9))))$
1,2	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Rechtsideale Th. 28.2.15.9(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{RId}(I; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{RId}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $y \in I$	A
5,6	7 $x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5,6	9 $x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 8, 7)
1,2	10 $\forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I (6, 9))))$
1,2	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Zweiseitige Ideale Th. 28.2.15.9(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H1$) (1, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.9.1
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.1
Funktionen:	Ax. 28.2.9.1
$\star$	Ax. 28.2.9.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1
Mengen:	Ax. 28.2.9.2
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.2
Funktionen:	Ax. 28.2.9.2
$\star$	Ax. 28.2.9.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.9.3
$A,\ I,\ a,\ x$	Ax. 28.2.9.3
Funktionen:	Ax. 28.2.9.3
$\star$	Ax. 28.2.9.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \leftrightarrow$ $\big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$	Th. 28.2.8.1
Mengen:	Ax. 28.2.9.4
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.4
Funktionen:	Ax. 28.2.9.4
$\star$	Ax. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4
Mengen:	Ax. 28.2.9.5
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.5
Funktionen:	Ax. 28.2.9.5
$\star$	Ax. 28.2.9.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5
Mengen:	Ax. 28.2.9.6
$A,\ I,\ x,\ a$	Ax. 28.2.9.6
Funktionen:	Ax. 28.2.9.6
$\star$	Ax. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6
Mengen:	Ax. 28.2.9.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ I$	Ax. 28.2.9.7
Funktionen:	Ax. 28.2.9.7
$\star$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$	Th. 28.2.15.9(H1)

Theorem 28.2.15.10 (Hauptideale und Green-Relationen).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ a, b \in A \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f[K_{A,\star}(a)] = K_{B,\diamond}(f(a)) \quad (K \in \{L, R, J\}) \\
&\textit{(ii)} \quad f|_{K_{A,\star}(a)} : K_{A,\star}(a) \cong K_{B,\diamond}(f(a)) \\
&\textit{(iii)} \quad a\ \mathcal{K}_{A,\star}\ b \leftrightarrow f(a)\ \mathcal{K}_{B,\diamond}\ f(b) \\
&\qquad (\mathcal{K} \in \{\mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{J}, \mathcal{H}\})
\end{aligned}
$$

Beweis.

Transport der vier möglichen Produktformen Th. 28.2.15.10(H1)

$$f : A \cong B,\ a \in A \vdash \forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)

8	11	$A, \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Die Teilmengen enthalten a; Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.
1,8	12	$f[A\{a\}] = f[A]f[\{a\}]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	13	$f[\{a\}A] = f[\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	14	$A\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 11)
1,8	15	$f[(A\{a\})A] = f[A\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14, 11)
1,8	16	$L_A(a) = \{a\} \cup A\{a\}$	Def. 28.2.9.4(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	17	$L_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\}$	Def. 28.2.9.4(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	18	$f[L_A(a)] = L_B(f(a))$	10,7,12,13,15,16,17; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	19	$R_A(a) = \{a\} \cup \{a\}A$	Def. 28.2.9.5(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	20	$R_B(f(a)) = \{a\} \cup \{a\}B$	Def. 28.2.9.5(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	21	$f[R_A(a)] = R_B(f(a))$	10,7,12,13,15,19,20; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	22	$J_A(a) = \{a\} \cup A\{a\} \cup \{a\}A \cup (A\{a\})A$	Def. 28.2.9.6(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	23	$J_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\} \cup \{a\}B \cup (B\{a\})B$	Def. 28.2.9.6(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	24	$f[J_A(a)] = J_B(f(a))$	10,7,12,13,15,22,23; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	25	$\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Die drei Fälle 18,21,24

Einschränkungen und Relationstransport:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $a, b \in A$	A
1,8	9 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Th. 28.2.15.10($H1$) (1, 8)
1,8	10 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(b)] = K_B(f(b)))$	Th. 28.2.15.10($H1$) (1, 8)
1,8	11 $\mathsf{LId}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(2, 8)
1,8	12 $\mathsf{UHGr}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H1$) (2, 11)
1,8	13 $L_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 12)
1,8	14 $\mathsf{HGr}(L_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 12)
1,8	15 $f\|_{L_A(a)} : L_A(a) \cong f[L_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 13, 14)
1,8	16 $f\|_{L_A(a)} : L_A(a) \cong L_B(f(a))$	$= E(9, 15)$
1,8	17 $\mathsf{RId}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(2, 8)
1,8	18 $\mathsf{UHGr}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H2$) (2, 17)
1,8	19 $R_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 18)
1,8	20 $\mathsf{HGr}(R_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 18)
1,8	21 $f\|_{R_A(a)} : R_A(a) \cong f[R_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 19, 20)
1,8	22 $f\|_{R_A(a)} : R_A(a) \cong R_B(f(a))$	$= E(9, 21)$
1,8	23 $\mathsf{Id}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(2, 8)
1,8	24 $\mathsf{UHGr}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H3$) (2, 23)
1,8	25 $J_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 24)
1,8	26 $\mathsf{HGr}(J_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 24)
1,8	27 $f\|_{J_A(a)} : J_A(a) \cong f[J_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 25, 26)
1,8	28 $f\|_{J_A(a)} : J_A(a) \cong J_B(f(a))$	$= E(9, 27)$
1	29 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.1(H1)(1); Abbildungseigenschaft der Bijektion.

1,8	30 $K_A(a) = K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] = f[K_A(b)]$	Vorwärts: Gleichheitseinsetzung. Rückwärts: auf beide Bilder h anwenden; $h(f(x)) = x$ für jeden Zeugen.
1,8	31 $K_A(a) \subseteq K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] \subseteq f[K_A(b)]$	Vorwärts: derselbe Bildzeuge. Rückwärts: $f(x) = f(y)$ impliziert $x = y$ wegen 5.
1,8	32 $a \mathcal{L}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{L}_B f(b)$	Def. 28.2.11.1(9, 10, 30)
1,8	33 $a \mathcal{R}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{R}_B f(b)$	Def. 28.2.11.2(9, 10, 30)
1,8	34 $a \mathcal{J}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{J}_B f(b)$	Def. 28.2.11.3(9, 10, 30)
1,8	35 $a \mathcal{H}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{H}_B f(b)$	Def. 28.2.11.4(32, 33)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.4.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Th. 28.2.14.2
$A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.14.2
Funktionen:	Th. 28.2.14.2
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
Mengen:	Def. 28.2.9.4
$A,\ a,\ b,\ x$	Def. 28.2.9.4
Funktionen:	Def. 28.2.9.4
$\star$	Def. 28.2.9.4
Neues Symbol	Def. 28.2.9.4
Linkshauptideal:	Def. 28.2.9.4
$\triangleright L_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \left\{b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)\right\}$	Def. 28.2.9.4
	Def. 28.2.9.4
Mengen:	Def. 28.2.9.5
$A,\ a,\ b,\ y$	Def. 28.2.9.5
Funktionen:	Def. 28.2.9.5
$\star$	Def. 28.2.9.5
Neues Symbol	Def. 28.2.9.5
Rechtshauptideal:	Def. 28.2.9.5
$\triangleright R_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.9.5
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash R_{A,\star}(a) := \left\{b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)\right\}$	Def. 28.2.9.5
	Def. 28.2.9.5
Mengen:	Def. 28.2.9.6
$A,\ a,\ b,\ x,\ y$	Def. 28.2.9.6
Funktionen:	Def. 28.2.9.6
$\star$	Def. 28.2.9.6
Neues Symbol	Def. 28.2.9.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Zweiseitiges Hauptideal:	Def. 28.2.9.6
$\triangleright J_{A,\star}(a)$	Def. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$	Def. 28.2.9.6
$J_{A,\star}(a) := \left\{ b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)\right.$	Def. 28.2.9.6
$\left. \vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x$	Def. 28.2.9.6
$\star\, a) \star y) \right\}$	Def. 28.2.9.6
$f : A \cong B,\ a \in A \vdash \forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Th. 28.2.15.10(H1)
Mengen:	Th. 28.2.9.14
$A,\ a,\ b,\ s,\ x$	Th. 28.2.9.14
Funktionen:	Th. 28.2.9.14
$\star$	Th. 28.2.9.14
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 28.2.15.4
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U,\star) \vdash f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4
Mengen:	Th. 28.2.9.15
$A,\ a,\ b,\ s,\ y$	Th. 28.2.9.15
Funktionen:	Th. 28.2.9.15
$\star$	Th. 28.2.9.15
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H2)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.18
$A,\ a,\ b,\ s,\ x,\ y$	Th. 28.2.9.18
Funktionen:	Th. 28.2.9.18
$\star$	Th. 28.2.9.18
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H3)
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 28.2.11.1
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.1
Funktionen:	Def. 28.2.11.1
$\star$	Def. 28.2.11.1
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.1
$\mathcal{L}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1
Mengen:	Def. 28.2.11.2
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.2
Funktionen:	Def. 28.2.11.2
$\star$	Def. 28.2.11.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.2
$\mathcal{R}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2
Mengen:	Def. 28.2.11.3
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.3
Funktionen:	Def. 28.2.11.3
$\star$	Def. 28.2.11.3
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.3
$\mathcal{J}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3
Mengen:	Def. 28.2.11.4
$A,\ a,\ b$	Def. 28.2.11.4
Funktionen:	Def. 28.2.11.4
$\star$	Def. 28.2.11.4
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.11.4
$\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$	Def. 28.2.11.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$ $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b\coloneqq\left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b\wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\right)$	Def. 28.2.11.4

Die Inklusionsaussage im zweiten Beweisteil liefert zugleich den Transport der zugehörigen Teilbarkeitsvorordnungen. Die Einschränkung von f auf eine Green-Klasse ist eine Bijektion auf die entsprechende Klasse in B. Eine Green-Klasse ist im Allgemeinen keine Unterhalbgruppe.

2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen

Für sämtliche nichtleeren Teilmengen ist die Abbildung $X\mapsto f[X]$ bereits durch Th. 28.2.14.4 als Isomorphismus bewiesen. Dies lässt sich beliebig oft anwenden. Die Einermengenkopie wird durch Th. 28.2.14.1 erfasst.

Definition 28.2.15.2 (Endliche nichtleere Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X$
Operation: $\star_{\mathcal{P}}$ *ist das Mengenprodukt.*

$$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\coloneqq\{X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\mid\mathsf{Finite}(X)\}$$

Theorem 28.2.15.11 (Mengenprodukte endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ U,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \lambda_a$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\subseteq A,\ \mathsf{Finite}(X)\,,\ \mathsf{Finite}(Y)\vdash\mathsf{Finite}(\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\})$$

Für diesen Beweis setzen wir $M(U,Y)=\{u\star y\mid u\in U,\ y\in Y\}$ und $P(U)\equiv(U\subseteq A\Rightarrow\mathsf{Finite}(M(U,Y)))$.

Beweis.

Leerer erster Faktor Th. 28.2.15.11(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ Y\subseteq A\vdash\mathsf{Finite}(M(\varnothing,Y))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $Y\subseteq A$	A
	3 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1

	4 $M(\varnothing, Y) = \varnothing$	Elementkriterium: es gibt keinen ersten Faktor.
	5 $\varnothing = M(\varnothing, Y)$	Th. 2.9.1.1(4)
	6 $\mathsf{Finite}(M(\varnothing, Y))$	$= E(5, 3)$

Adjunktion eines ersten Faktors Th. 28.2.15.11(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ Y \subseteq A,\ \mathsf{Finite}(Y)\,,\ U \subseteq A,\ \mathsf{Finite}(M(U, Y))\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $Y \subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(Y)$	A
4	4 $U \subseteq A$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(M(U, Y))$	A
6	6 $a \in A$	A
1,2,6	7 $\lambda_a : Y \to A, \quad \lambda_a(y) = a \star y$	Abgeschlossenheit; Funktionsdefinition durch die eindeutigen Produktwerte
	8 $Y \subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
1,2,3,6	9 $\mathsf{Finite}(\lambda_a[Y])$	Th. 20.3.1.2(7, 8, 3)
1,2,3,5,6	10 $\mathsf{Finite}(M(U, Y) \cup \lambda_a[Y])$	Th. 20.3.5.1(5, 9)
1,2,4,6	11 $M(U \cup \{a\}, Y) = M(U, Y) \cup \lambda_a[Y]$	Elementkriterium: der erste Faktor liegt in U oder ist a.
1,2,4,6	12 $M(U, Y) \cup \lambda_a[Y] = M(U \cup \{a\}, Y)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5, 6	13 $\mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	$= E(12, 10)$

Endlichkeitsinduktion:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $Y \subseteq A$	A
4	4 $\mathsf{Finite}(X)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(Y)$	A
6	6 $\varnothing \subseteq A$	A
1,3	7 $\mathsf{Finite}(M(\varnothing, Y))$	Th. 28.2.15.11($H1$) (1, 3)
1,3	8 $P(\varnothing)$	$\to I(6, 7)$
9	9 $\mathsf{Finite}(U) \wedge P(U) \wedge a \notin U$	A
10	10 $U \cup \{a\} \subseteq A$	A

	11 $U \subseteq U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.53
10	12 $U \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(11, 10)
	13 $a \in U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
10	14 $a \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 13)
9,10	15 $\mathsf{Finite}(M(U, Y))$	$\to E(\wedge E1(\wedge E2(9)),$ 12)
1,3,5,9, 10	16 $\mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	Th. 28.2.15.11($H2$) (1, 3, 5, 12, 15, 14)
1,3,5,9	17 $P(U \cup \{a\})$	$\to I(10, 16)$
1,3,4,5	18 $P(X)$	Ax. 20.2.1.3(8, 9, 17, 4)
1,2,3,4,5	19 $\mathsf{Finite}(M(X, Y))$	$\to E(18, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 20.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ c$	Th. 20.3.1.2
Funktionen:	Th. 20.3.1.2
F	Th. 20.3.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$	Th. 20.3.1.2
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ Y \subseteq A \vdash \mathsf{Finite}(M(\varnothing, Y))$	Th. 28.2.15.11(H1)
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ Y \subseteq A,\ \mathsf{Finite}(Y)\,,\ U \subseteq A,$ $\mathsf{Finite}(M(U,Y))\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\},Y))$	Th. 28.2.15.11(H2)
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

Theorem 28.2.15.12 (Endliche Potenzhalbgruppen sind isomorphieinvariant).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$f : A \cong B \vdash$$
$$\mathsf{HGrIso}\Big(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f|_{\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)}}; \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}}\Big)\,.$$

Beweis.

Abschluss der endlichen Teilmengen Th. 28.2.15.12(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
2	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(2)
3	5 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(3)
2	6 $\mathsf{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(2)
3	7 $\mathsf{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(3)
2,3	8 $X, Y \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 4,5
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(XY)$	Th. 28.2.15.11(1, 8, 6, 7)
1,2,3	10 $XY \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 4, 5)
1,2,3	11 $XY \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(10, 9)

1	12	$\forall X, Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\ (XY \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A))$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 11))))$
	13	$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
1	14	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
1	15	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.5(14, 13, 12)

Bild und Einschränkung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} : \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.4(1)
9	9	$X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
9	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(9)
9	11	$X \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 10
9	12	$\mathsf{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(9)
1,9	13	$\mathsf{Finite}(f[X])$	Th. 20.3.1.2(4, 11, 12)
1,9	14	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 10)
1,9	15	$f[X] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Def. 28.2.15.2(14, 13)
1	16	$\forall X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\ (f[X] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B))$	$\forall I(\to I(9, 15))$
1	17	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	18	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$)(17)
19	19	$Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	A
19	20	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(19)
19	21	$Y \subseteq B$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 20
19	22	$\mathsf{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(19)
1,19	23	$\mathsf{Finite}(h[Y])$	Th. 20.3.1.2(18, 21, 22)
1,19	24	$h[Y] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(18, 20)

1,19	25	$h[Y] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(24, 23)
1,19	26	$f[h[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(21, 5)
1	27	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}[\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)] = \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Bilddefinition aus 16; für jedes 19 liefern 25,26 einen Urbildzeugen.
1	28	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12($H1$) (2)
1	29	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12($H1$) (3)
	30	$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
	31	$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
1	32	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\vert_{\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)} : \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \cong \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Th. 28.2.14.14(8, 28, 29, 30, 31, 27)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.15.2
$A,\ X$	Def. 28.2.15.2
Operation:	Def. 28.2.15.2
$\star_{\mathcal{P}}$ ist das Mengenprodukt.	Def. 28.2.15.2
$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \coloneqq \{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \mathsf{Finite}(X)\}$	Def. 28.2.15.2
Mengen:	Th. 28.2.15.11
$A,\ X,\ Y,\ U,\ a,\ x,\ y$	Th. 28.2.15.11
Funktionen:	Th. 28.2.15.11
$\star,\ \lambda_a$	Th. 28.2.15.11
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \subseteq A,\ \mathsf{Finite}(X)\,,\ \mathsf{Finite}(Y) \vdash \mathsf{Finite}(\{x \star y \mid x$	Th. 28.2.15.11
$\in X,\ y \in Y\})$	Th. 28.2.15.11
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 28.2.15.5
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.5
Funktionen:	Th. 28.2.15.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Th. 28.2.15.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ U \subseteq A,\ \forall x, y \in U\ (x \star y \in U) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$	Th. 28.2.15.5
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 28.2.14.4
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 28.2.14.4
Funktionen:	Th. 28.2.14.4
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Th. 28.2.14.4
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash$ $\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.4
Mengen:	Th. 20.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ c$	Th. 20.3.1.2
Funktionen:	Th. 20.3.1.2
F	Th. 20.3.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$	Th. 20.3.1.2
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Th. 8.3.3.7
$A,\ B,\ Y$	Th. 8.3.3.7
Funktionen:	Th. 8.3.3.7
F	Th. 8.3.3.7
$Y \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12(H1)
Mengen:	Th. 28.2.14.14
$A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.14
Funktionen:	Th. 28.2.14.14
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.14
$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGr}(U, \star),\ \mathsf{HGr}(V, \diamond),$ $U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Th. 28.2.14.14

2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen

Definition 28.2.15.3 (Direktes Produkt einer Halbgruppenfamilie).

Mengen: $I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$
Funktionen: $\star_i,\ \odot$

$$
\begin{aligned}
&(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \\
&\prod_{i \in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i \in I} A_i \mid \forall i \in I\ (x(i) \in A_i)\}, \\
&(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i).
\end{aligned}
$$

Bei konstanter Familie ist dies die kartesische Potenz A^I. Das leere Produkt besteht aus der leeren Funktion und ist eine einelementige Halbgruppe. Eine nichtleere Indexmenge mit leerem Produktträger verursacht für den hier verwendeten Halbgruppenbegriff keinen Sonderfall: Abgeschlossenheit und Assoziativität gelten dann leer.

Definition 28.2.15.4 (Zugehörigkeit zur indizierten Vereinigung).

Mengenfamilie: $(A_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ u,\ i$
Schreibweise: $\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$

$$u \in \bigcup_{i\in I} A_i :\Leftrightarrow \exists i \in I\ (u \in A_i)$$

Definition 28.2.15.5 (Graphterm der punktweisen Produktoperation).

Mengenfamilie: $(A_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ x,\ y,\ i,\ j,\ a$
Operationen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ x, y \in \prod_{i\in I} A_i \vdash$$
$$x \odot y := \Big\{(i, a) \in I \times \bigcup_{j\in I} A_j \mid a = x(i) \star_i y(i)\Big\}.$$

Theorem 28.2.15.13 (Direkte Produkte tragen eine Halbgruppenoperation).

Mengen: $I,\ A_i,\ x,\ y,\ z,\ i$
Funktionen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \mathsf{HGr}\left(\prod_{i\in I} A_i, \odot\right)$$

1	1 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	2 $x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
3	3 $y \in \prod_{i\in I} A_i$	A
4	4 $i \in I$	A
1,2,4	5 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 2, 4)
1,3,4	6 $y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 3, 4)
1,4	7 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\to E(\forall E(1), 4)$
1,2,3,4	8 $x(i) \star_i y(i) \in A_i$	Ax. 28.2.1.1(7, 5, 6)
1,2,3,4	9 $\exists j \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1,2,3,4	10 $x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(9)
1,2,3	11 $\forall i \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(4, 8))$
1,2,3	12 $\forall i \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1,2,3	13 $x \odot y \colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (12), Def. 28.2.15.5

1,2,3	14	$\forall i \in I\ ((x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3,4	15	$(x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	$\to E(\forall E(14), 4)$
1,2,3,4	16	$x(i) \star_i y(i) = (x \odot y)(i)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4	17	$(x \odot y)(i) \in A_i$	$= E(16, 8)$
1,2,3	18	$\forall i \in I\ ((x \odot y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(4, 17))$
1,2,3	19	$x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 13, 18)
1	20	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\, \forall y \in \prod_{i \in I} A_i\ (x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 19))))$
21	21	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
22	22	$y \in \prod_{i \in I} A_i$	A
23	23	$z \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,21,22	24	$x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 21)), 22)$
1,22,23	25	$y \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 22)), 23)$
1,21,22, 23	26	$(x \odot y) \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 24)), 23)$
1,21,22, 23	27	$x \odot (y \odot z) \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 21)), 25)$
1,21,22, 23	28	$(x \odot y) \odot z \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 26)
1,21,22, 23	29	$x \odot (y \odot z) \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 27)
30	30	$i \in I$	A
1,21,30	31	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 30)
1,22,30	32	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 22, 30)
1,23,30	33	$z(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 23, 30)
1,30	34	$\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\to E(\forall E(1), 30)$
1,21,22, 23,30	35	$(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Ax. 28.2.1.2(34, 31, 32, 33)
1,21,22, 23,30	36	$((x \odot y) \odot z)(i) = (x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i)$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 24, 30)
1,21,22, 23,30	37	$(x \odot (y \odot z))(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 25, 30)
1,21,22, 23,30	38	$(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = ((x \odot y) \odot z)(i)$	Th. 2.9.1.1(36)
1,21,22, 23,30	39	$x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i)) = (x \odot (y \odot z))(i)$	Th. 2.9.1.1(37)
1,21,22, 23,30	40	$((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i)$	$= E(38, 39, 35)$
1,21,22, 23	41	$\forall i \in I\ (((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i))$	$\forall I(\to I(30, 40))$

1,21,22, 23	42 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	Th. 5.2.3.17(28, 29, 41)
1	43 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i \, \forall y \in \prod_{i\in I} A_i \, \forall z \in \prod_{i\in I} A_i \, ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\to I(21, \forall I(\to I(22, \forall I(\to I(23, 42))))))$
1	44 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} A_i, \odot\big)$	Def. 28.2.1.1(20, 43)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.15.3
$I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$	Def. 28.2.15.3
Funktionen:	Def. 28.2.15.3
$\star_i,\ \odot$	Def. 28.2.15.3
$(\forall i \in I \ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash$ $\prod_{i\in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I \ (x(i) \in A_i)\}$, $(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i)$.	Def. 28.2.15.3
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4
$u \in \bigcup_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I \ (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
$\forall x \in A \, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.5
$(A_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.5
Mengen:	Def. 28.2.15.5
$I,\ x,\ y,\ i,\ j,\ a$	Def. 28.2.15.5
Operationen:	Def. 28.2.15.5
$\star_i,\ \odot$	Def. 28.2.15.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ x, y \in \prod_{i \in I} A_i \vdash$ $x \odot y \coloneqq \left\{(i, a) \in I \times \bigcup_{j \in I} A_j \mid a = x(i) \star_i y(i)\right\}.$	Def. 28.2.15.5
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.15.14 (Produkte und Umindizierungen von Isomorphismen).

Mengen: $I,\ J,\ A_i,\ B_i,\ x,\ y,\ i,\ j$
Funktionen: $f_i,\ \sigma,\ \odot$

$$
\begin{aligned}
&(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash \\
&\textit{(i)} \quad \prod_i f_i : \prod_i A_i \cong \prod_i B_i \\
&\textit{(ii)} \quad (\prod_i f_i)(x)(i) = f_i(x(i)) \\
&(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ \sigma : J \xrightarrow{\sim} I \vdash \\
&\textit{(iii)} \qquad (x \mapsto x \circ \sigma) : \prod_{i \in I} A_i \cong \prod_{j \in J} A_{\sigma(j)}
\end{aligned}
$$

Definition 28.2.15.6 (Graphterme der koordinatenweisen Produktabbildungen).

Mengenfamilien: $(A_i)_{i\in I},\ (B_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ x,\ y,\ z,\ i,\ j,\ a,\ b$
Funktionsterme: $f_i,\ f_i^{-1},\ \Phi_f(x),\ \Psi_f(y),\ F,\ H$

$$
\begin{aligned}
\Phi_f(x) &\coloneqq \big\{(i,b) \in I \times \bigcup_{j\in I} B_j \mid b = f_i(x(i))\big\}, \\
\Psi_f(y) &\coloneqq \big\{(i,a) \in I \times \bigcup_{j\in I} A_j \mid a = f_i^{-1}(y(i))\big\}, \\
F &\coloneqq \big\{(x,z) \in \prod_{i\in I} A_i \times \prod_{i\in I} B_i \mid z = \Phi_f(x)\big\}, \\
H &\coloneqq \big\{(y,z) \in \prod_{i\in I} B_i \times \prod_{i\in I} A_i \mid z = \Psi_f(y)\big\}, \\
\prod_{i\in I} f_i &\coloneqq F.
\end{aligned}
$$

Beweis.

Koordinatenabbildung Th. 28.2.15.14(H1)

$$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash$$
$$F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$$
$$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$$

1	1	$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5	$\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
8	8	$x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
9	9	$i \in I$	A
1,9	10	$f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,9	11	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(10)
1,9	12	$f_i : A_i \to B_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)
1,8,9	14	$f_i(x(i)) \in B_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15	$\exists j \in I\ (f_i(x(i)) \in B_j)$	$\exists I(\wedge I(9, 14))$
1,8,9	16	$f_i(x(i)) \in \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f_i(x(i)) \in \bigcup_{i\in I} B_i)$	$\forall I(\to I(9, 16))$
1,8	18	$\Phi_f(x)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19	$\forall i \in I\ (\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20	$\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21	$f_i(x(i)) = \Phi_f(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22	$\Phi_f(x)(i) \in B_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23	$\forall i \in I\ (\Phi_f(x)(i) \in B_i)$	$\forall I(\to I(9, 22))$
1,8	24	$\Phi_f(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ (\Phi_f(x) \in \prod_{i\in I} B_i)$	$\forall I(\to I(8, 24))$
1	26	$F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (25), Def. 28.2.15.6

1	27 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ (F(x) = \Phi_f(x))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28 $F(x) = \Phi_f(x)$	$\to E(\forall E(27), 8)$
1,8	29 $\Phi_f(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30 $F(x)(i) = f_i(x(i))$	$= E(29, 20)$
1	31 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I (9, 30))))$
1	32 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Inverse Koordinatenabbildung Th. 28.2.15.14(H2)

$$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash$$
$$H\colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i \wedge$$
$$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$$

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
8	8 $y \in \prod_{i\in I} B_i$	A
9	9 $i \in I$	A
1,9	10 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,9	11 $f_i^{-1} : B_i \xrightarrow{\sim} A_i$	Th. 28.2.15.1($H1$) (10)
1,9	12 $f_i^{-1} : B_i \to A_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13 $y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)
1,8,9	14 $f_i^{-1}(y(i)) \in A_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15 $\exists j \in I\ (f_i^{-1}(y(i)) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(9, 14))$
1,8,9	16 $f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17 $\forall i \in I\ (f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(9, 16))$
1,8	18 $\Psi_f(y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (17), Def. 28.2.15.6

1,8	19 $\forall i \in I\ (\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20 $\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\to E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21 $f_i^{-1}(y(i)) = \Psi_f(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22 $\Psi_f(y)(i) \in A_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23 $\forall i \in I\ (\Psi_f(y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(9, 22))$
1,8	24 $\Psi_f(y) \in \prod_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25 $\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ (\Psi_f(y) \in \prod_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(8, 24))$
1	26 $H\colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (25), Def. 28.2.15.6
1	27 $\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ (H(y) = \Psi_f(y))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28 $H(y) = \Psi_f(y)$	$\to E(\forall E(27), 8)$
1,8	29 $\Psi_f(y) = H(y)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30 $H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$= E(29, 20)$
1	31 $\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, 30))))$
1	32 $H\colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i \wedge$ $\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Produktoperation und inverse Produktabbildung Th. 28.2.15.14(H3)

$$(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash F : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_i B_i$$

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1,2	8 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(3)
1	9 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i)$	$\forall I(\to I(2, 8))$
1	10 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	11 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i$	$\wedge E1(10)$

1	12	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(10)$
1	13	$H\colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i \wedge \forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 28.2.15.14($H2$) (1)
1	14	$H\colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i$	$\wedge E1(13)$
1	15	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge E2(13)$
16	16	$x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
1,16	17	$F(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,16	18	$H(F(x)) \in \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 17)
1,16	19	$H(F(x))\colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 18)
1,16	20	$x\colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16)
21	21	$i \in I$	A
1,21	22	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\to E(\forall E(9), 21)$
1,16,21	23	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16, 21)
1,16,21	24	$f_i^{-1}(f_i(x(i))) = x(i)$	Th. 8.3.3.5(22, 23)
1,16,21	25	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(12), 16)), 21)$
1,16,21	26	$H(F(x))(i) = f_i^{-1}(F(x)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(15), 17)), 21)$
1,16,21	27	$f_i(x(i)) = F(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(25)
1,16,21	28	$f_i^{-1}(F(x)(i)) = H(F(x))(i)$	Th. 2.9.1.1(26)
1,16,21	29	$H(F(x))(i) = x(i)$	$= E(27, 28, 24)$
1,16	30	$\forall i \in I\ (H(F(x))(i) = x(i))$	$\forall I(\to I(21, 29))$
1,16	31	$H(F(x)) = x$	Th. 5.2.3.17(19, 20, 30)
1	32	$H \circ F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Def. 5.3.3.1(11, 14)
	33	$\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Th. 8.3.1.1
1,16	34	$(H \circ F)(x) = H(F(x))$	Def. 5.3.3.1(11, 14, 16)
16	35	$\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x) = x$	Th. 8.3.1.3(16)
1,16	36	$H(F(x)) = (H \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(34)
16	37	$x = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x)$	Th. 2.9.1.1(35)
1,16	38	$(H \circ F)(x) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x)$	$= E(36, 37, 31)$
1	39	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ ((H \circ F)(x) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x))$	$\forall I(\to I(16, 38))$
1	40	$H \circ F = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 39)
41	41	$y \in \prod_{i\in I} B_i$	A
1,41	42	$H(y) \in \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 41)
1,41	43	$F(H(y)) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 42)
1,41	44	$F(H(y))\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 43)
1,41	45	$y\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41)

46	46 $i \in I$	A
1,46	47 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\to E(\forall E(9), 46)$
1,41,46	48 $y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41, 46)
1,41,46	49 $f_i(f_i^{-1}(y(i))) = y(i)$	Th. 8.3.3.6(47, 48)
1,41,46	50 $H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(15), 41)), 46)$
1,41,46	51 $F(H(y))(i) = f_i(H(y)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(12), 42)), 46)$
1,41,46	52 $f_i^{-1}(y(i)) = H(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(50)
1,41,46	53 $f_i(H(y)(i)) = F(H(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(51)
1,41,46	54 $F(H(y))(i) = y(i)$	$= E(52, 53, 49)$
1,41	55 $\forall i \in I\ (F(H(y))(i) = y(i))$	$\forall I(\to I(46, 54))$
1,41	56 $F(H(y)) = y$	Th. 5.2.3.17(44, 45, 55)
1	57 $F \circ H \colon \prod_{i \in I} B_i \to \prod_{i \in I} B_i$	Def. 5.3.3.1(14, 11)
	58 $\mathrm{id}_{\prod_{i \in I} B_i} \colon \prod_{i \in I} B_i \to \prod_{i \in I} B_i$	Th. 8.3.1.1
1,41	59 $(F \circ H)(y) = F(H(y))$	Def. 5.3.3.1(14, 11, 41)
41	60 $\mathrm{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y) = y$	Th. 8.3.1.3(41)
1,41	61 $F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 2.9.1.1(59)
41	62 $y = \mathrm{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y)$	Th. 2.9.1.1(60)
1,41	63 $(F \circ H)(y) = \mathrm{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y)$	$= E(61, 62, 56)$
1	64 $\forall y \in \prod_{i \in I} B_i\ ((F \circ H)(y) = \mathrm{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y))$	$\forall I(\to I(41, 63))$
1	65 $F \circ H = \mathrm{id}_{\prod_{i \in I} B_i}$	Th. 5.2.3.17(57, 58, 64)
1	66 $F : \prod_{i \in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} B_i$	Th. 8.3.4.14(14, 11, 65, 40)

Operationserhaltung:

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1	8 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i \in I} A_i, \odot_A\big)$	Th. 28.2.15.13(6)
1	9 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i \in I} B_i, \odot_B\big)$	Th. 28.2.15.13(7)
1	10 $F : \prod_{i \in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} B_i$	Th. 28.2.15.14($H3$) (1)

1	11	$F : \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Def. 8.2.1.1(10)
1	12	$F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge \forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	13	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
14	14	$x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
15	15	$y \in \prod_{i\in I} A_i$	A
1,14,15	16	$x \odot_A y \in \prod_{i\in I} A_i$	Ax. 28.2.1.1(8, 14, 15)
1,14	17	$F(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 14)
1,15	18	$F(y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 15)
1,14,15	19	$F(x) \odot_B F(y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Ax. 28.2.1.1(9, 17, 18)
1,14,15	20	$F(x \odot_A y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,14,15	21	$F(x \odot_A y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 20)
1,14,15	22	$F(x) \odot_B F(y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 19)
23	23	$i \in I$	A
1,23	24	$f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 23)$
1,14,23	25	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 23)
1,15,23	26	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 15, 23)
1,14,15, 23	27	$f_i(x(i) \star_i y(i)) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (24, 25, 26)
1,14,15, 23	28	$(x \odot_A y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 15, 23)
1,14,23	29	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (13), 14)), 23)$
1,15,23	30	$F(y)(i) = f_i(y(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (13), 15)), 23)$
1,14,15, 23	31	$F(x \odot_A y)(i) = f_i((x \odot_A y)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (13), 16)), 23)$
1,14,15, 23	32	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = F(x)(i) \diamond_i F(y)(i)$	Def. 28.2.15.3(7, 17, 18, 23)
1,14,15, 23	33	$F(x \odot_A y)(i) = f_i(x(i) \star_i y(i))$	$= E(28, 31)$
1,14,15, 23	34	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	$= E(29, 30, 32)$
1,14,15, 23	35	$f_i(x(i) \star_i y(i)) = F(x \odot_A y)(i)$	Th. 2.9.1.1(33)
1,14,15, 23	36	$f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i)) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(34)
1,14,15, 23	37	$F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	$= E(35, 36, 27)$
1,14,15	38	$\forall i \in I\ (F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i))$	$\forall I(\to I(23, 37))$

1,14,15	39	$F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y)$	Th. 5.2.3.17(21, 22, 38)
1	40	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i \; \forall y \in \prod_{i\in I} A_i \; (F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y))$	$\forall I(\to I(14, \forall I(\to I(15, 39))))$
1	41	$\mathsf{HGrHom}\big(F; \prod_{i\in I} A_i, \odot_A; \prod_{i\in I} B_i, \odot_B\big)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 40)
1	42	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i \; \forall i \in I \; (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
1	43	$F : \prod_{i\in I} A_i \cong \prod_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.12.2(41, 10)

Umindizierung:

1	1	$\forall i \in I \; \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	2	$\sigma : J \xrightarrow{\sim} I$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(\prod_i A_i, \odot_A)$	Th. 28.2.15.13(1)
1,2	4	$\forall j \in J \; \mathsf{HGr}\big(A_{\sigma(j)}, \star_{\sigma(j)}\big)$	1,2; All-Elimination in 1: Aus der Abbildung in 2 folgt für jedes $j \in J$, dass $\sigma(j) \in I$.
1,2	5	$\mathsf{HGr}\Big(\prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\Big)$	Th. 28.2.15.13(4)
2	6	$P_\sigma(x) = x \circ \sigma, \quad Q_\sigma(y) = y \circ \sigma^{-1}$	Funktionsdefinitionen auf den jeweils angegebenen Produktträgern
2	7	$Q_\sigma(P_\sigma(x))(i) = x(\sigma(\sigma^{-1}(i))) = x(i) \quad (i \in I)$	6; rechte Umkehrgleichung von σ
2	8	$P_\sigma(Q_\sigma(y))(j) = y(\sigma^{-1}(\sigma(j))) = y(j) \quad (j \in J)$	6; linke Umkehrgleichung von σ
2	9	$P_\sigma : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_j A_{\sigma(j)}$	7,8; Funktionsextensionalität und wechselseitige Inversen
10	10	$x \in \prod_i A_i$	A
11	11	$y \in \prod_i A_i$	A
10,11	12	$x, y \in \prod_i A_i$	$\wedge I^*(10, 11)$
2,10,11	13	$P_\sigma(x \odot_A y)(j) = x(\sigma(j)) \star_{\sigma(j)} y(\sigma(j)) \quad (j \in J)$	Def. 28.2.15.3(6, 12)
2,10,11	14	$P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y)$	13; Produktdefinition und Funktionsextensionalität
2	15	$\forall x, y \in \prod_i A_i \; (P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, 14))))$
2	16	$P_\sigma : \prod_i A_i \to \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 8.2.1.1(9)
1,2	17	$\mathsf{HGrHom}\Big(P_\sigma; \prod_i A_i, \odot_A; \prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\Big)$	Def. 28.2.12.1(3, 5, 16, 15)

1,2 18 $P_\sigma : \prod_i A_i \cong \prod_j A_{\sigma(j)}$ Def. 28.2.12.2(17, 9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.15.3
$I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$	Def. 28.2.15.3
Funktionen:	Def. 28.2.15.3
$\star_i,\ \odot$	Def. 28.2.15.3
$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash$ $\prod_{i\in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I\ (x(i) \in A_i)\}$, $(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i)$.	Def. 28.2.15.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup\limits_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4
$u \in \bigcup\limits_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y\colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
Mengenfamilien:	Def. 28.2.15.6
$(A_i)_{i\in I},\ (B_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.6
Mengen:	Def. 28.2.15.6
$I,\ x,\ y,\ z,\ i,\ j,\ a,\ b$	Def. 28.2.15.6
Funktionsterme:	Def. 28.2.15.6
$f_i,\ f_i^{-1},\ \Phi_f(x),\ \Psi_f(y),\ F,\ H$	Def. 28.2.15.6
$\Phi_f(x) \coloneqq \big\{(i,b) \in I \times \bigcup\limits_{j\in I} B_j \mid b = f_i(x(i))\big\},$	Def. 28.2.15.6
$\Psi_f(y) \coloneqq \big\{(i,a) \in I \times \bigcup\limits_{j\in I} A_j \mid a = f_i^{-1}(y(i))\big\},$	
$F \coloneqq \big\{(x,z) \in \prod\limits_{i\in I} A_i \times \prod\limits_{i\in I} B_i \mid z = \Phi_f(x)\big\},$	
$H \coloneqq \big\{(y,z) \in \prod\limits_{i\in I} B_i \times \prod\limits_{i\in I} A_i \mid z = \Psi_f(y)\big\},$	
$\prod\limits_{i\in I} f_i \coloneqq F.$	
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash$	Th. 28.2.15.14(H1)
$F\colon \prod\limits_{i\in I} A_i \to \prod\limits_{i\in I} B_i \wedge$	
$\forall x \in \prod\limits_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash$ $H\colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i \wedge$ $\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 28.2.15.14(H2)
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14
Mengen:	Th. 28.2.15.13
$I,\ A_i,\ x,\ y,\ z,\ i$	Th. 28.2.15.13
Funktionen:	Th. 28.2.15.13
$\star_i,\ \odot$	Th. 28.2.15.13
$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \mathsf{HGr}\left(\prod_{i\in I} A_i, \odot\right)$	Th. 28.2.15.13
$(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash F : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_i B_i$	Th. 28.2.15.14(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Damit ergeben sich insbesondere $A \times C \cong B \times D$ aus $A \cong B$ und $C \cong D$, sowie $A^I \cong B^I$.

Definition 28.2.15.7 (Binäres direktes Produkt).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$
Mengen: $a, a' \in A,\ b, b' \in B$
Träger: $A \times B$

$$(a, b) \odot (a', b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$$

Theorem 28.2.15.15 (Halbgruppenstruktur des binären Produkts).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ a',\ a'',\ b,\ b',\ b''$
Funktionen: $\star_A,\ \star_B,\ \odot$

$$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B) \vdash \mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3 $x \in A \times B$	A
3	4 $\exists a \in A\, \exists b \in B\ x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(3)
5	5 $a \in A \wedge \exists b \in B\ x = (a, b)$	A
5	6 $a \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\exists b \in B\ x = (a, b)$	$\wedge E2(5)$
8	8 $b \in B \wedge x = (a, b)$	A
8	9 $b \in B$	$\wedge E1(8)$

8	10 $x = (a, b)$	$\wedge E2(8)$
8	11 $(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12 $y \in A \times B$	A
12	13 $\exists a' \in A\, \exists b' \in B\, y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(12)
14	14 $a' \in A \wedge \exists b' \in B\, y = (a', b')$	A
14	15 $a' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16 $\exists b' \in B\, y = (a', b')$	$\wedge E2(14)$
17	17 $b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
17	18 $b' \in B$	$\wedge E1(17)$
17	19 $y = (a', b')$	$\wedge E2(17)$
17	20 $(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,5,14	21 $a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 15)
2,8,17	22 $b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 9, 18)
1,2,5,8, 14,17	23 $(a \star_A a', b \star_B b') \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(21, 22)
1,2,5,8, 14,17	24 $(a, b) \odot (a', b') = (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 6, 9, 15, 18)
1,2,5,8, 14,17	25 $(a \star_A a', b \star_B b') = (a, b) \odot (a', b')$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,5,8, 14,17	26 $(a, b) \odot (a', b') \in A \times B$	$= E(25, 23)$
1,2,5,8, 14,17	27 $x \odot y \in A \times B$	$= E(11, 20, 26)$
1,2,5,8, 14	28 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(16, 17, 27)$
1,2,5,8, 12	29 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(13, 14, 28)$
1,2,5,12	30 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(7, 8, 29)$
1,2,12,3	31 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(4, 5, 30)$
1,2	32 $\forall x \in A \times B\, \forall y \in A \times B\, (x \odot y \in A \times B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I (12, 31))))$
33	33 $x \in A \times B$	A
33	34 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(33)
35	35 $a \in A \wedge \exists b \in B\, x = (a, b)$	A
35	36 $a \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37 $\exists b \in B\, x = (a, b)$	$\wedge E2(35)$
38	38 $b \in B \wedge x = (a, b)$	A
38	39 $b \in B$	$\wedge E1(38)$
38	40 $x = (a, b)$	$\wedge E2(38)$
38	41 $(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(40)
42	42 $y \in A \times B$	A
42	43 $\exists a' \in A\, \exists b' \in B\, y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(42)
44	44 $a' \in A \wedge \exists b' \in B\, y = (a', b')$	A
44	45 $a' \in A$	$\wedge E1(44)$

44	46 $\exists b' \in B\ y = (a', b')$	$\wedge E2(44)$
47	47 $b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
47	48 $b' \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49 $y = (a', b')$	$\wedge E2(47)$
47	50 $(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(49)
51	51 $z \in A \times B$	A
51	52 $\exists a'' \in A\, \exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	Th. 3.16.5.4(51)
53	53 $a'' \in A \wedge \exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	A
53	54 $a'' \in A$	$\wedge E1(53)$
53	55 $\exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	$\wedge E2(53)$
56	56 $b'' \in B \wedge z = (a'', b'')$	A
56	57 $b'' \in B$	$\wedge E1(56)$
56	58 $z = (a'', b'')$	$\wedge E2(56)$
56	59 $(a'', b'') = z$	Th. 2.9.1.1(58)
1,35,44	60 $a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 36, 45)
1,44,53	61 $a' \star_A a'' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 54)
2,38,47	62 $b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 39, 48)
2,47,56	63 $b' \star_B b'' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 48, 57)
1,35,44, 53	64 $(a \star_A a') \star_A a'' = a \star_A (a' \star_A a'')$	Ax. 28.2.1.2(1, 36, 45, 54)
2,38,47, 56	65 $(b \star_B b') \star_B b'' = b \star_B (b' \star_B b'')$	Ax. 28.2.1.2(2, 39, 48, 57)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	66 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= ((a \star_A a') \star_A a'', (b \star_B b') \star_B b'')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 60, 62)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	67 $(a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 61, 63)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	68 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	$= E(64, 65, 66)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	69 $(a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	Th. 2.9.1.1(67)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	70 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	$= E(69, 68)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	71 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$= E(41, 50, 59, 70)$
1,2,35, 38,44,47, 53	72 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(55, 56, 71)$

1,2,35, 38,44,47, 51	73 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(52, 53, 72)$
1,2,35, 38,44,51	74 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(46, 47, 73)$
1,2,35, 38,51,42	75 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(43, 44, 74)$
1,2,35, 51,42	76 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(37, 38, 75)$
1,2,51, 42,33	77 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(34, 35, 76)$
1,2	78 $\forall x \in A \times B \forall y \in A \times B \forall z \in A \times B$ $((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\to I(33, \forall I(\to I$ $(42, \forall I(\to I(51,$ $77))))))$
1,2	79 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Def. 28.2.1.1(32, 78)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7
$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a, a' \in A,\ b, b' \in B$	Def. 28.2.15.7
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A \times B$	Def. 28.2.15.7
$(a, b) \odot (a', b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.15.16 (Halbgruppenstruktur kartesischer Potenzen).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star,\ \odot$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	$\forall I(1)$
1	3	$\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} A, \odot\big)$	Th. 28.2.15.13(2)
1	4	$\mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$	Def. 28.2.15.3(3); konstante Familie.

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.15.13
$I,\ A_i,\ x,\ y,\ z,\ i$	Th. 28.2.15.13
Funktionen:	Th. 28.2.15.13
$\star_i,\ \odot$	Th. 28.2.15.13
$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \mathsf{HGr}\left(\prod_{i\in I} A_i, \odot\right)$	Th. 28.2.15.13
Mengen:	Def. 28.2.15.3
$I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$	Def. 28.2.15.3
Funktionen:	Def. 28.2.15.3
$\star_i,\ \odot$	Def. 28.2.15.3
$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash$ $\prod_{i\in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I\ (x(i) \in A_i)\}$, $(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i)$.	Def. 28.2.15.3

Theorem 28.2.15.17 (Isomorphiekriterium mit angegebener Umkehrabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G,\ \cdot_S,\ \cdot_T$

$$\mathsf{HGr}(S, \cdot_S)\,,\ \mathsf{HGr}(T, \cdot_T)\,,\ F : S \to T,\ G : T \to S,$$
$$G \circ F = \mathrm{id}_S,\ F \circ G = \mathrm{id}_T,$$
$$\forall x, y \in S\ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y)) \vdash \mathsf{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \cdot_S)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(T, \cdot_T)$	A
3	3 $F : S \to T$	A
4	4 $G : T \to S$	A
5	5 $G \circ F = \mathrm{id}_S$	A
6	6 $F \circ G = \mathrm{id}_T$	A
7	7 $\forall x, y \in S\ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y))$	A
3,4,5,6	8 $F : S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.14(4, 3, 6, 5)
1,2,3,7	9 $\mathsf{HGrHom}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	10 $\mathsf{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.2(9, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.2.15.18 (Kanonische Isomorphismen direkter Produkte).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ I,\ J,\ a,\ b,\ c$
Operationen: *Alle Produkte und Potenzen tragen die koordinatenweisen Operationen.*
Einpunktträger: $* \cdot * := *$

$$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)\,,\ \mathsf{HGr}(C, \star_C) \vdash$$
(i) $A \times B \cong B \times A$
(ii) $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$
(iii) $A \times \{*\} \cong A$
(iv) $A^{I \times J} \cong (A^J)^I$
(v) $(A \times B)^I \cong A^I \times B^I$

Beweis.

Vertauschung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15$(1, 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(B \times A, \odot)$	Th. 28.2.15.15$(2, 1)$
1,2	5 $S : A \times B \to B \times A\,, \quad T : B \times A \to A \times B$	Definition durch $S(a, b) = (b, a)$, $T(b, a) = (a, b)$.
1,2	6 $\forall a, a' \in A\ \forall b, b' \in B\ (S((a, b)(a', b')) = (bb', aa') = S(a, b)S(a', b'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von S.
1,2	7 $T \circ S = \mathrm{id}_{A \times B}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	8 $S \circ T = \mathrm{id}_{B \times A}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	9 $\forall x, y \in A \times B\ (S(xy) = S(x)S(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	10 $S : A \times B \cong B \times A$	Th. 28.2.15.17$(3, 4, 5, 7, 8, 9)$

Umklammerung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(C, \star_C)$	A
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15$(1, 2)$
2,3	5 $\mathsf{HGr}(B \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15$(2, 3)$
1,2,3	6 $\mathsf{HGr}((A \times B) \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15$(4, 3)$
1,2,3	7 $\mathsf{HGr}(A \times (B \times C), \odot)$	Th. 28.2.15.15$(1, 5)$
1,2,3	8 $R : (A \times B) \times C \to A \times (B \times C)\,, \quad Q : A \times (B \times C) \to (A \times B) \times C$	Definition durch $R((a, b), c) = (a, (b, c))$, $Q(a, (b, c)) = ((a, b), c)$.
1,2,3	9 $\forall a, a' \in A\ \forall b, b' \in B\ \forall c, c' \in C$ $(R(((a, b), c)((a', b'), c'))$ $= (aa', (bb', cc'))$ $= R((a, b), c)R((a', b'), c'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von R.
1,2,3	10 $Q \circ R = \mathrm{id}_{(A\times B)\times C}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	11 $R \circ Q = \mathrm{id}_{A\times(B\times C)}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	12 $\forall x, y \in (A \times B) \times C\ (R(xy) = R(x)R(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2,3	13 $R : (A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$	Th. 28.2.15.17$(6, 7, 8, 10, 11, 12)$

Einpunktfaktor:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(\{*\}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1; einziges Produkt $* \cdot * = *$, beide Dreierprodukte sind $*$.
1	3 $\mathsf{HGr}(A \times \{*\}, \odot)$	Th. 28.2.15.15$(1, 2)$
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	$\wedge E1(\wedge I(1, 1))$

1	5 $P : A \times \{*\} \to A\,, \quad E : A \to A \times \{*\}$	Definition durch $P(a,*) = a$, $E(a) = (a,*)$.
1	6 $\forall a, b \in A\ (P((a,*)(b,*)) = ab = P(a,*)P(b,*))$	Def. 28.2.15.7; Definition von P.
1	7 $E \circ P = \mathrm{id}_{A \times \{*\}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8 $P \circ E = \mathrm{id}_A$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	9 $\forall x, y \in A \times \{*\}\ (P(xy) = P(x)P(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10 $P : A \times \{*\} \cong A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Verschachtelte kartesische Potenzen:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}\big(A^{I \times J}, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	3 $\mathsf{HGr}\big(A^J, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	4 $\mathsf{HGr}\big((A^J)^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5 $K : A^{I \times J} \to (A^J)^I\,, \quad L : (A^J)^I \to A^{I \times J}$	Definition durch $K(u)(i)(j) = u(i,j)$, $L(v)(i,j) = v(i)(j)$; jeder Wert liegt in A.
1	6 $\forall u, w \in A^{I \times J}\ \forall i \in I\ \forall j \in J\ (K(uw)(i)(j) = u(i,j)w(i,j) = (K(u)K(w))(i)(j))$	Def. 28.2.15.3; Definition von K.
1	7 $L \circ K = \mathrm{id}_{A^{I \times J}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8 $K \circ L = \mathrm{id}_{(A^J)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

1	9	$\forall x, y \in A^{I\times J}\ (K(xy) = K(x)K(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10	$K : A^{I\times J} \cong (A^J)^I$	Th. 28.2.15.17(2, 4, 5, 7, 8, 9)

Aufteilung eines Paars von Koordinaten:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3	$\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{HGr}\big((A \times B)^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5	$\mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
2	6	$\mathsf{HGr}\big(B^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(2)
1,2	7	$\mathsf{HGr}\big(A^I \times B^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.15(5, 6)
1,2	8	$D : (A \times B)^I \to A^I \times B^I\,, \quad E : A^I \times B^I \to (A \times B)^I$	Definition durch $D(u) = (\pi_1 \circ u, \pi_2 \circ u)$, $E(v, w)(i) = (v(i), w(i))$.
1,2	9	$\forall u, u' \in (A \times B)^I\ \forall i \in I\ \forall k \in \{1, 2\}\ (\pi_k((uu')(i)) = \pi_k(u(i))\pi_k(u'(i)))$	Def. 28.2.15.7; koordinatenweise Operation.
1,2	10	$E \circ D = \mathrm{id}_{(A\times B)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	11	$D \circ E = \mathrm{id}_{A^I \times B^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	12	$\forall x, y \in (A \times B)^I\ (D(xy) = D(x)D(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	13	$D : (A \times B)^I \cong A^I \times B^I$	Th. 28.2.15.17(4, 7, 8, 10, 11, 12)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.15.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ a,\ a',\ a'',\ b,\ b',\ b''$	Th. 28.2.15.15
Funktionen:	Th. 28.2.15.15
$\star_A,\ \star_B,\ \odot$	Th. 28.2.15.15
$\mathsf{HGr}(A,\star_A),\ \mathsf{HGr}(B,\star_B) \vdash \mathsf{HGr}(A\times B,\odot)$	Th. 28.2.15.15
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7
$\mathsf{HGr}(A,\star_A),\ \mathsf{HGr}(B,\star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a,a'\in A,\ b,b'\in B$	Def. 28.2.15.7
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A\times B$	Def. 28.2.15.7
$(a,b)\odot(a',b') \coloneqq (a\star_A a', b\star_B b')$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Th. 28.2.15.17
$S,\ T,\ x,\ y$	Th. 28.2.15.17
Funktionen:	Th. 28.2.15.17
$F,\ G,\ \cdot_S,\ \cdot_T$	Th. 28.2.15.17
$\mathsf{HGr}(S,\cdot_S),\ \mathsf{HGr}(T,\cdot_T),\ F:S\to T,\ G:T\to S,$ $G\circ F=\mathrm{id}_S,\ F\circ G=\mathrm{id}_T,$ $\forall x,y\in S\ (F(x\cdot_S y)=F(x)\cdot_T F(y)) \vdash \mathsf{HGrIso}(F;S,\cdot_S;T,\cdot_T)$	Th. 28.2.15.17
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y\in A \vdash x\star y\in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z\in A \vdash (x\star y)\star z = x\star(y\star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.15.16
$A,\ I$	Th. 28.2.15.16
Funktionen:	Th. 28.2.15.16
$\star,\ \odot$	Th. 28.2.15.16
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^I,\odot\big)$	Th. 28.2.15.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.15.3
$I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$	Def. 28.2.15.3
Funktionen:	Def. 28.2.15.3
$\star_i,\ \odot$	Def. 28.2.15.3
$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash$ $\prod_{i\in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I\ (x(i) \in A_i)\},$ $(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i).$	Def. 28.2.15.3

Definition 28.2.15.8 (Gegenhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$

$$(A, \star)^{\mathrm{op}} \coloneqq (A, \star^{\mathrm{op}}), \qquad x \star^{\mathrm{op}} y \coloneqq y \star x$$

Theorem 28.2.15.19 (Isomorphismen der Gegenhalbgruppen).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGrIso}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$$

Beweis.

Die umgekehrte Operation Th. 28.2.15.19(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2,3	4 $x, y \in A$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5 $y \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4)
1,2,3	6 $x \star^{\mathrm{op}} y \in A$	Def. 28.2.15.8(5)
1	7 $\forall x, y \in A\ (x \star^{\mathrm{op}} y \in A)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 6))))$
8	8 $x \in A$	A
9	9 $y \in A$	A
10	10 $z \in A$	A

8,9,10	11	$x, y, z \in A$	$\wedge I^*(8, 9, 10)$
1,8,9,10	12	$(x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = z \star (y \star x)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)
1,8,9,10	13	$(z \star y) \star x = z \star (y \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 11)
1,8,9,10	14	$z \star (y \star x) = (z \star y) \star x$	Th. 2.9.1.1(13)
1,8,9,10	15	$(z \star y) \star x = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)
1,8,9,10	16	$(x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z)$	$\mathsf{Tr}.(12, 14, 15)$
1	17	$\forall x, y, z \in A\ ((x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 16))))))$
1	18	$\mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.1.1(7, 17)

Die unveränderte Trägerabbildung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19($H1$)(2)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19($H1$)(3)
10	10	$x \in A$	A
11	11	$y \in A$	A
10,11	12	$x, y \in A$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,10,11	13	$f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(y \star x)$	Def. 28.2.15.8(2, 12)
1,10,11	14	$f(y \star x) = f(y) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 12)
1,10,11	15	$f(y) \diamond f(x) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y)$	Def. 28.2.15.8(3)
1,10,11	16	$f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y)$	$\mathsf{Tr}.(13, 14, 15)$
1	17	$\forall x, y \in A\ (f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, 16))))$
1	18	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 4, 17)
1	19	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.12.2(18, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.15.8
$A,\ x,\ y$	Def. 28.2.15.8
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.15.8
$(A,\star)^{\mathrm{op}}\coloneqq(A,\star^{\mathrm{op}}),\qquad x\star^{\mathrm{op}}y\coloneqq y\star x$	Def. 28.2.15.8
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$f:A\cong B\vdash\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f:A\cong B\vdash\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f:A\cong B\vdash f:A\to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash f\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19(H1)
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen

Definition 28.2.15.9 (Zentralisator und Zentrum einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$C_A(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\ (a \star x = x \star a)\}, \qquad Z(A) \coloneqq C_A(A).$$

Zentralisatoren können leer sein. Die folgenden Aussagen verwenden deshalb die auf den Teilträgern abgeschlossenen assoziativen Operationen; Nichtleerheit wird nur bei der Bezeichnung Unterhalbgruppe verlangt.

Theorem 28.2.15.20 (Isomorphie von Zentralisatoren und Zentren).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash$$
(i) $f[C_A(X)] = C_B(f[X])$
(ii) $f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$
(iii) $f[Z(A)] = Z(B)$
(iv) $f|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$

Beweis.

Produktabschluss eines Zentralisators Th. 28.2.15.20(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X \subseteq A \vdash \mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $a \in C_A(X)$	A
4	4 $b \in C_A(X)$	A
3,4	5 $a, b \in C_A(X)$	$\wedge I^*(3,4)$
3,4	6 $a, b \in A$	Def. 28.2.15.9(5)
1,3,4	7 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6)

8	8 $x \in X$	A
2,8	9 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
3,4,8	10 $b \star x = x \star b$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
3,4,8	11 $a \star x = x \star a$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
1,2,3,4,8	12 $(a \star b) \star x = a \star (b \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 9)
1,2,3,4,8	13 $a \star (b \star x) = a \star (x \star b)$	$= E(10)$
1,2,3,4,8	14 $a \star (x \star b) = (a \star x) \star b$	Ax. 28.2.1.2(1,6,9); Symmetrie
1,2,3,4,8	15 $(a \star x) \star b = (x \star a) \star b$	$= E(11)$
1,2,3,4,8	16 $(x \star a) \star b = x \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 6)
1,2,3,4,8	17 $(a \star b) \star x = x \star (a \star b)$	Tr.(12, 13, 14, 15, 16)
1,2,3,4	18 $\forall x \in X\ ((a \star b) \star x = x \star (a \star b))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 17))$
1,2,3,4	19 $a \star b \in C_A(X)$	Def. 28.2.15.9(7, 18)
1,2	20 $\forall a, b \in C_A(X)\ (a \star b \in C_A(X))$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 19))))$
	21 $C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,2	22 $\mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 21, 20)

Bildkriterium und Einschränkung Th. 28.2.15.20(H2)

$$f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
8	8 $X \subseteq A$	A
1,8	9 $f[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(8, 4)
10	10 $a \in A$	A
11	11 $x \in X$	A
8,11	12 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 11)
1,8,10,11	13 $a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 10, 12)
1,8,10,11	14 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 12, 10)

1,8,10,11	15	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a \star x) = f(x \star a)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 13, 14)$
1,8,10,11	16	$f(a \star x) = f(a) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 10, 12)$
1,8,10,11	17	$f(x \star a) = f(x) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 12, 10)$
1,8,10,11	18	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a) \diamond f(x) = f(x) \diamond f(a)$	$= E(16, 17, 15)$
1,8,10	19	$(\forall x \in X\ (a \star x = x \star a)) \leftrightarrow (\forall y \in f[X]\ (f(a) \diamond y = y \diamond f(a)))$	18 für alle 11; jedes $y \in f[X]$ besitzt einen Bildzeugen.
1,10	20	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9$(4, 10)$
1,8,10	21	$a \in C_A(X) \leftrightarrow f(a) \in C_B(f[X])$	Def. 28.2.15.9$(2, 3, 8, 9, 10, 20, 19)$
1,8	22	$f[C_A(X)] = C_B(f[X])$	21 für alle 10; Bilddefinition und 7
	23	$C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,8	24	$\mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.20($H1$) $(2, 8)$
1,8	25	$f\|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong f[C_A(X)]$	Th. 28.2.15.4$(1, 23, 24)$
1,8	26	$f\|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$	$= E(22, 25)$

Spezialisierung auf das Zentrum:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
	8	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	9	$f\|_{C_A(A)} : C_A(A) \cong C_B(f[A])$	Th. 28.2.15.20($H2$) $(1, 8)$
1	10	$f\|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$	Def. 28.2.15.9$(9, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.15.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ X,\ a,\ x$	Def. 28.2.15.9
Funktionen:	Def. 28.2.15.9
$\star$	Def. 28.2.15.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A \vdash$	Def. 28.2.15.9
$C_A(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X\ (a \star x = x \star a)\}, \qquad Z(A) :=$	Def. 28.2.15.9
$C_A(A)$.	Def. 28.2.15.9
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.15.5
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.5
Funktionen:	Th. 28.2.15.5
$\star$	Th. 28.2.15.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ U \subseteq A,\ \forall x,y \in U\ (x \star y \in U) \vdash \mathsf{HGr}(U,\star)$	Th. 28.2.15.5
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A,\star; B,\diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A,\star; B,\diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A,\star; B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X \subseteq A \vdash \mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.20(H1)
Mengen:	Th. 28.2.15.4
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash f|_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$	Th. 28.2.15.20(H2)

Definition 28.2.15.10 (Lokaler Träger eines idempotenten Elements).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$$
$$eAe \coloneqq \{(e \star a) \star e \mid a \in A\}.$$

Theorem 28.2.15.21 (Isomorphie der lokalen Träger).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ b,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$$
(i) $f[eAe] = f(e)Bf(e)$
(ii) $f|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$
(iii) $\forall u \in eAe\ (e \star u = u \wedge u \star e = u)$

Beweis.

Lokaler Abschluss und neutrales Element Th. 28.2.15.21(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ ee=e\vdash \mathsf{UHGr}(eAe;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e\in A$	A
3	3 $ee=e$	A
4	4 $u\in eAe$	A
1,2,3,4	5 $\exists a\in A\ (u=(ea)e)$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 4)
6	6 $a\in A\wedge u=(ea)e$	A
6	7 $a\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $u=(ea)e$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9 $ea\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 7)
1,2,6	10 $(ea)e\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 9, 2)
6	11 $(ea)e=u$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	12 $u\in A$	$=E(11,10)$
1,2,6	13 $(ee)a=e(ea)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 2, 7)
1,2,6	14 $e(ea)=(ee)a$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,6	15 $e(ea)=ea$	$=E(3,14)$
1,2,6	16 $(e(ea))e=e((ea)e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 9, 2)
1,2,6	17 $e((ea)e)=(e(ea))e$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,6	18 $eu=u$	$=E(11,15,11,17)$
1,2,6	19 $((ea)e)e=(ea)(ee)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 2, 2)
1,2,3,6	20 $ue=u$	$=E(11,3,11,19)$
1,2,3,6	21 $u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u$	$\wedge I(12,\wedge I(18,20))$
1,2,3,4	22 $u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u$	$\exists E(5,6,21)$
1,2,3	23 $\forall u\in eAe\ (u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u)$	$\forall I(\to I(4,22))$
1,2,3,4	24 $u\in A$	$\wedge E1(22)$
1,2,3	25 $eAe\subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]:24)
1,2,3,4	26 $eu=u\wedge ue=u$	$\wedge E2(22)$
1,2,3	27 $\forall u\in eAe\ (eu=u\wedge ue=u)$	$\forall I(\to I(4,26))$
	28 $(ee)e=(ee)e$	$=I$
3	29 $e=(ee)e$	$=E(3,3,28)$
2,3	30 $\exists a\in A\ (e=(ea)e)$	$\exists I^*(2,29)$
1,2,3	31 $e\in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 30)
1,2,3	32 $eAe\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(31)
33	33 $u\in eAe$	A

34	34 $v \in eAe$	A
1,2,3,33	35 $u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u$	$\to E(\forall E(23), 33)$
1,2,3,34	36 $v \in A \wedge ev = v \wedge ve = v$	$\to E(\forall E(23), 34)$
1,2,3,33	37 $u \in A$	$\wedge E1(35)$
1,2,3,34	38 $v \in A$	$\wedge E1(36)$
1,2,3,33	39 $eu = u$	$\wedge E1(\wedge E2(35))$
1,2,3,34	40 $ve = v$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,2,3,33, 34	41 $uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 38)
1,2,3,33, 34	42 $(eu)v = e(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 37, 38)
1,2,3,33, 34	43 $e(uv) = (eu)v$	Th. 2.9.1.1(42)
1,2,3,33, 34	44 $e(uv) = uv$	$= E(39, 43)$
1,2,3,33, 34	45 $uv = e(uv)$	Th. 2.9.1.1(44)
1,2,3,33, 34	46 $(uv)e = u(ve)$	Ax. 28.2.1.2(1, 37, 38, 2)
1,2,3,33, 34	47 $(uv)e = uv$	$= E(40, 46)$
1,2,3,33, 34	48 $(e(uv))e = uv$	$= E(45, 47)$
1,2,3,33, 34	49 $uv = (e(uv))e$	Th. 2.9.1.1(48)
1,2,3,33, 34	50 $\exists a \in A\ (uv = (ea)e)$	$\exists I^*(41, 49)$
1,2,3,33, 34	51 $uv \in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 50)
1,2,3	52 $\forall u, v \in eAe\ (uv \in eAe)$	$\forall I(\to I(33, \forall I(\to I(34, 51))))$
1,2,3	53 $eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in eAe\ (uv \in eAe)$	$\wedge I(25, \wedge I(32, 52))$
1	54 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star) \leftrightarrow \big(eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \varnothing \wedge \forall u \in eAe\, \forall v \in eAe\ (uv \in eAe)\big)$	Th. 28.2.8.1(1)
1,2,3	55 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star)$	$\to E(\leftrightarrow E2(54), 53)$

Bildgleichheit und Isomorphie:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)

1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $e \in A$	A
9	9 $e \star e = e$	A
1,8	10 $f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	11 $f(e \star e) = f(e) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 8)
1,8,9	12 $f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 11)$
13	13 $a \in A$	A
1,8,13	14 $e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 8, 13)
1,8,13	15 $f((e \star a) \star e) = f(e \star a) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 14, 8)
1,8,13	16 $f(e \star a) = f(e) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 8, 13)
1,8,13	17 $f((e \star a) \star e) = (f(e) \diamond f(a)) \diamond f(e)$	$= E(16, 15)$
1,8,9	18 $f[eAe] = f(e)Bf(e)$	17 für alle 13; 7; lokale Trägerdefinition
1,8,9	19 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star)$	Th. 28.2.15.21($H1$) (2, 8, 9)
1,8,9	20 $eAe \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 19)
1,8,9	21 $\mathsf{HGr}(eAe, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 19)
1,8,9	22 $f\|_{eAe} : eAe \cong f[eAe]$	Th. 28.2.15.4(1, 20, 21)
1,8,9	23 $f\|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$	$= E(18, 22)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.15.10
$A,\ e,\ a$	Def. 28.2.15.10
Funktionen:	Def. 28.2.15.10
$\star$	Def. 28.2.15.10
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$ $eAe \coloneqq \{(e \star a) \star e \mid a \in A\}.$	Def. 28.2.15.10
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \leftrightarrow \big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$	Th. 28.2.8.1
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$f : A \cong B,\ x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ ee = e \vdash \mathsf{UHGr}(eAe;A,\star)$	Th. 28.2.15.21(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(U,\star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 28.2.15.4
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U,\star) \vdash f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4

2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen

Definition 28.2.15.11 (Einheiten bezüglich eines neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\ (e \star x = x \wedge x \star e = x) \vdash$$
$$U(A,e) \coloneqq \{u \in A \mid \exists v \in A\ (u \star v = e \wedge v \star u = e)\}.$$

Hier werden ausschließlich Multiplikation und Bijektivität benutzt. Der spätere Gruppenbegriff ist für die folgende Aussage nicht erforderlich.

Theorem 28.2.15.22 (Transport neutraler Elemente, Nullen und Einheiten).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ z,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$
(i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
(ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$
(iii) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$
$\quad \rightarrow \big(f\vert_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B,f(e))\big)$

Beweis.

Globale Multiplikationsbedingungen Th. 28.2.15.22(H1)

$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$
(i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$
$\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
(ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$
$\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $z \in A$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	6 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	8 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(7)
9	9 $\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
10	10 $y \in B$	A
1,10	11 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
1,10	12 $f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(6, 10)
1,9,10	13 $eh(y) = h(y) \wedge h(y)e = h(y)$	$\to E(\forall E(9), 11)$
1,9,10	14 $eh(y) = h(y)$	$\wedge E1(13)$
1,9,10	15 $h(y)e = h(y)$	$\wedge E2(13)$
1,2,10	16 $f(eh(y)) = f(e)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 2, 11)
1,2,10	17 $f(h(y)e) = f(h(y))f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 11, 2)
1,2,9,10	18 $y = f(e)y$	$= E(14, 12, 16)$
1,2,9,10	19 $y = yf(e)$	$= E(15, 12, 17)$
1,2,9,10	20 $f(e)y = y$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,9,10	21 $yf(e) = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,9,10	22 $f(e)y = y \wedge yf(e) = y$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,9	23 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\forall I(\to I(10, 22))$
1,2	24 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \to (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\to I(9, 23)$
25	25 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	A
26	26 $x \in A$	A
1,26	27 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 26)

1,25,26	28	$f(e)f(x) = f(x) \wedge f(x)f(e) = f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(25), 27)$
1,25,26	29	$f(e)f(x) = f(x)$	$\wedge E1(28)$
1,25,26	30	$f(x)f(e) = f(x)$	$\wedge E2(28)$
1,2,26	31	$ex \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 26)
1,2,26	32	$xe \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 26, 2)
1,2,26	33	$f(ex) = f(e)f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 2, 26)
1,2,26	34	$f(xe) = f(x)f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 26, 2)
1,2,25,26	35	$f(ex) = f(x)$	$= E(29, 33)$
1,2,25,26	36	$f(xe) = f(x)$	$= E(30, 34)$
1,2,26	37	$ex = x \leftrightarrow f(ex) = f(x)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 31, 26)
1,2,26	38	$xe = x \leftrightarrow f(xe) = f(x)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 32, 26)
1,2,25,26	39	$ex = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(37), 35)$
1,2,25,26	40	$xe = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(38), 36)$
1,2,25,26	41	$ex = x \wedge xe = x$	$\wedge I(39, 40)$
1,2,25	42	$\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 41))$
1,2	43	$(\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)) \rightarrow (\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$	$\rightarrow I(25, 42)$
1,2	44	$(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\leftrightarrow I(24, 43)$
45	45	$\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)$	A
46	46	$y \in B$	A
1,46	47	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 46)
1,46	48	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(6, 46)
1,45,46	49	$zh(y) = z \wedge h(y)z = z$	$\rightarrow E(\forall E(45), 47)$
1,45,46	50	$zh(y) = z$	$\wedge E1(49)$
1,45,46	51	$h(y)z = z$	$\wedge E2(49)$
1,3,46	52	$f(zh(y)) = f(z)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 3, 47)
1,3,46	53	$f(h(y)z) = f(h(y))f(z)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 47, 3)
1,3,45,46	54	$f(z) = f(z)y$	$= E(50, 48, 52)$
1,3,45,46	55	$f(z) = yf(z)$	$= E(51, 48, 53)$
1,3,45,46	56	$f(z)y = f(z)$	Th. 2.9.1.1(54)
1,3,45,46	57	$yf(z) = f(z)$	Th. 2.9.1.1(55)
1,3,45,46	58	$f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)$	$\wedge I(56, 57)$
1,3,45	59	$\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	$\forall I(\rightarrow I(46, 58))$
1,3	60	$(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \rightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\rightarrow I(45, 59)$
61	61	$\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	A

62	62 $x \in A$	A
1,62	63 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 62)
1,61,62	64 $f(z)f(x) = f(z) \wedge f(x)f(z) = f(z)$	$\rightarrow E(\forall E(61), 63)$
1,61,62	65 $f(z)f(x) = f(z)$	$\wedge E1(64)$
1,61,62	66 $f(x)f(z) = f(z)$	$\wedge E2(64)$
1,3,62	67 $zx \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 3, 62)
1,3,62	68 $xz \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 62, 3)
1,3,62	69 $f(zx) = f(z)f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 3, 62)
1,3,62	70 $f(xz) = f(x)f(z)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 62, 3)
1,3,61,62	71 $f(zx) = f(z)$	$= E(65, 69)$
1,3,61,62	72 $f(xz) = f(z)$	$= E(66, 70)$
1,3,62	73 $zx = z \leftrightarrow f(zx) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 67, 3)
1,3,62	74 $xz = z \leftrightarrow f(xz) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 68, 3)
1,3,61,62	75 $zx = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(73), 71)$
1,3,61,62	76 $xz = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(74), 72)$
1,3,61,62	77 $zx = z \wedge xz = z$	$\wedge I(75, 76)$
1,3,61	78 $\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)$	$\forall I(\rightarrow I(62, 77))$
1,3	79 $(\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))) \rightarrow (\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$	$\rightarrow I(61, 78)$
1,3	80 $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\leftrightarrow I(60, 79)$

Der Träger der Einheiten Th. 28.2.15.22(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A,\ \forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x) \vdash U(A, e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
1,2,3	4 $U(A, e) \subseteq A$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3)
2,3	5 $ee = e$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 2))$
2,3	6 $\exists v \in A\ (ev = e \wedge ve = e)$	$\exists I^*(2, \wedge I(5, 5))$
1,2,3	7 $e \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8 $U(A, e) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(7)
9	9 $u \in U(A, e)$	A

10	10 $v \in U(A, e)$	A
1,2,3,9	11 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 9)
1,2,3,10	12 $v \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,2,3,9	13 $\exists u' \in A\ (uu' = e \wedge u'u = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 9)
14	14 $u' \in A \wedge uu' = e \wedge u'u = e$	A
14	15 $u' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16 $uu' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	17 $u'u = e$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
1,2,3,10	18 $\exists v' \in A\ (vv' = e \wedge v'v = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 10)
19	19 $v' \in A \wedge vv' = e \wedge v'v = e$	A
19	20 $v' \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $vv' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
19	22 $v'v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1,2,3,9, 10	23 $uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 11, 12)
1,14,19	24 $v'u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 15)
1,2,3,9, 10,14,19	25 $(uv)(v'u') = u(v(v'u'))$	Ax. 28.2.1.2(1, 11, 12, 24)
1,2,3,10, 14,19	26 $(vv')u' = v(v'u')$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 20, 15)
1,2,3,10, 14,19	27 $v(v'u') = (vv')u'$	Th. 2.9.1.1(26)
3,14	28 $eu' = u'$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 15))$
1,2,3,10, 14,19	29 $v(v'u') = u'$	$= E(21, 28, 27)$
1,2,3,9, 10,14,19	30 $(uv)(v'u') = e$	$= E(29, 16, 25)$
1,2,3,9, 10,14,19	31 $(v'u')(uv) = v'(u'(uv))$	Ax. 28.2.1.2(1, 20, 15, 23)
1,2,3,9, 10,14	32 $(u'u)v = u'(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 15, 11, 12)
1,2,3,9, 10,14	33 $u'(uv) = (u'u)v$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,3,10	34 $ev = v$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 12))$
1,2,3,9, 10,14	35 $u'(uv) = v$	$= E(17, 34, 33)$
1,2,3,9, 10,14,19	36 $(v'u')(uv) = e$	$= E(35, 22, 31)$
1,2,3,9, 10,14,19	37 $\exists w \in A\ ((uv)w = e \wedge w(uv) = e)$	$\exists I^*(24, \wedge I(30, 36))$
1,2,3,9, 10,14,19	38 $uv \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 23, 37)

1,2,3,9, 10,14	39 $uv \in U(A,e)$	$\exists E(18,19,38)$
1,2,3,9, 10	40 $uv \in U(A,e)$	$\exists E(13,14,39)$
1,2,3	41 $\forall u,v \in U(A,e)\ (uv \in U(A,e))$	$\forall I(\to I(9,\forall I(\to I (10,40))))$
1,2,3	42 $\mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	Th. 28.2.15.5(1, 4, 41)
1,2,3	43 $U(A,e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	$\wedge I(4,42)$

Abschluss und Transport der Einheiten:

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	6 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	7 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	9 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(8)
1,2	10 $f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1,2	11 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	Th. 28.2.15.22($H1$) $(1, \wedge I(2,2))$
1,2,3	12 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\to E(\leftrightarrow E1(11), 3)$
1,2,3	13 $U(A,e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	Th. 28.2.15.22($H2$) $(4,2,3)$
1,2,3	14 $U(A,e) \subseteq A$	$\wedge E1(13)$
1,2,3	15 $\mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	$\wedge E2(13)$
1,2,3	16 $U(B,f(e)) \subseteq B \wedge \mathsf{HGr}(U(B,f(e)),\diamond)$	Th. 28.2.15.22($H2$) $(5,10,12)$
1,2,3	17 $U(B,f(e)) \subseteq B$	$\wedge E1(16)$
18	18 $u \in A$	A
19	19 $v \in A$	A
1,18,19	20 $uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 18, 19)
1,18,19	21 $vu \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 19, 18)
1,18,19	22 $f(uv) = f(u)f(v)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,18,19)$
1,18,19	23 $f(vu) = f(v)f(u)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,19,18)$

1,2,18,19	24	$uv = e \leftrightarrow f(uv) = f(e)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 20, 2)$
1,2,18,19	25	$vu = e \leftrightarrow f(vu) = f(e)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 21, 2)$
1,2,18,19	26	$uv = e \leftrightarrow f(u)f(v) = f(e)$	$= E(22, 24)$
1,2,18,19	27	$vu = e \leftrightarrow f(v)f(u) = f(e)$	$= E(23, 25)$
	28	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (uv = e \wedge vu = e)$	Th. 2.1.1.3
1,2,18,19	29	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\leftrightarrow S(26, \leftrightarrow S(27, 28))$
1,2	30	$\forall u, v \in A \left((uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))\right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(19, 29))))$
31	31	$u \in A$	A
1,31	32	$f(u) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 31)
33	33	$u \in U(A, e)$	A
1,2,3,33	34	$\exists v \in A\ (uv = e \wedge vu = e)$	Def. 28.2.15.11(4, 2, 3, 33)
35	35	$v \in A \wedge uv = e \wedge vu = e$	A
35	36	$v \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37	$uv = e \wedge vu = e$	$\wedge E2(35)$
1,35	38	$f(v) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 36)
1,2,31,35	39	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30), 31)), 36)$
1,2,31,35	40	$f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(39), 37)$
1,2,31,35	41	$\exists w \in B\ (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	$\exists I^*(38, 40)$
1,2,3,31, 35	42	$f(u) \in U(B, f(e))$	Def. 28.2.15.11(5, 10, 12, 32, 41)
1,2,3,31, 33	43	$f(u) \in U(B, f(e))$	$\exists E(34, 35, 42)$
1,2,3,31	44	$u \in U(A, e) \rightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow I(33, 43)$
45	45	$f(u) \in U(B, f(e))$	A
1,2,3,45	46	$\exists w \in B\ (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	Def. 28.2.15.11(5, 10, 12, 45)
47	47	$w \in B \wedge f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	A
47	48	$w \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49	$f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	$\wedge E2(47)$
1,47	50	$h(w) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 48)
1,47	51	$f(h(w)) = w$	Th. 8.3.3.6(7, 48)
1,47	52	$w = f(h(w))$	Th. 2.9.1.1(51)
1,47	53	$f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e)$	$= E(52, 49)$
1,2,31,47	54	$(uh(w) = e \wedge h(w)u = e) \leftrightarrow (f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30), 31)), 50)$
1,2,31,47	55	$uh(w) = e \wedge h(w)u = e$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(54), 53)$
1,2,31,47	56	$\exists v \in A\ (uv = e \wedge vu = e)$	$\exists I^*(50, 55)$

1,2,3,31, 47	57	$u \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(4, 2, 3, 31, 56)
1,2,3,31, 45	58	$u \in U(A, e)$	$\exists E(46, 47, 57)$
1,2,3,31	59	$f(u) \in U(B, f(e)) \to u \in U(A, e)$	$\to I(45, 58)$
1,2,3,31	60	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\leftrightarrow I(44, 59)$
1,2,3	61	$\forall u \in A\ (u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e)))$	$\forall I(\to I(31, 60))$
62	62	$y \in f[U(A, e)]$	A
1,2,3,62	63	$\exists u \in U(A, e)\ (y = f(u))$	Th. 5.2.4.3(14, 6, 62)
64	64	$u \in U(A, e) \wedge y = f(u)$	A
64	65	$u \in U(A, e)$	$\wedge E1(64)$
64	66	$y = f(u)$	$\wedge E2(64)$
64	67	$f(u) = y$	Th. 2.9.1.1(66)
1,2,3,64	68	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(14, 65)
1,2,3,64	69	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\to E(\forall E(61), 68)$
1,2,3,64	70	$f(u) \in U(B, f(e))$	$\to E(\leftrightarrow E1(69), 65)$
1,2,3,64	71	$y \in U(B, f(e))$	$= E(67, 70)$
1,2,3,62	72	$y \in U(B, f(e))$	$\exists E(63, 64, 71)$
1,2,3	73	$y \in f[U(A, e)] \to y \in U(B, f(e))$	$\to I(62, 72)$
74	74	$y \in U(B, f(e))$	A
1,2,3,74	75	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(17, 74)
1,2,3,74	76	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 75)
1,2,3,74	77	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(7, 75)
1,2,3,74	78	$y = f(h(y))$	Th. 2.9.1.1(77)
1,2,3,74	79	$f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$= E(78, 74)$
1,2,3,74	80	$h(y) \in U(A, e) \leftrightarrow f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$\to E(\forall E(61), 76)$
1,2,3,74	81	$h(y) \in U(A, e)$	$\to E(\leftrightarrow E2(80), 79)$
1,2,3,74	82	$f(h(y)) \in f[U(A, e)]$	Th. 5.2.4.5(14, 6, 81)
1,2,3,74	83	$y \in f[U(A, e)]$	$= E(77, 82)$
1,2,3	84	$y \in U(B, f(e)) \to y \in f[U(A, e)]$	$\to I(74, 83)$
1,2,3	85	$y \in f[U(A, e)] \leftrightarrow y \in U(B, f(e))$	$\leftrightarrow I(73, 84)$
1,2,3	86	$\forall y\ (y \in f[U(A, e)] \leftrightarrow y \in U(B, f(e)))$	$\forall I(85)$
1,2,3	87	$f[U(A, e)] = U(B, f(e))$	Ax. 3.4.1.1(86)
1,2,3	88	$f\|_{U(A,e)} : U(A, e) \cong f[U(A, e)]$	Th. 28.2.15.4(1, 14, 15)
1,2,3	89	$f\|_{U(A,e)} : U(A, e) \cong U(B, f(e))$	$= E(87, 88)$
1,2	90	$(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \to \left(f\|_{U(A,e)} : U(A, e) \cong U(B, f(e))\right)$	$\to I(3, 89)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
$f:A\cong B,\ x,y\in A\vdash x=y\leftrightarrow f(x)=f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)
Mengen:	Def. 28.2.15.11
$A,\ e,\ u,\ v,\ x$	Def. 28.2.15.11
Funktionen:	Def. 28.2.15.11
$\star$	Def. 28.2.15.11
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e\in A,\ \forall x\in A\ (e\star x=x\wedge x\star e=x)\vdash$ $U(A,e):=\{u\in A\mid\exists v\in A\ (u\star v=e\wedge v\star u=e)\}.$	Def. 28.2.15.11
$a\in A\vdash A\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5
$A\subseteq B,\ x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.15.5
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.5
Funktionen:	Th. 28.2.15.5
$\star$	Th. 28.2.15.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ U\subseteq A,\ \forall x,y\in U\ (x\star y\in U)\vdash\mathsf{HGr}(U,\star)$	Th. 28.2.15.5
$f:A\cong B\vdash\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f:A\cong B,\ e,z\in A\vdash$ (i) $(\forall x\in A\ (ex=x\wedge xe=x))$ $\leftrightarrow(\forall y\in B\ (f(e)y=y\wedge yf(e)=y))$ (ii) $(\forall x\in A\ (zx=z\wedge xz=z))$ $\leftrightarrow(\forall y\in B\ (f(z)y=f(z)\wedge yf(z)=f(z)))$	Th. 28.2.15.22(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e\in A,\ \forall x\in A\ (ex=x\wedge xe=x)\vdash U(A,e)\subseteq A\wedge$	Th. 28.2.15.22(H2)
$\mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	Th. 28.2.15.22(H2)
$P\leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C\subseteq A,\ F\colon A\to B,\ y\in F[C]\vdash\exists x\in C\,y=F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 5.2.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
Mengen:	Th. 28.2.15.4
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U,\star) \vdash f|_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4

Definition 28.2.15.12 (Adjunktion eines frischen neutralen oder Nullelements).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A,\star)$
Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star,\ \iota_A$

$$
\begin{aligned}
&A^{+1} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing, 1)\}, \quad \iota_A(a) \coloneqq (a, 0), \quad 1_A \coloneqq (\varnothing, 1),\\
&\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 1_A x = x 1_A \coloneqq x;\\
&A^{+0} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing, 1)\}, \quad 0_A \coloneqq (\varnothing, 1),\\
&\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 0_A x = x 0_A \coloneqq 0_A.
\end{aligned}
$$

Die beiden Träger sind als Mengen gleich. Für $A \neq \varnothing$ sind ihre Operationen verschieden; für $A = \varnothing$ ergeben beide Adjunktionen die einelementige Halbgruppe. Die Tags 0 und 1 halten das neue Element von der Kopie von A getrennt. Es wird auch dann ein frisches Element adjungiert, wenn A bereits ein neutrales Element beziehungsweise eine Null besitzt. Damit kollidiert A^{+1} nicht mit der Produktpotenz $A^1 = A$.

Theorem 28.2.15.23 (Fortsetzung auf adjungierte Elemente).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ h,\ f^{+1},\ f^{+0},\ \iota_A,\ \iota_B$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f^{+1} : A^{+1} \cong B^{+1} \\
&\textit{(ii)} \quad f^{+0} : A^{+0} \cong B^{+0} \\
&\textit{(iii)} \quad f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)) = \iota_B(f(a)) \\
&\textit{(iv)} \quad f^{+1}(1_A) = 1_B \\
&\textit{(v)} \quad f^{+0}(0_A) = 0_B
\end{aligned}
$$

Beweis.

Abschluss und Assoziativität der Adjunktionen Th. 28.2.15.23(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0}, \cdot\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
1,2,3	4 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1	5 $\forall a, b \in A\ (ab \in A)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I (3, 4))))$
6	6 $a \in A$	A
7	7 $b \in A$	A
8	8 $c \in A$	A
1,6,7,8	9 $(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 7, 8)
1	10 $\forall a, b, c \in A\ ((ab)c = a(bc))$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I (7, \forall I(\to I(8, 9))))))$
1	11 $\forall a, b \in A\ (\iota_A(a)\iota_A(b) = \iota_A(ab) \in \iota_A[A])$	Def. 28.2.15.12(5)
1	12 $\forall x \in A^{+1}\ (1_A x = x = x1_A)\,, \quad \forall x \in A^{+0}\ (0_A x = 0_A = x0_A)$	Def. 28.2.15.12
1	13 $\forall \varepsilon \in \{0, 1\}\ \forall x, y \in A^{+\varepsilon}\ (xy \in A^{+\varepsilon})$	11,12; jeder Faktor hat einen alten oder den neuen Tag.
1	14 $\forall a, b, c \in A\ ((\iota_A(a)\iota_A(b))\iota_A(c) = \iota_A(a)(\iota_A(b)\iota_A(c)))$	Def. 28.2.15.12(10)
1	15 $\forall x, y \in A^{+1}\ (1_A x)y = xy = 1_A(xy),\ (x1_A)y = xy = x(1_A y),\ (xy)1_A = xy = x(y1_A)$	Def. 28.2.15.12

1	16	$\forall x, y, z \in A^{+0}\ ((x = 0_A \vee y = 0_A \vee z = 0_A) \Rightarrow (xy)z = 0_A = x(yz))$	Def. 28.2.15.12; beide Klammerungen absorbieren den Nullfaktor.
1	17	$\forall \varepsilon \in \{0,1\}\ \forall x, y, z \in A^{+\varepsilon}\ ((xy)z = x(yz))$	14,15,16; Fallunterscheidung nach den Tags
1	18	$\mathsf{HGr}\big(A^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0}, \cdot\big)$	Def. 28.2.1.1(13, 17)

Bijektion und Produktfälle:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\varepsilon \in \{0,1\}$	A
1	9	$\mathsf{HGr}\big(A^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23($H1$) (2)
1	10	$\mathsf{HGr}\big(B^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(B^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23($H1$) (3)
1,8	11	$\mathsf{HGr}(A^{+\varepsilon}, \cdot)$	9,8; Konjunktionselimination und Fallunterscheidung
1,8	12	$\mathsf{HGr}(B^{+\varepsilon}, \cdot)$	10,8; Konjunktionselimination und Fallunterscheidung
1	13	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	14	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(13)
1,8	15	$f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \to B^{+\varepsilon}, \quad h^{+\varepsilon} : B^{+\varepsilon} \to A^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.15.12(4,14); die beiden Tagfälle sind disjunkt und erschöpfend.
16	16	$a \in A$	A
1,16	17	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18	$\forall a \in A\ (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19	$b \in B$	A
1,19	20	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)
1	21	$\forall b \in B\ (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\to I(19, 20))$

1,8	22 $h^{+\varepsilon} \circ f^{+\varepsilon} = \mathrm{id}_{A^{+\varepsilon}}\,, \quad f^{+\varepsilon} \circ h^{+\varepsilon} = \mathrm{id}_{B^{+\varepsilon}}$	Auf alten Tags 18,21; auf dem neuen Tag die Definition; Funktionsextensionalität.
1,8	23 $f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \xrightarrow{\sim} B^{+\varepsilon}$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$(15), $\wedge E2$ (22), $\wedge E1$(22))
24	24 $a \in A$	A
25	25 $b \in A$	A
1,24,25	26 $f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 24, 25)$
1	27 $\forall a, b \in A\ (f(ab) = f(a)f(b))$	$\forall I(\to I(24, \forall I(\to I$ $(25, 26))))$
1,8	28 $\forall a, b \in A\ (f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)\iota_A(b)) = \iota_B(f(ab)) = f^{+\varepsilon}(\iota_A(a))f^{+\varepsilon}(\iota_A(b)))$	Def. 28.2.15.12(27)
1	29 $\forall x \in A^{+1}\ f^{+1}(1_A x) = f^{+1}(x) = 1_B f^{+1}(x),$ $f^{+1}(x1_A) = f^{+1}(x) = f^{+1}(x)1_B$	Def. 28.2.15.12
1	30 $\forall x \in A^{+0}\ f^{+0}(0_A x) = 0_B = 0_B f^{+0}(x),$ $f^{+0}(x0_A) = 0_B = f^{+0}(x)0_B$	Def. 28.2.15.12
1,8	31 $\forall x, y \in A^{+\varepsilon}\ (f^{+\varepsilon}(xy) = f^{+\varepsilon}(x)f^{+\varepsilon}(y))$	28,29,30; erschöpfende Tagfälle
1,8	32 $\mathsf{HGrHom}(f^{+\varepsilon}; A^{+\varepsilon}, \cdot; B^{+\varepsilon}, \cdot)$	Def. 28.2.12.1(11, 12, 15, 31)
1,8	33 $f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \cong B^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.12.2(32, 23)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.12
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.15.12
Mengen:	Def. 28.2.15.12
$A,\ a,\ b,\ x$	Def. 28.2.15.12
Funktionen:	Def. 28.2.15.12
$\star,\ \iota_A$	Def. 28.2.15.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A^{+1} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing, 1)\}, \quad \iota_A(a) \coloneqq (a, 0), \quad 1_A \coloneqq (\varnothing, 1),$ $\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 1_A x = x 1_A \coloneqq x;$ $A^{+0} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing, 1)\}, \quad 0_A \coloneqq (\varnothing, 1),$ $\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 0_A x = x 0_A \coloneqq 0_A.$	Def. 28.2.15.12
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23(H1)
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

2.15.8 Kongruenzen und Quotienten

Definition 28.2.15.13 (Kongruenz und Quotient einer Halbgruppe).

Voraussetzung:	$\mathsf{HGr}(A, \star)$;
	für den Quotienten zusätzlich $\rho \in \mathrm{Con}(A)$
Mengen:	$A,\ a,\ a',\ b,\ b'$
Relationen:	$\rho \subseteq A \times A$

$$\rho \in \mathrm{Con}(A) \coloneqq \mathsf{EqRel}(A,\rho) \wedge$$
$$\forall a,a',b,b' \in A\ (a\ \rho\ a' \wedge b\ \rho\ b' \Rightarrow ab\ \rho\ a'b');$$
$$[a]_\rho \coloneqq [a]_{\rho,A}\,, \qquad A/\rho \coloneqq \{[a]_\rho \mid a \in A\}, \qquad [a]_\rho[b]_\rho \coloneqq [ab]_\rho.$$

Definition 28.2.15.14 (Transport einer beliebigen Relation).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: f
Relationen: ρ

$$f : A \to B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$$
$$f_*\rho \coloneqq \{(f(a),f(b)) \mid a,b \in A,\ a\ \rho\ b\}.$$

Theorem 28.2.15.24 (Transport von Kongruenzen und Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $f,\ h,\ \bar{f},\ \star,\ \diamond$
Relationen: $\rho,\ f_*\rho$

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash$$
$$\textit{(i)}\quad f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$$
$$\textit{(ii)}\quad \bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho), \quad \bar{f}([a]_\rho) \coloneqq [f(a)]_{f_*\rho}$$

Beweis.

Kriterium für das Relationsbild Th. 28.2.15.24(H1)

$$f : A \cong B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$$
$$\text{(i)}\quad \forall u,v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$$
$$\text{(ii)}\quad \forall a,b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\rho \subseteq A \times A$	A

1	9	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	10	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(9)
11	11	$u \in B$	A
12	12	$v \in B$	A
11,12	13	$u, v \in B$	$\wedge I^*(11, 12)$
1,11,12	14	$h(u), h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(10, 13)
1,11,12	15	$f(h(u)) = u\,, \quad f(h(v)) = v$	$\wedge I$(Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(13)), Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (13)))
1,8,11,12	16	$u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v)$	Definition des Relationsbildes: vorwärts eindeutige Urbilder, rückwärts die Zeugen aus 14,15.
1,8	17	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I$ (12, 16))))
18	18	$a \in A$	A
19	19	$b \in A$	A
18,19	20	$a, b \in A$	$\wedge I^*(18, 19)$
1,18,19	21	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 20)
1,18,19	22	$h(f(a)) = a\,, \quad h(f(b)) = b$	$\wedge I$(Th. 8.3.3.5(5, $\wedge E1$(20)), Th. 8.3.3.5(5, $\wedge E2$ (20)))
1,8,18,19	23	$a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	All-Elimination in 17 mit 21; Gleichheitseinsetzung 22
1,8	24	$\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	$\forall I(\to I(18, \forall I(\to I$ (19, 23))))

Die transportierte Kongruenz Th. 28.2.15.24(H2)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)

1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,8	9	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)
1	11	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	12	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (11)
1,8	13	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$, $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 10)
1,8	14	$f_*\rho \subseteq B \times B$	Definition des Relationsbildes und 4,10
15	15	$u \in B$	A
1,15	16	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(12, 15)
1,8,15	17	$h(u)\ \rho\ h(u)$	Ax. 11.2.1.1(9, 16)
1,8,15	18	$u\ f_*\rho\ u$	13, 17
1,8	19	$\forall u \in B\ (u\ f_*\rho\ u)$	$\forall I(\to I(15, 18))$
20	20	$u \in B$	A
21	21	$v \in B$	A
22	22	$u\ f_*\rho\ v$	A
20,21,22	23	$u, v \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ v$	$\wedge I^*(20, 21, 22)$
1,8,20, 21,22	24	$h(u), h(v) \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(v)$	12, 13, 23
1,8,20, 21,22	25	$h(v)\ \rho\ h(u)$	Ax. 11.2.1.2(9, 24)
1,8,20, 21,22	26	$v\ f_*\rho\ u$	13, 25
1,8	27	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \Rightarrow v\ f_*\rho\ u)$	$\forall I(\to I(20, \forall I(\to I(21, \to I(22, 26)))))$
28	28	$u \in B$	A
29	29	$v \in B$	A
30	30	$w \in B$	A
31	31	$u\ f_*\rho\ v \wedge v\ f_*\rho\ w$	A
28,29,30, 31	32	$u, v, w \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ v\,, \quad v\ f_*\rho\ w$	$\wedge I^*(28, 29, 30, 31)$
1,8,28, 29,30,31	33	$h(u), h(v), h(w) \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(v)\,, \quad h(v)\ \rho\ h(w)$	12, 13, 32
1,8,28, 29,30,31	34	$h(u)\ \rho\ h(w)$	Ax. 11.2.1.3(9, 33)
1,8,28, 29,30,31	35	$u\ f_*\rho\ w$	13, 34
1,8	36	$\forall u, v, w \in B\ (u\ f_*\rho\ v \wedge v\ f_*\rho\ w \Rightarrow u\ f_*\rho\ w)$	$\forall I(\to I(28, \forall I(\to I(29, \forall I(\to I(30, \to I(31, 35)))))))$

1,8	37	$\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 11.2.2.1(14, 19, 27, 36)
38	38	$u \in B$	A
39	39	$u' \in B$	A
40	40	$v \in B$	A
41	41	$v' \in B$	A
42	42	$u\ f_*\rho\ u' \wedge v\ f_*\rho\ v'$	A
38,39,40, 41,42	43	$u, u', v, v' \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ u'\,, \quad v\ f_*\rho\ v'$	$\wedge I^*(38, 39, 40, 41, 42)$
1,8,38, 39,40,41, 42	44	$h(u), h(u'), h(v), h(v') \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(u')\,, \quad h(v)\ \rho\ h(v')$	$12, 13, 43$
1,8,38, 39,40,41, 42	45	$h(u)h(v)\ \rho\ h(u')h(v')$	Def. 28.2.15.13(8, 44)
1,38,39, 40,41,42	46	$h(uv) = h(u)h(v)\,, \quad h(u'v') = h(u')h(v')$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(11, 43)$
1,8,38, 39,40,41, 42	47	$h(uv)\ \rho\ h(u'v')$	$= E(46, 45)$
1,38,39, 40,41,42	48	$uv, u'v' \in B$	Ax. 28.2.1.1(3, 43)
1,8,38, 39,40,41, 42	49	$uv\ f_*\rho\ u'v'$	$13, 48, 47$
1,8	50	$\forall u, u', v, v' \in B\ (u\ f_*\rho\ u' \wedge v\ f_*\rho\ v' \Rightarrow uv\ f_*\rho\ u'v')$	$\forall I(\rightarrow I(38, \forall I(\rightarrow I(39, \forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I(41, \rightarrow I(42, 49)))))))))$
1,8	51	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Def. 28.2.15.13(37, 50)

Wohldefiniertheit der Quotientenoperationen Th. 28.2.15.24(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,2	3	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(1, 2)
4	4	$a \in A$	A
5	5	$a' \in A$	A
6	6	$b \in A$	A
7	7	$b' \in A$	A
8	8	$[a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho$	A
8	9	$[a]_\rho = [a']_\rho$	$\wedge E1(8)$
8	10	$[b]_\rho = [b']_\rho$	$\wedge E2(8)$

1,2,4,5,8	11 $a \ \rho \ a'$	Th. 11.4.1.6(3, 4, 5, 9)
1,2,6,7,8	12 $b \ \rho \ b'$	Th. 11.4.1.6(3, 6, 7, 10)
1,2,4,5,6, 7,8	13 $ab \ \rho \ a'b'$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12)
1,4,6	14 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 6)
1,5,7	15 $a'b' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 5, 7)
1,2,4,5,6, 7,8	16 $[ab]_\rho = [a'b']_\rho$	Th. 11.4.1.5(3, 14, 15, 13)
1,2	17 $\forall a, a', b, b' \in A \ ([a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho \Rightarrow [ab]_\rho = [a'b']_\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 16)))))))))$
18	18 $X \in A/\rho$	A
1,2,18	19 $\exists a \in A \ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 18)
20	20 $Y \in A/\rho$	A
1,2,20	21 $\exists b \in A \ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 20)
22	22 $a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
22	23 $a \in A$	$\wedge E1(22)$
22	24 $X = [a]_\rho$	$\wedge E2(22)$
22	25 $[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(24)
26	26 $b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
26	27 $b \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(26)$
26	29 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(28)
1,22,26	30 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 23, 27)
1,2,22,26	31 $[ab]_\rho \in A/\rho$	Th. 11.4.2.2(3, 30)
1,2,22,26	32 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 23, 27)
1,2,22,26	33 $[ab]_\rho = [a]_\rho[b]_\rho$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,22,26	34 $XY \in A/\rho$	$= E(29, = E(25, = E(33, 31)))$
1,2,20,22	35 $XY \in A/\rho$	$\exists E(21, 26, 34)$
1,2,18,20	36 $XY \in A/\rho$	$\exists E(19, 22, 35)$
1,2	37 $\forall X, Y \in A/\rho \ (XY \in A/\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(20, 36))))$
38	38 $X \in A/\rho$	A
1,2,38	39 $\exists a \in A \ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 38)
40	40 $Y \in A/\rho$	A
1,2,40	41 $\exists b \in A \ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 40)
42	42 $Z \in A/\rho$	A
1,2,42	43 $\exists c \in A \ (Z = [c]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 42)

44	44 $a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
44	45 $a \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46 $X = [a]_\rho$	$\wedge E2(44)$
44	47 $[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(46)
48	48 $b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
48	49 $b \in A$	$\wedge E1(48)$
48	50 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(48)$
48	51 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(50)
52	52 $c \in A \wedge Z = [c]_\rho$	A
52	53 $c \in A$	$\wedge E1(52)$
52	54 $Z = [c]_\rho$	$\wedge E2(52)$
52	55 $[c]_\rho = Z$	Th. 2.9.1.1(54)
1,44,48	56 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 49)
1,48,52	57 $bc \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 49, 53)
1,44,48, 52	58 $(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 45, 49, 53)
1,2,44,48	59 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 49)
1,2,44, 48,52	60 $[ab]_\rho[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 56, 53)
1,2,48,52	61 $[b]_\rho[c]_\rho = [bc]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 49, 53)
1,2,44, 48,52	62 $[a]_\rho[bc]_\rho = [a(bc)]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 57)
1,2,44, 48,52	63 $[a(bc)]_\rho = [a]_\rho[bc]_\rho$	Th. 2.9.1.1(62)
1,2,48,52	64 $[bc]_\rho = [b]_\rho[c]_\rho$	Th. 2.9.1.1(61)
1,2,44,48	65 $([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [ab]_\rho[c]_\rho$	$= E(59, = I)$
1,2,44, 48,52	66 $([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	$= E(60, 65)$
1,2,44, 48,52	67 $([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a(bc)]_\rho$	$= E(58, 66)$
1,2,44, 48,52	68 $([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a]_\rho([b]_\rho[c]_\rho)$	$= E(64, = E(63, 67))$
1,2,44, 48,52	69 $(XY)Z = X(YZ)$	$= E(55, = E(51, = E(47, 68)))$
1,2,42, 44,48	70 $(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(43, 52, 69)$
1,2,40, 42,44	71 $(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(41, 48, 70)$
1,2,38, 40,42	72 $(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(39, 44, 71)$

1,2	73 $\forall X, Y, Z \in A/\rho\ ((XY)Z = X(YZ))$	$\forall I(\to I(38, \forall I(\to I(40, \forall I(\to I(42, 72))))))$
1,2	74 $\mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(17, 37, 73)

Bijektive Klassenabbildung Th. 28.2.15.24(H4)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,8	9 $\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10 $\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)
1,8	11 $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 8)
1,8	12 $\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 11)
1,8	13 $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$, $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 10)
14	14 $a \in A$	A
15	15 $b \in A$	A
14,15	16 $a, b \in A$	$\wedge I^*(14, 15)$
1,14,15	17 $f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 16)
1,8,14,15	18 $[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow a\ \rho\ b$	Th. 11.4.1.7(9, 16)
1,8,14,15	19 $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	All-Elimination in 13 mit 16
1,8,14,15	20 $f(a)\ f_*\rho\ f(b) \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 11.4.1.7(12, 17)
1,8,14,15	21 $[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Äquivalenztransitivität aus 18,19,20
1,8	22 $\forall a, b \in A\ ([a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho})$	$\forall I(\to I(14, \forall I(\to I(15, 21))))$

1,8	23 $\bar{f} : A/\rho \to B/(f_*\rho)$	Definition der Klassenabbildung: Vertreterexistenz; Wohldefiniertheit aus der Vorwärtsrichtung von 22.
1,8	24 $\bar{f} : A/\rho \rightarrowtail B/(f_*\rho)$	Injektivitätsdefinition und Rückwärtsrichtung von 22
1	25 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	26 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(25)
27	27 $u \in B$	A
1,27	28 $h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(26, 27)
1,27	29 $f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 27)
1,8,27	30 $[h(u)]_\rho \in A/\rho\,, \quad \bar{f}([h(u)]_\rho) = [u]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(28, 29); Definition von $\bar{f}$.
1,8	31 $\bar{f} : A/\rho \twoheadrightarrow B/(f_*\rho)$	Jede Zielklasse hat einen Vertreter; 27–30 liefern ein Urbild.
1,8	32 $\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(23, 24, 31)

Operationserhaltung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
5	5 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,5	6 $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 5)
1,5	7 $\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 5)
1,5	8 $\mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Th. 28.2.15.24($H3$) (2, 5)
1,5	9 $\mathsf{HGr}(B/(f_*\rho), \cdot)$	Th. 28.2.15.24($H3$) (3, 6)
1,5	10 $\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Th. 28.2.15.24($H4$) (1, 5)
1,5	11 $\bar{f} : A/\rho \to B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(10)
12	12 $X \in A/\rho$	A

1,5,12	13 $\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 12)
14	14 $Y \in A/\rho$	A
1,5,14	15 $\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 14)
16	16 $a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
16	17 $a \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18 $X = [a]_\rho$	$\wedge E2(16)$
16	19 $[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(18)
20	20 $b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
20	21 $b \in A$	$\wedge E1(20)$
20	22 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(20)$
20	23 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(22)
1,16,20	24 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 17, 21)
1,16	25 $f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 17)
1,20	26 $f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 21)
1,16,20	27 $f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 17, 21)
1,5,16,20	28 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(2, 5, 17, 21)
1,5,16	29 $\bar{f}([a]_\rho) = [f(a)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,20	30 $\bar{f}([b]_\rho) = [f(b)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,16,20	31 $\bar{f}([ab]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,16,20	32 $[f(a)]_{f_*\rho}[f(b)]_{f_*\rho} = [f(a)f(b)]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(3, 6, 25, 26)
1,5,16,20	33 $[f(a)f(b)]_{f_*\rho} = [f(a)]_{f_*\rho}[f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 2.9.1.1(32)
1,5,16	34 $[f(a)]_{f_*\rho} = \bar{f}([a]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(29)
1,5,20	35 $[f(b)]_{f_*\rho} = \bar{f}([b]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,5,16,20	36 $\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([ab]_\rho)$	$= E(28, = I)$
1,5,16,20	37 $\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	$= E(31, 36)$
1,5,16,20	38 $\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(a)f(b)]_{f_*\rho}$	$= E(27, 37)$
1,5,16,20	39 $\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([a]_\rho)\bar{f}([b]_\rho)$	$= E(35, = E(34, = E(33, 38)))$
1,5,16,20	40 $\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$= E(23, = E(19, 39))$
1,5,14,16	41 $\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(15, 20, 40)$
1,5,12,14	42 $\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(13, 16, 41)$
1,5	43 $\forall X, Y \in A/\rho\ (\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y))$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(14, 42))))$
1,5	44 $\mathsf{HGrHom}\big(\bar{f}; A/\rho, \cdot; B/(f_*\rho), \cdot\big)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 43)
1,5	45 $\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho)$	Def. 28.2.12.2(44, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.13
$\mathsf{HGr}(A, \star)$; für den Quotienten zusätzlich $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	Def. 28.2.15.13
Mengen:	Def. 28.2.15.13
$A,\ a,\ a',\ b,\ b'$	Def. 28.2.15.13
Relationen:	Def. 28.2.15.13
$\rho \subseteq A \times A$	Def. 28.2.15.13
$\rho \in \mathrm{Con}(A) \coloneqq \mathsf{EqRel}(A, \rho) \wedge$ $\quad \forall a, a', b, b' \in A\ (a\ \rho\ a' \wedge b\ \rho\ b' \Rightarrow ab\ \rho\ a'b')$; $[a]_\rho \coloneqq [a]_{\rho, A}\,, \qquad A/\rho \coloneqq \{[a]_\rho \mid a \in A\}, \qquad [a]_\rho[b]_\rho \coloneqq [ab]_\rho.$	Def. 28.2.15.13
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
$f : A \cong B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$ (i) $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$ (ii) $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24(H1)
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 11.2.1.2
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.2
$\sim$	Ax. 11.2.1.2
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Ax. 11.2.1.2
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.1.6
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.6
$\sim$	Th. 11.4.1.6
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.6
Mengen:	Th. 11.4.1.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash f_* \rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2)
Mengen:	Th. 11.4.1.7
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.7
$\sim$	Th. 11.4.1.7
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}\right) \leftrightarrow x \sim y$	Th. 11.4.1.7
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Th. 28.2.15.24(H3)
$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_* \rho)$	Th. 28.2.15.24(H4)
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Ist zusätzlich eine Kongruenz σ auf B vorgegeben, so ist die Voraussetzung $f_*\rho = \sigma$ genau $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ \sigma\ f(b)$. Unter dieser Voraussetzung lautet der Zielquotient B/σ.

Definition 28.2.15.15 (Rees-Kongruenz und Rees-Quotient).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b$
Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$

$$\mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash$$
$$a\ \rho_I\ b \coloneqq (a, b \in A \wedge (a = b \vee (a \in I \wedge b \in I))), \qquad A/I \coloneqq A/\rho_I.$$

Theorem 28.2.15.25 (Isomorphie von Rees-Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ I,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash ([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$$

Beweis.

Rees-Kongruenz Th. 28.2.15.25(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \rho_I \in \mathrm{Con}(A)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $\rho_I \subseteq A \times A$	Def. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	5 $\forall a \in A\ (a\ \rho_I\ a)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfall.

1,2	6 $\forall a, b \in A\ (a\ \rho_I\ b \Rightarrow b\ \rho_I\ a)$	Def. 28.2.15.15; Symmetrie der Gleichheit und der beiden Mitgliedschaften.
1,2	7 $\forall a, b, c \in A\ (a\ \rho_I\ b \wedge b\ \rho_I\ c \Rightarrow a\ \rho_I\ c)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfälle einsetzen, sonst liegen a, c in I.
1,2	8 $\mathsf{EqRel}(A, \rho_I)$	Def. 11.2.2.1(4, 5, 6, 7)
9	9 $a \in A$	A
10	10 $a' \in A$	A
11	11 $b \in A$	A
12	12 $b' \in A$	A
13	13 $a\ \rho_I\ a' \wedge b\ \rho_I\ b'$	A
9,10,11, 12,13	14 $a, a', b, b' \in A\,, \quad a\ \rho_I\ a'\,, \quad b\ \rho_I\ b'$	$\wedge I^*(9, 10, 11, 12, 13)$
1,9,10, 11,12,13	15 $ab, a'b' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	16 $(a = a' \wedge b = b') \vee (a, a' \in I) \vee (b, b' \in I)$	Def. 28.2.15.15(14); Distributivität der Disjunktionen.
1,9,10, 11,12,13	17 $a = a' \wedge b = b' \Rightarrow ab = a'b'$	Gleichheitseinsetzung
1,2,9,10, 11,12,13	18 $a, a' \in I \Rightarrow ab, a'b' \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	19 $b, b' \in I \Rightarrow ab, a'b' \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	20 $ab\ \rho_I\ a'b'$	Def. 28.2.15.15(15, 16, 17, 18, 19)
1,2	21 $\forall a, a', b, b' \in A\ (a\ \rho_I\ a' \wedge b\ \rho_I\ b' \Rightarrow ab\ \rho_I\ a'b')$	$\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, \forall I(\rightarrow I(11, \forall I(\rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 20)))))))))$
1,2	22 $\rho_I \in \mathrm{Con}(A)$	Def. 28.2.15.13(8, 21)

Transport der zusammengezogenen Klasse:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)

1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,8	9 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(2, 8)
1,8	10 $\mathsf{Id}(f[I]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (1, 8)
1,8	11 $\rho_I \in \mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.25($H1$) (2, 8)
1,8	12 $\rho_{f[I]} \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.25($H1$) (3, 10)
13	13 $a \in A$	A
14	14 $b \in A$	A
13,14	15 $a, b \in A$	$\wedge I^*(13, 14)$
1,13,14	16 $a = b \leftrightarrow f(a) = f(b)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 15)
1,8,13,14	17 $a \in I \leftrightarrow f(a) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 9, 15)
1,8,13,14	18 $b \in I \leftrightarrow f(b) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 9, 15)
1,8,13,14	19 $a \ \rho_I \ b \leftrightarrow f(a) \ \rho_{f[I]} \ f(b)$	Def. 28.2.15.15(16, 17, 18)
1,8	20 $\forall a, b \in A \ (a \ \rho_I \ b \leftrightarrow f(a) \ \rho_{f[I]} \ f(b))$	$\forall I(\rightarrow I(13, \forall I(\rightarrow I (14, 19))))$
1,8	21 $f_* \rho_I = \rho_{f[I]}$	Relationsextensionalität: 20 auf jedem Bildpaar; 7 liefert alle Paare in B.
1,8	22 $\bar{f} : A/\rho_I \cong B/(f_* \rho_I)$	Th. 28.2.15.24(1, 11)
1,8	23 $([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$	Def. 28.2.15.15(22, 21)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.9.4
$A,\ I$	Th. 28.2.9.4
Funktionen:	Th. 28.2.9.4
$\star$	Th. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A, \star)\ ,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4
Mengen:	Def. 28.2.15.15
$A,\ I,\ a,\ b$	Def. 28.2.15.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.15
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.15.15
$\mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash$	Def. 28.2.15.15
$a\ \rho_I\ b := (a, b \in A \wedge (a = b \vee (a \in I \wedge b \in I))), \qquad A/I :=$	Def. 28.2.15.15
A/ρ_I.	Def. 28.2.15.15
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.9.7
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.7
Funktionen:	Th. 28.2.9.7
$\star$	Th. 28.2.9.7
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{Id}(I; A, \star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7
Mengen:	Th. 28.2.9.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ I,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.6
Funktionen:	Th. 28.2.9.6
$\star$	Th. 28.2.9.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in A,\ x\in I\vdash a\star x\in I$	Th. 28.2.9.6
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.13
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,;$ für den Quotienten zusätzlich $\rho\in\mathrm{Con}(A)$	Def. 28.2.15.13
Mengen:	Def. 28.2.15.13
$A,\ a,\ a',\ b,\ b'$	Def. 28.2.15.13
Relationen:	Def. 28.2.15.13
$\rho\subseteq A\times A$	Def. 28.2.15.13
$\rho\in\mathrm{Con}(A)\coloneqq\mathsf{EqRel}(A,\rho)\wedge$ $\quad\forall a,a',b,b'\in A\ (a\ \rho\ a'\wedge b\ \rho\ b'\Rightarrow ab\ \rho\ a'b');$ $[a]_\rho\coloneqq[a]_{\rho,A}\,,\qquad A/\rho\coloneqq\{[a]_\rho\mid a\in A\},\qquad [a]_\rho[b]_\rho\coloneqq[ab]_\rho.$	Def. 28.2.15.13
$f:A\cong B\vdash\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f:A\cong B\vdash\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f:A\cong B\vdash f:A\to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash f\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f:A\cong B\vdash f[A]=B$	Th. 28.2.15.2(H4)
$f:A\cong B,\ \mathsf{Id}(U;A,\star)\vdash\mathsf{Id}(f[U];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3(H6)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star)\vdash\rho_I\in\mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.25(H1)
$f:A\cong B,\ x,y\in A\vdash x=y\leftrightarrow f(x)=f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)
$f:A\cong B,\ U\subseteq A,\ x\in A\vdash x\in U\leftrightarrow f(x)\in f[U]$	Th. 28.2.15.2(H7)
Mengen:	Th. 28.2.15.24
$A,\ B,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 28.2.15.24
Funktionen:	Th. 28.2.15.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ h,\ \bar{f},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.24
Relationen:	Th. 28.2.15.24
$\rho,\ f_*\rho$	Th. 28.2.15.24
$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash$ (i) $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$ (ii) $\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho), \quad \bar{f}([a]_\rho) \coloneqq [f(a)]_{f_*\rho}$	Th. 28.2.15.24

2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen

Definition 28.2.15.16 (Endomorphismen und Automorphismen einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$
Mengen: $A,\ u$
Operation: $\circ$ *ist die Abbildungskomposition.*

$$\mathrm{End}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)\},$$
$$\mathrm{Aut}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)\}.$$

Theorem 28.2.15.26 (Konjugation von Endomorphismen und Automorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ h,\ C_f,\ C_h,\ \circ$

$$f : A \cong B \vdash$$
(i) $C_f : (\mathrm{End}(A), \circ) \cong (\mathrm{End}(B), \circ),$
$C_f(u) \coloneqq f \circ u \circ f^{-1}$
(ii) $C_f|_{\mathrm{Aut}(A)} : (\mathrm{Aut}(A), \circ) \cong (\mathrm{Aut}(B), \circ)$

Beweis.

Die beiden Kompositionshalbgruppen Th. 28.2.15.26(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
3	3 $v \in \mathrm{End}(A)$	A

2,3	4	$u, v \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(2,3)$
1,2,3	5	$\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	6	$\mathsf{HGrHom}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	7	$\mathsf{HGrHom}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(6, 5)
1,2,3	8	$u \circ v \in \mathrm{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(7)
1	9	$\forall u, v \in \mathrm{End}(A)\ (u \circ v \in \mathrm{End}(A))$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 8))))$
10	10	$u \in \mathrm{End}(A)$	A
11	11	$v \in \mathrm{End}(A)$	A
12	12	$w \in \mathrm{End}(A)$	A
10,11,12	13	$u, v, w \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(10, 11, 12)$
1,10,11, 12	14	$u : A \to A \wedge (v : A \to A \wedge w : A \to A)$	Def. 28.2.15.16(13)
1,10,11, 12	15	$u \circ (v \circ w) = (u \circ v) \circ w$	Th. 5.3.3.11($\wedge E2$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ (14))
1,10,11, 12	16	$(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$	Th. 2.9.1.1(15)
1	17	$\forall u, v, w \in \mathrm{End}(A)\ ((u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, 16))))))$
1	18	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ)$	Def. 28.2.1.1(9, 17)
19	19	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
1,19	20	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(19)
1,19	21	$\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(20)
1,19	22	$u \in \mathrm{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(21)
1	23	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	Th. 3.5.1.1([19]⁝22)
24	24	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
25	25	$v \in \mathrm{Aut}(A)$	A
24,25	26	$u, v \in \mathrm{Aut}(A)$	$\wedge I^*(24, 25)$
1,24,25	27	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	28	$\mathsf{HGrIso}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	29	$\mathsf{HGrIso}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(28, 27)
1,24,25	30	$u \circ v \in \mathrm{Aut}(A)$	Def. 28.2.15.16(29)
1	31	$\forall u, v \in \mathrm{Aut}(A)\ (u \circ v \in \mathrm{Aut}(A))$	$\forall I(\to I(24, \forall I(\to I(25, 30))))$
1	32	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.5(18, 23, 31)
1	33	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	$\wedge I(18, \wedge I(23, 32))$

Abschluss und Träger der Konjugation Th. 28.2.15.26(H2)

$$f : A \cong B \vdash C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9 $\mathsf{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(8)
10	10 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
1,10	11 $\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(10)
1,10	12 $\mathsf{HGrHom}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(9, 11)
1,10	13 $\mathsf{HGrHom}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.1(12, 6)
1,10	14 $C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Def. 28.2.15.16(13); Definition von C_f.
1	15 $\forall u \in \mathrm{End}(A)\ (C_f(u) \in \mathrm{End}(B))$	$\forall I(\to I(10, 14))$
1	16 $C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.6.6(15); Definition von C_f als Wertzuordnung
1	17 $C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.4.18(16)
18	18 $u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
1,18	19 $\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(18)
1,18	20 $\mathsf{HGrIso}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(8, 19)
1,18	21 $\mathsf{HGrIso}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.3(20, 1)
1,18	22 $C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B)$	Def. 28.2.15.16(21); Definition von C_f.
1	23 $\forall u \in \mathrm{Aut}(A)\ (C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B))$	$\forall I(\to I(18, 22))$
1	24 $\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.26($H1$) (2)))
25	25 $w \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	A
1,25	26 $\exists u \in \mathrm{Aut}(A)\ (w = C_f(u))$	Th. 5.2.4.3(24, 16, 25)
27	27 $u \in \mathrm{Aut}(A) \wedge w = C_f(u)$	A
1,27	28 $C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B)$	$\to E(\forall E(23), \wedge E1$ (27))

1,27	29	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(27)), 28)$
1,25	30	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	$\exists E(26, 27, 29)$
1	31	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 3.5.1.1([25]:30)
1	32	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	$\wedge I(17, 31)$

Inverse Konjugation und Produkt:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (8)
10	10	$x \in A$	A
1,10	11	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 10)
1	12	$\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(10, 11))$
13	13	$y \in B$	A
1,13	14	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 13)
1	15	$\forall y \in B\ (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\to I(13, 14))$
1	16	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	17	$f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(16, 4, 12)
1	18	$h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(17)
1	19	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.26($H1$) (2)
1	20	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(B), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(B), \circ)$	Th. 28.2.15.26($H1$) (3)
1	21	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ)$	$\wedge E1(19)$
1	22	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(B), \circ)$	$\wedge E1(20)$
1	23	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
1	24	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1	25	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 28.2.15.26($H2$) (1)
1	26	$C_h[\mathrm{End}(B)] \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge C_h[\mathrm{Aut}(B)] \subseteq \mathrm{Aut}(A)$	Th. 28.2.15.26($H2$) (8)

1	27 $C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(B) \wedge C_h : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(A)$	Definition der Konjugationsabbildungen und 25,26
28	28 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
1,28	29 $u : A \to A$	Def. 28.2.15.16(28)
1,28	30 $C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 28)
1,28	31 $C_f(u) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(30)
1,28	32 $C_h(C_f(u)) \in \mathrm{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 30)
1,28	33 $C_h(C_f(u)) : A \to A$	Def. 28.2.15.16(32)
34	34 $x \in A$	A
1,28,34	35 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 34)
1,28,34	36 $h(f(x)) = x$	$\to E(\forall E(12), 34)$
1,28,34	37 $u(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(29, 34)
1,28,34	38 $h(f(u(x))) = u(x)$	$\to E(\forall E(12), 37)$
1,28,34	39 $C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,28,34	40 $((f \circ u) \circ h)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	Th. 5.3.3.4(9, 29, 4, 35)
1,28,34	41 $C_f(u)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (39), 40)
1,28,34	42 $C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(C_f(u))$
1,28,34	43 $C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ f$	$= E(18, 42)$
1,28,34	44 $((h \circ C_f(u)) \circ f)(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	Th. 5.3.3.4(4, 31, 9, 34)
1,28,34	45 $C_h(C_f(u))(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (43), 44)
1,28,34	46 $C_h(C_f(u))(x) = u(x)$	$= E(41, 36, 38, 45)$
1,28	47 $\forall x \in A\ (C_h(C_f(u))(x) = u(x))$	$\forall I(\to I(34, 46))$
1,28	48 $C_h(C_f(u)) = u$	Th. 5.2.3.17(33, 29, 47)
1	49 $C_h \circ C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$(27))
	50 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)} : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,28	51 $(C_h \circ C_f)(u) = C_h(C_f(u))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$(27), 28)
28	52 $u = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u)$	Th. 8.3.1.4(28)
1,28	53 $(C_h \circ C_f)(u) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u)$	$= E(48, 52, 51)$
1	54 $\forall u \in \mathrm{End}(A)\ ((C_h \circ C_f)(u) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u))$	$\forall I(\to I(28, 53))$
1	55 $C_h \circ C_f = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}$	Th. 5.2.3.17(49, 50, 54)
56	56 $w \in \mathrm{End}(B)$	A
1,56	57 $w : B \to B$	Def. 28.2.15.16(56)

1,56	58	$C_h(w) \in \mathrm{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 56)
1,56	59	$C_h(w) : A \to A$	Def. 28.2.15.16(58)
1,56	60	$C_f(C_h(w)) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 58)
1,56	61	$C_f(C_h(w)) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(60)
62	62	$y \in B$	A
1,56,62	63	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 62)
1,56,62	64	$f(h(y)) = y$	$\to E(\forall E(15), 62)$
1,56,62	65	$w(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(57, 62)
1,56,62	66	$f(h(w(y))) = w(y)$	$\to E(\forall E(15), 65)$
1,56,62	67	$C_h(w) = (h \circ w) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(w)$
1,56,62	68	$C_h(w) = (h \circ w) \circ f$	$= E(18, 67)$
1,56,62	69	$((h \circ w) \circ f)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	Th. 5.3.3.4(4, 57, 9, 63)
1,56,62	70	$C_h(w)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (68), 69)
1,56,62	71	$C_f(C_h(w)) = (f \circ C_h(w)) \circ h$	Definition von $C_f(C_h(w))$
1,56,62	72	$((f \circ C_h(w)) \circ h)(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 59, 4, 62)
1,56,62	73	$C_f(C_h(w))(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (71), 72)
1,56,62	74	$C_f(C_h(w))(y) = w(y)$	$= E(70, 64, 66, 73)$
1,56	75	$\forall y \in B\ (C_f(C_h(w))(y) = w(y))$	$\forall I(\to I(62, 74))$
1,56	76	$C_f(C_h(w)) = w$	Th. 5.2.3.17(61, 57, 75)
1	77	$C_f \circ C_h : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27))
	78	$\mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)} : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,56	79	$(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27), 56)
56	80	$w = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w)$	Th. 8.3.1.4(56)
1,56	81	$(C_f \circ C_h)(w) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w)$	$= E(76, 80, 79)$
1	82	$\forall w \in \mathrm{End}(B)\ ((C_f \circ C_h)(w) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w))$	$\forall I(\to I(56, 81))$
1	83	$C_f \circ C_h = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}$	Th. 5.2.3.17(77, 78, 82)
1	84	$C_f : \mathrm{End}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27), 83, 55)
85	85	$u \in \mathrm{End}(A)$	A
86	86	$v \in \mathrm{End}(A)$	A
85,86	87	$u, v \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(85, 86)$
1,85,86	88	$u : A \to A \wedge v : A \to A$	Def. 28.2.15.16(87)
1,85,86	89	$u \circ v \in \mathrm{End}(A)$	Ax. 28.2.1.1(21, 87)

1,85,86	90 $C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 85)
1,85,86	91 $C_f(u) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(90)
1,85,86	92 $C_f(v) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 86)
1,85,86	93 $C_f(v) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(92)
1,85,86	94 $C_f(u \circ v) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 89)
1,85,86	95 $C_f(u \circ v) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(94)
1,85,86	96 $u \circ v : A \to A$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$(88))
1,85,86	97 $C_f(u) \circ C_f(v) : B \to B$	Def. 5.3.3.1(93, 91)
98	98 $y \in B$	A
1,85,86, 98	99 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 98)
1,85,86, 98	100 $v(h(y)) \in A$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (88), 99)
1,85,86, 98	101 $f(v(h(y))) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 100)
1,85,86, 98	102 $h(f(v(h(y)))) = v(h(y))$	$\to E(\forall E(12), 100)$
1,85,86, 98	103 $C_f(v) = (f \circ v) \circ h$	Definition von $C_f(v)$
1,85,86, 98	104 $((f \circ v) \circ h)(y) = f(v(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E2$ (88), 4, 98)
1,85,86, 98	105 $C_f(v)(y) = f(v(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (103), 104)
1,85,86, 98	106 $C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,85,86, 98	107 $((f \circ u) \circ h)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E1$ (88), 4, 101)
1,85,86, 98	108 $C_f(u)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (106), 107)
1,85,86, 98	109 $(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = C_f(u)(C_f(v)(y))$	Def. 5.3.3.1(93, 91, 98)
1,85,86, 98	110 $(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E$(105, 108, 102, 109)
1,85,86, 98	111 $C_f((u \circ v)) = (f \circ (u \circ v)) \circ h$	Definition von $C_f((u \circ v))$
1,85,86, 98	112 $((f \circ (u \circ v)) \circ h)(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 96, 4, 98)
1,85,86, 98	113 $C_f((u \circ v))(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (111), 112)
1,85,86, 98	114 $(u \circ v)(h(y)) = u(v(h(y)))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$(88), 99)
1,85,86, 98	115 $C_f(u \circ v)(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E$(114, 113)

1,85,86, 98	116	$C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y)$	Th. 2.9.1.3(115, 110)
1,85,86	117	$\forall y \in B\ (C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y))$	$\forall I(\rightarrow I(98, 116))$
1,85,86	118	$C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v)$	Th. 5.2.3.17(95, 97, 117)
1	119	$\forall u, v \in \mathrm{End}(A)\ (C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v))$	$\forall I(\rightarrow I(85, \forall I(\rightarrow I(86, 118))))$
1	120	$\mathsf{HGrHom}(C_f; \mathrm{End}(A), \circ; \mathrm{End}(B), \circ)$	Def. 28.2.12.1(21, 22, $\wedge E1(27), 119$)
1	121	$C_f : \mathrm{End}(A) \cong \mathrm{End}(B)$	Def. 28.2.12.2(120, 84)
1	122	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	$\wedge E2(25)$
1	123	$\mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{End}(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$
124	124	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	A
1,124	125	$w \in \mathrm{End}(B)$	Th. 3.5.2.6(123, 124)
1,124	126	$C_h(w) \in C_h[\mathrm{Aut}(B)]$	Th. 5.2.4.5(123, $\wedge E2(27), 124$)
1,124	127	$C_h(w) \in \mathrm{Aut}(A)$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2$ (26), 126)
1,124	128	$(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1(27), 125$)
1,124	129	$\mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w) = w$	Th. 8.3.1.3(125)
1,124	130	$w = C_f(C_h(w))$	$= E(83, 129, 128)$
1,124	131	$C_f(C_h(w)) \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 5.2.4.5(23, $\wedge E1$ (27), 127)
1,124	132	$w \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (130), 131)
1	133	$\mathrm{Aut}(B) \subseteq C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 3.5.1.1 ([124]$\vdots$132)
1	134	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] = \mathrm{Aut}(B)$	Th. 3.5.3.5(122, 133)
1	135	$C_f\vert_{\mathrm{Aut}(A)} : \mathrm{Aut}(A) \cong C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 28.2.15.4(121, 23, 24)
1	136	$C_f\vert_{\mathrm{Aut}(A)} : \mathrm{Aut}(A) \cong \mathrm{Aut}(B)$	$= E(134, 135)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.16
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.15.16
Mengen:	Def. 28.2.15.16
$A,\ u$	Def. 28.2.15.16
Operation:	Def. 28.2.15.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\circ$ ist die Abbildungskomposition.	Def. 28.2.15.16
$\mathrm{End}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)\}$, $\mathrm{Aut}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)\}$.	Def. 28.2.15.16
Mengen:	Th. 28.2.12.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 28.2.12.1
Funktionen:	Th. 28.2.12.1
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\ ,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$ $\vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1
Mengen:	Th. 5.3.3.11
$A,\ B,\ C,\ D$	Th. 5.3.3.11
Funktionen:	Th. 5.3.3.11
$F,\ G,\ H$	Th. 5.3.3.11
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ H\colon C \to D \vdash H \circ (G \circ F) = (H \circ G)$	Th. 5.3.3.11
$\circ\, F$	Th. 5.3.3.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 28.2.12.3
$A,\ B,\ C$	Th. 28.2.12.3
Funktionen:	Th. 28.2.12.3
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$ $\vdash \mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.3
Mengen:	Th. 28.2.15.5
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.5
Funktionen:	Th. 28.2.15.5
$\star$	Th. 28.2.15.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ U \subseteq A,\ \forall x, y \in U\ (x \star y \in U) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$	Th. 28.2.15.5
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Th. 5.2.6.6
$A,\ B$	Th. 5.2.6.6
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.6
F	Th. 5.2.6.6
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 5.2.6.6
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}$	Th. 28.2.15.26(H1)
$(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.26(H1)
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.3.3.12
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.12
Funktionen:	Th. 8.3.3.12
$F,\ F^{-1},\ G$	Th. 8.3.3.12
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \to A,$ $\forall y \in B\ (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12
$f : A \cong B \vdash C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 28.2.15.26(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.4
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.3.3.4
Funktionen:	Th. 5.3.3.4
$\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$	Th. 5.3.3.4
$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Th. 5.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.4
$A,\ x$	Th. 8.3.1.4
$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 8.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 28.2.15.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.15.4
Funktionen:	Th. 28.2.15.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.4
$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U,\star) \vdash f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.15.4

2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen

Definition 28.2.15.17 (Geordnete Mengen von Unterstrukturen).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A,\star)$
Ordnung: $\subseteq$ *auf allen vier Mengen sowie auf* $\mathrm{Con}(A)$

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Sub}(A) \coloneqq \{U \subseteq A \mid \mathsf{UHGr}(U;A,\star)\},\\
&\mathrm{LId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{LId}(I;A,\star)\},\\
&\mathrm{RId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{RId}(I;A,\star)\},\\
&\mathrm{Id}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{Id}(I;A,\star)\}.
\end{aligned}$$

Ein Ordnungsisomorphismus bedeutet hier ausdrücklich eine Bijektion, die die Inklusionsrelation in beiden Richtungen erhält; dies ist kein Halbgruppenisomorphismus ohne zusätzliche Operation auf der Strukturmenge.

Theorem 28.2.15.27 (Isomorphe Inklusionsordnungen der Unterstrukturen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ V$
Funktionen: $f,\ h$
Relationen: $\rho,\ \sigma$

$$\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ U,V \subseteq A,\ \rho,\sigma \in \mathrm{Con}(A) \vdash\\
&\textit{(i)}\quad (U \mapsto f[U]) : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)\\
&\qquad (\mathcal{S} = \mathrm{Sub}, \mathrm{LId}, \mathrm{RId}, \mathrm{Id})\\
&\textit{(ii)}\quad U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]\\
&\textit{(iii)}\quad (\rho \mapsto f_*\rho) : \mathrm{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Con}(B)\\
&\textit{(iv)}\quad \rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma
\end{aligned}$$

Beweis.

Unterhalbgruppen und Ideale:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (8)
10	10	$\mathsf{UHGr}(W; A, \star)$	A
1,10	11	$\mathsf{UHGr}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (1, 10)
1	12	$\forall W\ (\mathsf{UHGr}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(10, 11))$
13	13	$\mathsf{UHGr}(W; B, \diamond)$	A
1,13	14	$\mathsf{UHGr}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (8, 13)
1	15	$\forall W\ (\mathsf{UHGr}(W; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\to I(13, 14))$
16	16	$\mathsf{LId}(W; A, \star)$	A
1,16	17	$\mathsf{LId}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) (1, 16)
1	18	$\forall W\ (\mathsf{LId}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{LId}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19	$\mathsf{LId}(W; B, \diamond)$	A
1,19	20	$\mathsf{LId}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H4$) (8, 19)
1	21	$\forall W\ (\mathsf{LId}(W; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{LId}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\to I(19, 20))$
22	22	$\mathsf{RId}(W; A, \star)$	A
1,22	23	$\mathsf{RId}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) (1, 22)
1	24	$\forall W\ (\mathsf{RId}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{RId}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(22, 23))$
25	25	$\mathsf{RId}(W; B, \diamond)$	A
1,25	26	$\mathsf{RId}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H5$) (8, 25)
1	27	$\forall W\ (\mathsf{RId}(W; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{RId}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\to I(25, 26))$
28	28	$\mathsf{Id}(W; A, \star)$	A
1,28	29	$\mathsf{Id}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (1, 28)
1	30	$\forall W\ (\mathsf{Id}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{Id}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(28, 29))$
31	31	$\mathsf{Id}(W; B, \diamond)$	A
1,31	32	$\mathsf{Id}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (8, 31)
1	33	$\forall W\ (\mathsf{Id}(W; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{Id}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\to I(31, 32))$

1	34	$\Phi : \mathcal{S}(A) \to \mathcal{S}(B) \wedge \Psi : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(A)$	Def. 28.2.15.17(12, 18,24,30,15,21,27, 33); $\Phi(W) = f[W]$, $\Psi(W) = h[W]$.
35	35	$W \in \mathcal{S}(A)$	A
1,35	36	$W \subseteq A$	Def. 28.2.15.17(35)
1,35	37	$f[W] \subseteq B \wedge h[f[W]] = W \wedge (W \neq \varnothing \leftrightarrow f[W] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 36)$
1,35	38	$h[f[W]] = W$	$\wedge E1(\wedge E2(37))$
1,35	39	$\Psi(\Phi(W)) = h[f[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ
1,35	40	$\Psi(\Phi(W)) = W$	$= E(38, 39)$
1	41	$\Psi \circ \Phi : \mathcal{S}(A) \to \mathcal{S}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(34), \wedge E2(34))$
	42	$\mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)} : \mathcal{S}(A) \to \mathcal{S}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,35	43	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \Psi(\Phi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(34), \wedge E2(34), 35)$
35	44	$W = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	Th. 8.3.1.4(35)
1,35	45	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	$= E(40, 44, 43)$
1	46	$\forall W \in \mathcal{S}(A)\ ((\Psi \circ \Phi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W))$	$\forall I(\to I(35, 45))$
1	47	$\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
48	48	$W \in \mathcal{S}(B)$	A
1,48	49	$W \subseteq B$	Def. 28.2.15.17(48)
1,48	50	$f[h[W]] = W$	Th. 8.3.3.7(49, 5)
1,48	51	$\Phi(\Psi(W)) = f[h[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ
1,48	52	$\Phi(\Psi(W)) = W$	$= E(50, 51)$
1	53	$\Phi \circ \Psi : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ $(34), \wedge E1(34))$
	54	$\mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)} : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,48	55	$(\Phi \circ \Psi)(W) = \Phi(\Psi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ $(34), \wedge E1(34), 48)$
48	56	$W = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	Th. 8.3.1.4(48)
1,48	57	$(\Phi \circ \Psi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	$= E(52, 56, 55)$
1	58	$\forall W \in \mathcal{S}(B)\ ((\Phi \circ \Psi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W))$	$\forall I(\to I(48, 57))$
1	59	$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}$	Th. 5.2.3.17(53, 54, 58)
1	60	$\Phi : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ $(34), \wedge E1(34), 59,$ 47)
61	61	$U, V \subseteq A$	A
61	62	$U \subseteq A$	$\wedge E1(61)$
61	63	$V \subseteq A$	$\wedge E2(61)$
64	64	$U \subseteq V$	A

1,61,64	65	$f[U] \subseteq f[V]$	Th. 5.2.4.10(4, 64, 63)
1,61	66	$U \subseteq V \Rightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\to I(64, 65)$
1,61	67	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 62)
1,61	68	$f[V] \subseteq B \wedge h[f[V]] = V \wedge (V \neq \varnothing \leftrightarrow f[V] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 63)
69	69	$f[U] \subseteq f[V]$	A
1,61,69	70	$h[f[U]] \subseteq h[f[V]]$	Th. 5.2.4.10(9, 69, $\wedge E1$(68))
1,61,69	71	$U \subseteq V$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (67)), $\wedge E1(\wedge E2$ (68)), 70)
1,61	72	$f[U] \subseteq f[V] \Rightarrow U \subseteq V$	$\to I(69, 71)$
1,61	73	$U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\leftrightarrow I(66, 72)$

Monotonie des Relationsbildes Th. 28.2.15.27(H1)

$$f : A \cong B,\ \rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A),\ \rho \subseteq \sigma \vdash f_* \rho \subseteq f_* \sigma$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
3	3	$\sigma \in \mathrm{Con}(A)$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	6	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	8	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 2)
1,2	9	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(8)
1,3	10	$\mathsf{EqRel}(A, \sigma)$	Def. 28.2.15.13(4, 3)
1,3	11	$\sigma \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(10)
12	12	$\rho \subseteq \sigma$	A
13	13	$p \in f_* \rho$	A
1,2,13	14	$\exists a \in A\, \exists b \in A\ (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho)$	Def. 28.2.15.14(6, 9, 13)
15	15	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho))$	A
15	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	18	$p = (f(a), f(b))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (15)))

15	19 $(a, b) \in \rho$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (15)))
12,15	20 $(a, b) \in \sigma$	Th. 3.5.2.6(12, 19)
12,15	21 $a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma))$	$\wedge I(16, \wedge I(17, \wedge I(18,$ 20)))
12,15	22 $\exists a \in A\, \exists b \in A\, (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma)$	$\exists I^*(21)$
1,3,12,15	23 $p \in f_* \sigma$	Def. 28.2.15.14(6, 11, 22)
1,2,3,12, 13	24 $p \in f_* \sigma$	$\exists E^*(14, 15, 23)$
1,2,3,12	25 $f_* \rho \subseteq f_* \sigma$	Th. 3.5.1.1([13]⁝24)

Rücktransport einer Kongruenz Th. 28.2.15.27(H2)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash h_*(f_* \rho) = \rho$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	5 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	6 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	7 $\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 2)
1,2	8 $\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(7)
1	9 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (9)
1,2	11 $f_* \rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 2)
1,2	12 $\mathsf{EqRel}(B, f_* \rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 11)
1,2	13 $f_* \rho \subseteq B \times B$	Def. 11.2.2.1(12)
1,2	14 $\forall u, v \in B\, (u\ f_* \rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$	$\wedge E($ Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 8))
1,2	15 $\forall a, b \in A\, (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_* \rho\ f(b))$	$\wedge E($ Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 8))
16	16 $p \in h_*(f_* \rho)$	A
1,2,16	17 $\exists u \in B\, \exists v \in B\, (p = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_* \rho\ v)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 16)
18	18 $u \in B \wedge (v \in B \wedge (p = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_* \rho\ v))$	A

18	19 $u \in B$	$\wedge E1(18)$
18	20 $v \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21 $p = (h(u), h(v))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(18)))$
18	22 $u\ f_*\rho\ v$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(18)))$
1,2,18	23 $u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v)$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(14), 19)), 20)$
1,2,18	24 $(h(u), h(v)) \in \rho$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(23), 22)$
1,2,18	25 $p \in \rho$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (21), 24)
1,2,16	26 $p \in \rho$	$\exists E^*(17, 18, 25)$
1,2	27 $h_*(f_*\rho) \subseteq \rho$	Th. 3.5.1.1([16]:26)
28	28 $q \in \rho$	A
1,2,28	29 $q \in A \times A$	Th. 3.5.2.6(8, 28)
1,2,28	30 $\exists a \in A\, \exists b \in A\ (q = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(29)
31	31 $a \in A \wedge (b \in A \wedge q = (a, b))$	A
31	32 $a \in A$	$\wedge E1(31)$
31	33 $b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
31	34 $q = (a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(31))$
28,31	35 $a\ \rho\ b$	$= E(34, 28)$
1,2,31	36 $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(15), 32)), 33)$
1,2,28,31	37 $f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(36), 35)$
1,31	38 $f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 32)
1,31	39 $f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 33)
1,31	40 $h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(6, 32)
1,31	41 $h(f(b)) = b$	Th. 8.3.3.5(6, 33)
1,31	42 $q = (h(f(a)), h(f(b)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (40), Th. 2.9.1.1(41), 34)
1,2,28,31	43 $f(a) \in B \wedge (f(b) \in B \wedge (q = (h(f(a)), h(f(b))) \wedge f(a)\ f_*\rho\ f(b)))$	$\wedge I(38, \wedge I(39, \wedge I(42, 37)))$
1,2,28,31	44 $\exists u \in B\, \exists v \in B\ (q = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v)$	$\exists I^*(43)$
1,2,28,31	45 $q \in h_*(f_*\rho)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 44)
1,2,28	46 $q \in h_*(f_*\rho)$	$\exists E^*(30, 31, 45)$
1,2	47 $\rho \subseteq h_*(f_*\rho)$	Th. 3.5.1.1([28]:46)
1,2	48 $h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 3.5.3.5(27, 47)

Kongruenzen:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
9	9	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,9	10	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, 9)$
1	11	$\forall \rho \in \mathrm{Con}(A)\ (f_*\rho \in \mathrm{Con}(B))$	$\forall I(\to I(9, 10))$
12	12	$\tau \in \mathrm{Con}(B)$	A
1,12	13	$h_*\tau \in \mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(8, 12)$
1	14	$\forall \tau \in \mathrm{Con}(B)\ (h_*\tau \in \mathrm{Con}(A))$	$\forall I(\to I(12, 13))$
1	15	$\Theta : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(B) \wedge \Lambda : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(A)$	11,14; $\Theta(\rho) = f_*\rho$, $\Lambda(\tau) = h_*\tau$.
16	16	$a \in A$	A
1,16	17	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18	$\forall a \in A\ (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19	$b \in B$	A
1,19	20	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)
1	21	$\forall b \in B\ (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\to I(19, 20))$
22	22	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,22	23	$h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, 22)$
1,22	24	$\Lambda(\Theta(\rho)) = h_*(f_*\rho)$	Definitionen von Θ, Λ
1,22	25	$\Lambda(\Theta(\rho)) = \rho$	$= E(23, 24)$
1	26	$\Lambda \circ \Theta : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (15), $\wedge E2$(15))
	27	$\mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)} : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,22	28	$(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \Lambda(\Theta(\rho))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (15), $\wedge E2$(15), 22)
22	29	$\rho = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho)$	Th. 8.3.1.4(22)
1,22	30	$(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho)$	$= E(25, 29, 28)$
1	31	$\forall \rho \in \mathrm{Con}(A)\ ((\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho))$	$\forall I(\to I(22, 30))$
1	32	$\Lambda \circ \Theta = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}$	Th. 5.2.3.17(26, 27, 31)
1	33	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)

1	34	$f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(33, 4, 18)
1	35	$h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(34)
36	36	$\tau \in \mathrm{Con}(B)$	A
1,36	37	$(h^{-1})_*(h_*\tau) = \tau$	Th. 28.2.15.27($H2$) (8, 36)
1,36	38	$f_*(h_*\tau) = \tau$	$= E(35, 37)$
1,36	39	$\Theta(\Lambda(\tau)) = f_*(h_*\tau)$	Definitionen von Θ, Λ
1,36	40	$\Theta(\Lambda(\tau)) = \tau$	$= E(38, 39)$
1	41	$\Theta \circ \Lambda : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$(15))
	42	$\mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)} : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,36	43	$(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \Theta(\Lambda(\tau))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$(15), 36)
36	44	$\tau = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau)$	Th. 8.3.1.4(36)
1,36	45	$(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau)$	$= E(40, 44, 43)$
1	46	$\forall \tau \in \mathrm{Con}(B)\ ((\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau))$	$\forall I(\to I(36, 45))$
1	47	$\Theta \circ \Lambda = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
1	48	$\Theta : \mathrm{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Con}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$(15), 47, 32)
49	49	$\rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A)$	A
50	50	$\rho \subseteq \sigma$	A
1,49,50	51	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	Th. 28.2.15.27($H1$) (1, $\wedge E1$(49), $\wedge E2$ (49), 50)
1,49	52	$\rho \subseteq \sigma \Rightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\to I(50, 51)$
1,49	53	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, $\wedge E1$(49))
1,49	54	$f_*\sigma \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, $\wedge E2$(49))
1,49	55	$h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27($H2$) (1, $\wedge E1$(49))
1,49	56	$h_*(f_*\sigma) = \sigma$	Th. 28.2.15.27($H2$) (1, $\wedge E2$(49))
57	57	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	A
1,49,57	58	$h_*(f_*\rho) \subseteq h_*(f_*\sigma)$	Th. 28.2.15.27($H1$) (8, 53, 54, 57)
1,49,57	59	$\rho \subseteq \sigma$	$= E(55, 56, 58)$
1,49	60	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma \Rightarrow \rho \subseteq \sigma$	$\to I(57, 59)$
1,49	61	$\rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\leftrightarrow I(52, 60)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
$f : A \cong B,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H3)
$f : A \cong B,\ \mathsf{LId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H4)
$f : A \cong B,\ \mathsf{RId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H5)
$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(U; A, \star) \vdash \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H6)
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.17
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.15.17
Ordnung:	Def. 28.2.15.17
$\subseteq$ auf allen vier Mengen sowie auf $\mathrm{Con}(A)$	Def. 28.2.15.17
$\mathrm{Sub}(A) \coloneqq \{U \subseteq A \mid \mathsf{UHGr}(U; A, \star)\}$, $\mathrm{LId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{LId}(I; A, \star)\}$, $\mathrm{RId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{RId}(I; A, \star)\}$, $\mathrm{Id}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{Id}(I; A, \star)\}$.	Def. 28.2.15.17
$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow$	Th. 28.2.15.3(H1)
$f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3(H1)
Mengen:	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.4
$A,\ x$	Th. 8.3.1.4
$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 8.3.1.4
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.3.7
$A,\ B,\ Y$	Th. 8.3.3.7
Funktionen:	Th. 8.3.3.7
F	Th. 8.3.3.7
$Y \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A, \star)$;	Def. 28.2.15.13
für den Quotienten zusätzlich $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	
Mengen:	Def. 28.2.15.13
$A,\ a,\ a',\ b,\ b'$	Def. 28.2.15.13
Relationen:	Def. 28.2.15.13
$\rho \subseteq A \times A$	Def. 28.2.15.13
$\rho \in \mathrm{Con}(A) \coloneqq \mathsf{EqRel}(A, \rho) \wedge$	Def. 28.2.15.13
$\quad \forall a, a', b, b' \in A\ (a\ \rho\ a' \wedge b\ \rho\ b' \Rightarrow ab\ \rho\ a'b');$	
$[a]_\rho \coloneqq [a]_{\rho, A}\,, \qquad A/\rho \coloneqq \{[a]_\rho \mid a \in A\}, \qquad [a]_\rho[b]_\rho \coloneqq [ab]_\rho.$	
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
Mengen:	Def. 28.2.15.14
$A,\ B,\ a,\ b$	Def. 28.2.15.14
Funktionen:	Def. 28.2.15.14
f	Def. 28.2.15.14
Relationen:	Def. 28.2.15.14
ρ	Def. 28.2.15.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f : A \to B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$ $f_*\rho \coloneqq \{(f(a), f(b)) \mid a, b \in A,\ a\ \rho\ b\}.$	Def. 28.2.15.14
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2)
$f : A \cong B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$ (i) $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$ (ii) $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27(H2)
Mengen:	Th. 8.3.3.12
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.12
Funktionen:	Th. 8.3.3.12
$F,\ F^{-1},\ G$	Th. 8.3.3.12
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \to A,$ $\forall y \in B\ (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12
$f : A \cong B,\ \rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A),\ \rho \subseteq \sigma$ $\vdash f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	Th. 28.2.15.27(H1)

Folglich werden vorhandene kleinste und größte Elemente, minimale und maximale Unterstrukturen sowie vorhandene Infima und Suprema transportiert: Die definierenden Inklusionsbedingungen sind auf beiden Seiten äquivalent. Bei den hier ausdrücklich nichtleeren Unterhalbgruppen und Idealen ist ein leerer Durchschnitt nicht automatisch wieder eine Unterstruktur.

2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen

Definition 28.2.15.18 (Halbgruppenterme mit Parametern).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A,\star)\ ,\quad \alpha : I \to A$
Konstruktion: *Terme sind endliche, nach diesen drei Regeln gebildete Ausdrücke.*
Transport: t^f *ersetzt jeden Parameter* c_a *durch* $c_{f(a)}$.

$$t ::= x_i \mid c_a \mid (t \cdot t), \qquad i \in I,\ a \in A;$$
$$x_i^A(\alpha) \coloneqq \alpha(i), \quad c_a^A(\alpha) \coloneqq a, \quad (st)^A(\alpha) \coloneqq s^A(\alpha) \star t^A(\alpha).$$

Ein Gleichungssystem E ist eine Menge von Paaren solcher Terme. Wir setzen

$$\mathrm{Sol}_A(E) \coloneqq \{\alpha : I \to A \mid \forall (s,t) \in E\ (s^A(\alpha) = t^A(\alpha))\},$$
$$E^f \coloneqq \{(s^f, t^f) \mid (s,t) \in E\}.$$

Theorem 28.2.15.28 (Isomorphismen transportieren alle Gleichungslösungen).

Mengen: $A,\ B,\ I,\ E$
Funktionen: $f,\ h,\ \alpha : I \to A$
Terme: $s,\ t$ *nach der vorstehenden Definition*

$f : A \cong B \vdash$
(i) $f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$
(ii) $\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$
(iii) $(\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \mathrm{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sol}_B(E^f)$

Beweis.

Auswertungen liegen im Träger Th. 28.2.15.28(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \alpha : I \to A \vdash t^A(\alpha) \in A$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\alpha : I \to A$	A
3	3	$i \in I$	A
2,3	4	$\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
2,3	5	$x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(2, 3)
2,3	6	$x_i^A(\alpha) \in A$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 4)
2	7	$\forall i \in I\ (x_i^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
8	8	$a \in A$	A
2,8	9	$c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(2, 8)
2,8	10	$c_a^A(\alpha) \in A$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 8)
2	11	$\forall a \in A\ (c_a^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\to I(8, 10))$
12	12	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	A
1,12	13	$s^A(\alpha) \star t^A(\alpha) \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 12)
1,2,12	14	$(st)^A(\alpha) \in A$	Def. 28.2.15.18(13)
1,2	15	$t^A(\alpha) \in A$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Konstruktion der Terme: 7,11 sind die Anfangsfälle, 12–14 der einzige Konstruktionsschritt.

Strukturelle Induktion über einen Term Th. 28.2.15.28(H2)

$$f : A \cong B,\ \alpha : I \to A \vdash f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)

8	8	$\alpha : I \to A$	A
1,8	9	$f \circ \alpha : I \to B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
10	10	$i \in I$	A
8,10	11	$x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(8, 10)
8,10	12	$f(x_i^A(\alpha)) = f(\alpha(i))$	$= E(11, = I)$
1,8,10	13	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = (f \circ \alpha)(i)$	Def. 28.2.15.18(9, 10)
1,8,10	14	$(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 10)
1,8,10	15	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = f(\alpha(i))$	$= E(14, 13)$
1,8,10	16	$f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(12, 15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\to I(10, 16))$
18	18	$a \in A$	A
8,18	19	$c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(8, 18)
8,18	20	$f(c_a^A(\alpha)) = f(a)$	$= E(19, = I)$
1,18	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 18)
1,8,18	22	$(c_a^f)^B(f \circ \alpha) = f(a)$	Def. 28.2.15.18(9, 21)
1,8,18	23	$f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(20, 22)
1,8	24	$\forall a \in A\ (f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\to I(18, 23))$
25	25	$f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	A
26	26	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	A
1,8	27	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28($H1$) (2, 8)
1,8	28	$f(s^A(\alpha) \star t^A(\alpha)) = f(s^A(\alpha)) \diamond f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 27)
1,8,25,26	29	$f((st)^A(\alpha)) = ((st)^f)^B(f \circ \alpha)$	Def. 28.2.15.18(28, 25, 26)
1,8	30	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Termkonstruktion: 17,24 und 25–29

Gleichheit, Systeme und Bijektivität:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)

1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\alpha : I \to A$	A
1	9	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (9)
1,8	11	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28($H1$) (2, 8)
1,8	12	$s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow f(s^A(\alpha)) = f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 11)
1,8	13	$f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28($H2$) (1, 8)
1,8	14	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28($H2$) (1, 8)
1,8	15	$s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow (s^f)^B(f \circ \alpha) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	$= E(13, 14, 12)$
1,8	16	$\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Definition der Lösungsmengen; 15 für jedes Paar in E.
1	17	$\forall \alpha : I \to A\ (\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f))$	$\forall I(\to I(8, 16))$
18	18	$x \in A$	A
1,18	19	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 18)
1	20	$\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(18, 19))$
21	21	$y \in B$	A
1,21	22	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 21)
1	23	$\forall y \in B\ (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\to I(21, 22))$
1,8	24	$f \circ \alpha : I \to B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
1,8	25	$h \circ (f \circ \alpha) : I \to A$	Def. 5.3.3.1(24, 10)
26	26	$i \in I$	A
1,8,26	27	$\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 26)
1,8,26	28	$h(f(\alpha(i))) = \alpha(i)$	$\to E(\forall E(20), 27)$
1,8,26	29	$(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 26)
1,8,26	30	$(h \circ (f \circ \alpha))(i) = h((f \circ \alpha)(i))$	Def. 5.3.3.1(24, 10, 26)
1,8,26	31	$(h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i)$	$= E(29, 28, 30)$
1,8	32	$\forall i \in I\ ((h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i))$	$\forall I(\to I(26, 31))$
1,8	33	$h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	Th. 5.2.3.17(25, 8, 32)
34	34	$\beta : I \to B$	A
1,34	35	$h \circ \beta : I \to A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	36	$h \circ \beta : I \to A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	37	$f \circ (h \circ \beta) : I \to B$	Def. 5.3.3.1(36, 4)
38	38	$i \in I$	A
1,34,38	39	$\beta(i) \in B$	Th. 5.2.3.9(34, 38)
1,34,38	40	$f(h(\beta(i))) = \beta(i)$	$\to E(\forall E(23), 39)$

1,34,38	41	$(h \circ \beta)(i) = h(\beta(i))$	Def. 5.3.3.1(34, 10, 38)
1,34,38	42	$(f \circ (h \circ \beta))(i) = f((h \circ \beta)(i))$	Def. 5.3.3.1(36, 4, 38)
1,34,38	43	$(f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i)$	$= E(41, 40, 42)$
1,34	44	$\forall i \in I\ ((f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i))$	$\forall I(\to I(38, 43))$
1,34	45	$f \circ (h \circ \beta) = \beta$	Th. 5.2.3.17(37, 34, 44)
1,34	46	$h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ (h \circ \beta) \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	$\to E(\forall E(17), 35)$
1,34	47	$h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow \beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	$= E(45, 46)$
1,34	48	$\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E)$	$\leftrightarrow E2(47)$
1	49	$\forall \beta : I \to B\ (\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E))$	$\forall I(\to I(34, 48))$
1	50	$\Phi : \mathrm{Sol}_A(E) \to \mathrm{Sol}_B(E^f) \wedge \Psi : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_A(E)$	Definitionen von Φ, Ψ aus 17,49
1	51	$\forall \alpha : I \to A\ (h \circ (f \circ \alpha) = \alpha)$	$\forall I(\to I(8, 33))$
1	52	$\forall \beta : I \to B\ (f \circ (h \circ \beta) = \beta)$	$\forall I(\to I(34, 45))$
53	53	$\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E)$	A
53	54	$\alpha : I \to A$	Definition von $\mathrm{Sol}_A(E)$ aus 53
1,53	55	$h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	$\to E(\forall E(51), 54)$
1,53	56	$\Psi(\Phi(\alpha)) = h \circ (f \circ \alpha)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,53	57	$\Psi(\Phi(\alpha)) = \alpha$	$= E(55, 56)$
1	58	$\Psi \circ \Phi : \mathrm{Sol}_A(E) \to \mathrm{Sol}_A(E)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$(50))
	59	$\mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)} : \mathrm{Sol}_A(E) \to \mathrm{Sol}_A(E)$	Th. 8.3.1.1
1,53	60	$(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \Psi(\Phi(\alpha))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$(50), 53)
53	61	$\alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha)$	Th. 8.3.1.4(53)
1,53	62	$(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha)$	$= E(57, 61, 60)$
1	63	$\forall \alpha \in \mathrm{Sol}_A(E)\ ((\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha))$	$\forall I(\to I(53, 62))$
1	64	$\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}$	Th. 5.2.3.17(58, 59, 63)
65	65	$\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	A
65	66	$\beta : I \to B$	Definition von $\mathrm{Sol}_B(E^f)$ aus 65
1,65	67	$f \circ (h \circ \beta) = \beta$	$\to E(\forall E(52), 66)$
1,65	68	$\Phi(\Psi(\beta)) = f \circ (h \circ \beta)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,65	69	$\Phi(\Psi(\beta)) = \beta$	$= E(67, 68)$
1	70	$\Phi \circ \Psi : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50))
	71	$\mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)} : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.1.1
1,65	72	$(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \Phi(\Psi(\beta))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50), 65)
65	73	$\beta = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	Th. 8.3.1.4(65)

1,65	74	$(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	$= E(69, 73, 72)$
1	75	$\forall \beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)\ ((\Phi \circ \Psi)(\beta) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta))$	$\forall I(\to I(65, 74))$
1	76	$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}$	Th. 5.2.3.17(70, 71, 75)
1	77	$\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)} \wedge \Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}$	$\wedge I(64, 76)$
1	78	$(\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \mathrm{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50), $\wedge E2$ (77), $\wedge E1$(77))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.18
$\mathsf{HGr}(A, \star)\ ,\quad \alpha : I \to A$	Def. 28.2.15.18
Konstruktion:	Def. 28.2.15.18
Terme sind endliche, nach diesen drei Regeln gebildete Ausdrücke.	Def. 28.2.15.18
Transport:	Def. 28.2.15.18
t^f ersetzt jeden Parameter c_a durch $c_{f(a)}$.	Def. 28.2.15.18
$t ::= x_i \mid c_a \mid (t \cdot t), \qquad i \in I,\ a \in A;$ $x_i^A(\alpha) \coloneqq \alpha(i), \quad c_a^A(\alpha) \coloneqq a, \quad (st)^A(\alpha) \coloneqq s^A(\alpha) \star t^A(\alpha).$	Def. 28.2.15.18
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\ ,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
$f : A \cong B \vdash f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\ ,\ \alpha : I \to A \vdash t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28(H1)
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\left(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\right)$	Th. 28.2.15.1
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)
$f : A \cong B,\ \alpha : I \to A \vdash f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28(H2)
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.4
$A,\ x$	Th. 8.3.1.4
$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 8.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14

Dies erfasst insbesondere $x^2 = x$, $xy = yx$, $ax = b$, $xa = b$ und $xy = e = yx$. Die Lösungsmengen sind im Allgemeinen nur Mengen. Wenn eine solche Lösungsmenge unter der koordinatenweisen Operation abgeschlossen ist, liefert zusätzlich der Einschränkungssatz einen Halbgruppenisomorphismus. Die Äquivalenz für Gleichungen bleibt bei Negation, Konjunktion, Disjunktion und Quantifizierung erhalten: Für Existenzquantoren transportiert man den Zeugen mit f, für Allquantoren verwendet man die Surjektivität. Damit werden auch Kürzbarkeit und andere durch solche Formeln beschriebene Eigenschaften in beiden Richtungen erhalten.

2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 28.2.16.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash$$
$$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1 $\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
2	3 $\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f};\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.4(2)
2	4 $\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists I(3)$
1	5 $\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists E(1,2,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.4
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 28.2.14.4
Funktionen:	Th. 28.2.14.4
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Th. 28.2.14.4
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash$ $\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f};\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.4

2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 28.2.16.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$r,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(B,\diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright\,A\subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright\,r\colon B\to A$
Retraktion:	$a\in A\vdash r(a)=a$
Produkt über dem Rückzug:	$x,y\in B\vdash x\diamond y=r(x)\star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright\,\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$

$$\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$$

Isomorphismen aus passenden Inflationsfasern. Die Multiplikation einer Inflation hängt nur von den Rückzugswerten ab. Deshalb genügt es, passende Faserbijektionen zu verkleben und dabei den gegebenen Isomorphismus auf der Grundhalbgruppe beizubehalten. Die mengentheoretische Verklebung ist in Band 09 bereits bewiesen.

Theorem 28.2.16.2 (Rekonstruktion aus passenden Inflationsfasern).

Mengen: $S,\ T,\ G,\ H,\ x,\ y,\ g$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ r,\ s,\ \varphi,\ f,\ u$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star)),\ \mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond)),\\&\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)\,,\\&\forall g\in G\,\exists u\left(u\colon r^{-1}[\{g\}]\xrightarrow{\sim}s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right)\vdash\\&\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)\end{aligned}$$

Beweis.

Konstruktion einer kompatiblen Bijektion:

1	1 $\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star))$	A
2	2 $\mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond))$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)$	A
4	4 $\forall g\in G\,\exists u\left(u\colon r^{-1}[\{g\}]\xrightarrow{\sim}s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right)$	A
1	5 $G\subseteq S\wedge r\colon S\to G\wedge\forall g\in G\,(r(g)=g)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	6 $H\subseteq T\wedge s\colon T\to H\wedge\forall h\in H\,(s(h)=h)$	Def. 28.2.16.1(2)
3	7 $\varphi\colon G\xrightarrow{\sim}H$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4	8 $\exists f\left(\begin{array}{l}f\colon S\xrightarrow{\sim}T\wedge\\\quad\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))\wedge\\\quad\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))\end{array}\right)$	Th. 9.4.1.1(5, 6, 7, 4)
9	9 $\begin{array}{l}f\colon S\xrightarrow{\sim}T\wedge\\\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))\wedge\\\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))\end{array}$	A

Trägerzugriffe und Produktwerte:

1	10 $\mathsf{HGr}(G,\star)\wedge\mathsf{HGr}(S,\star)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	11 $\mathsf{HGr}(H,\diamond)\wedge\mathsf{HGr}(T,\diamond)$	Def. 28.2.16.1(2)
12	12 $x,y\in S$	A
1,12	13 $r(x),r(y)\in G$	Th. 5.2.3.9(5, 12)
9,12	14 $f(x),f(y)\in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1$(9), 12)
1,12	15 $x\star y=r(x)\star r(y)$	Def. 28.2.16.1(1, 12)
1,12	16 $r(x)\star r(y)\in G$	Ax. 28.2.1.1(10, 13)
9	17 $\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
9	18 $\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

1,9,12	19	$f(x \star y) = f(r(x) \star r(y))$	$= E(15)$
1,9,12	20	$= \varphi(r(x) \star r(y))$	$\to E(16, \forall E(17))$
1,3,9,12	21	$\mathsf{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,9,12	22	$\varphi(r(x) \star r(y)) = \varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y))$	Ax. 28.2.12.3(21, 13)
1,3,9,12	23	$\varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y)) = s(f(x)) \diamond s(f(y))$	$= E(\to E(12, \forall E$ (18)))
1,2,3,9, 12	24	$s(f(x)) \diamond s(f(y)) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.16.1(2, 14)
1,2,3,9, 12	25	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	$\mathsf{Tr}.(19, 20, 22, 23, 24)$
1,2,3,9	26	$f \colon S \to T$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	27	$\mathsf{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(10, 11, 26, 25)
1,2,3,9	28	$\mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(27, $\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	29	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists I(28)$
1,2,3,4	30	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 29)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.16.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ a$	Def. 28.2.16.1
Funktionen:	Def. 28.2.16.1
$r,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.16.1
Axiome	Def. 28.2.16.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.16.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.16.1
Erweiterung:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright A \subseteq B$	Def. 28.2.16.1
Rückzug:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright r \colon B \to A$	Def. 28.2.16.1
Retraktion:	Def. 28.2.16.1
$a \in A \vdash r(a) = a$	Def. 28.2.16.1
Produkt über dem Rückzug:	Def. 28.2.16.1
$x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$	Def. 28.2.16.1
Neues Symbol	Def. 28.2.16.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Inflation:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright \mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$	Def. 28.2.16.1
$\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$	Def. 28.2.16.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A,\star; B,\diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 9.4.1.1
$S,\ T,\ G,\ H,\ g,\ h,\ x,\ x',\ y,\ z$	Th. 9.4.1.1
$Q_g,\ R_h,\ W,\ D$	Th. 9.4.1.1
Teilmengen:	Th. 9.4.1.1
$\triangleright G \subseteq S,\ H \subseteq T$	Th. 9.4.1.1
Funktionen:	Th. 9.4.1.1
$\triangleright r\colon S \to G,\ s\colon T \to H,\ \varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Th. 9.4.1.1
Retraktionsgleichungen:	Th. 9.4.1.1
$\triangleright \forall g \in G\, r(g) = g,\ \forall h \in H\, s(h) = h$	Th. 9.4.1.1
Hilfsfunktionen:	Th. 9.4.1.1
$u,\ U,\ f,\ \varphi^{-1}$	Th. 9.4.1.1
$\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash$	Th. 9.4.1.1
$\exists f \Big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\wedge\, \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\Big)$	
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 28.2.16.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen: $B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B \vdash$$
$$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y \coloneqq \forall z \in B \left(x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y\right)$$

Theorem 28.2.16.3 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen: $B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\diamond$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B,\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y,\ z \in B \vdash$$
$$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
4	4 $x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y$	A
5	5 $z \in B$	A
1,2,3,4	6 $\forall u \in B \left(x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y\right)$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\rightarrow E(5, \forall E(6))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.16.2
$B,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.16.2
Funktionen:	Def. 28.2.16.2
$\diamond$	Def. 28.2.16.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.16.2
$\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$	Def. 28.2.16.2
$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B \vdash$ $x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y \coloneqq \forall z \in B \left(x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y\right)$	Def. 28.2.16.2

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 28.2.16.4 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: $B,\ x,\ z$
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x \in B \vdash x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $z \in B$	A
3	4 $x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	5 $z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	6 $x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
	7 $\forall z \in B \left(x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x\right)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

1,2	$8\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 2, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.16.2
$B,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.16.2
Funktionen:	Def. 28.2.16.2
$\diamond$	Def. 28.2.16.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.16.2
$\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$	Def. 28.2.16.2
$\mathsf{HGr}(B,\diamond),\ x,y \in B \vdash$ $x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y \coloneqq \forall z \in B \left(x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y\right)$	Def. 28.2.16.2

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 28.2.16.5 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star),\ \mathsf{HGr}(B,\diamond),\ A \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\\ &\forall x,y \in A\,(x \star y = x \diamond y),\\ &\forall x \in A\left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(x)\right),\\ &\forall x,y \in A\,F(x \star y) = x \star y \vdash \mathsf{HGrIso}(F; A,\star; B,\diamond)\end{aligned}$$

Beweis.

Trägerzugriffe und Translationsprofile:

1	$1\ \mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	$2\ \mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
3	$3\ A \subseteq B$	A
4	$4\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	$5\ \forall u,v \in A\,(u \star v = u \diamond v)$	A
6	$6\ \forall u \in A\left(u \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(u)\right)$	A
7	$7\ \forall u,v \in A\,F(u \star v) = u \star v$	A

4	8	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	9	$x \in A$	A
10	10	$y \in A$	A
3,9	11	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
3,10	12	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 10)
4,9	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 9)
4,10	14	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
6,9	15	$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(x)$	$\to E(9, \forall E(6))$
6,10	16	$y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(y)$	$\to E(10, \forall E(6))$

Produktvergleich und Isomorphieschluss:

2,3,4,6,9, 10	17	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y) \wedge F(y) \diamond x = F(y) \diamond F(x)$	Th. 28.2.16.3(2, 11, 13, 15, 14)
2,3,4,6,9, 10	18	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(17)$
2,3,4,6,9, 10	19	$F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(18)
2,3,4,6,9, 10	20	$y \diamond x = F(y) \diamond x \wedge x \diamond y = x \diamond F(y)$	Th. 28.2.16.3(2, 12, 14, 16, 11)
2,3,4,6,9, 10	21	$x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(20)$
2,3,4,6,9, 10	22	$x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(21)
5,9,10	23	$x \star y = x \diamond y$	$\to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	24	$x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(23)
7,9,10	25	$F(x \star y) = x \star y$	$\to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	26	$x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(25)
2,3,4,5,6, 7,9,10	27	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	$\mathsf{Tr}.(25, 23, 21, 18)$
1,2,3,4,5, 6,7	28	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 8, 27)
1,2,3,4,5, 6,7	29	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(28, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
A, B, x, y	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 28.2.16.3
$B,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.16.3
Funktionen:	Th. 28.2.16.3
$\diamond$	Th. 28.2.16.3
$\mathsf{HGr}(B, \diamond),\ x, y \in B,\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y,\ z \in B \vdash$ $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	Th. 28.2.16.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.2.16.6 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $B,\ X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$
Funktionen: $\diamond,\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},\\ &\forall x \in X\ \exists y \in Y\ \big(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y\big),\\ &\forall y \in Y\ \exists x \in X\ \big(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\big) \vdash X \equiv^{\mathrm{tr}}_{\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}} Y\end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte Th. 28.2.16.6(H1)

$$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},$$
$$\forall x\in X\,\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big),$$
$$\forall y\in Y\,\exists x\in X\,\big(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\big)\vdash X\diamond_{\mathcal{P}}Z=Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall u\in X\,\exists v\in Y\,\big(u\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}v\big)$	A
6	6 $\forall v\in Y\,\exists u\in X\,\big(v\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}u\big)$	A
7	7 $w\in X\diamond_{\mathcal{P}}Z$	A
1,2,4,7	8 $\exists x\in X\,\exists z\in Z\,(w=x\diamond z)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1$(1,2,4)),7))$
8	9 $x\in X$	A
8	10 $z\in Z$	A
8	11 $w=x\diamond z$	A
5,8	12 $\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big)$	$\rightarrow E(9,\forall E(5))$
12	13 $y\in Y$	A
12	14 $x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y$	A
2,8	15 $x\in B$	Th. 28.2.4.2$(H2)(2,9)$
3,12	16 $y\in B$	Th. 28.2.4.2$(H2)(3,13)$
4,8	17 $z\in B$	Th. 28.2.4.2$(H2)(4,10)$
1,2,3,4,8,12	18 $x\diamond z=y\diamond z\wedge z\diamond x=z\diamond y$	Th. 28.2.16.3$(1,15,16,14,17)$
1,2,3,4,8,12	19 $x\diamond z=y\diamond z$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4,8,12	20 $w=y\diamond z$	$\mathsf{Tr}.(11,19)$
1,3,4,8,12	21 $y\diamond z\in Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$	Th. 28.2.4.2$(H3)(1,3,4,13,10)$
1,2,3,4,8,12	22 $w\in Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$	$=E(20,21)$
1,2,3,4,5,8	23 $w\in Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$	$\exists E^{*}(12\text{–}22)$
1,2,3,4,5,7	24 $w\in Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$	$\exists E^{*}(8\text{–}23)$
1,2,3,4,5	25 $X\diamond_{\mathcal{P}}Z\subseteq Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$	Th. 3.5.1.1$([7]\dot{:}24)$
26	26 $w\in Y\diamond_{\mathcal{P}}Z$	A

1,3,4,26	27	$\exists y \in Y\, \exists z \in Z\, (w = y \diamond z)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\text{Th. } 28.2.4.1(1,3,4)), 26))$
27	28	$y \in Y$	A
27	29	$z \in Z$	A
27	30	$w = y \diamond z$	A
6,27	31	$\exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31	32	$x \in X$	A
31	33	$y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	A
3,27	34	$y \in B$	Th. 28.2.4.2($H2$)(3, 28)
2,31	35	$x \in B$	Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 32)
4,27	36	$z \in B$	Th. 28.2.4.2($H2$)(4, 29)
1,2,3,4, 27,31	37	$y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38	$y \diamond z = x \diamond z$	$\wedge E1(37)$
1,2,3,4, 27,31	39	$w = x \diamond z$	$\mathsf{Tr}.(30, 38)$
1,2,4,27, 31	40	$x \diamond z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 2, 4, 32, 29)
1,2,3,4, 27,31	41	$w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42	$w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(31\text{–}41)$
1,2,3,4,6, 26	43	$w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(27\text{–}42)$
1,2,3,4,6	44	$Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5, 6	45	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Linke Mengenprodukte Th. 28.2.16.6(H2)

$$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\\ \forall x\in X\,\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right),\\ \forall y\in Y\,\exists x\in X\left(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\right)\vdash Z\diamond_{\mathcal{P}}X=Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall u\in X\,\exists v\in Y\left(u\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}v\right)$	A
6	6 $\forall v\in Y\,\exists u\in X\left(v\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}u\right)$	A
7	7 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}X$	A
1,2,4,7	8 $\exists z\in Z\,\exists x\in X\,(w=z\diamond x)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1$(1,4,2)),7))$
8	9 $z\in Z$	A
8	10 $x\in X$	A
8	11 $w=z\diamond x$	A
5,8	12 $\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right)$	$\rightarrow E(10,\forall E(5))$
12	13 $y\in Y$	A
12	14 $x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y$	A
2,8	15 $x\in B$	Th. 28.2.4.2$(H2)(2,10)$
3,12	16 $y\in B$	Th. 28.2.4.2$(H2)(3,13)$
4,8	17 $z\in B$	Th. 28.2.4.2$(H2)(4,9)$
1,2,3,4,8,12	18 $x\diamond z=y\diamond z\wedge z\diamond x=z\diamond y$	Th. 28.2.16.3$(1,15,16,14,17)$
1,2,3,4,8,12	19 $z\diamond x=z\diamond y$	$\wedge E2(18)$
1,2,3,4,8,12	20 $w=z\diamond y$	$\mathsf{Tr}.(11,19)$
1,3,4,8,12	21 $z\diamond y\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	Th. 28.2.4.2$(H3)(1,4,3,9,13)$
1,2,3,4,8,12	22 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$=E(20,21)$
1,2,3,4,5,8	23 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$\exists E^*(12\text{–}22)$
1,2,3,4,5,7	24 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$\exists E^*(8\text{–}23)$
1,2,3,4,5	25 $Z\diamond_{\mathcal{P}}X\subseteq Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	Th. 3.5.1.1$([7]\dot{:}24)$
26	26 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	A

1,3,4,26	27	$\exists z \in Z\, \exists y \in Y\, (w = z \diamond y)$	$\wedge E2(\rightarrow E($ $\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($1, 4, 3)), 26))$
27	28	$z \in Z$	A
27	29	$y \in Y$	A
27	30	$w = z \diamond y$	A
6,27	31	$\exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	$\rightarrow E(29, \forall E(6))$
31	32	$x \in X$	A
31	33	$y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	A
3,27	34	$y \in B$	Th. 28.2.4.2($H2$)(3, 29)
2,31	35	$x \in B$	Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 32)
4,27	36	$z \in B$	Th. 28.2.4.2($H2$)(4, 28)
1,2,3,4, 27,31	37	$y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38	$z \diamond y = z \diamond x$	$\wedge E2(37)$
1,2,3,4, 27,31	39	$w = z \diamond x$	$\mathsf{Tr}.(30, 38)$
1,2,4,27, 31	40	$z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 4, 2, 28, 32)
1,2,3,4, 27,31	41	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31\text{–}41)$
1,2,3,4,6, 26	43	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27\text{–}42)$
1,2,3,4,6	44	$Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5, 6	45	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Schluss:

1	1	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$\forall x \in X\, \exists y \in Y \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y\right)$	A
5	5	$\forall y \in Y\, \exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	A
1	6	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,4,5, 7	8	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.16.6($H1$) $(1, 2, 3, 7, 4, 5)$

1,2,3,4,5, 7	$9\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.16.6($H2$) $(1,2,3,7,4,5)$
1,2,3,4,5, 7	$10\ X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8,9)$
1,2,3,4,5	$11\ \forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \begin{pmatrix} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{pmatrix}$	$\forall I(\rightarrow I(7,10))$
1,2,3,4,5	$12\ X \equiv^{\mathrm{tr}}_{\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}} Y$	Def. 28.2.16.2(6, 2, 3, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28.2.16.3
$B,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.16.3
Funktionen:	Th. 28.2.16.3
$\diamond$	Th. 28.2.16.3
$\mathsf{HGr}(B,\diamond),\ x,y \in B,\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y,\ z \in B \vdash$ $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	Th. 28.2.16.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash$ $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},$ $\forall x \in X\, \exists y \in Y \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y\right),$ $\forall y \in Y\, \exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right) \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.16.6(H1)
$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},$ $\forall x \in X\, \exists y \in Y \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y\right),$ $\forall y \in Y\, \exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right) \vdash Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.16.6(H2)
Mengen:	Def. 28.2.16.2
$B,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.16.2
Funktionen:	Def. 28.2.16.2
$\diamond$	Def. 28.2.16.2
Relationsoperatoren:	Def. 28.2.16.2
$\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$	Def. 28.2.16.2
$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ x,y \in B \vdash$ $x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y \coloneqq \forall z \in B \left(x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y\right)$	Def. 28.2.16.2

2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Ein Isomorphismus zweier Halbgruppen induziert einen Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht, wie das Gegenbeispiel von Mogiljanskaja zeigt.

Die Operationen $\star_{\mathcal{P}}$ und $\diamond_{\mathcal{P}}$ bezeichnen dabei die aus $\star$ und $\diamond$ abgeleiteten Mengenprodukte gemäß Def. 28.2.4.1.

Theorem 28.2.16.7 (Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel).

Mengen: $S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f,\ F$

$$\begin{aligned}&\exists S, T\, \exists \star, \diamond \Big(\\ &\quad \mathsf{HGr}(S, \star) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ &\quad \neg \mathsf{Finite}(S) \wedge \neg \mathsf{Finite}(T) \wedge \\ &\quad \neg \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond) \wedge \\ &\quad \exists F\, \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \Big)\end{aligned}$$

Es gibt also zwei unendliche, nicht isomorphe Halbgruppen, deren Potenzhalbgruppen der nichtleeren Teilmengen isomorph sind. Die Potenzhalbgruppe bestimmt ihre Grundhalbgruppe somit im Allgemeinen nicht bis auf Isomorphie. Über den entsprechenden endlichen Fall entscheidet dieses Gegenbeispiel nicht.
Beweis: Die Lesefassung enthält die Konstruktion und den vollständigen erklärenden Beweis. Die Beweistabellen führen die Definitionen, Hilfsaussagen und Ableitungen aus; ihr konkretes Gegenbeispiel liefert die Zeugen des Existenzsatzes.

2.17 Produktquadrate mit höchstens zwei Werten

Die Potenzmenge des Produktquadrats darf im Allgemeinen nicht mit dem Produktquadrat der Potenzhalbgruppe gleichgesetzt werden. Bei einer Zweiermenge reichen jedoch die Einermengen und der ganze Träger aus.

Theorem 28.2.17.1 (Einermengen und Gesamtmenge im Potenzquadrat).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \\ &A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \\ &\qquad \wedge A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \wedge \forall a \in A^2\, (\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I($ Th. 3.5.3.1, 2))
1,2	4 $A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)

1,2	5	$A \star_{\mathcal{P}} A \neq \varnothing$	$\wedge E2($ Th. 3.16.3.1(Th. 28.2.4.2$(H1)($ $1,3,3)))$
1,2	6	$A^2 \neq \varnothing$	$= E($Th. 2.9.1.1(4), 5)
1,2	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11$(1,2)$
1	8	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	9	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2	10	$A \star_{\mathcal{P}} A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	Th. 28.2.14.8$(8, 9,$ $\wedge I(3,3))$
1,2	11	$A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$= E($Th. 2.9.1.1(4), 10)
12	12	$a \in A^2$	A
1,2	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9$(1,2)$
1,2,12	14	$a \in A$	Th. 3.5.2.6$(13,12)$
1,2,12	15	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 28.2.14.12$(1,2,$ $14)),12)$
1,2	16	$\forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$ $A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\rightarrow I(12,15))$
1,2	17	$\wedge\, A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$ $\wedge\, \forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$	$\wedge I(6, \wedge I(7, \wedge I(11,$ $16)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Def. 28.2.14.1
A	Def. 28.2.14.1
Funktionen:	Def. 28.2.14.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.14.1
Lokale Schreibweise:	Def. 28.2.14.1
A^2	Def. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.11
Funktionen:	Th. 28.2.14.11
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 28.2.14.5
A	Th. 28.2.14.5
$A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ a,b \in A \vdash a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 28.2.14.12
$A,\ a,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.12
Funktionen:	Th. 28.2.14.12
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$	Th. 28.2.14.12
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ a \in A \vdash \left(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \leftrightarrow a \in A^2\right)$	Th. 28.2.14.12

Theorem 28.2.17.2 (Bei einem zweielementigen Quadrat gibt es keine fehlenden Teilmengen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ A^2 = \{a,b\}$$
$$\vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$

Der Beweis gilt auch für $a = b$. In der Tabelle steht $D = A^2$ und $K = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$; dies sind ausschließlich Abkürzungen.

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$D = \{a,b\}$	A
1,2	4	$D \neq \varnothing \wedge K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$ $\wedge\, D \in K \wedge \forall d \in D\,(\{d\} \in K)$	Th. 28.2.17.1(1, 2)
3	5	$a \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.3)
3	6	$b \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.4)
1,2,3	7	$\{a\} \in K$	$\to E(5, \forall E(\wedge E(4)))$
1,2,3	8	$\{b\} \in K$	$\to E(6, \forall E(\wedge E(4)))$
1,2,3	9	$\{a,b\} \in K$	$= E(3, \wedge E(4))$
10	10	$X \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	A
3,10	11	$X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(3, 10)$
3,10	12	$X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	$= E$(Th. 3.19.1.5, 11)
3,10	13	$X = \{a\} \vee (X = \{b\} \vee X = \{a,b\})$	Th. 3.13.2.10(12)
14	14	$X = \{a\}$	A
1,2,3,14	15	$X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (14), 7)
16	16	$X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	A
17	17	$X = \{b\}$	A
1,2,3,17	18	$X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (17), 8)
19	19	$X = \{a,b\}$	A
1,2,3,19	20	$X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (19), 9)
1,2,3,16	21	$X \in K$	$\vee E(16, 17, 18, 19, 20)$

1,2,3,10	22 $X \in K$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 21)$
1,2,3	23 $\mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\} \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([10]:22)
1,2,3	24 $K = \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5($\wedge E(4)$, 23)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.17.1
$A,\ a$	Th. 28.2.17.1
Funktionen:	Th. 28.2.17.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.17.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$ $A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$ $\quad \wedge A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \wedge \forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$	Th. 28.2.17.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 3.19.1.5
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.5
$\mathcal{P}(\{a, b\}) \setminus \{\varnothing\} = \big\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$	Th. 3.19.1.5
Mengen:	Th. 3.13.2.10
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\!:\! x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Weiterführende Ergänzung: Nullelemente erkennen. Ein Isomorphismus nichtleerer Potenzhalbgruppen erhält die Existenz eines Nullelements, auch ohne Endlichkeitsvoraussetzung. Die Ergänzung *Nullelemente aus Potenzhalbgruppen erkennen* beweist dies unter Verwendung der Nullnotation aus Band 33: Lesefassung und Beweistabellen.

Der Hinweis ist ein Ausblick; der hier vorausgehende Aufbau verwendet den Ergänzungssatz nicht.