/ /

غازات سامه

الشقوق الحامضيه المجموعة الثانيه:

الكلوريد $Cl^-$ ← فوران ابيض ⇐ $HCl$ عديم الرائحه يعمل غيوم ابيض على الانبوبه

البروميد $Br^-$ ← برتقالى محمر ⇐ $HBr$ "ابخره سامه"

+ $H_2SO_4$ ⟵

اليوديد $I^-$ ← ابخره بنفسجيه ⇐ $HI$ ⇐ راسب بني "ابخره سامه"

النترات $NO_3^-$ ← ابخره بنيه ⇐ $NO_2$ يتفاعل بوجود النحاس.

** لازم الانبوبه تكون جافه

* لازم الحمض يكون مركز

التجربه التأكيديه

- الخواص الكيميائيه

| التجربه | الملاحظه | الاستنتاج. |
|---|---|---|
| ملح صلب + dil $HCl$ | لا يوجد تفاعل V é | المجموعه الاولى غير موجوده |
| ملح صلب + conc $H_2SO_4$ | | الشق حامضي هو ممكن ان يكون $Cl^-$ |
| ملح صلب + $AgNO_3$ | راسب ابيض | الشق الحامضي هو $Cl^-$ |
| محلول ملح + $Pb(CH_3COO)_2$ | راسب ابيض | الشق الحامضي هو $Cl^-$ |

الاسكيما الكيميا الغير العضويه

## التجارب الاساسيه المجموعه الثانيه

| التجربه | الملاحظه | النتيجه |
|---|---|---|
| ملح صلب + $H_2SO_4$ conc | فوران وتصاعد غاز (HCl) عديم اللون الذي يكون سحب بيضاء مع الزجاجه مبلله بالأمونيا او هيدروكسيد الامونيوم | الشق الحامضي احتمال ان يكون $Cl^-$ |
| ملح صلب + $H_2SO_4$ conc | فوران وتصاعد غازات برتقالي محمر يتحول المحلول للون البرتقالي لنتيجه فصل البروم | الشق الحامضي احتمال أن يكون $Br^-$ |
| ملح صلب + $H_2SO_4$ conc | تصاعد غازات بنفسجيه وتكون راسب اسود | الشق الحامضي احتمال أن يكون $I^-$ |
| ملح صلب + $H_2SO_4$ conc | غازات بنيه محمره من يلاحظ وجود نحاس | الشق الحامضي احتمال ان يكون $NO_3^-$ |

الطلبة