

## 10. gyakorlat

### Definíció: Jobb oldali hatványfüggvény

$$(x - x_k)_+^\ell := \begin{cases} (x - x_k)^\ell & \text{ha } x \geq x_k \\ 0 & \text{ha } x < x_k \end{cases}$$

### Tétel: Globális spline bázis

1. Az  $1, x, \dots, x^\ell, (x - x_1)_+^\ell, \dots, (x - x_{n-1})_+^\ell$  függvényrendszer lineárisan független  $S_\ell(\Omega_n)$ -en.
2. Bármely  $S \in S_\ell(\Omega_n)$  egyértelműen előállítható a fenti rendszerrel.
3.  $\dim S_\ell(\Omega_n) = n + \ell$

### Megjegyzés

Ezek annyiban térnek el az eddigi feladatoktól, hogy most minden intervallumra külön felírt  $P_i$  függvény helyett egy globális bázist használunk, a lineáris kombinációs együtthatókra fogjuk felírni a LER-t.

### 1. feladat

Írjuk át a 8. gyakorlat 5. feladat b) részének megoldásában az  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ ,  $x \in [-1; 1]$  másodfokú spline interpolációjaként felírt spline-t globális bázisba!

### 2. feladat

Legyen  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ ,  $x \in [-1; 1]$ . Interpoláljuk a függvényt a  $-1, 0, 1$  alappontokon a tanult globális bázisban (egyoldali hatványfüggvényekkel) másodfokú spline-nal  $f'(-1) = 0$  peremfeltétellel.

### 3. feladat

Legyen  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ ,  $x \in [0; 4]$ . Interpoláljuk a függvényt a  $0, 1, 2, 3, 4$  alappontokon a harmadfokú spline-nal, periodikus peremfeltétellel a tanult globális bázisban (egyoldali hatványfüggvényekkel).

- a) Készítsük el a LER-t a feladat megoldásához,
- b) majd oldjuk meg Matlabbal és rajzoljuk fel a spline-t és a függvényt.

**Definíció:** A legkisebb négyzetek módszerének alapfeladata

Adottak az  $x_1, \dots, x_N \in [a; b]$  különböző alappontok,  $y_1, \dots, y_N \in \mathbb{R}$  függvényértékek vagy mérési eredmények. Olyan  $p_n \in P_n$  polinomot keresünk ( $n + 1 \leq N$ , általában  $N \gg n$ ), melyre

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i))^2 \text{ minimális.}$$

A  $p_n$  polinomot *négyzetesen legjobban közelítő polinomnak* nevezzük.

**Definíció:** Legkisebb négyzetek módszere

1. Írjuk fel a  $p_n(x_i) = y_i$ , ( $i = 1, \dots, N$ ) LER-t mátrix alakban, ahol

$$p_n(x) := a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0.$$

2. Vezessük be hozzá a következő jelöléseket:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & \dots & x_N^n \end{bmatrix}_{N \times (n+1)} \quad a := \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}_{n+1 \times 1} \quad y := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}_{N \times 1}.$$

3. A kapott  $A \cdot a = y$  LER klasszikus értelemben nem oldható meg, hiszen  $N > n+1$  esetén több egyenletünk van, mint ismeretlenünk.

4. Túlhatalozott eset általánosított megoldásra a Gauss-féle normálegyenleteket kapjuk:

$$a^+ = A^+ y = (A^T A)^{-1} \cdot A^T y \quad \Leftrightarrow \quad A^T A \cdot a^+ = A^T y.$$

5. A szimmetrikus LER alakja:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \dots & \sum x_i^n \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n+1} & \dots & \sum x_i^{2n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^n y_i \end{bmatrix}.$$

Ennek a LER-nek a megoldása lesz a négyzetesen legjobban közelítő polinom együtthatói. (ld. előadás, hogy miért)

#### 4. feladat

Közelítsük a koordinátarendszer  $(-1; 1)$ ,  $(0; 2)$ ,  $(1; 2)$  pontjait négyzetesen legjobban közelítő

- a)* elsőfokú polinommal,
- b)* másodfokú polinommal,
- c)* harmadfokú polinommal.

## 1. megoldás

Mivel  $x \in [-1; 0]$  esetén

$$S(x) = P_1(x),$$

ezért a spline alakja globális bázisban:

$$S(x) = P_1(x) + \beta(x - 0)_+^2.$$

Azaz  $x \in [0; 1]$  esetén

$$P_2(x) = S(x) = P_1(x) + \beta(x - 0)_+^2,$$

így

$$P_2(x) - P_1(x) = (-x^2 + 2x) - (x^2 + 2x) = -2x^2 = \beta(x - 0)_+^2 \Rightarrow \beta = -2.$$

Tehát

$$S(x) = x^2 + 2x - 2(x - 0)_+^2.$$

### Megjegyzés

Ebben a feladatban egy intervallumonként ismert spline-nak egy másik alakját írtuk fel globális bázis elemekkel. Tehát itt nem a spline tulajdonságok ellenőrzése volt a feladat.

## 2. megoldás

### Megjegyzés

Amikor egy feladat azt kéri, hogy írjuk fel a spline-t globális bázisban, akkor általában erre a megoldási módra gondol, nem az előzőre.

A spline alakja globális bázisban:

$$S(x) = ax^2 + bx + c + \beta(x - 0)_+^2$$

$$S'(x) = 2ax + b + 2\beta(x - 0)_+$$

### Megjegyzés

Ebben az esetben csak az interpolációs és peremfeltételeket kell felírunk, hiszen a globális bázis használata biztosítani fogja a spline feltételeket.

Interpolációs feltételek:

$$S(-1) = a - b + c = -1$$

$$S(0) = c = 0$$

$$S(1) = a + b + c + \beta = 1$$

Ebből következik, hogy  $c = 0$  és  $b = a + 1$  Peremfeltétel:

$$S'(-1) = -2a + b = 0$$

Melyből az következik, hogy

$$0 = -2a + b = -2a + (a + 1) \Rightarrow a = 1, b = 2$$

$$\Rightarrow 1 = a + b + c + \beta = 1 + 2 + \beta = 1 \Rightarrow \beta = -2$$

Tehát a keresett spline:

$$S(x) = x^2 + 2x - 2(x - 0)_+^2$$

(Látható, hogy ugyan azt kaptuk, mint az előző feladatnál.)

#### Megjegyzés

Ezt a globális bázisban megadott spline-t is fel lehet írni intervallumonkénti polinom alakban, csak az egyoldali hatványfüggvények definícióját kell pontosan ismerni hozzá.

### 3. megoldás

a) A spline alakja:

$$S(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d + \beta_1(x - 1)_+^3 + \beta_2(x - 2)_+^3 + \beta_3(x - 3)_+^3$$

$$S'(x) = 3ax^2 + 2bx + c + 3\beta_1(x - 1)_+^2 + 3\beta_2(x - 2)_+^2 + 3\beta_3(x - 3)_+^2$$

$$S''(x) = 6ax + 2b + 6\beta_1(x - 1)_+ + 6\beta_2(x - 2)_+ + 6\beta_3(x - 3)_+$$

(7 ismeretlen)

#### Megjegyzés

Annyi jobboldali hatványfüggvény kell, ahány függvényre bontanánk szét a spline-t minusz egy, az  $x_1, \dots, x_{n-1}$  alappontokhoz tartozóak.

Interpolációs feltétel:

- (1)  $S(0) = d = 0$
- (2)  $S(1) = a + b + c + d = 1$
- (3)  $S(2) = 8a + 4b + 2c + d + \beta_1 \cdot 1^3 = 0$
- (4)  $S(3) = 27a + 9b + 3c + d + \beta_1 \cdot 2^3 + \beta_2 \cdot 1^3 = -1$
- (5)  $S(4) = 64a + 16b + 4c + d + \beta_1 \cdot 3^3 + \beta_2 \cdot 2^3 + \beta_3 = 0$

Periodikus peremfeltétel:

- (6)  $S'(0) = S'(4) : \quad c = 3a \cdot 4^2 + 2b \cdot 4 + c + 3\beta_1 \cdot 3^2 + 3\beta_2 \cdot 2^2 + 3\beta_3 \cdot 1^2$
- (7)  $S''(0) = S''(4) : \quad 2b = 6a \cdot 4 + 2b + 6\beta_1 \cdot 3 + 6\beta_2 \cdot 2 + 6\beta_3 \cdot 1$

melyekből következik, hogy

- (6)  $48a + 8b + 27\beta_1 + 12\beta_2 + 3\beta_3 = 0$
- (7)  $24a + 18\beta_1 + 12\beta_2 + 6\beta_3 = 0$

Ez LER-ként felírva:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 8 & 1 & 0 \\ 64 & 16 & 4 & 1 & 27 & 8 & 1 \\ 48 & 8 & 0 & 0 & 27 & 12 & 3 \\ 24 & 0 & 0 & 0 & 18 & 12 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Lásd: gyakorlathoz kapcsolódó gyak10.mlx fájl.

#### 4. megoldás

a) Keresett polinom alakja:  $P_1(x) = p_1x + p_0$ .

Ebből felírt LER:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ez nem megoldható.  $\text{rang}(A) = 2$ , túlhatározott eset.

$$N = 3, \quad \sum x_i = 0, \quad \sum x_i^2 = 2, \quad \sum y_i = 5, \quad \sum x_i y_i = 1$$

Így:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Amely megoldása:  $p_0 = \frac{5}{3}, p_1 = \frac{1}{2}$ . Tehát:  $P_1(x) = \frac{1}{2}x + \frac{5}{3}$ .

b) Klasszikus értelemben megoldható LER  $\rightarrow$  interpoláció.

Keresett polinom alakja:  $P_2(x) = p_2x^2 + p_1x + p_0$ .

Ebből felírt LER:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ez megoldható és ennek megoldása:  $p_2 = -\frac{1}{2}, p_1 = \frac{1}{2}, p_0 = 2$ . Tehát a keresett polinom:  $P_2(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 2$  (Ez át fog menni a pontokon.)

c) Keresett polinom alakja:  $P_2(x) = p_3x^3 + p_2x^2 + p_1x + p_0$ .

Ebből felírt LER ( $Ax^+ = b$  alakú):

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$\text{rang}(A) = 3$ , alulhatározott eset, azaz végtelen sok megoldás van.

$x^+$  a legkisebb normájú megoldás

$$AA^T y = b \text{ és } x^+ = A^T y$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Gauss eliminációt használva számoljuk ki az  $y$ -t:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3/4 & 1 & 7/4 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4/3 & 7/3 \\ 0 & 0 & 8/3 & -1/3 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$y_3 = -\frac{1}{8}, \quad y_2 = \frac{5}{2}, \quad y_1 = -\frac{3}{8}$$

És így

$$x^+ = A^T y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{3}{8} \\ \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Tehát a keresett polinom:  $P_3(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + 2$ .